LIBRARY OF

Dr. Z. P. Metcalf

1885–1956

GENRE NYMPHALE.

CARACTÈRES DU GENRE.

Antennes terminées en une petite massue alongée; longueur des palpes inférieurs ne surpassant pas notablement celle de la tête; cellule discoïdale ou centrale des secondes ailes ouverte en arrière, mais se rétrécissant vers son milieu. Chenilles n'ayant que quelques épines ou quelques tubercules, avec l'extrémité postérieure du corps plus ou moins fourchue.

1. *Massue des antennes formée presqu'insensiblement, grêle, cylindrico-obconique.*

A. *Ailes supérieures alongées, les inférieures larges.*

Le genre Neptis de Fabricius. (Pap. *Aceris*, *lucilla*, etc.)

2. *Massue des antennes formée brusquement, épaisse, en forme de cône renversé ou alongé.*

Le genre Apatura de Fabricius. (Pap. *Iris*, *ilia*, *Bolina*, etc.)

Le genre Paphia du même. (Pap. *Jasius*, *Stelenes*, *Chiron*, etc.)

ESPÈCES.

A. Bord postérieur des premières ailes plus ou moins concave. Bord correspondant des secondes avec deux queues extérieures, linéaires et aiguës.

1. Nymphale Jasius.

Ailes supérieures ayant de part et d'autre une raie maculaire, et le bord postérieur, fauves : dessous des quatre ferrugineux vers la base, avec des anneaux, et une bande, blancs.

2. Nymphale Pélias.

Dessus des quatre ailes avec une bande sur le milieu, et des points à l'extrémité, fauves : dessous ferrugineux vers la base, avec des anneaux, et une bande, blancs.

3. Nymphale Brutius.

Dessus des ailes avec une bande blanche sur le milieu : dessous ferrugineux vers la base, avec des anneaux, et une bande, blancs.

4. Nymphale Castor.

Dessus des ailes fauve, avec le limbe postérieur largement noir : dessous ferrugineux vers la base, avec des anneaux, et une bande, blancs.

5. Nymphale Pollux.

Dessus des ailes avec une bande fauve sur le milieu : dessous noir, avec des anneaux, et une bande, d'un blanc-verdâtre.

6. Nymphale Eudoxe.

Dessus des ailes avec une bande sur le milieu, et des taches à l'extrémité, fauves : dessous ferrugineux vers la base, avec des anneaux argentés ; ailes inférieures seulement avec une bande blanche.

NYMPHALE. (Insecte.)

7. Nymphale Lucrétius.

Dessus des ailes avec deux bandes fauves, maculaires: dessous ferrugineux, avec quelques anneaux bleuâtres vers la base; inférieures avec une raie grise, postérieure et transversale.

8. Nymphale Fabius.

Dessus des ailes avec une bande sur le milieu, et des points à l'extrémité, jaunes : dessous d'un cendré-luisant, avec des ondes noires à la base.

9. Nymphale Anticlée.

Dessus des ailes avec une bande fauve, terminale : bande des supérieures maculaire et plus courte, bande des inférieures offrant quatre petits yeux.

10. Nymphale Candiope.

Dessus des ailes d'un jaune-roussâtre, avec l'extrémité tachetée de noir et de fauve : dessous avec l'origine de la côte d'un vert-pomme-luisant.

11. Nymphale Athamas.

Ailes avec une bande discoïdale d'un vert-blanchâtre, presque transparente, et bordée extérieurement en dessous par des lunules ferrugineuses.

12. Nymphale Sempronius.

Ailes avec deux queues, blanches, ayant le bord noir et ponctué de blanc. Fab.

13. Nymphale Horatius.

Ailes dentées, ayant deux queues, noires : extrémité des inférieures d'un rouge-sanguin, avec des points oculaires noirs. Fab.

14. Nymphale Tiridate.

Dessus des ailes d'un bleu-noir, avec des lunules d'un jaune d'ocre sur la tranche du bord terminal: moitié postérieure des quatre ponctuée de bleuâtre.

15. Nymphale Thurius.

Dessus des ailes d'un bleu-noir, avec des lunules d'un jaune d'ocre sur la tranche du bord terminal: milieu des supérieures avec des points, celui des inférieures avec une large bande, bleuâtres.

16. Nymphale Œclus.

Dessus des ailes d'un bleu-noir : dessous d'un bleu-cendré et ondé de noir, avec une tache fauve à l'angle de l'anus.

17. Nymphale Éthéocle.

Dessus des ailes d'un vert-noir; dessous brunâtre : leurs deux surfaces avec une bande blanche, discoïdale.

18. Nymphale Éphyra.

Dessus des ailes d'un noir-brun, avec des points verdâtres sur le bord postérieur des premières, et des lunules blanches sur le bord correspondant des secondes.

19. Nymphale Étésipe.

Dessus des ailes d'un bleu-noir; dessous marbré de blanc, de noir et de ferrugineux : leurs deux surfaces avec une bande blanche discoïdale.

20. Nymphale Éthéta.

Dessus des ailes d'un noir-bleu, avec des taches d'un bleu-pâle sur la moitié postérieure : dessous marbré de blanc, de noir et de ferrugineux.

21. Nymphale Bérénice.

Dessus des ailes noir, avec une bande rousse, commune : dessous des inférieures tacheté de blanc, de jaune et de ferrugineux.

22. Nymphale Pyrrhus.

Dessus des ailes d'un noir-brun, avec la base d'un jaune d'ocre pâle : les inférieures avec une double rangée de lunules bleuâtres.

NYMPHALE. (Insecte.)

23. Nymphale Nisus.

Dessus des ailes d'un noir-brun : les inférieures d'un bleu-pâle avant le bord, avec des points oculaires et une bande blanche.

24. Nymphale Solon.

Ailes en queue, noires, avec une bande jaunâtre, et la base obscure. Fab.

25. Nymphale Xipharès.

Dessus des ailes noir : milieu des supérieures avec des taches blanches, milieu des inférieures avec une bande jaune, dentée en dehors.

26. Nymphale Miltiade.

Ailes en queue, d'un brun-obscur; les inférieures avec une tache blanche : dessous des quatre avec une bande blanche, commune, et un seul œil. Fab.

B. Bord postérieur des premières ailes plus ou moins concave. Bord correspondant des secondes avec une queue extérieure, linéaire, aiguë, et la dent qui précède l'angle anal obtuse et un peu plus prononcée que les autres.

27. Nymphale Achéronta.

Dessus des ailes supérieures roux à la base, noir et tacheté de blanc à l'extrémité : inférieures d'un ferrugineux-obscur, avec un point noir.

C. Bord postérieur des premières ailes concave, et plus ou moins tronqué au sommet. Bord correspondant des secondes avec deux queues linéaires, dont l'une anale et courbée du côté du corps; l'autre extérieure, oblique, beaucoup plus longue, et obtuse à son extrémité.

28. Nymphale Thétis.

Dessus des ailes fauve, avec trois raies noires, transverses, communes, droites : dessous glacé de blanc-verdâtre, avec une ligne transverse et discoïdale, puis une rangée de points oculaires.

29. Nymphale Pellénis.

Dessus des ailes fauve, avec deux lignes noires, transverses, communes; la postérieure des supérieures anguleuse : dessous glacé de blanc-verdâtre, avec une ligne transverse et discoïdale, puis une rangée de points oculaires.

30. Nymphale Astina.

Ailes en queue, d'un brun-obscur, avec un espace fauve, discoïdal et commun : les supérieures avec une lunule noire. Fab.

31. Nymphale Corésie.

Dessus des ailes d'un noir-brun, avec la base et une double bande postérieure d'un ferrugineux-purpurin : dessous avec la moitié antérieure très-blanche et bordée en dehors par une ligne ferrugineuse, dentée.

32. Nymphale Chiron.

Dessus des ailes d'un noir-brun, avec quatre bandes communes d'un brun-tanné : dessous avec la moitié antérieure d'un gris de perle et bordée en dehors par une bande blanche.

33. Nymphale Thémistocle.

Dessus des ailes d'un noir-brun, avec quatre bandes communes d'un brun-tanné : dessous d'un brun-violet, avec une rangée postérieure de points noirâtres.

34. Nymphale Dioné.
(*Voyez pag.* 292, *n°.* 12.)

35. Nymphale Corinne.
(*Voyez page* 291, *n°.* 11.)

36. Nymphale Furcula.

Dessus des ailes fauve à la base, ensuite noir et glacé de bleu : dessous d'un ferrugineux-luisant, avec deux lignes noires, transverses et ondulées.

NYMPHALE. (Insecte.)

D. Bord postérieur des premières ailes concave. Bord correspondant des secondes avec deux queues, dont l'une anale, très-courte et arrondie; l'autre extérieure, oblique, dilatée en angle vers l'origine de son côté interne, un peu courbe et rétrécie à son extrémité.

37. Nymphale Orsiloque.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre, avec deux bandes transverses d'un gris de perle : dessous d'un gris de perle, avec des bandes fauves.

38. Nymphale Crithon.

Ailes en queue, d'un brun-noirâtre en dessus, d'un gris-violâtre en dessous : une bande blanche sur chaque surface. Fab.

E. Bord postérieur des premières ailes peu concave ou presque droit. Bord correspondant des secondes avec deux queues, dont l'une anale, très-courte et arrondie; l'autre extérieure, oblique, linéaire et aiguë.

39. Nymphale Camillus.

Ailes blanches de part et d'autre, avec des bandes transverses roussâtres et bordées de brun.

40. Nymphale Thyoné.

Ailes fauves de part et d'autre, avec plusieurs lignes transverses d'un brun-noirâtre : les 4e., 6e. et 8e. lignes des secondes ailes légèrement bordées de blanc.

41. Nymphale Hylas.

Ailes fauves ou blanches de part et d'autre, avec des lignes transverses et le bord d'un brun-noirâtre : deux points à l'angle interne.

42. Nymphale Périandre.

Ailes blanches de part et d'autre, avec six lignes transverses roussâtres, le bord postérieur brun et rayé de blanc.

43. Nymphale Coclès.

Ailes un peu en queue (avec deux queues), rayées de blanc et de jaunâtre, et ayant une bande blanche sur le milieu : dessous des inférieures avec une rangée de points oculaires. Fab.

F. Bord postérieur des premières ailes dilaté en angle vers son milieu. Bord correspondant des secondes tronqué presque carrément vers l'angle de l'anus, et ayant une queue extérieure, oblique, assez longue, arrondie à son extrémité.

44. Nymphale Hippona.

Dessus des ailes noir : supérieures variées de fauve et de jaune; inférieures avec une rangée de points blancs vers l'angle de l'anus.

G. Bord postérieur des premières ailes plus ou moins concave. Bord correspondant des secondes tronqué presque carrément vers l'angle de l'anus, et ayant une queue extérieure, oblique, obtuse ou arrondie à son extrémité.

α. Bord interne des premières ailes sans échancrure.

45. Nymphale Clytemnestre.

Ailes d'un noir-brun : les deux surfaces des supérieures avec une bande d'un jaune d'ocre sur le milieu : dessous des quatre ayant des taches argentées vers la base.

46. Nymphale Décius.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre, avec une bande blanche, commune, sur le milieu : inférieures rousses vers l'angle anal, avec des yeux et deux points violets.

47. Nymphale Érota.

Ailes un peu en queue, d'un brun-noirâtre, avec des ondes plus foncées et une bande blanche commune sur le milieu : inférieures avec deux yeux en dessus et en dessous. Fab.

NYMPHALE. (Insecte.)

48. Nymphale Véranès.

Dessus des ailes blanc et sans taches à la base ; ferrugineux à l'extrémité, avec des points fauves et des points noirâtres.

49. Nymphale Lycurgue.

Dessus des ailes d'un bleu-noir, avec une rangée de lunules d'un bleu-pâle sur le limbe postérieur : dessous des inférieures avec des points blancs, marginaux.

50. Nymphale Portia.

Ailes dentelées, fauves en dessus, avec une ligne anguleuse et le limbe postérieur d'un brun-noirâtre : dessous gris, avec des points noirs vers la queue des inférieures.

51. Nymphale troglodyte.

Ailes dentées et en queue, rousses, avec une ligne transverse et le bord postérieur d'un brun-noirâtre. Fab.

52. Nymphale Ryphea.

Ailes entières, d'un brun-noirâtre, à reflet violet en dessus, avec deux bandes souci sur les premières, et une tache presque discoïdale de cette couleur sur les secondes.

53. Nymphale Nésée.

Ailes entières, d'un brun-noirâtre en dessus : supérieures avec un reflet violet et deux bandes souci, inférieures sans taches.

β. Bord interne des premières ailes avec une échancrure plus ou moins profonde, au moins dans les mâles.

54. Nymphale Hélié.

Ailes dentées, d'un brun-tanné en dessus : extrémité des supérieures noirâtre, avec des taches d'un jaune d'ocre et disposées en une bande anguleuse.

55. Nymphale Halice.

Ailes entières, rousses en dessus : moitié postérieure des supérieures d'un noir-bleu, avec une bande très-blanche, anguleuse, interrompue dans son milieu.

56. Nymphale Pléione.

Ailes dentées, fauves en dessus, avec le sommet des supérieures noir : dessous réticulé de ferrugineux, et offrant sur le milieu une raie brune transversale.

57. Nymphale Éribote.

Ailes entières, fauves ou ferrugineuses en dessus, avec un reflet violet à la base : inférieures ayant de part et d'autre des points marginaux presqu'ocellés.

58. Nymphale Polycarme.

Ailes entières, noires en dessus, brunes en dessous, sans taches. Fab.

59. Nymphale Laertia.

Ailes entières, d'un brun-noirâtre en dessus, avec la base glacée de violet : dessous des supérieures avec des points blancs, marginaux.

60. Nymphale Morvus.

Ailes entières, noires en dessus, avec la base glacée de bleu-verdâtre : dessous des supérieures sans taches au bord terminal.

61. Nymphale Octavius.

Ailes en queue, noires, avec une bande verte, courte : dessous gris, avec une ligne brune, transversale. Fab.

H. Bord postérieur des premières ailes plus ou moins concave. Angle anal des secondes prolongé et replié en dessous.

γ. Bord interne des premières ailes sans échancrure.

NYMPHALE. (Insecte.)

62. Nymphale Orion.

Ailes entières, d'un noir-brun en dessus : supérieures avec une bande longitudinale, inférieures avec la base, fauves; bord postérieur des quatre blanchâtre de part et d'autre.

63. Nymphale? Cocyte.

Ailes en faulx, noires en dessus, avec le bord postérieur cendré. Fab.

64. Nymphale Odin.

Ailes entières, uniangulées, obscures: inférieures offrant de part et d'autre une couple de points noirs presqu'ocellés. Fab.

65. Nymphale Mycérine.

Dessus des ailes d'un noir-violet, avec une bande commune d'un bleu-ardoisé : dessous des supérieures avec deux points ocellés à la base.

66. Nymphale posthume.

Ailes en faulx, entières, d'un brun-noirâtre, avec le disque bleu : dessous des inférieures gris et sans taches. Fab.

67. Nymphale Cymodoce.

Dessus des ailes d'un brun-obscur, avec un reflet bleu à la base : angle anal des inférieures offrant de part et d'autre un seul œil.

68. Nymphale Égeste.

Ailes entières, fauves en dessus, avec le bord postérieur des quatre et le milieu des inférieures d'un brun-obscur : dessous d'un brun-incarnat, avec une ligne ferrugineuse, commune.

69. Nymphale Bisaltide.

Dessus des ailes fauve, avec l'extrémité des supérieures noire et ponctuée de blanc de part et d'autre : dessous des supérieures avec deux yeux peu prononcés, dessous des inférieures avec trois.

b. Bord interne des premières ailes avec une échancrure, du moins dans les mâles.

70. Nymphale Itys.

Dessus des ailes fauve : supérieures avec une bande blanchâtre, anguleuse, vers l'extrémité : dessous des inférieures d'un bleu-pâle à la base.

71. Nymphale Isidora.

Dessus des ailes fauve, avec une tache sur la côte, et le sommet des supérieures, noirâtres : dessous des inférieures avec des points oculaires sur le bord terminal.

72. Nymphale Marthésius.

Ailes entières, noires en dessus, avec une rangée postérieure de points blancs : base des supérieures largement fauve.

73. Nymphale Roger.

Ailes entières, noires en dessus, avec deux bandes sur les supérieures, et une tache sur le milieu des inférieures, d'un rouge-vermillon : dessous varié de grisâtre et de ferrugineux.

I. Bord postérieur des premières ailes droit, ou à peine convexe. Angle anal des secondes prolongé et obtus.

74. Nymphale Dircé.

Ailes d'un brun-obscur : supérieures offrant de part et d'autre une bande jaune : dessous des quatre rayé de blanchâtre.

75. Nymphale Phorcis.

Ailes dentées, d'un brun-obscur, sans taches en dessus : dessous avec quelques lignes noires, transverses, et en outre deux points gris aux inférieures.

K. Bord terminal des ailes supérieures droit, ou à peine concave. Ailes inférieures alongées dans le sens de la longueur du corps.

NYMPHALE. (Insecte.)

76. Nymphale Mésentéria.

Ailes dentelées, d'un brun-noirâtre : dessus des supérieures avec une bande fauve, transverse, bifide; leur dessous jaunâtre à la base, avec des points d'un bleu-luisant.

77. Nymphale Cocala.

Ailes dentelées, d'un brun-noirâtre en dessus, avec une bande transverse sur le milieu : bande des supérieures fauve, bifide; bande des inférieures blanche.

78. Nymphale Phliassa.

Ailes dentelées, d'un brun-noirâtre en dessus, avec une bande blanche sur le milieu : bande des supérieures courte, se perdant dans une bande fauve échancrée en un seul endroit de son côté interne; bande des inférieures terminée en pointe à l'angle de l'anus.

79. Nymphale Cythéréa.

Ailes dentelées, d'un brun-noirâtre en dessus, avec une bande blanche, discoïdale, pointue à ses extrémités : bande des supérieures courte, s'alignant immédiatement à une bande fauve dont le côté interne est entier.

80. Nymphale Iphicla.

Ailes dentelées, d'un brun-noirâtre en dessus, avec une bande blanche, discoïdale, arrondie à son extrémité antérieure, pointue à l'extrémité opposée : sommet des supérieures avec une tache fauve, solitaire.

81. Nymphale Mythra.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre, avec une bande blanche, discoïdale, pointue à chaque extrémité : sommet des supérieures avec une tache orangée : dessous des quatre d'un jaune-fauve, avec une bande et des lignes blanches, transversales.

L. Bord postérieur des premières ailes plus ou moins concave, ou tronqué au sommet. Bord correspondant des secondes ayant, au moins dans les mâles, l'une des trois dents postérieures plus prononcée que les autres.

a. Dernière dent des secondes ailes plus prononcée que les autres.

82. Nymphale Syma.

Ailes dentées, d'un brun-noirâtre en dessus, avec une bande blanche, commune : sommet des supérieures avec une tache orangée : dessous des quatre ferrugineux, avec plusieurs raies blanches, transversales.

83. Nymphale Fatime.

Ailes un peu en queue, d'un noir enfumé, avec une bande jaune (fauve), commune, mais plus courte aux inférieures : milieu de ces dernières avec des taches rousses. Fab.

84. Nymphale Libérie.

Ailes dentées, fauves en dessus, avec le sommet des supérieures brunâtre : dessous des inférieures avec une rangée discoïdale de quatre points oculaires.

85. Nymphale Bella.

Dessus des ailes fauve, avec le sommet des supérieures noir et tacheté de blanc : dessous des inférieures réticulé de gris, et offrant quatre yeux.

86. Nymphale Laurence.

Dessus des ailes noir, avec une bande commune d'un bleu-verdâtre-luisant : dessous des inférieures d'un gris-argenté, avec un point obscur à la base.

87. Nymphale Laure.

Dessus des ailes noir, avec une bande sur le milieu : bande des supérieures fauve, interrompue; bande des inférieures blanche et environnée d'un reflet bleu.

NYMPHALE. (Insecte.)

88. Nymphale Thoé.

Ailes ayant de part et d'autre une bande blanche, commune, et un œil sans prunelle : dessous des inférieures d'un gris-argenté.

89. Nymphale Pavon.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre, avec deux bandes plus claires : sommet des supérieures avec une tache fauve : dessous des inférieures avec trois points bleuâtres, oculaires.

90. Nymphale Vacuna.

Ailes dentelées, d'un brun-noirâtre en dessus (avec un reflet violet dans le mâle) : supérieures offrant de part et d'autre une bande souci : dessous des inférieures avec un point bleu oculaire.

91. Nymphale Agathis.

Ailes dentelées, d'un brun-noirâtre en dessus (avec un reflet violet dans le mâle) : supérieures ayant de part et d'autre au sommet deux raies blanches, transverses, maculaires : dessous des inférieures sans yeux.

92. Nymphale Zunilda.

Ailes dentelées, d'un brun-noirâtre en dessus (avec un reflet violet dans le mâle) : supérieures ayant de part et d'autre au sommet deux raies blanches, transverses, maculaires : dessous des inférieures avec deux points bleus, oculaires.

β. Avant-dernière dent des secondes ailes plus prononcée que les autres.

93. Nymphale Gélanie.

Ailes dentées, d'un brun-noirâtre, ayant de part et d'autre une bande blanche, commune : dessous offrant à la base des taches ferrugineuses entourées de blanc.

δ. Anté-pénultième dent des secondes ailes plus prononcée que les autres.

94. Nymphale Acilia.

Ailes dentées, d'un brun-noirâtre, avec des lignes grises, transverses, une bande blanche, commune, et une rangée postérieure d'yeux sans prunelle.

95. Nymphale Stélénès.

Ailes offrant de part et d'autre deux bandes vertes, pâles, dont l'antérieure des inférieures entière : dessous des supérieures marqué au milieu de la côte d'un Z bleuâtre.

96. Nymphale Épaphéa.

Ailes d'un brun-tanné de part et d'autre, avec une bande blanche, commune : moitié postérieure des supérieures fauve en dessus.

97. Nymphale Symachia.

Ailes d'un brun-noirâtre, ayant en dessus une bande blanche, commune, et en dessous quatre bandes rousses, avec autant de bandes blanches.

98. Nymphale Typha.

Ailes dentées, d'un noir-brun, avec une bande commune en dessus, le disque de la base en dessous, blancs : disque des supérieures divisé par une raie.

99. Nymphale Néérea.

Ailes dentées, d'un noir-brun, avec une bande commune en dessus, le disque de la base en dessous, d'un vert-pâle : disque des supérieures non divisé.

100. Nymphale Lamina.

Ailes dentées, d'un noir-brun, ayant de part et d'autre une bande blanche, commune, et deux rangées transverses de lunules bleues : dessous tacheté de roux.

NYMPHALE. (Insecte.)

101. Nymphale Ursule.

(*Voyez* Pap. Éphestion, *pag.* 42, *n°.* 51 de la première partie.)

102. Nymphale Oisis.

Ailes dentées, noires en dessus (glacées de bleu dans le mâle), avec trois raies blanches, maculaires, transversales, dont l'antérieure et la suivante coupant l'abdomen.

103. Nymphale Sylvina.

Dessus des ailes varié de noir et de jaunâtre, dessous verdâtre : supérieures ayant de part et d'autre une bande blanche, transverse, maculaire.

104. Nymphale Opis.

Dessus des ailes d'un brun-obscur, avec une bande commune, et des caractères, d'un jaune d'ocre : supérieures avec une rangée transverse de points blancs.

105. Nymphale Cupavius.

Ailes d'un noir-brun : dessus et dessous des supérieures avec deux bandes blanches, maculaires; surfaces correspondantes des inférieures avec le milieu d'un jaune d'ocre.

106. Nymphale Iapis.

Ailes sinuées, d'un noir-brun en dessus, d'un brun-tanné-clair en dessous, avec une bande postérieure d'un blanc-bleuâtre sur chaque surface.

107. Nymphale ? Cocyta.

Ailes inégalement dentées, d'un brun-noirâtre : extrémité des inférieures bleuâtre. Fab.

108. Nymphale ? Monime.

Ailes dentées, noirâtres : inférieures brunes, avec l'angle anal bleuâtre et divisé transversalement par une ligne noire. Fab.

M. Bord postérieur des premières ailes plus ou moins concave, ou tronqué au sommet. Bord correspondant des secondes arrondi.

109. Nymphale Acouthéa.

Dessus des ailes d'un brun-obscur, dessous d'un gris de perle à l'extrémité : leurs deux surfaces offrant une bande blanche, commune et très-anguleuse.

110. Nymphale Péléa.

Ailes dentées, d'un brun-obscur : supérieures avec des taches blanches et des taches noires en fer de flèche : dessous des quatre cendré, avec des lunules noires.

111. Nymphale Althéa.

Ailes dentées, d'un brun-obscur en dessus, avec une bande crénelée, et une ligne anguleuse, blanches : dessous avec une ligne ferrugineuse, commune et discoïdale.

112. Nymphale Alciméda.

Ailes dentées, d'un noir-brun en dessus, avec une bande crénelée, et une ligne ponctuée, blanches : des taches fauves sur le bord terminal des inférieures.

113. Nymphale Amphicéda.

Ailes blanches, avec le bord postérieur ondé de noir en dessus : leur dessous offrant à la base des caractères, et sur le milieu une ligne commune, d'un brun-obscur.

114. Nymphale Sangaris.

Dessus des ailes d'un rouge-vermillon, avec des points noirs sur le limbe postérieur : dessous d'un brun-tanné-clair, avec une ligne ferrugineuse, commune et discoïdale.

NYMPHALE (Insecte.)

115. Nymphale Discouthéa.

Dessus des ailes d'un bronzé-pâle, avec la base, et une ligne transverse et maculaire à l'extrémité, obscures : supérieures ayant vers la côte une ligne transverse de taches blanches.

116. Nymphale Alphéda.

Dessus des ailes d'un vert-bronzé, dessous d'un vert-blanchâtre : chaque surface offrant à la base des caractères, et à l'extrémité deux lignes flexueuses, obscures.

117. Nymphale Arcadius.

Ailes entières : supérieures noires, tachetées de bleu et de blanc; inférieures d'un brun-obscur : dessous (des quatre) brun. Fab.

118. Nymphale Véronique.

Dessus des ailes d'un vert-violâtre, avec des raies transverses, et le bord postérieur, obscurs : dessous avec une ligne commune de points blancs.

119. Nymphale Æthiopa.

Dessus des ailes d'un bleu-violet, avec le bord postérieur noir : sommet des supérieures offrant de part et d'autre une ligne trasverse de points blancs.

120. Nymphale Honorius.

Ailes entières, bleues : supérieures ayant le sommet noir, avec la côte brune; inférieures ponctuées de noir à la base, rayées à l'extrémité. Fab.

121. Nymphale Cyrna.

Dessus des ailes d'un bleu-verdâtre : dessous jaunâtre, avec deux lignes transverses, dont l'une maculaire, l'autre ondulée, noirâtres.

122. Nymphale Atlita.

Ailes dentées, d'un brun-noirâtre, avec un reflet bleu : dessous fauve, avec des raies violâtres, ondulées; cinq yeux sans prunelle aux inférieures. Fab.

123. Nymphale Guidie.

Ailes d'un brun-tanné : les deux surfaces des supérieures avec une bande, et des points au sommet, blancs; dessus des inférieures avec une bande fauve, tachetée de noir.

124. Nymphale Doriclée.

Ailes d'un brun-jaunâtre, et ayant en dessus deux lignes transverses de points noirs : dessous des inférieures avec un point noir à la base.

125. Nymphale Lysandra.

Ailes entières, d'un brun-jaunâtre, ayant en dessus deux lignes de points noirs, et en dessous une seule ligne de points blancs.

126. Nymphale Augé.

Dessus des ailes d'un brun-jaunâtre : supérieures avec trois raies vertes, transversales; inférieures avec une rangée de points noirs.

127. Nympale Hespérus.

Ailes sinuées, obscures, ondées de noir : supérieures avec quatre points blancs. Fab.

128. Nymphale Chrémès.

Ailes entières, obscures : inférieures rousses, avec des bandes noires en dessus, un point blanc central en dessous. Fab.

NYMPHALE. (Insecte.)

129. Nymphale Mirus.

Ailes sinuées, obscures, avec de légères bandes d'un brun-tanné : dessous des inférieures obscur à la base, varié à l'extrémité. Fab.

130. Nymphale Méléagris.

Dessus des ailes d'un brun-obscur, dessous d'un jaune-fauve : leurs deux surfaces avec une multitude de points blancs.

131. Nymphale Dédale.

Ailes entières : leur dessus d'un brun-obscur, avec une multitude de points blancs : leur dessous d'un brun-pâle et sans taches.

132. Nymphale Mélantha.

Ailes dentées, d'un brun-obscur en dessus, avec des points blancs : leur dessous brun. Fab.

133. Nymphale Marthe.

Ailes dentées, variées de brun et de fauve : supérieures avec trois rangées de lunules, inférieures avec une bande, blanches. Fab.

134. Nymphale Absalon.

Ailes entières, fauves, fasciées de brun : leur dessous orangé, avec des ondes obscures. Fab.

135. Nymphale Amulia.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre, sans taches : dessous d'un jaune-fauve, avec trois raies transverses, plus une rangée de points, bleues et marquées de noir.

136. Nymphale Haquinus.

Ailes presqu'entières, d'un brun-noirâtre : leur dessous orangé, avec des taches d'un bleu-argentin, et marquées de noir. Fab.

137. Nymphale Amasia.

Dessus des ailes d'un vert-argentin, avec l'extrémité plus foncée : dessous d'un vert-pré, avec des points noirs oculaires le long du bord postérieur.

138. Nymphale Démétra.

Ailes entières, d'un brun-obscur en dessus, avec des bandes plus obscures, mais peu prononcées : dessous d'un vert-blanchâtre, avec le bord du sommet des supérieures blanc.

139. Nymphale Argénissa.

Ailes entières, d'un bleu-bronzé en dessus, d'un vert-obscur en dessous, et ayant de part et d'autre cinq lignes noires, transverses, ondulées.

140. Nymphale Médon.

Ailes dentées, d'un noir-bronzé en dessus : supérieures avec une bande oblique, inférieures avec le milieu, d'un vert-doré ou bleuâtre.

141. Nymphale Francine.

Ailes dentées, d'un noir-bronzé en dessus : supérieures avec une bande jaunâtre et oblique; inférieures avec le milieu, et des taches marginales, d'un vert-bleuâtre.

142. Nymphale Erithonius.

Ailes dentées, d'un brun-noirâtre en dessus : inférieures offrant une bande d'un bleu-violâtre, et dilatée vers l'angle de l'anus.

143. Nymphale Narva.

Ailes dentées, noires, avec une rangée postérieure de points blancs : supérieures avec des taches, inférieures avec le milieu, jaunes.

NYMPHALE. (Insecte.)

144. Nymphale Perséa.

Ailes dentées, noires de part et d'autre, avec un espace discoïdal et commun d'un fauve-briqueté : supérieures avec deux taches et une bande, inférieures avec des points marginaux, d'un jaune d'ocre.

145. Nymphale Eléus.

Ailes dentées, d'un fauve-briqueté de part et d'autre, avec l'extrémité d'un noir-bronzé : supérieures avec une bande, inférieures avec un simple cordon de points, blancs.

146. Nymphale Janaïs.

Ailes un peu dentées, noires : supérieures ponctuées de blanc de part et d'autre : dessus des inférieures avec le milieu rouge ; leur dessous jaune à la base, avec des points noirs.

147. Nymphale Sémire.

Ailes un peu dentées, d'un brun-obscur, et ayant de part et d'autre une bande verte, interrompue : inférieures tachetées de ferrugineux vers l'angle de l'anus : dessous des quatre jaune à la base, avec des points noirs.

148. Nymphale Lucrétia.

Ailes un peu dentées, d'un brun-obscur, et ayant de part et d'autre une bande blanche, interrompue : dessous jaune à la base, avec des points noirs.

149. Nymphale Sulpitia.

Ailes dentées, noires, avec une bande blanche, commune : dessous des inférieures jaunâtre, avec des points noirs à la base, une bande sur le milieu, et des points à l'extrémité, blancs. Fab.

150. Nymphale Hostilia.

Ailes dentées, presque semblables de part et d'autre, fauves, avec des taches noires à la base : extrémité des supérieures d'un brun-noirâtre, avec des points d'un jaune-pâle.

151. Nymphale assimilée.

Ailes presqu'entières, semblables de part et d'autre, noires, avec des lignes d'un vert-blanchâtre : inférieures offrant vers l'extrémité une suite de taches écarlates.

152. Nymphale Disippe.

Ailes dentelées, fauves, avec les nervures, et le bord postérieur tacheté de blanc, noirs : inférieures avec une raie noire, transverse, courbée en arrière.

153. Nymphale Misippe.

(*Voyez pag.* 188, *n°.* 40 de la première partie.)

154. Nymphale Callisto.

Ailes dentées, d'un noir-brun : inférieures ayant de part et d'autre une bande fauve, chargée de sept taches très-noires, ovales, à prunelle blanche.

155. Nymphale Lasinassa.

Ailes dentées, d'un brun-noirâtre en dessous, et ayant à l'extrémité des points, des taches sagittées, et des lunules, blanchâtres : dessus des quatre ailes (mâle) *avec une tache d'un violet-blanchâtre sur le milieu.*

156. Nymphale Liria.

Ailes dentées, d'un brun-noirâtre en dessous, et ayant à l'extrémité des points, une bande crénelée intérieurement, et des lunules, blanchâtres : dessus des quatre ailes (mâle) *avec une tache d'un violet-blanchâtre sur le milieu.*

NYMPHALE. (Insecte.)

157. Nymphale Bolina.

Ailes dentées, d'un brun-tanné en dessous, avec une bande blanche; bande des inférieures marquée à chaque bout d'une liture noire : dessus des quatre ailes (mâle) *avec une tache d'un blanc-violâtre sur le milieu.*

158. Nymphale Aliména.

Ailes dentées, presque semblables de part et d'autre, noires, avec une bande commune sur le milieu, et une triple rangée de taches sur le bord, bleues.

159. Nymphale Salmasis.

Ailes dentées, noires en dessus, avec le milieu rayonné de bleu : dessous d'un brun obscur, avec une bande transverse, et une raie maculaire, blanchâtres. (Fem.)

160. Nymphale Antilope.

Ailes dentelées, d'un brun-noirâtre, offrant de part et d'autre sur le limbe postérieur trois cordons de points blancs : dessus des supérieures (mâle) *glacé de violet à l'extrémité.*

161. Nymphale Vitellia.

Ailes dentelées, d'un brun-obscur : dessous avec des points discoïdaux, et des traits marginaux, d'un blanc-bleuâtre.

162. Nymphale Eurinome.

Ailes un peu dentées, semblables de part et d'autre, noires, avec une multitude de taches, et le milieu des inférieures, à partir de la base, blancs.

163. Nymphale? Philomèle.

Ailes sinuées, noires, tachetées de blanc : inférieures avec des rayons jaunes à la base. Fab.

164. Nymphale? Pinthæus.

Ailes entières, semblables de part et d'autre, d'un brun-obscur : supérieures avec trois taches jaunes; inférieures avec le milieu, à partir de la base, blanc. Linn.

165. Nymphale? Zoïle.

Ailes entières, d'un noir-brun : supérieures avec trois taches, inférieures avec le milieu, blancs. Fab.

166. Nymphale Siva.

Ailes entières : dessus des supérieures d'un brun-noirâtre-chatoyant, avec une multitude de taches d'un vert-bleuâtre; leur dessous avec l'origine de la côte, et trois taches, argentées.

167. Nymphale Sophus.

Ailes entières : supérieures noires, avec le milieu fauve et tacheté de noir; inférieures d'un brun-obscur, avec des points, et une ligne transverse, noirs. Fab.

168. Nymphale? Sisamnus.

Ailes entières, d'un noir-brun, avec une bande commune, et des points, blancs: bande des supérieures courte. Fab.

169. Nymphale Polyxo.

Ailes presque dentées, d'un fauve-briqueté en dessus, avec le milieu d'un jaune d'ocre : supérieures avec l'extrémité, inférieures avec six taches oculaires, noires.

170. Nymphale Æropus.

Ailes presque dentées, d'un brun-noirâtre, offrant de part et d'autre une bande commune, jaune ou blanche : dessous des supérieures avec un œil d'un bleu-pâle à la base.

NYMPHALE. (Insecte.)

171. Nymphale Tulbagh.

Ailes presque dentées, brunâtres : supérieures avec deux bandes fauves, inférieures avec une seule et une rangée d'yeux, de part et d'autre.

172. Nymphale Lubentina.

Ailes presque dentées, d'un vert-obscur : supérieures ayant de part et d'autre une bande blanche maculaire ; extrémité des inférieures avec un double cordon de points cramoisis.

173. Nymphale Adonia.

Ailes presque dentées, d'un vert-obscur, offrant toutes les quatre de part et d'autre une bande blanche commune : extrémité des inférieures avec un seul cordon de points cramoisis.

174. Nymphale Evélina.

Ailes entières, d'un vert-bronzé en dessus, avec une bande plus foncée sur le milieu : les deux surfaces des supérieures avec une tache incarnate à la base, dessous des inférieures avec deux.

175. Nymphale du peuplier.

Ailes légèrement dentées, d'un brun-noirâtre en dessus, avec une bande blanche maculaire, un cordon de lunules fauves, et une double ligne marginale d'un bleu-ardoisé.

176. Nymphale Sibylla.

Ailes légèrement dentées, d'un brun-noirâtre en dessus, avec une bande blanche maculaire : dessous des inférieures d'un bleu-cendré à la base, avec des points noirs.

177. Nymphale Camilla.

Ailes légèrement dentées, d'un bleu-foncé, avec une bande blanche maculaire : dessous des inférieures d'un bleu-cendré sans taches à la base.

178. Nymphale Procris.

Ailes dentées, rousses, avec une bande blanche commune sur le milieu : dessous d'un vert-cendré à la base, avec des lignes noires transversales.

179. Nymphale Épione.

Ailes entières, d'un brun-obscur : les deux surfaces des supérieures avec une bande blanche sur le milieu : dessous des inférieures avec cinq lignes rousses transversales, et deux taches blanches à la base.

180. Nymphale Lycorias.

Ailes sinuées, d'un brun-noirâtre en dessus : supérieures avec une bande oblique d'un rouge-vermillon ; inférieures avec une double ligne blanchâtre avant le bord terminal.

181. Nymphale Eumée.

Ailes entières, d'un brun-obscur, avec une bande blanche : bande des inférieures terminée à chaque bout par une tache fauve. Fab.

182. Nymphale Cocalia.

Ailes dentées, d'un brun-obscur : supérieures tachetées de noir et de jaune : dessous des quatre gris, avec une rangée transverse de points blancs. Fab.

183. Nymphale ? Phégéa.

Ailes dentées, d'un brun-obscur : supérieures avec une bande, inférieures avec le milieu ferrugineux ou blanc : dessous plus pâle et ondé de noir. Fab.

184. Nymphale Marguerite.

Ailes presque dentées, d'un blanc-argenté en dessus, avec l'extrémité noire et tachetée de blanc : dessous des inférieures aspergé de brun, avec une rangée de points oculaires.

NYMPHALE. (Insecte.)

185. Nymphale Flavilla.

Ailes presque dentées, d'un jaune-fauve, avec le sommet brunâtre en dessus: dessous avec trois lignes ferrugineuses transversales, et deux points oculaires très-blancs sur les ailes supérieures, cinq sur les inférieures.

186. Nymphale Lirissa.

Ailes sinuées, d'un cendré-obscur en dessus, avec des ondes noires: les deux surfaces des supérieures avec une bande, celles des inférieures avec des points oculaires, blancs.

187. Nymphale Lassus.

Ailes entières, d'un brun-obscur, avec des lignes noires transversales: supérieures avec une tache blanche sur la côte: dessous (des quatre) pâle, avec des lignes obscures et transverses. Fab.

188. Nymphale ? Dyndima.

Ailes entières, couleur d'acier en dessus, jaunâtres en dessous, avec des ondes noires de part et d'autre: sommet des supérieures offrant deux taches blanches.

189. Nymphale Démophon.

Dessus des ailes noir, avec une bande commune d'un bleu-verdâtre-luisant: dessous varié de gris, avec un seul point à la base, puis une ligne ondulée, noirs.

190. Nymphale Amphitoé.

Dessus des ailes noir, avec une bande commune d'un bleu-verdâtre-luisant: dessous varié de gris, avec deux points à la base, puis une ligne très-anguleuse, noirs.

191. Nymphale Lycomède.

Dessus des ailes noir, avec une bande commune d'un bleu-verdâtre-luisant: dessous jaunâtre, avec deux points à la base, puis deux lignes anguleuses, noirs.

192. Nymphale Amphimaque.

Dessus des ailes noir, avec une bande commune d'un bleu-verdâtre-luisant: dessous ayant la moitié antérieure, et un point, d'un blanc-grisâtre.

193. Nymphale Démodice.

Dessus des ailes noir, avec une bande commune d'un bleu-verdâtre-luisant: dessous des supérieures avec des lignes transverses, et des anneaux, noirs; dessous des inférieures avec deux yeux éloignés l'un de l'autre.

194. Nymphale Déiphile.

Dessus des ailes noir, avec le milieu violet, et une bande commune de taches fauves à l'extrémité: dessous d'un gris de perle à la base, avec des taches ferrugineuses.

195. Nymphale Aucæa.

Dessus des ailes d'un noir-foncé ou d'un brun-noirâtre, avec une bande oblique d'un bleu-verdâtre aux supérieures: dessous vert, avec trois lignes ferrugineuses aux inférieures.

196. Nymphale Antiochus.

Ailes entières, d'un noir-velouté en dessus, avec une bande commune orangée et luisante, mais plus courte aux supérieures.

197. Nymphale Antinoé.

Ailes presque dentées, d'un noir-velouté en dessus, avec une bande orangée et luisante: bande des supérieures atténuée vers le bord interne.

198. Nymphale Numilius.

Ailes sinuées, d'un noir-velouté en dessus, avec le milieu des inférieures, et deux taches aux supérieures, orangés et luisans: sommet des inférieures bleuâtre.

NYMPHALE. (Insecte.)

199. Nymphale Erminia.

Ailes presque dentées : dessus des supérieures noir, avec la base d'un vert-doré, et une bande blanche maculaire à l'extrémité ; inférieures avec deux yeux, dont un moitié plus petit.

200. Nymphale Iris.

Ailes dentées, d'un brun-noirâtre (un reflet violet dans le mâle), avec des taches aux supérieures, et une bande unidentée aux inférieures, blanches : dessus des supérieures sans tache oculaire.

201. Nymphale Ilia.

Ailes dentées, d'un brun-noirâtre (un reflet violet dans le mâle), avec des taches aux supérieures, une bande sinuée aux inférieures, blanches ou orangées : supérieures offrant de part et d'autre une tache oculaire.

202. Nymphale Cyanippe.

Ailes dentées, d'un brun-obscur en dessus, avec deux raies maculaires plus obscures à l'extrémité : milieu des inférieures d'un bleu-argenté-brillant.

203. Nymphale Leucophthalme.

Ailes dentées, noirâtres en dessus : les deux surfaces des supérieures avec une bande d'un jaune d'ocre, celles des inférieures avec une tache orbiculaire très-blanche sur le milieu.

204. Nymphale Médée.

Ailes presque dentées, noires en dessus, avec trois bandes de taches jaunes : première et seconde bandes traversant l'abdomen.

205. Nymphale Micalia.

Ailes presque dentées, noires en dessus, avec des lunules à l'extrémité des quatre, et une bande sur le milieu des supérieures, jaunes : dessous des inférieures avec une tache d'un brun-marron.

206. Nymphale Volumna.

Ailes presque dentées, d'un noir-bleu en dessus : dessous des supérieures avec des anneaux et une bande d'un vert-pâle-luisant ; dessous des inférieures avec trois yeux, dont l'antérieur bipupillé.

207. Nymphale Sydonia.

Ailes presque dentées, d'un noir-brun sans taches, mais avec un reflet violet à la base : dessous plus pâle, avec quatre points verdâtres.

208. Nymphale Mygdonia.

Ailes un peu dentées, d'un noir-brun en dessus : dessous des inférieures avec des taches d'un brun-marron, plus quatre yeux presqu'effacés et groupés deux à deux.

209. Nymphale Alpaïs.

Ailes preque dentées, brunes : sommet des supérieures d'un noir-bleu et tacheté de blanc : dessous des inférieures avec trois yeux, dont l'antérieur bipupillé.

210. Nymphale Maia.

Ailes presque dentées, brunes en dessus (un reflet violet dans le mâle) : dessous des supérieures avec un point noirâtre à la base ; dessous des inférieures avec quatre points verdâtres, rapprochés deux à deux, et dont le second plus gros.

211. Nymphale Orphise.

Ailes entières, brunes en dessus (un reflet violet dans le mâle) : dessous des supérieures avec un point noirâtre à la base ; dessous des inférieures avec quatre points verdâtres, rapprochés deux à deux, et dont l'antérieur plus gros.

NYMPHALE. (Insecte.)

212. Nymphale Macris.

Ailes presque dentées, brunes en dessus (un reflet violet dans le mâle) : dessous des supérieures avec trois yeux peu prononcés, dessous des inférieures avec sept.

213. Nymphale Myrto.

Ailes entières, brunes en dessus : dessous des supérieures sans taches à la base, dessous des inférieures avec cinq yeux peu prononcés.

N. Bord postérieur des quatre ailes arrondi.

214. Nymphale Marsolia.

Ailes entières, brunes en dessus (un reflet violet dans le mâle) : dessous des supérieures avec des points noirs à la base, dessous des inférieures avec sept yeux peu prononcés.

215. Nymphale Amélie.

Ailes entières, d'un brun-tanné obscur en dessus : extrémité des supérieures avec une bande, et des points, blancs : dessous des inférieures avec des taches oculaires d'un brun-marron.

216. Nymphale Euphémie.

Ailes entières, d'un bleu-luisant en dessus, avec le milieu noir : dessous brun, avec deux paires d'yeux sur les inférieures.

217. Nymphale Irénéa.

Ailes entières, d'un brun-noirâtre, ayant en dessus une bande blanche discoïdale, et en dessous trois bandes blanches, dont l'antérieure entourée de roux.

218. Nymphale Postverta.

Ailes presque dentées : dessus du mâle d'un vert-bronzé-luisant; dessus de la femelle d'un brun-noirâtre, avec des bandes blanches : dessous des ailes inférieures (dans les deux sexes) d'un blanc-violâtre, avec six raies transverses ferrugineuses et deux yeux.

219. Nymphale Sérina.

Ailes presque dentées : dessus du mâle d'un vert-bronzé-luisant; dessus de la femelle d'un brun-noirâtre, avec des taches blanches : dessous des ailes inférieures (dans les deux sexes) blanc, avec quatre raies jaunes bordées de brun et deux yeux.

220. Nymphale Artémisia.

Ailes dentées, noires : supérieures avec des taches, inférieures avec une bande, blanches : dessous des inférieures avec deux yeux argentés. Fab.

221. Nymphale Johanna.

Ailes presque dentées, d'un vert-bronzé en dessus, avec l'extrémité des supérieures d'un brun-noirâtre et chargée de six taches blanches : inférieures ocellées de part et d'autre.

222. Nymphale Irma.

Ailes presque dentées, d'un vert-bronzé en dessus, avec l'extrémité des supérieures d'un brun-noirâtre et chargée de taches tirant sur le cendré : dessous des inférieures gris, avec trois lignes ferrugineuses, transversales, et dont l'antérieure bifide.

223. Nymphale Inès.

Ailes presque dentées, d'un vert-bronzé en dessus : sommet des supérieures d'un brun-noirâtre de part et d'autre, avec des taches blanches : dessous des inférieures blanc, avec cinq lignes brunes, transversales.

NYMPHALE. (Insecte.)

224. Nymphale Cadma.

Ailes dentelées, d'un jaune-fauve : supérieures ayant de part et d'autre au sommet un espace noir, avec deux taches d'un jaune-pâle : dessous des inférieures avec deux yeux bleus.

225. Nymphale Isis.

Ailes d'un noir-brun : supérieures entières, ayant de part et d'autre une tache cramoisie sur le milieu ; inférieures dentées, offrant en dessus une ligne marginale blanchâtre.

226. Nymphale Claudine.

Ailes presque dentées, noires, ayant chacune en dessus un espace cramoisi sémi-lunaire : dessous des inférieures marbré, avec sept yeux à l'extrémité.

227. Nymphale Pyrame.

Ailes presque dentées, noires (dessus du mâle avec un reflet violet) : supérieures offrant de part et d'autre une bande coquelicot : dessous des inférieures sablé, et ayant des points oculaires, plus une ligne marginale, bleuâtres.

228. Nymphale Galanthis.

Ailes entières, noires : supérieures avec deux bandes, inférieures avec une seule, cramoisies en dessus, plus pâles en dessous.

229. Nymphale Sorana.

Ailes presque dentées, noires, glacées de violet : supérieures ayant de part et d'autre deux bandes cramoisies, dont l'antérieure commune au dessus des secondes ailes : dessous de ces dernières ailes avec deux yeux, et une ligne très-anguleuse, bleus.

230. Nymphale Pithéas.

Ailes entières, noires : supérieures ayant de part et d'autre deux bandes cramoisies, dont l'antérieure commune au dessus des secondes ailes : dessous de ces dernières ailes d'un rose-pâle au milieu, avec deux yeux à prunelle bleuâtre.

231. Nymphale Condomanus.

Ailes entières, d'un noir-violet : supérieures ayant de part et d'autre deux bandes cramoisies, dont l'antérieure commune au dessus des secondes ailes : dessous de ces dernières ailes avec deux anneaux, et une liture centrale, jaunes.

232. Nymphale Pygas.

Ailes presque dentées, noires : supérieures ayant de part et d'autre un espace cramoisi sémi-lunaire : dessous des inférieures avec trois anneaux, et une ligne transverse à la base, jaunes.

233. Nymphale Pyracmon.

Ailes presque dentées, noires (glacées de bleu dans le mâle) : supérieures ayant de part et d'autre une bande cramoisie, bifide : dessous des inférieures avec trois anneaux, et une ligne transverse à la base, jaunes.

234. Nymphale Hydaspe.

Ailes presque dentées, noires, avec la base glacée de bleu en dessus : supérieures ayant de part et d'autre une bande cramoisie, courte : dessous des inférieures avec deux anneaux jaunes, et quatre points oculaires.

235. Nymphale Hydarnis.

Ailes entières, noires en dessus, avec la base glacée de bleu : supérieures avec une bande cramoisie, courte : dessous des inférieures avec cinq anneaux, et deux taches biponctuées, noirs.

NYMPHALE. (Insecte.)

236. Nymphale Clyménus.

Ailes entières, noires en dessus (un reflet violet changeant dans le mâle), avec une bande d'un vert-doré sur le milieu des supérieures, et une semblable sur le bord terminal des inférieures : dessous de ces dernières ailes gris, avec cinq anneaux, et quatre points, noirs.

237. Nymphale Euclide.

Ailes entières, noires en dessus (un reflet violet changeant dans le mâle), avec une bande d'un vert-doré vers le milieu des quatre : dessous des inférieures gris, avec cinq anneaux, et trois points, noirs.

238. Nymphale Candréna.

Ailes entières, noires en dessus (base glacée de violet dans le mâle), avec un chevron à l'extrémité des supérieures, une bande à l'extrémité des inférieures, d'un vert-doré : dessous des inférieures gris, avec six anneaux noirs.

239. Nymphale Oppel.

Ailes entières, noires en dessus, avec une bande sur le milieu des supérieures, une ligne à l'extrémité des inférieures, d'un vert-doré : dessous des inférieures d'un jaune d'ocre pâle, avec deux lignes noires transverses et parallèles.

240. Nymphale Tytius.

Ailes entières, d'un brun-obscur, avec une bande blanche : bande des supérieures interrompue : dessous des quatre offrant à la base des points noirs oculaires.

241. Nymphale Soronus.

Ailes entières, d'un brun-obscur, avec un grand nombre de taches noires oculaires : supérieures ayant de part et d'autre une bande jaunâtre sur leur milieu.

242. Nymphale ? Phylacis.

Ailes entières : supérieures d'un brun-obscur, avec des taches briquetées : inférieures briquetées en dessus, blanches en dessous à la base, et ayant de part et d'autre des points noirs à l'extrémité.

243. Nymphale Epigia.

Ailes entières, semblables de part et d'autre, noires : supérieures avec une bande blanche, courte ; inférieures avec le milieu d'une couleur rousse qui s'étend sur les ailes de devant.

244. Nymphale Laphria.

Ailes entières, d'un brun-obscur et sans taches en dessus : dessous d'un fauve-pâle, avec des points, et une ligne commune, noirâtres.

245. Nymphale Aréthusus.

Ailes entières, d'un noir-chatoyant en dessus, avec une multitude de taches d'un bleu-verdâtre : dessous des inférieures avec des points rouges à la base et à l'angle de l'anus. (Une bande blanche non sinuée aux ailes supérieures de la femelle.)

246. Nymphale Amphinome.

Ailes presque dentées, noires en dessus, avec des hiéroglyphes d'un vert-bleuâtre : supérieures offrant de part et d'autre une bande blanche : dessous des inférieures rayonné de rouge.

247. Nymphale Féronia.

Ailes presque dentées, d'un brun-noirâtre en dessus, avec des hiéroglyphes bleuâtres et une rangée d'yeux à iris simple.

NYMPHALE. (Insecte.)

248. Nymphale Férentina.

Ailes presque dentées, d'un brun-noirâtre en dessus, avec des hiéroglyphes bleuâtres, peu prononcés, et une rangée d'yeux à iris double. (4e et 5e yeux des ailes inférieures marqués dans le mâle d'une lunule rousse.)

249. Nymphale Chloé.

Ailes inégalement dentées, d'un bleu-verdâtre en dessus, avec une multitude de taches noires : base des quatre offrant de part et d'autre des marques ferrugineuses.

O. Ailes oblongues ou alongées dans le sens du diamètre du corps.

250. Nymphale Eulimène.

Ailes dentées, d'un brun-noirâtre, offrant en dessus trois bandes fauves : dessous des inférieures avec six bandes, et le bord terminal, d'un blanc-incarnat.

251. Nymphale Nesté.

Ailes dentées, d'un brun-noirâtre en dessus, verdâtre en dessous : leurs deux surfaces offrant de part et d'autre trois bandes, jaunes dans le mâle, blanchâtres dans la femelle.

252. Nymphale Héliodore.

Ailes presqu'entières, semblables de part et d'autre, d'un brun-noirâtre, avec trois bandes d'une jaune-fauve.

253. Nymphale Hordonia.

Ailes presqu'entières, d'un brun-noirâtre en dessus, avec trois bandes d'un jaune-fauve : dessous jaunâtre et aspergé de ferrugineux.

254. Nymphale Frobénia.

Ailes un peu dentées, semblables de part et d'autre, d'un brun-noirâtre, avec une bande fauve, postérieure : bande des premières ailes formée de trois taches.

255. Nymphale de l'Érable.

Ailes dentées, d'un noir-brun en dessus, fauves en dessous, avec trois bandes blanches maculaires : bande de la base des supérieures longitudinale et lancéolée.

256. Nymphale Leucothoé.

Ailes dentées, d'un noir-brun en dessus, fauves en dessous, offrant de part et d'autre trois bandes blanches maculaires : bande du milieu des inférieures chargée antérieurement de points noirs.

257. Nymphale Strophia.

Ailes dentées, d'un noir-brun de part et d'autre, avec trois bandes blanches maculaires : dessous des inférieures ponctué de noir à la base et au milieu.

258. Nymphale Hélicopis.

Ailes dentées, d'un noir-brun de part et d'autre, avec deux bandes blanches maculaires en dessus, et quatre en dessous : base des supérieures marquée de deux points blancs.

259. Nymphale Lucille.

Ailes un peu dentées, d'un noir-brun en dessus, ferrugineuses en dessous, ayant le milieu traversé de part et d'autre par une bande blanche maculaire : base des supérieures avec une ligne longitudinale de points blancs.

260. Nymphale Mélicerta.

Ailes dentelées, d'un noir-brun de part et d'autre, avec une large bande, et des lignes transverses, blanches : base des supérieures avec plusieurs points blancs, épars.

NYMPHALE. (Insecte.)

261. Nymphale Mélinoé.

Ailes dentelées, d'un noir-brun de part et d'autre, avec une large bande, et des lignes transverses, blanches : base des supérieures avec une tache en forme de coin, et un point, blancs.

262. Nymphale Ophione.

Ailes dentelées, d'un brun-noirâtre de part et d'autre, avec une large bande, et des lignes transverses, blanches : dessous avec des taches oculaires très-noires.

263. Nymphale Vénilia.

Ailes un peu dentées, noires, ayant de part et d'autre une bande discoïdale, et des points, blancs : dessous avec des rayons d'un blanc-verdâtre à la base.

264. Nymphale Nauplia.

Ailes entières, d'un noir-brun : les deux surfaces des supérieures avec des taches, celles des inférieures avec une bande, blanches : bande des inférieures entourée en dessous de jaune et de roux.

265. Nymphale Émilie.

Ailes entières, noires : les deux surfaces des supérieures avec des taches, celles des inférieures avec deux bandes, d'un blanc-luisant : bande de la base des inférieures commune aux ailes supérieures, l'autre entourée de roux en dessous.

266. Nymphale Cœnobite.

Ailes dentées, noires : supérieures avec une ligne longitudinale et des taches : dessus des inférieures avec une bande blanche; leur dessous blanc, avec quatre bandes, et des taches marginales, d'un brun-obscur. Fab.

267. Nymphale Hersilie.

Ailes dentées, d'un blanc-cendré en dessus, avec le limbe postérieur d'un brun-obscur : dessous des inférieures d'un fauve-pâle, avec deux bandes, et des lunules marginales, blanches.

A. Bord postérieur des premières ailes plus ou moins concave. Bord correspondant des secondes avec deux queues extérieures, linéaires & aiguës.

1. Nymphale Jasius (1).

Nymphalis Jasius.

Nym. alis anticis utrinquè strigâ maculari limboque postico fulvis : subtùs omnibus ad basin ferrugineis, annulis fasciâque albis.

Papilio E. A. Jason, *alis bicaudatis, fuscis, posticè lutescentibus : subtùs caracteribus fasciâque albis.* Linn. *Syst. Nat.* 2. *p.* 749. *n°.* 26.

Papilio N. *Jasius.* Fab. *Syst. Ent. p.* 449. *n°.* 29. —*Spec. Inst. tom.* 2. *p.* 10. *n°.* 40.—*Mant. Inst. tom.* 2. *p.* 6. *n°.* 44. — *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 61. *n°.* 191.

Papilio Jasius. Esp. *Pap. part.* 1. *tab.* 99. *cont.* 54. *fig.* 1.

Esp. *Pap. part.* 1. *tab.* 104. *cont.* 59. *fig.* 2-8. (La chenille & la chrysalide.)

Papilio Jasius. De Prunner, *Lepid. Pedem. p.* 2. *n°.* 2.

Papilio Jasius. Petagna. *Inst. Ent. tom.* 2. *p.* 443. *n°.* 1.

Papilio Jasius. Cyrill. *Ent. Neap. Specim.* 1. *tab.* 11. *fig.* 1.

Papilio Jasius. Drury, *Inst. tom.* 1. *pl.* 1. *fig.* 1.

Papilio Jasius. Ochsen. *Pap. Eur. tom.* 1. *p.* 151. *n°.* 1.

Papilio Jason. Herbst, *tab.* 64. *fig.* 3. 4. 5.

Papilio Jason. Cram. *pl.* 339. *fig.* A. B.

Papilio Rhea. Hubn. *Pap. tab.* 113. *fig.* 580. 581.

Illig. *Magaz. tom.* 3. *pag.* 203.

Seba, *Mus.* 4. *tab.* 46. *fig.* 21.

Elle a de trois à quatre pouces d'envergure, & elle est d'un brun-chatoyant en dessus. Ses premières ailes ont le bord postérieur couvert par une bande fauve, plus ou moins sinuée en dedans, finement liserée de noir en dehors, & divisée par huit nervures brunes, dont les quatre antérieures plus fortes. En avant de cette bande, & à partir du bord d'en haut, il y a une rangée transverse, & quelquefois double, de cinq ou six gros points fauves. Les secondes ailes ont six dents, dont la quatrième & la postérieure prolongées en queues linéaires, toutes deux externes & d'un noir-foncé. Cette couleur est aussi celle du bord terminal, parallèlement auquel règne un cordon de sept taches d'un fauve plus ou moins verdâtre, grandes, la plupart en forme de coin, & précédées du côté du corps par une ligne de cinq à sept points d'un bleu-verdâtre. Les échancrures sont en outre ciliées de blanc, ainsi que l'angle anal, lequel est arrondi sans être saillant.

Le dessous des quatre ailes a la partie antérieure ferrugineuse, chargée de taches & de bandelettes transversales d'un brun-olivâtre & encadrées de blanc. Vient ensuite une bande commune & discoïdale d'un blanc-satiné, ayant le côté externe bordé par des points noirs aux ailes supérieures. Ces dernières ailes sont après cela fauves jusqu'au bout, & coupées transversalement par une bande d'un gris-ardoisé, bande dont le côté interne a des échancrures dans chacune desquelles il y a une tache noire à peu près triangulaire. Les nervures sont aussi d'un bleu-ardoisé depuis la bande blanche jusqu'au bord. Les secondes ailes ont, sur le côté externe de la bande blanche susdite, une série de taches ferrugineuses, derrière lesquelles est un espace olivâtre, où l'on voit une rangée de points d'un bleu-violet, séparés les uns des autres, & adossés à des taches marginales de la couleur & presque de la forme de celles qui leur correspondent en dessus. La tête, le corselet, & l'origine de la côte des premières ailes, sont ferrugineux. L'abdomen est d'un brun-obscur, avec des poils grisâtres, pareils à ceux qui garnissent la gouttière des secondes ailes. Les antennes sont noires, & les palpes ont la tranche extérieure blanche, avec la sommité fauve. La trompe est d'un ferrugineux-luisant.

La femelle ressemble au mâle, mais elle a le milieu des ailes inférieures finement pointillé de bleu en dessus.

Ce lépidoptère plane comme les oiseaux de proie, c'est-à-dire, qu'il agite peu ses ailes en volant. On le voit assez souvent se reposer sur des troncs d'arbres exposés au soleil. Il habite la Barbarie, l'Espagne, le Portugal, l'Asie mineure, les rives du Bosphore ou canal de Constantinople, la Sicile, le pays de Naples, la Dalmatie, le comté de Nice, la Corse, les îles d'Hières (particulièrement celle de Porte-Cros), & les environs de Toulon. On le trouve aussi, mais moins communément, près de Montpellier. Il donne deux fois dans l'année : en juin, puis en septembre. M. Devilliers, officier d'infanterie, assure qu'il répand une odeur de musc.

M. Lefebure de Cérisy, ingénieur des constructions maritimes à Toulon, nous a envoyé sur les métamorphoses de cet insecte un mémoire fort intéressant, auquel étoit joint un dessin qui ne laisse absolument rien à desirer.

La chenille provient d'un œuf verdâtre. Elle est

(1) Nous avons adopté la dénomination de *Jasius*, parce qu'elle est beaucoup plus usitée que celle de *Jason*; parce que d'ailleurs Linnæus a deux papillons *Jason* : celui dont il s'agit ici, & un autre dont nous parlons dans le *Supplément* placé à la fin de ce volume.

extrêmement lente dans tous ſes mouvemens, & ſemble ne changer de place qu'à regret. Après avoir tapiſſé de ſoie le deſſus d'une feuille d'*arbouſier*, elle s'y tient attachée par les pattes membraneuſes, ayant les ſix pattes écailleuſes & la tête élevées en l'air. La nuit, elle quitte pour aller manger les feuilles voiſines, & revient au bout d'un quart d'heure reprendre ſon poſte ordinaire. Dans le premier âge, elle eſt toute verte; mais, lorſqu'elle a fubi les premières mues, elle devient d'un vert-jaunâtre qui ſe rapproche tellement de la couleur de la feuille dont elle ſe nourrit, qu'on a de la peine à l'apercevoir. Sa peau eſt comme chagrinée, & pliſſée tranſverſalement. Une ligne jaune, placée près des ſtigmates, longe chaque côté du corps, & il y a ſur le dos quatre points orangés, peu apparens. Les pattes écailleuſes ſont noires, les autres ſont vertes. La tête eſt armée de quatre cornes verticales, dont les deux intermédiaires plus longues. Ces cornes ont la ſommité rougeâtre, & la baſe jaunâtre. Au moment de ſa tranſformation, cette chenille choiſit une branche à laquelle elle ſe ſuſpend par les pattes de derrière au moyen d'un amas de ſoie. Après être reſtée trois jours dans cette attitude, elle ſe débarraſſe de ſa peau.

La chryſalide eſt liſſe, groſſe, un peu carénée, d'un vert-pâle. Son extrémité poſtérieure eſt munie de deux pointes entre leſquelles il y a un pédicule adhérant à l'amas de ſoie dont nous venons de parler.

Les chenilles écloſes à la fin de ſeptembre paſſent l'hiver & ne ſe métamorphoſent qu'au mois de mai ſuivant. Celles qui naiſſent dans le mois de juin accompliſſent toutes leurs métamorphoſes dans l'eſpace de trois mois. Le papillon n'eſt guère que quinze jours en chryſalide.

2. Nymphale Pélias.

Nymphalis Pelias.

Nym. alis omnibus ſuprà fuſcià mediâ punctiſque marginalibus fulvis : ſubtùs ad baſin ferrugineis, annulis fuſciâque albis.

Papilio Pelias. Cram. *Pap. pl.* 3. *fig.* C. D.

Papilio Pelias. Herbst, *Pap. tab.* 63. *fig.* 5. 6.

Elle a environ trois pouces & demi d'envergure. Le deſſus des ailes eſt ferrugineux à la baſe; traverſé au milieu par une bande fauve, oblique; noir à l'extrémité, avec un rang de points fauves, lunulés. La bande des premières ailes eſt biſide antérieurement, & marquée au deſſous de la biſſure d'une ligne de quatre points noirs. La bande des ſecondes ailes deſcend juſqu'à la gouttière du bord interne, & elle eſt ſuivie en dehors de trois à quatre points bleus, alignés tranſverſalement près de l'angle anal.

En deſſous on retrouve les mêmes caractères que dans le *Jaſius*, ſeulement le fauve des ailes ſupérieures eſt diviſé en taches ſéparées, & la bande blanche de leur milieu eſt plus large.

Du Cap de Bonne-Eſpérance.

3. Nymphale Brutius.

Nymphalis Brutius.

Nym. alis ſuprà faſcià mediâ albâ : ſubtùs ad baſin ferrugineis, annulis faſciâque albis.

Papilio Brutus. Cram. *Pap. pl.* 241. *fig.* E. F.

Elle eſt à peu près de la taille de la précédente. Le deſſus des ailes eſt d'un noir-brun, avec une bande blanche, commune, diſcoïdale, maculaire aux ſupérieures, plus large & entière aux inférieures dont elle atteint le bord interne. Ces dernières ailes ont à l'angle anal un groupe de deux à trois points bleus.

Le deſſous des quatre ailes eſt comme dans le *Jaſius*, avec cette différence qu'ici la bande blanche des inférieures a le côté externe bordé par une raie fauve, continue, au lieu de l'avoir bordé par une ſérie de taches ferrugineuſes; & que l'eſpace qui la ſuit en dehors, au lieu d'être verdâtre, eſt noir & chargé confuſément de points ferrugineux dont le contour eſt d'un bleu-pâle.

De la côte de Guinée.

4. Nymphale Caſtor.

Nymphalis Caſtor.

Nym. alis ſuprà fulvis, limbo poſtico latè nigro : ſubtùs ad baſin ferrugineis, annulis faſciâque albis.

Papilio N. Caſtor, *alis dentato-bicaudatis, fulvis, margine nigris : ſubtùs faſciâ maculiſque albis nigrâ fœtis.* Fab. *Gen. Inſ. Mant. p.* 251.— *Spec. Inſ. tom.* 2. *p.* 11. *n°.* 44. — *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 6. *n°.* 48. — *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 63. *n°.* 196.

Papilio Pollux. Cram. *Pap. pl.* 37. *fig.* C. D.

Papilio Pollux. Herbst, *Pap. tab.* 63. *fig.* 3. 4.

Papilio Camulus. Drury, *Inſ. tom.* 3. *pl.* 30. *fig.* 1. 2.

Fabricius a donné le nom de *Caſtor* au Pollux de Cramer, & *vice verſâ*.

Elle a environ trois pouces & demi d'envergure. Le deſſus des ailes eſt d'un fauve-brun à la baſe; d'un fauve-jaunâtre au milieu; noir à l'extrémité, avec de petits croiſſans rouſſâtres, marginaux. Le diſque des premières ailes offre en outre quelques taches noires, éparſes; & il y a un point bleu à l'angle anal des ſecondes.

Le deſſous des quatre ailes reſſemble à peu près

au dessous du *Jasius*, depuis la base jusqu'à la bande blanche inclusivement; ensuite le fond est fauve jusqu'au bord, avec une rangée transverse de taches noires. Ces taches ont différentes formes. Aux premières ailes, elles sont, pour la plupart, triangulaires & finement bordées de bleuâtre en dehors. Aux secondes ailes, les six antérieures sont ovales, piquées de bleuâtre, & chargées chacune d'un point ferrugineux; la postérieure est ronde, plus grande, saupoudrée de gris & marquée dans son milieu d'un petit œil violâtre. Le corselet est ferrugineux, l'abdomen jaunâtre. Les antennes sont noires.

De la côte de Guinée.

5. Nymphale Pollux.

Nymphalis Pollux.

Nym. alis suprà fasciâ mediâ fulvâ : subtùs ad basin nigris, annulis fasciâque virescenti-albis.

Papilio N. Pollux, *alis dentato-bicaudatis, fuscis, fasciâ flavâ : subtùs fasciâ maculisque albis nigro fixtis.* Fab. *Gen. Inf. Mant. p.* 251. — *Spec. Inf. tom.* 2. *p.* 11. *n°.* 45. — *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 6. *n°.* 49. — *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 63. *n°.* 197.

Papilio Castor. Cram. *Pap. pl.* 37. *fig.* E. F.

Papilio Castor. Herbst, *Pap. tab.* 63. *fig.* 1. 2.

Elle est approchant de la taille de la précédente. Le dessus des ailes est d'un noir-brun, avec une bande fauve, commune, oblique & difcoïdale. La bande des premières ailes est maculaire, bifide antérieurement, & marquée au dessous de la fissure d'une ligne de trois points noirs. La bande des secondes ailes ne descend pas au-delà du disque. Celles-ci ont au sommet un point roussâtre, & le long du bord terminal un double rang de points inégaux d'un bleu-violet.

Le dessous des quatre ailes se rapproche beaucoup du dessous du *Jasius*; mais ici le fond de la partie antérieure est noir, au lieu d'être ferrugineux; les taches qu'on y voit sont pareillement noires, & leur encadrement est d'un blanc-verdâtre; le bord terminal des ailes supérieures est d'un gris-ardoisé, comme la bande dentée qui le précède intérieurement; le bord analogue des inférieures a, derrière la rangée de points violets, des taches fauves bien plus étroites. Le corps est d'un brun-obscur en dessus, d'un gris-sale en dessous. Les antennes sont noires.

De la côte de Guinée.

N. B. Cramer représente le dessous de son Castor ferrugineux vers la base. C'est sans doute une méprise de l'enlumineur; car les individus que nous avons vus en nature, & nous en avons vu plusieurs, ont le fond noir dans cette partie. On a omis aussi les petites taches fauves situées à l'extrémité de la surface inférieure des secondes ailes.

6. Nymphale Eudoxe.

Nymphalis Eudoxus.

Nym. alis suprà fasciâ mediâ maculisque marginalibus fulvis : subtùs ad basin ferrugineis, annulis argenteis; posticis tantùm fasciâ albâ.

Papilio N. Eudoxus, *alis caudatis, nigris, fasciâ communi rubrâ : subtùs maculis argenteis nigrâ fixtis.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 65. *n°.* 203.

Papilio Eudoxus. Drury, *Inf. tom.* 3. *pl.* 33. *fig.* 1. 4.

Papilio Eudoxus. Jon. *Fig. pict.* 5. *tab.* 53.

Elle a environ trois pouces & demi d'envergure. Le dessus des ailes est brun à la base; puis noir jusqu'au bout avec une bande fauve, commune, oblique, discoïdale, se rétrécissant à mesure qu'elle approche de la côte des supérieures. Celles-ci ont, le long du bord terminal, une rangée de points, & les inférieures une rangée de lunules, fauves. Il y a en outre deux points bleus près de l'angle anal des ailes inférieures.

Le dessous des quatre ailes est ferrugineux, & présente, sur les trois quarts antérieurs des premières, & à la base des secondes, des taches noires, entourées de blanc-argenté. Les ailes supérieures ont ensuite deux rangées transverses de taches fauves, séparées par une raie noire, ponctuée de bleu. Les ailes inférieures sont traversées dans leur milieu par une bande blanche, mouchetée de brun; en avant du bord postérieur, par deux lignes ondulées bleuâtres, liserées de noir; & près du bord même par un cordon de lunules fauves.

De Sierra-Leone.

7. Nymphale Lucrétius.

Nymphalis Lucretius.

Nym. alis suprà fasciis duabus maculatis fulvis : subtùs ferrugineis, ad basin annulis aliquot cœrulescentibus; posticis strigâ posticâ grisescente.

Papilio N. Lucretius, *alis dentatis, atris, fulvo fasciatis : subtùs maculis atris lineâ cœruleâ cinctis.* Fab. *Spec. Inf. tom.* 2. *p.* 22. *n°.* 91. — *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 12. *n°.* 107. — *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 84. *n°.* 261.

Papilio Lucretius. Cram. *Pap. pl.* 82. *fig.* E. F.

Papilio Lucretius. Herbst, *Pap. tab.* 66. *fig.* 1. 2.

Elle est à peu près de la taille de la précédente. Le dessus des ailes est d'un noir-brun, avec deux bandes fauves, maculaires, dont une terminale & moins

moins large, l'autre disposée obliquement entre celle-ci & le milieu de la surface.

Le dessous des quatre ailes est ferrugineux & présente, vers la base, diverses taches noires, bordées de bleuâtre; il y a en outre à l'extrémité des inférieures, sur un fond plus intense, une raie grise, transversale, courbée en arrière, & à laquelle correspond sur les ailes supérieures une bande d'un ferrugineux plus clair que le reste de la surface.

De la côte de Guinée.

8. Nymphale Fabius.

Nymphalis Fabius.

Nym. alis suprà fasciâ mediâ punctisque marginalibus flavis : subtùs nitidè-cinereis, undis basèos nigris.

Papilio N. Fabius, *alis dentato-bicaudatis, fuscis, flavo fasciatis : subtùs basi nigro undatis, apice punctis fulvis.* Fab. *Spec. Inf. tom.* 2. *p.* 12. *n°.* 47. — *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 7. *n°.* 52. — *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 64. *n°.* 201.

Papilio E. A. Euphanes, *alis bicaudatis, fuscis : superioribus maculis transversalibus punctisque marginalibus luteis; inferioribus fasciâ unitâ : subtùs omnibus cinereis, maculis albis, luteis nigrisque variis.* Esp. *Pap. Exot. tom.* 1. *p.* 238. *tab.* 59. *fig.* 1.

Elle a environ deux pouces & demi d'envergure. Le dessus des ailes est d'un brun-noirâtre, avec une bande jaune, commune, oblique, discoïdale. La bande des premières ailes est maculaire & précédée intérieurement, près de la côte, de deux taches de sa couleur. Il y a en outre, le long du bord terminal des mêmes ailes, une rangée de points, &, sur le limbe correspondant des inférieures, deux rangées de lunules d'un jaune un peu verdâtre.

Le dessous des quatre ailes est d'un cendré luisant, coupé transversalement à la base par trois lignes noires en zig-zag, au milieu par une bande blanche, vers l'extrémité par un rang de points d'un jaune-fauve & entourés de verdâtre. Après ces points, les secondes ailes en ont de bleuâtres, que précède immédiatement en dehors un cordon de lunules jaunes.

Des îles Nicobar, mer des Indes.

9. Nymphale Anticlée.

Nymphalis Anticlea.

Nym. alis suprà fasciâ terminali fulvâ : anticarum macularia abbreviatâque, posticarum ocellis quatuor.

Papilio Anticlea. Drury, *Inf. tom.* 3. *pl.* 27. *fig.* 5. 6.

Elle est beaucoup plus petite que les précédentes, & ses queues sont plus courtes. Le dessus des ailes est d'un noir enfumé, avec une bande fauve, terminale. La bande des ailes supérieures est maculaire & ne monte pas jusqu'au sommet. Celle des inférieures est continue, plus large, & marquée vers l'angle anal de quatre petits yeux noirs à prunelle blanche.

Le dessous des quatre ailes est roussâtre, avec des parties plus claires & d'autres plus foncées, bordées par des lignes noires transversales. Indépendamment de ces caractères, il y a à la base des premières ailes trois points noirs, ocellés; &, sur le bord postérieur des secondes, plusieurs petits yeux correspondant à ceux de la surface opposée.

De Sierra-Leone.

10. Nymphale Candiope.

Nymphalis Candiope.

Nym. alis suprà lutescentibus, apice nigro fulvoque maculato : subtùs costâ basèos nitidè viridi.

Elle a près de quatre pouces d'envergure. Le dessus des ailes a environ la moitié antérieure d'un jaune-roussâtre & terminée par du fauve vif; l'autre moitié d'un noir-brun, avec deux rangées transverses de taches fauves, dont les intérieures orbiculaires, les extérieures lunulées & tout-à-fait marginales.

Le dessous des premières ailes est d'un jaune-pâle vers la base, avec la côte d'un vert-pomme & finement entrecoupée de blanc; plus, quelques traits noirs transversaux, derrière lesquels il y a une bande obscure, commune aux ailes inférieures. Après cette bande, le fond est d'un brun-clair, avec des points noirâtres formant une ligne parallèle au bord postérieur.

Le dessous des secondes ailes est d'un brun-grisâtre, avec une tache d'un vert-pomme luisant à l'origine de la côte, deux bandes tortueuses de taches blanchâtres sur le milieu, une rangée de points d'une teinte incarnate en avant du bord postérieur, &, sur ce même bord, une série de lunules verdâtres, marquées chacune d'un point qui est noir en dehors, violet en dedans. Le corps est roussâtre en dessus, cendré en dessous.

Sa patrie nous est inconnue.

11. Nymphale Athamas.

Nymphalis Athamas.

Nym. alis fasciâ mediâ glaucâ, subhyalinâ, subtùsque lunulis ferrugineis extùs marginatâ.

Papilio Athamas. Cram. *Pap. pl.* 89, *fig.* C. D.

Papilio Athamas. Drury, *Inf. tom.* 1. *pl.* 2. *fig.* 3. 4.

Papilio Pyrrhus. Donow. *Of an Epitome of*

the Nat. Hiſt. Inſ. of India, cah. 2. pl. 4. fig. 3.

Elle a approchant deux pouces & demi d'envergure. Le deſſus des ailes eſt d'un noir-violet, avec une bande d'un vert-blanchâtre, commune, oblique, diſcoïdale, un peu tranſparente, beaucoup plus large dans la femelle que dans le mâle. Cette bande ne monte pas juſqu'à la côte des premières ailes, mais elle en eſt ſéparée par un gros point de ſa couleur, & quelquefois par deux, dont l'extérieur très-petit. Les ſecondes ont parallèlement au bord terminal une rangée de ſept points blancs, oblongs.

Le deſſous des quatre ailes diffère du deſſus, en ce que le fond eſt plus pâle; en ce que le côté externe de la bande verte eſt longé par une ſuite de lunules ferrugineuſes, bordées de blanc en dedans & de noir en dehors; enfin, en ce qu'aux points marginaux des ſecondes ailes correſpond ici un rang de points noirs, entourés de blanc-violâtre-luiſant. Le corps eſt d'un brun-cendré, avec quatre points blanchâtres ſur la tête. Les antennes ſont noires, avec la ſommité ferrugineuſe.

De la Chine & de l'île de Java.

N. B. Donowan a confondu cette eſpèce avec le *Pyrrhus*.

12. Nymphale Sempronius.

Nymphalis Sempronius.

Nym. alis bicaudatis, albis, margine atro, albo punctato. Fab.

Papilio N. *Sempronius.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom. 3. pars 1. p. 62. n°. 194.*

Papilio Sempronius. Jon. *Fig. pict. 5. tab.*

Le corps eſt grand, blanc, avec les antennes noires. Le deſſus des ailes eſt blanc, avec tous les bords noirs, & le poſtérieur ponctué de blanc.

Le deſſous eſt varié de blanc, de vert, de noir, & coupé tranſverſalement par une raie bleue; il y a en outre, à l'angle anal des ailes inférieures, trois taches fauves marquées de noir; & le bord terminal des mêmes ailes eſt noir, avec des lunules jaunes.

Elle habite.....

(*Traduction du texte de Fabricius.*)

13. Nymphale Horatius.

Nymphalis Horatius.

Nym. alis dentato-bicaudatis, atris: poſticis apice ſanguineis, punctis ocellaribus atris. Fab.

Papilio N. *Horatius.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom. 3. pars 1. p. 64. n°. 202.*

Papilio Horatius. Jon. *Fig. pict. 5. tab. 16. fig. 2.*

Elle a tout-à-fait le port des précédentes. Le corps eſt noir, avec quatre points blancs ſur la tête. Les ailes ſupérieures ſont noires, avec une bande marginale, courte, commune aux ſecondes ailes, & un point d'un rouge-ſanguin. Leur deſſous eſt cendré & préſente à la baſe trois points noirs; au milieu, une bande plus obſcure que le fond & bordée de noir.

Les ailes inférieures ont deux queues. Leur deſſus eſt noir, avec une large bordure terminale d'un rouge-ſanguin, bordure ſur laquelle il y a cinq points noirs ocellés, dont la prunelle eſt blanche. Le deſſous des mêmes ailes eſt cendré, avec une bande plus foncée ſur le milieu; une raie jaune, des lunules noires & bleues vers le bout.

Elle habite.....

(*Traduction du texte de Fabricius.*)

14. Nymphale Tiridate.

Nymphalis Tiridates.

Nym. alis ſuprà atro-cæruleis, margine poſtico lunulis ochreaceis: omnium dimidio apicali punctis cæruleſcentibus.

Papilio N. Tiridates, *alis dentato-bicaudatis, ſuprà nigris, cæruleo maculatis margineque albo punctato.* Fab. *Spec. Inſ. tom. 2. p. 11. n°. 45. — Mant. Inſ. tom. 2. p. 6. n°. 47. — Ent. Syſt. em. tom. 3. pars 1. p. 62. n°. 195.*

Papilio Tiridates. Cram. *Pap. pl. 162. fig. A. B.*

Papilio Tiridates. Drury, *Inſ. tom. 3. pl. 23. fig. 1. 2.*

Papilio Tiridates. Herbst, *Pap. tab. 62. fig. 3. 4.*

Papilio Tiridates. Donow. *Of an Epit. of the Nat. Hiſt. Inſ. of India, cah. 3. pl. 2. fig. 3.*

Elle a près de quatre pouces d'envergure. Le deſſus des ailes eſt d'un bleu-noir, avec deux rangées tranſverſes & poſtérieures de points d'un bleu clair, & une rangée tout-à-fait terminale de lunules d'un jaune-terreux.

En deſſous, le fond des quatre ailes eſt d'un brun-griſâtre un peu luiſant. Vers la baſe ſont des traits noirs, ondulés, tranſverſaux, légèrement bordés de bleuâtre; vient après cela une ſérie tranſverſe & tortueuſe de points jaunâtres. Cette ligne eſt ſuivie aux ſecondes ailes d'un rang de points violâtres, adoſſés à des lunules jaunâtres. Les premières ailes ont à leur angle interne une double tache noire, bordée en dehors par une accolade bleuâtre. Le deſſus du corps eſt d'un brun-noirâtre, avec quatre points blanchâtres ſur la tête. Les antennes ſont noires, & les palpes jaunâtres en deſſous.

Des îles de Java & d'Amboine.

15. Nymphale Thurius.

Nymphalis Thurius.

Nym. alis ſuprà atro-cœruleis, margine poſtico lunulis ochraceis : diſco anticarum punctis, poſticarum faſciâ latâ, cœruleſcentibus.

Papilio Thicſte. Stoll, *Pap. Suppl. à* Cram. *pl.* 32. *fig.* 2 & 2. B.

Elle a beaucoup de rapport avec la nymphale *Tiridate;* mais, ce qui l'en diſtingue particulièrement, c'eſt que le deſſus des ſecondes ailes eſt traverſé au milieu par une bande d'un bleu encore plus pâle que les points, & le deſſous des quatre, par une bande griſâtre tortueuſe. La bande bleue du deſſus des ſecondes ailes eſt large & dentée en dehors.

Priſe dans le pays des Caffres par M. Levaillant.

16. Nymphale Œclus.

Nymphalis Œclus.

Nym. alis ſuprà atro-cœruleis : ſubtùs cinereo-cœruleſcentibus nigroque undatis, maculâ anguli ani fulvâ.

Papilio N. Œclus, *alis dentato-bicaudatis, ſuprà nigris : ſubtùs cinereis, nigro undatis, maculâ ocellari fulvâ.* Fab. *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 6. *n°.* 50. — *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 63. *n°.* 198.

Papilio Œclus. Herbst, *Pap. tab.* 65. *fig.* 3. 4.

Papilio Aeilus. Cram. *Pap. pl.* 317. *fig.* A. B.

Elle a près de trois pouces & demi d'envergure. Le deſſus des ailes eſt d'un bleu-noir, ſans taches aux inférieures, avec quatre ou cinq points blancs épars vers le ſommet des ſupérieures.

En deſſous, le fond des quatre ailes eſt d'un bleu-ardoiſé pâle, avec une multitude de lignes noires, ondulées & tranſverſales. Il y a en outre, à l'angle interne de chaque aile, une tache jaune orbiculaire. Celle des inférieures a le milieu marqué d'un point noir. Les deux ſurfaces du corps ſont colorées comme celles des ailes, & la tête offre deux points blancs. Les antennes ſont noires.

De l'île d'Amboine.

17. Nymphale Ethéocle.

Nymphalis Etheocles.

Nym. alis ſuprà atro-viridibus, ſubtùs fuſceſcentibus : utrinquè faſciâ albâ, mediâ.

Papilio N. Etheocles, *alis bicaudatis, cœruleo-fuſcis, utrinquè faſciâ albâ : poſticis margine viridi.* Fab. *Spec. Inſ. tom.* 2. *p.* 6. *n°.* 51. — *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 64. *n°.* 200.

Papilio Etheocles. Cram. *Pap. pl.* 119. *fig.* D. E.

Papilio Etheocles. Herbst, *Pap. tab.* 65. *fig.* 3. 4. 5.

Elle eſt de la même taille que l'*Œclus.* Le deſſus des ailes eſt d'un vert-noir, avec une bande blanche, commune, oblique, diſcoïdale. La bande des premières ailes eſt maculaire, rétrécie antérieurement, & précédée, vers l'origine de ſon côté interne, d'un groupe de trois à quatre points de ſa couleur. Les ſecondes ailes ont, parallèlement à leur bord poſtérieur, une rangée de croiſſans blanchâtres, &, ſur le bord même qui eſt d'un vert plus clair que le reſte de la ſurface, quelques croiſſans ferrugineux.

Le deſſous des quatre ailes eſt d'un brun-pâle, un peu luiſant, avec une bande blanche, correſpondante à celle du deſſus. A la baſe des ſupérieures ſont trois points ocellés, à celle des inférieures trois lignes tranſverſes, noirs & bordés de bleuâtre. On voit en outre à l'angle interne des premières ailes une double tache noire, & en avant du bord poſtérieur des ſecondes, un cordon de lunules violâtres. Ce bord eſt vert, depuis la queue extérieure juſqu'à l'angle anal incluſivement, avec une ſuite de points noirs.

De la côte de Guinée.

18. Nymphale Ephyra.

Nymphalis Ephyra.

Nym. alis ſuprà fuſco nigris, anticarum margine poſtico punctis vireſcentibus, poſticarum lunulis albidis.

Elle diffère de l'*Ethéocle* en ce qu'elle eſt d'environ neuf lignes plus petite, & ſans bande blanche de part & d'autre; en ce que le deſſus de ſes ailes eſt d'un noir-brun, peu ou pas chatoyant; en ce que celui des ſupérieures a trois points verdâtres le long de la côte, & huit ou neuf ſemblables le long du bord terminal.

De la côte occidentale d'Afrique.

N. B. Nous n'avons vu que des mâles. Parmi eux il s'en trouvoit un dont le deſſus des ſecondes ailes offroit, avant les croiſſans blanchâtres, une rangée de lunules d'un vert-obſcur.

19. Nymphale Etéſipe.

Nymphalis Eteſipe.

Nym. alis ſuprà atro-cœruleis, ſubtùs albo, nigro ferrugineoque marmoratis : utrinquè faſciâ albâ, mediâ.

Papilio Etheocles. Drury, *Inſ. tom.* 3. *pl.* 10.

Fabricius l'a confondue avec l'*Ethéocle*, quoiqu'elle en diffère eſſentiellement.

Elle a environ trois pouces & demi d'envergure.

Le deſſus des ailes eſt d'un noir-bleu, avec une bande blanche, commune, oblique, diſcoïdale. Cette bande eſt continue & dentelée extérieurement aux ſecondes ailes. Aux premières, elle ſe compoſe de taches dont les poſtérieures très-

grandes, les antérieures très-petites, & formant par leur disposition une fissure assez profonde. Les secondes ailes ont au milieu de leur bord terminal un croissant roussâtre, plus ou moins distinct; &, en avant de l'angle anal qui est verdâtre, un groupe de deux ou trois points blancs.

Le dessous des quatre ailes est cendré, avec une multitude de taches blanches, entremêlées de taches noires dont toutes les antérieures ayant le milieu ferrugineux; plus une bande blanche, correspondant à celle de dessus. Indépendamment de cela, les secondes ailes ont le bord antérieur d'un blanc-satiné. Leur bord postérieur est verdâtre à l'angle de l'anus, avec deux taches violâtres; jaune entre les deux queues; puis noir; enfin, chargé au sommet d'un rang de trois lunules ferrugineuses. Le dessus du corps est d'un noir-brun, avec quatre points blancs sur la tête, & deux autres sur le milieu du corselet. Les antennes sont tout-à-fait noires.

De Sierra-Leone.

20. Nymphale Ethéta.

Nymphalis Etheta.

Nym. alis suprà atro-cæruleis, dimidio apicali cærulescenti-maculatis : subtùs albo, nigro ferrugineoque marmoratis.

Elle diffère de l'*Etésipe* en ce qu'elle est moins grande; en ce que le dessus de ses ailes offre à l'extrémité deux rangées transverses de taches d'un bleu-pâle, surtout les extérieures; en ce que la bande blanche, discoïdale, manque de part & d'autre. La surface supérieure des premières ailes est seulement marquée de quelques points blancs entre le disque & le milieu du bord d'en haut.

De la côte occidentale d'Afrique.

N. B. Ne seroit-ce point le mâle de l'*Etésipe?*

21. Nymphale Bérénice.

Nymphalis Berenice.

Nym. alis suprà nigris, fasciâ communi rufâ : posticis subtùs albo, flavo ferrugineoque maculatis.

Papilio N. Berenice, *alis dentatis, nigris, fasciâ communi rubrâ : posticis subtùs nigro, albo, ferrugineo flavoque maculatis.* Fab. *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 48. *n°.* 471. — *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 114. *n°.* 350.

Papilio Berenice. Drury, *Inf. tom.* 3. *pl.* 11. *fig.* 1. 2.

Papilio Zingha. Cram. *pl.* 315. *fig.* B. C.

Papilio Zinghus. Herbst, *tab.* 151. *fig.* 3. 4.

Elle est de la taille de la précédente. Le dessus des ailes est noir, avec une bande rousse, traversant obliquement le milieu des supérieures, & couvrant toute la base des inférieures. Ces dernières sont ponctuées de blanc vers l'angle de l'anus, & de roux vers le sommet.

Le dessous des premières est grisâtre le long de la côte, avec des points & des veines noirs; roux le long du bord interne, avec du noir près de l'angle de ce nom.

Le dessous des secondes ailes est blanchâtre à la base, avec des points noirs; puis noir jusqu'au bout, avec des taches grisâtres, entremêlées de points ferrugineux. Il y a en outre, vers l'angle de l'anus, quelques taches jaunes, entre lesquelles sont des hiéroglyphes blancs.

De la côte occidentale d'Afrique, & particulièrement de Sierra-Leone.

22. Nymphale Pyrrhus.

Nymphalis Pyrrhus.

Nym. alis suprà fusco-nigris, basi pallidè ochreaceâ : posticis lunularum cærulescentium serie duplici.

Papilio E. A. Pyrrhus, *alis bicaudatis, fuscis, fasciâ communi albâ : primorum dimidiatâ.* Linn. *Syst. Nat.* 2. *p.* 749. *n°.* 25. — *Mus. Lud. Ulr. p.* 205.

Papilio Pyrrhus. Clerck, *Icon. tab.* 25. *fig.* 2.

Papilio N. *Pyrrhus.* Fab. *Syst. em. p.* 449. *n°.* 30. — *Spec. Inf. tom.* 2. *p.* 10. *n°.* 41. — *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 6. *n°.* 45. — *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 61. *n°.* 192.

Papilio Pyrrhus. Cram. *Pap. pl.* 220. *fig.* A. B.

Papilio Pyrrhus. Herbst, *Pap. tab.* 62. *fig.* 1. 2.

Seba, *Mus.* 4. *tab.* 47. *fig.* 2. 3.

Elle a environ quatre pouces & demi d'envergure. Le dessus des ailes est d'un noir-brun, avec la moitié antérieure des inférieures, & un grand espace triangulaire à l'origine du bord interne des supérieures, d'un jaune livide. Les ailes supérieures ont neuf taches orbiculaires du même jaune, savoir : deux un peu au-delà du milieu de la côte, & sept alignées parallèlement au bord de derrière. Les secondes ailes ont deux rangées de lunules bleues : l'une bordant le côté externe de la partie jaune; l'autre marginale, terminée à l'angle de l'anus par un croissant fauve, & séparée de la précédente par une ligne transverse de points blancs ou bleuâtres.

Le dessous des quatre ailes est d'un brun-jaunâtre, coupé transversalement près de la base par deux raies noires, communes, dont la postérieure décrivant un coude & remontant jusqu'à la poitrine. Immédiatement après cette dernière raie, c'est-à-dire, au milieu de la surface, il y a une bande blanche, terminée en pointe sur les secondes ailes, & suivie sur toutes les quatre d'une

ligne noire, ondulée, bordée de blanc extérieurement, & entre laquelle & le bord, mais plus près de celui-ci, on voit un cordon de taches blanches. Indépendamment de ces caractères, le deſſous des ſecondes ailes offre trois lunules d'un rouge-ferrugineux, diſpoſées obliquement entre le diſque & le bord interne; plus une rangée terminale de lunules jaunes. Le corps eſt d'un jaune-pâle; la tête & le devant du corſelet ſont noirs, avec des points blancs.

De l'île d'Amboine.

N. B. Fabricius rapporte ici la fig. 3, *pl.* 2, *tom.* 1 de Drury; mais cette figure repréſente l'*Athamas*. Drury n'a point donné le *Pyrrhus*.

23. Nymphale Niſus.

Nymphalis Niſus.

Nym. alis ſuprà fuſco-nigris : poſticis antè marginem poſticum cæruleſcentibus, punctis ocellaribus fuſciâque albâ.

Papilio N. Euryalus, *alis caudatis, nigris : poſticis antè marginem cæruleis, maculis nigris pupillâ albâ.* Fab. *Spec. Inſ. tom.* 2. *p.* 20. *n°.* 83. — *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 11. *n°.* 95. — *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 70. *n°.* 218. (Le mâle.)

Papilio Euryalus. Cram. *Pap. pl.* 74. *fig.* A. B.

Papilio Euryales. Herbst, *Pap. tab.* 61. *fig.* 1. 2.

Papilio N. Niſus, *alis caudatis, nigris : anticis faſciâ fulvâ; poſticis albâ ſubmarginali.* Fab. *Spec. Inſ. tom.* 2. *p.* 21. *n°.* 84. — *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 11. *n°.* 96. — *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 70. *n°.* 219. (La femelle.)

Papilio Niſus. Cram. *Pap. pl.* 150. *fig.* A. B.

Papilio Niſſus. Herbst, *Pap. tab.* 61. *fig.* 3. 4.

Les auteurs ont donné le mâle de ce lépidoptère ſous le nom d'*Euryalus*, & la femelle ſous celui de *Niſus*. Nous adoptons le dernier de ces deux noms, parce qu'il y a un ſatyre qui porte celui d'*Euryale*.

Notre *Niſus* a le port & la taille du *Pyrrhus*; mais ſa queue poſtérieure eſt ſenſiblement plus courte que celle qui la précède en dehors. Le deſſus des ailes eſt d'un noir-brun, avec une bande fauve ou jaunâtre vers l'extrémité des ſupérieures, & une bande blanche ſur le bord terminal des inférieures. La bande des premières ailes deſcend de la côte à l'angle interne. Elle ſe compoſe ordinairement de points fauves dans le mâle, de taches jaunâtres, grandes & en forme de coin dans la femelle; nous diſons ordinairement, parce qu'il arrive qu'elle s'oblitère plus ou moins, n'importe le ſexe. La bande marginale des ſecondes ailes eſt précédée antérieurement d'une bande d'un bleu-cendré, ſur laquelle il y a une rangée courbe de huit yeux noirs à prunelle bleuâtre, yeux beaucoup plus grands dans la femelle que dans le mâle.

Le deſſous des quatre ailes eſt brun, un peu teinté de gris-luiſant, avec deux bandes jaunes, communes, dont l'antérieure bordée de noir, plus courte & moins vive; la poſtérieure ayant des points bleuâtres à ſon côté externe ſur les ailes de devant, & à ſon côté interne ſur celles de derrière. On voit en outre au milieu de chaque aile une ligne noire, tranſverſe & tortueuſe, laquelle eſt doublée de jaunâtre en dehors, mais ſeulement dans la femelle. Le corps eſt noir en deſſus, brun en deſſous. Les antennes ſont noires.

De l'île d'Amboine.

24. Nymphale Solon.

Nymphalis Solon.

Nym. alis caudatis, nigris, faſciâ flaveſcente, baſi fuſcis. Fab.

Papilio N. *Solon.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 69. *n°.* 216.

Papilio Solon. Jon. *Fig. piét.* 5. *tab.* 63. *fig.* 2.

Comme nous n'avons pas vu ce lépidoptère, nous ignorons quelle peut être ſa véritable place.

Le corps eſt brun. Le deſſus des ailes eſt obſcur à la baſe; enſuite noir, avec une bande jaunâtre, commune, mais interrompue ſur les ſupérieures. Indépendamment de cela, le bord terminal eſt ponctué de jaune.

Le deſſous des ailes eſt cendré, avec quelques ondes noires à la baſe; une bande d'un jaune-pâle ſur le milieu; des taches jaunes peu prononcées à l'extrémité.

Il habite.....

(*Traduction de Fabricius.*)

25. Nymphale Xipharès.

Nymphalis Xiphares.

Nym. alis ſuprà nigris : anticarum diſco maculis albis, poſticarum faſciâ flavâ extùſque dentatâ.

Papilio N. Xiphares, *alis dentato-caudatis, nigris : anticis albo maculatis, poſticis faſciâ flavâ.* Fab. *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 11. *n°.* 96. — *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 71. *n°.* 221.

Papilio Xiphares. Cram. *Pap. pl.* 377. *fig.* A. B.

Papilio Xiphares. Herbst, *Pap. tab.* 60. *fig.* 5. 6.

Cette nymphale, dont l'envergure eſt d'environ quatre pouces, a la même forme que toutes celles de cette diviſion; mais ſa queue poſtérieure eſt arquée, & beaucoup plus longue que celle qui la précède en dehors.

Le deſſus des premières ailes eſt d'un noir-brun, avec quatre ou cinq taches blanches, diſcoïdales,

& huit points jaunâtres, dont cinq disposés transversalement en arc entre les taches précédentes & le sommet, les trois autres groupés à l'angle interne. Le dessus des secondes ailes est d'un noir-brun, & traversé au milieu par une bande jaune, oblique, large, dentée en dehors. On y voit en outre deux séries marginales de lunules, dont les intérieures d'un bleu pâle & luisant, les extérieures jaunâtres.

Le dessous des quatre ailes est d'un brun-olivâtre vers la base, avec quelques raies noires, transversales & bordées de bleuâtre; puis grisâtre jusqu'au bout, avec un bande blanche, commune, discoïdale, tortueuse, & précédée extérieurement d'une ligne jaunâtre, ondulée. Aux lunules du dessus des secondes ailes correspondent ici des lunules à peu près semblables.

Du Cap de Bonne-Espérance.

26. Nymphale Miltiade.

Nymphalis Miltiades.

Nym. alis caudatis, fuscis: posticis maculâ albâ: subtùs omnibus fasciâ communi albâ ocelloque unico. Fab.

Papilio N. *Miltiades.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 66. *n°.* 205.

Papilio Miltiades. Jon. *Fig. pict.* 5. *tab.* 80. *fig.* 2.

Cette espèce n'est mise ici que conditionnellement. Le corps est grand, brun. Les ailes supérieures sont d'un brun-obscur, avec une tache ferrugineuse sur leur milieu, & deux points blancs vis-à-vis de leur sommet. Leur dessous est plus pâle que le dessus, avec deux raies noires, transverses, à la base; une bande blanche derrière le milieu; un œil noir à iris jaune & sans prunelle vers le bord postérieur.

Les secondes ailes sont en queue. Leur dessus est d'un brun-obscur, avec une grande tache blanche, plus une raie jaune, transverse & marginale. Leur dessous est comme celui des premières ailes, mais la bande blanche a le milieu dilaté & marqué d'un œil noir.

Elle habite.....

(*Traduction du texte de Fabricius.*)

B. Bord postérieur des premières ailes plus ou moins concave. Bord correspondant des secondes avec une queue extérieure, linéaire, aiguë, & la dent qui précède l'angle anal, obtuse & un peu plus prononcée que les autres.

27. Nymphale Achéronta.

Nymphalis Acheronta.

Nym. alis anticis suprà basi rufis, apice nigris albo maculatis: posticis fusco ferrugineis puncto nigro.

Papilio N. Acheronta, *alis dentato-caudatis: anticis basi rubris, apice nigris albo maculatis.* Fab. *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 47. *n°.* 463. — *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 76. *n°.* 239.

Papilio Cadmus. Cram. *Pap. pl.* 22. *fig.* A. B.

Papilio Pherecides. Cram. *Pap. pl.* 330. *fig.* A. B.

Papilio Cadmus. Herbst, *Pap. tab.* 57. *fig.* 1. 2.

Papilio Pherecides. Herbst, *Pap. tab.* 57. *fig.* 3. 4.

Elle a environ trois pouces & demi d'envergure. Le dessus des premières ailes est d'un fauve-foncé depuis la base jusque vers le milieu, avec les nervures plus ou moins noirâtres; ensuite noir jusqu'au bout, avec six points blancs, dont quatre formant une ligne oblique derrière la couleur fauve, les deux autres disposés transversalement vis-à-vis du sommet. Le dessus des secondes ailes est d'un ferrugineux obscur, avec un point noir, plus ou moins distinct, vers l'angle de l'anus.

Le dessous des quatre ailes est d'un brun légèrement glacé de gris, avec quelques taches noires, annulaires, près de la base; une ligne flexueuse & transverse de cette couleur sur le milieu; une bande obscure & pareillement transverse entre la ligne susdite & le bord postérieur. Cette bande est terminée au bord antérieur des premières ailes par une tache d'un blanc-luisant, & au bord interne des secondes par deux points noirs ocellés. Les secondes ailes ont en outre un point blanchâtre dans une des taches annulaires de la base. Le corps est d'un brun-roussâtre en dessus, d'un brun-pâle en dessous. Les antennes sont ferrugineuses, avec la massue noire.

Elle se trouve depuis le Bréfil jusqu'à l'état de New-York inclusivement.

C. Bord postérieur des premières ailes concave, & plus ou moins tronqué au sommet. Bord correspondant des secondes avec deux queues linéaires, dont l'une anale & courbée du côté du corps; l'autre extérieure, oblique, beaucoup plus longue, & obtuse à son extrémité.

28. Nymphale Thétis.

Nymphalis Thetis.

Nym. alis suprà fulvis, strigis tribus nigris, communibus, rectis: subtùs glauco-nitidis, strigâ mediâ serieque punctorum ocellatorum.

Papilio N. Thetis, *alis dentato-caudatis, fulvis, strigis nigris: posticis subtùs glaucis.* Fab. *Spec. Inf. tom.* 2. *p.* 87. *n°.* 385. — *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 47. *n°.* 465. — *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 77. *n°.* 241.

Papilio Petreus. Cram. *Pap. pl.* 87. *fig.* D. E.

Stoll, *Pap. Suppl. à* Cram. *pl.* 2. *fig.* 2. A. (La chenille.) *Fig.* 2. B. (La chrysalide.)

Papilio Petreus. Herbst, *Pap. tab.* 67. *fig.* 1. 2.

Papilio Petreus. Esp. *Pap. Exot. tab.* 58. *fig.* 1. 4.

Papilio Peleus. Sulz. *Inf. p.* 142. *tab.* 13. *fig.* 4.

Elle a entre trois pouces & trois pouces & demi d'envergure. Le deſſus des premières ailes eſt d'un fauve plus ou moins vif, ſuivant le ſexe, avec trois lignes noires, communes, obliques, non ſinuées. Il y a en outre deux ou trois petites lignes tranſverſes, de cette couleur, vers la baſe des premières ailes, leſquelles ont l'extrémité de la côte & une partie du bord terminal noirâtres. Ce dernier bord & les queues ſont obſcurs aux ſecondes ailes, dont l'angle anal offre trois croiſſans blanchâtres, croiſſans que ſurmontent deux points noirs entourés chacun d'un cercle blanc, tantôt ſimple, tantôt double. La queue extérieure a l'extrémité un peu blanche.

Le deſſous des quatre ailes eſt d'un brun ferrugineux, glacé de violâtre ou de blanc-verdâtre, avec une ligne obſcure, commune, diſcoïdale, oblique, derrière laquelle il y a une rangée tranſverſe de points noirs, ocellés. Les ailes ſupérieures ont de plus quelques légères taches brunes le long de la côte.

La femelle a les queues bordées de fauve.

La chenille, d'après Stoll, eſt ferrugineuſe, tachetée de noir, avec la tête fauve & armée de deux épines noirâtres, longues, légèrement rameuſes. Sur ſon dos, entre la cinquième & la onzième inciſions, eſt une bande jaune, aſſez large, ſinuée, d'où s'élève un rang de quatre épines noires, aiguës, & dont la poſtérieure un peu courbée en avant. Les pattes écailleuſes ſont noires; les pattes membraneuſes jaunes, ainſi que le ventre. Elle vit ſur l'*acajou des Indes occidentales* (*anacardium occidentale*).

La chryſalide eſt jaune, mouchetée de noir, avec des épines brunes, dont les deux antérieures & les ſuivantes longues, les poſtérieures courtes & dorſales.

De la Guyane & du Bréſil.

29. Nymphale Pellénis.

Nymphalis Pellenis.

Nym. alis ſuprà fulvis, ſtrigis duabus nigris, communibus; anticarum poſticâ angulatâ: ſubtùs glauco-nitidis, ſtrigâ mediâ ſerieque punctorum ocellatorum.

Elle diffère de la précédente, en ce qu'elle a environ un demi-pouce de moins; en ce que la ſeconde ligne noire eſt fortement briſée aux premières ailes, & que la troiſième y manque totalement; en ce que le mâle a la queue extérieure moins longue, un peu plus large & bordée de fauve comme dans la femelle.

Nous la ſoupçonnons des Antilles.

30. Nymphale Aſtina.

Nymphalis Aſtina.

Nym. alis caudatis, fuſcis, diſco communi fulvo: anticis lunulâ atrâ. Fab.

Papilio N. *Aſtina.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 81. *n°.* 251.

Papilio Aſtina. Jon. *Fig. pict.* 5. *tab.* 80. *fig.* 1.

Voici ce qu'en dit Fabricius: le deſſus des ailes eſt d'un brun-obſcur, avec un eſpace fauve, diſcoïdal & commun. Les ſupérieures ont en outre une lunule noire.

Le deſſous de toutes les ailes eſt ondé de brun, & la queue des inférieures eſt longue.

De l'île Saint-Thomas.

31. Nymphale Coréſie.

Nymphalis Coreſia.

Nym. alis ſuprà fuſco-nigris, baſi faſciâque geminâ purpuraſcenti-ferrugineis: ſubtùs dimidio baſilari niveo, ſtrigâ ferratâ ferrugineâ extùs marginato.

Elle a environ deux pouces & demi d'envergure. Le deſſus des ailes eſt d'un noir-brun, avec la baſe, & deux bandes poſtérieures, d'un ferrugineux-purpurin. Les ſecondes ailes ont le bout de la queue extérieure blanc, la queue anale ferrugineuſe de part & d'autre & ſurmontée d'un groupe d'atomes blanchâtres.

Le deſſous des quatre ailes a la moitié antérieure d'un blanc-ſatiné, & bordée en dehors par une bande ferrugineuſe dont le côté externe eſt en ſcie & terminé de noir. L'autre moitié eſt d'un brun-griſâtre-luiſant, ſurtout au ſommet, avec le bord poſtérieur ferrugineux. Sur la partie blanche de la baſe ſont trois lignes rouſſâtres, tranſverſes, très fines & légèrement flexueuſes. Le corps a le deſſus d'un noir-brun, le deſſous blanc. Les antennes ſont noires en deſſus, ferrugineuſes & annelées de blanc en deſſous.

Du Bréſil.

32. Nymphale Chiron.

Nymphalis Chiron.

Nym. alis ſuprà nigro-fuſcis, faſciis quatuor communibus corticinis: ſubtùs dimidio baſilari margaritaceo, faſciâ albâ extùs marginato.

Papilio E. A. Chiron, *alis caudatis, nigris, fuſco faſciatis: anticè albis, ſtrigis ferrugineis.* Fab. *Syſt. Ent. p.* 452. *n°.* 40. — *Spec. Inſ. tom.* 2. *p.* 16. *n°.* 60. — *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 8. *n°.* 68. — *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 26. *n°.* 78.

Papilio Marius. Cram. *pl.* 200. *fig.* D. E.

Papilio Marius. Stoll, *Suppl. à* Cram.

Papilio Marius. Esp. *Pap. Exot. tom.* 1. *tab.* 52. *fig.* 4.

Daubenton, *Pl. enlum.* 71. *fig.* 2. 3.

Papilio Chiron. Herbst, *tab.* 52. *fig.* 1. 2.

Elle eſt de la même taille que la précédente. Le deſſus des quatre ailes eſt d'un brun-noirâtre, avec quatre raies ou bandes communes d'un brun-tanné-pâle. Il y a en outre vers l'extrémité des premières ailes une rangée tranſverſe de trois points blancs, & à l'angle anal des ſecondes deux taches noires oculaires, dont la plus intérieure ſaupoudrée de blanchâtre. La queue interne de ces dernières ailes a le milieu d'un roux-vif, & la queue externe a le bout blanc.

Le deſſous de toutes les ailes eſt d'un gris de perle à la baſe, avec quatre lignes rouſſes, tranſverſales, dont l'extérieure bordée par une bande blanche étroite. De cette bande au bord terminal, le fond eſt brun, avec trois raies violâtres, communes, plus quelques points blancs au ſommet des ailes ſupérieures, & deux points noirs ocellés à l'angle anal des inférieures.

De l'Amérique méridionale.

33. Nymphale Thémiſtocle.

Nymphalis Themiſtocles.

Nym. alis ſuprà nigro-ſuſcis, ſaſciis quatuor communibus corticinus : ſubtùs violaceo-brunneis, punctorum nigricantium ſerie poſticâ.

Papilio N. Themiſtocles, *alis caudatis, brunneis, ſuſco-ſaſciatis : poſticis punctis duobus atris.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 66. *n°.* 207.

Papilio Themiſtocles. Jon. *Fig. pict.* 5. *tab.* 70. *fig.* 2.

Elle reſſemble beaucoup au *Chiron;* mais elle n'a qu'une ſeule queue, celle de l'angle de l'anus manque; les bandes brunes du deſſus des ailes ſont plus vives; le deſſous eſt entièrement brun & légèrement glacé de violet, avec deux lignes obſcures & ondulées ſur le milieu, & une ſérie de points noirâtres ocellés en avant du bord poſtérieur. Outre cela le mâle n'a pas de points blancs vis-à-vis du ſommet des premières ailes.

Du Bréſil.

34. Nymphale Dioné.

Nymphalis Dioné.

Nous l'avons décrite comme Vaneſſe (p. 309, n°. 12); mais elle doit être rapportée ici.

35. Nymphale Corinne.

Nymphalis Corinna.

Elle a été miſe parmi les Vaneſſes (p. 309, n°. 11); mais elle doit être rapportée ici.

36. Nymphale Furcula.

Nymphalis Furcula.

Nym. alis ſuprà baſi ſulvis, tunc nigris cæruleoque micantibus : ſubtùs nitenti-ferrugineis, ſtrigis duabus nigris, undulatis.

Papilio N. Furcula, *alis caudatis, ſuſcis, baſi ſulvis : anticis ſaſciâ cæruleâ.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 79. *n°.* 246.

Papilio Furcula. Jon. *Fig. pict.* 5. *tab.* 79. *fig.* 1.

Papilio Iolé. Drury, *Inſ. tom.* 3. *pl.* 38. *fig.* 2.

Papilio Iole. Stoll, *Pap. Suppl. à* Cram. *pl.* 29. *fig.* 4 & 4. D.

Elle eſt à peu près de la taille des deux précédentes. Le deſſus des quatre ailes eſt fauve à la baſe; enſuite noir juſqu'au bout, avec un reflet d'un bleu-violet, reflet qui ſe fait principalement ſentir contre la couleur fauve des ſupérieures. Les ſecondes ailes ont, près de l'angle anal, un point d'un noir-foncé & entouré d'un anneau roux.

Le deſſous des quatre ailes eſt d'un ferrugineux légèrement glacé de violâtre, avec deux lignes tranſverſes & ondulées, puis une rangée de points oculaires, noirs. Le deſſus du corps eſt fauve.

De la Jamaïque.

D. Bord poſtérieur des premières ailes concave. Bord correſpondant des ſecondes avec deux queues, dont l'une anale, très-courte & arrondie; l'autre extérieure, oblique, longue, dilatée en angle vers l'origine de ſon côté interne, un peu courbe & rétrécie à ſon extrémité.

37. Nymphale Orſiloque.

Nymphalis Orſilochus.

Nym. alis ſuprà ſuſcis, ſaſciis duabus margaritaceis, tranſverſis : ſubtùs margaritaceis, ſaſciis ſulvis.

Papilio E. A. Orſilochus, *alis caudatis : anticis ſaſciis duabus, poſticis unicâ, albis : ſubtùs baſi albis ſaſciâ ſulvâ.* Fab. *Gen. Inſ. Mant. p.* 252. — *Spec. Inſ. tom.* 2. *p.* 16. *n°.* 62. — *Mant. Inſ. tom.* 2, *p.* 8. *n°.* 70. — *Ent. Syſt. em. tom,* 3. *pars* 1. *p.* 27. *n°.* 89.

Papilio Cinna. Cram. *Pap. pl.* 200. *fig.* F. G.

Papilio Orſilochus. Herbst, *Pap. tab.* 52. *fig.* 3. 4.

Elle a environ deux pouces d'envergure. Le deſſus de ſes ailes eſt d'un brun-noirâtre, avec deux bandes communes, couleur de nacre de perle, & dont l'antérieure diſcoïdale, droite, aſſez large; la poſtérieure linéaire, & en outre oblitérée aux ſecondes ailes. Celles-ci ont la queue

queue anale fauve & marquée d'un point noir ; la queue extérieure brune, bordée de blanc & précédée de quelques traits de cette couleur.

Le deſſous des quatre ailes eſt nacre de perle, avec trois bandes fauves, communes. Il y en a une quatrième, très-courte, vis-à-vis du ſommet des ailes ſupérieures, ailes dont le bord terminal eſt également fauve. Le bord correſpondant des ailes inférieures eſt longé par une double ligne noire, ondée, & les queues ſont colorées comme en deſſus. Le corps eſt brun en deſſus, blanc en deſſous. Les antennes ſont ferrugineuſes.

De la Guyane.

38. Nymphale Chriton.

Nymphalis Chriton.

Nym. alis caudatis, ſuprà fuſcis, ſubtùs glaucis : faſciâ utrinquè albâ. Fab.

Papilio E. A. *Chriton.* Fab. *Gen. Inſ. Mant. p.* 252. — *Spec. Inſ. tom.* 2. *p.* 16. *n°.* 61. — *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 8. *n°.* 69. — *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 27. *n°.* 79.

Papilio Chriton. Herbst, *Pap. tab.* 52. *fig.* 5. 6.

Elle a de l'affinité avec la précédente. Les ailes ſupérieures ont la baſe d'un brun-obſcur, avec quelques lignes tranſverſes encore plus obſcures ; le milieu traverſé par une bande blanche, large ; l'extrémité noire, avec ſix ou ſept points blancs. Les ailes inférieures ſont d'un brun-obſcur, avec une raie blanche, s'alignant à la bande des premières ailes, mais ne deſcendant pas juſqu'à l'angle de l'anus. Leur bord poſtérieur eſt rayé, & l'on y voit trois taches noires entourées d'un iris blanc. L'angle anal offre une petite tache rouſſe, & la queue eſt longue, noirâtre, bordée de blanc.

Le deſſous des quatre ailes eſt d'un gris-violâtre-luiſant, avec une large bande blanche & des lignes fauves, tranſverſales. Aux trois taches noires, & à la tache rouſſe des ſecondes ailes correſpondent ici des taches ſemblables.

De Surinam.

(*Traduction du texte de Fabricius.*)

E. Bord poſtérieur des premières ailes peu concave ou preſque droit. Bord correſpondant des ſecondes avec deux queues, dont l'une anale, très-courte & arrondie ; l'autre extérieure, oblique, linéaire & aiguë.

39. Nymphale Camillus.

Nymphalis Camillus.

Nym. alis utrinquè albis, faſciis tranſverſis rufeſcentibus fuſcoque marginatis.

Papilio N. Camillus, *alis bicaudatis, albis, fuſcis fulvis nigro marginatis : poſticis maculâ caudali atrâ.* Fab. *Spec. Inſ. tom.* 2. *p.* 11. *n°.* 42. — *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 6. *n°.* 46. — *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 62. *n°.* 193.

Papilio Pantheus. Drury, *Inſ. tom.* 3. *pl.* 6. *fig.* 4.

Elle a approchant deux pouces & demi d'envergure. Ses ailes ſont blanches de part & d'autre, avec ſept bandes communes, dont les quatre antérieures rouſſâtres & bordées de brun, les trois poſtérieures entièrement brunes & linéaires. Outre cela, les premières ailes ont l'extrémité des nervures brune, & le milieu de leur bord d'en haut offre deux petites bandes colorées comme les quatre bandes antérieures. L'angle anal & la queue interne des ſecondes ailes ſont fauves, avec une tache noire, mais ſaupoudrée de bleu en deſſus. Le corps eſt blanc, avec une ligne noire le long du dos, & une ſemblable le long de chaque côté. Les antennes ſont noires. Les palpes ont le deſſus rouſſâtre, le deſſous blanc.

De l'Afrique équinoxiale.

40. Nymphale Thyoné.

Nymphalis Thyone.

Nym. alis utrinquè fulvis, ſtrigis plurimis fuſcis : poſticarum 4^a, 6^a, 8^a, *tenuiter albo marginatis.*

Papilio Thyonneus. Cram. *Pap. pl.* 220. *fig.* E. F.

Elle eſt à peu près de la taille de la précédente. Le deſſus de toutes les ailes eſt d'un fauve-foncé, avec neuf lignes tranſverſes d'un brun-noirâtre. Les quatrième, ſixième & huitième lignes des ailes inférieures ont un des côtés finement bordé de blanc.

Le deſſous ne diffère du deſſus que parce qu'il eſt plus pâle, & parce que les premières ailes ont près du ſommet un petit eſpace blanc. Le corps eſt fauve en deſſus, avec trois lignes noires le long du corſelet, & une ſeule le long du dos.

Nous n'avons vu que le mâle, en ſorte que nous ne pouvons dire ſi la femelle offre des différences.

De l'île d'Amboine.

41. Nymphale Hylas.

Nymphalis Hylas.

Nym. alis utrinquè fulvis aut albis, ſtrigis margineque fuſcis anguloque ani bipunctato.

Papilio Hylas. Clerck, *Icon. tab.* 40. *fig.* 4. (Fem. var.)

Elle a entre un pouce & demi & deux pouces d'envergure. Le mâle eſt fauve de part & d'autre. La femelle eſt blanche, avec l'angle anal de chaque aile fauve & marqué de deux points noirs. Ces

points existent pareillement dans le mâle. Celui-ci comme celle-là ont plusieurs lignes communes, & tout le contour des ailes, d'un brun-noirâtre. On voit en outre, vers l'extrémité des secondes ailes, une série transverse de points noirs, oblongs, dont quelques-uns, surtout dans la femelle, bordés de bleuâtre. Le corps est fauve ou blanc, selon le sexe, avec des lignes obscures & longitudinales. Les antennes sont noires & annelées de blanc.

De l'île de Java.

N. B. La figure de Clerck représente une femelle qui forme variété, en ce que les lignes brunes des ailes sont plus larges.

42. Nymphale Périandre.

Nymphalis Periander.

Nym. alis utrinquè albis, strigis sex rufescentibus margineque postico fusco, albo strigoso.

Papilio N. Periander, *alis caudatis, concoloribus, albis flavo fuscìatis, apice fuscis albo strigosis.* Fab. *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 9. *n°.* 74. — *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 67. *n°.* 208.

Papilio Periander. Donow. *Of an Epit. of the Nat. Hist. of the Inf. of India, cah.* 3. *pl.* 5. *fig.* 1.

Elle est à peu près de la taille de l'*Hylas*. Les quatre ailes sont blanches de part & d'autre, avec six raies roussâtres, transverses, plus ou moins longues, & une bande terminale d'un brun-obscur. Cette bande est entièrement divisée par trois ou quatre lignes blanches, flexueuses, dont l'antérieure précédée d'un rang de points noirs, lesquels sont ronds aux premières ailes, triangulaires & plus gros aux secondes. Le corps est blanc, avec des lignes brunes, longitudinales. Les antennes sont noires, annelées de blanc, avec le bout de la massue fauve.

De l'île de Java.

N. B. Décrite sur des individus mâles.

43. Nymphale Coclès.

Nymphalis Cocles.

Nym. alis subcaudatis (bicaudatis), albo flavescentique strigosis, fusciâ mediâ albâ : posticis subtùs strigâ punctorum ocellatorum. Fab.

Papilio N. *Cocles.* Fab. *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 7. *n°.* 53. — *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 65. *n°.* 204.

Papilio Cocles. Donow. *Of an Epitome of the Nat. Hist. of the Inf. of India, cah.* 3. *pl.* 2. *fig.* 2.

Elle a le port & la taille de l'*Hylas*. Ses ailes sont très-minces, rayées transversalement de blanc, de jaunâtre & de brun. Sur leur milieu, il y a une bande blanche, large, commune; & vers leur bord postérieur, une raie noire transversale.

En dessous, le fond des quatre ailes est blanchâtre, avec des lignes jaunâtres, transverses, & une ligne noire, marginale. Les ailes supérieures présentent en outre, vers l'extrémité de leur bord interne, un seul point noir oculaire. Les ailes inférieures ont une rangée transverse de six points blancs à iris jaunâtre & à prunelle blanche. La prunelle des cinq yeux antérieurs est oblongue, celle de l'œil postérieur arrondie. Les mêmes ailes ont deux queues courtes, dont l'extérieure aiguë; l'intérieure encore plus courte, ronde, offrant en dessus des lunules bleues, & en dessous une tache noire. Les antennes sont noires & annelées de blanc.

De Siam.

N. B. Nous avons mieux aimé traduire Fabricius que de nous servir de la figure de Donowan, attendu qu'elle rend mal les couleurs & la queue de l'angle de l'anus.

F. Bord postérieur des premières ailes dilaté en angle vers son milieu. Bord correspondant des secondes tronqué presque carrément vers l'angle de l'anus, & ayant une queue extérieure, oblique, assez longue, arrondie à son extrémité.

44. Nymphale Hippona.

Nymphalis Hippona.

Nym. alis suprà nigris : anticis fulvo flavoque variis, posticis strigâ anali punctorum alborum.

Papilio N. Hippona, *alis dentato-caudatis, flavo nigroque variis : posticis punctis quatuor albis.* Fab. *Gen. Inf. Mant. p.* 256. *n°.* 280-81. — *Spec. Inf. tom.* 2. *p.* 54. *n°.* 258.

Papilio H. *Hippona.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 180. *n°.* 559.

Papilio Hippona. Donow. *Of an Epit. of the Nat. Hist. of the Inf. of India, cah.* 3. *pl.* 16. *fig.* 4.

Papilio Fabius. Drury, *Inf. tom.* 3. *pl.* 16. *fig.* 1. 2.

Papilio Fabius. Cram. *Pap. pl.* 90. *fig.* C. D.

Papilio Fabius. Stoll, *Pap. Suppl. à* Cram. *pl.* 2. *fig.* 1. (Pap.) *fig.* 1. A. B. C. (chen. & chryf.)

Papilio Fabius. Herbst, *Pap. tab.* 67. *fig.* 3. 4.

Papilio Fabius. Esp. *Pap. exot. tom.* 1. *tab.* 54. *fig.* 3. 4.

Fabricius avoit d'abord rangé cette espèce parmi les *Nymphales*; mais, en dernier lieu, il en a fait un *Héliconien*, sans doute à cause des couleurs.

Elle a environ trois pouces & demi d'envergure. Les premières ailes ont le dessus noir, avec deux larges bandes, dont l'antérieure fauve, arquée, allant de la base à l'angle interne; la postérieure jaune, sinuée, oblique, atteignant la côte & le

bord terminal. L'angle externe ou ſommet offre en outre deux ou trois taches jaunes. Les ſecondes ailes ont le deſſus noir, avec une bande fauve, parallèle au bord d'en haut, & quatre points blancs, linéaires, alignés ſur le bord poſtérieur entre la queue & l'angle de l'anus.

Le deſſous des quatre ailes eſt d'une teinte ferrugineuſe, avec des bandes pâles & tranſverſes ſur les ſupérieures, avec des nuances violâtres ſur les inférieures. Le corps eſt rouſſâtre en deſſus, brun en deſſous.

La chenille, ſelon Stoll, eſt d'un vert-obſcur, avec une raie noire le long du dos, & des taches de cette couleur ſur les côtés. Ses pattes ſont d'un vert-pâle. Sa tête eſt noire, marquée de deux points jaunâtres, & munie de deux épines courtes & obtuſes. Elle vit ſur une plante appelée *poivrier*. Elle ne mange que la nuit. Durant le jour, elle reſte cachée dans une eſpèce d'étui ou de fourreau qu'elle pratique en roulant une feuille.

La chryſalide eſt courte, épaiſſe, ſans éminences angulaires, griſâtre, avec des mouchetures brunes. Elle s'attache, par la queue, à la tige de la plante ſus-mentionnée.

Des Antilles, de la Guyane & du Bréſil.

G. Bord poſtérieur des premières ailes plus ou moins concave. Bord correſpondant des ſecondes tronqué preſque carrément vers l'angle de l'anus, & ayant une queue extérieure, oblique, obtuſe ou arrondie à ſon extrémité.

a. Bord interne des premières ailes ſans échancrure.

45. Nymphale Clytemneſtre.

Nymphalis Clytemneſtra.

Nym. alis fuſco-nigris : anticis utrinquè faſciâ mediâ ochraceâ : omnibus ſubtùs ad baſin argenteo maculatis.

Papilio N. Clytemneſtra, *alis angulatis, nigris, ſubtùs albo maculatis : anticis utrinquè faſciâ flavâ.* Fab. *Spec. Inſ. tom.* 2. *p.* 93. *n°.* 406. — *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 50. *n°.* 491. — *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 123. *n°.* 375.

Papilio Clytemneſtra. Cram. *pl.* 137. *fig.* A. B.

Papilio Clytemneſtra. Cram. *pl.* 366. *fig.* A. B.

Papilio Clytemneſtra. Herbst, *tab.* 59. *fig.* 1. 2. 3.

Cette nymphale a environ trois pouces & demi d'envergure. La dent qui précède l'angle anal de ſes ailes inférieures eſt plus ſaillante que les autres, & dans la femelle le bout de la queue reſſemble pour ainſi dire à un pied.

Le deſſus des ailes eſt d'un noir-brun à reflet verdâtre, avec une bande d'un jaune d'ocre-pâle, large, ſinuée, deſcendant du milieu de la côte à l'angle interne des ſupérieures, leſquelles ont au ſommet un ou pluſieurs points du même jaune. Les ſecondes ailes offrent des points ſemblables, tantôt au ſommet ſeulement, tantôt tout le long du bord poſtérieur.

Le deſſous des quatre ailes eſt d'un brun-noirâtre, nuancé de gris-violâtre & de ferrugineux, avec des taches argentées, inégales, & éparſes depuis la baſe juſqu'au milieu de la ſurface. Outre cela, les premières ailes ont une bande comme en deſſus; mais ici, la partie antérieure eſt argentée, & le ſommet a un ou deux points également argentés. Le corps eſt de la couleur du fond des ailes. Les antennes ſont noires, avec la ſommité de la maſſue ferrugineuſe.

De la Guyane & du Bréſil.

46. Nymphale Décius.

Nymphalis Decius.

Nym. alis ſuprà fuſcis, faſciâ communi albâ, mediâ : poſticis ad angulum ani rufis, ocellis punctiſque duobus violaceis.

Papilio N. Decius, *alis caudatis, faſciâ communi albâ : poſticis apice rufis, ocellis punctiſque duobus albis.* Fab. *Spec. Inſ. tom.* 2. *p.* 10. *n°.* 82. — *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 67. *n°.* 210.

Papilio Decius. Cram. *Pap. pl.* 114. *fig.* A. B.

Papilio Decius. Herbst, *Pap. tab.* 56. *fig.* 1. 2.

Papilio Decius. Drury, *Inſ. tom.* 3. *pl.* 6. *fig.* 1. 2. (Var. an mas?)

Elle eſt approchant de la taille de la précédente. Le deſſus des ailes eſt d'un brun-noirâtre, & traverſé obliquement au milieu par une bande d'un blanc-violâtre, moins large aux ſupérieures qu'aux inférieures. Ces dernières ailes ont le bord d'en bas fauve, à partir de l'angle anal juſqu'à la queue incluſivement, avec cinq points violâtres, dont les trois extérieurs bordés de noir, & s'alignant, ainſi que les deux autres, avec des taches jaunâtres qui deſcendent de la côte des premières ailes.

Le deſſous de toutes les ailes eſt d'un brun-ferrugineux, & préſente à la baſe quelques lignes noires, tranſverſes, courtes, bordées de bleuâtre; au milieu une bande blanche comme en deſſus; à l'extrémité une multitude d'ondes noirâtres qui oblitèrent en partie la bande blanche ſuſdite. Les ſecondes ailes ont en outre le bord interne ondé de noirâtre juſqu'auprès de ſon origine. Leur bord poſtérieur eſt entièrement ferrugineux, avec une ligne bleuâtre, flexueuſe, derrière laquelle il y a une ſérie de ſept points blancs, dont les cinq extérieurs entourés de noir. Les deux ſurfaces du corps ſont de la même couleur que celles des ailes.

De la Guinée.

N. B. La figure de Drury repréſente un individu qui diffère en deſſus des autres, en ce que les taches jaunâtres manquent aux quatre ailes; en ce que le fauve du bout des inférieures monte juſqu'à la côte, & laiſſe à peine apercevoir la bande blanche. Cet individu, qu'on voit dans la collection du Muſéum, eſt le mâle ou une variété du mâle.

47. Nymphale Erota.

Nymphalis Erota.

Nym. alis ſubcaudatis, fuſcis, nigro undatis fuſciâque communi mediâ albâ : poſticis utrinquè ocellis duobus. Fab.

Papilio N. *Erota.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 76. *n°.* 257.

Papilio Erota. Jon. *Fig. pict.* 4. *tab.* 39. *fig.* 1.

Le corps eſt grand, brun. Les ailes ſont d'un brun-noirâtre, avec des ondes plus foncées. Sur le milieu eſt une bande blanche, commune, large. La bande des ailes ſupérieures eſt ondée de noirâtre; celle des inférieures peu prononcée. Ces dernières ont deux yeux & une petite queue.

Le deſſous des quatre ailes eſt jaunâtre à la baſe, avec des lignes ferrugineuſes, tranſverſales; blanchâtre à l'extrémité, avec des lignes également ferrugineuſes. Les ſecondes ailes ont en outre deux yeux comme en deſſus.

De l'Afrique.

(*Traduction du texte de Fabricius.*)

48. Nymphale Véranès.

Nymphalis Veranes.

Nym. alis ſuprà baſi albis, immaculatis, apice ferrugineis fulvoque & fuſco punctatis.

Papilio N. Veranes, *alis caudatis, ſuprà fuſcis, fulvo nigroque maculatis, baſi albis.* Fab. *Spec. Inſ. tom.* 2. *p.* 14. *n°.* 55. — *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 7. *n°.* 61. — *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 66. *n°.* 206.

Papilio Verunes. Cram. *pl.* 160. *fig.* D. E. (Mas.)

Papilio Veranes. Cram. *pl.* 388. *fig.* A. B. (Fem.)

Papilio Veranes. Drury, *Inſ. tom.* 3. *pl.* 31. *fig.* 1. 2.

Papilio Veranes. Herbst, *Pap. tab.* 56. *fig.* 3. 4. 5.

Elle a près de trois pouces & demi d'envergure. Le deſſus des ailes a la moitié antérieure d'un beau blanc, mais qui paſſe au jaunâtre vers la côte des ſupérieures; l'autre moitié ferrugineuſe, avec deux rangées tranſverſes de gros points fauves & une rangée intermédiaire de points noirâtres ſur les premières ailes, &, au contraire, deux rangées de points noirâtres & une rangée intermédiaire de points fauves ſur les ſecondes.

Le deſſous des quatre ailes eſt d'un jaune-feuille-morte & préſente vers la baſe quelques lignes brunes, tranſverſes, ondulées, piquées de bleuâtre; ſur le milieu une raie obſcure, oblique & commune; vers l'extrémité, qui eſt légèrement glacée de violâtre, des points noirâtres, correſpondant à ceux du deſſus. On voit en outre, derrière la raie diſcoïdale des ailes inférieures, trois taches oculaires, dont une contre la côte, & deux près de l'angle de l'anus. Le deſſus du corps eſt blanc, avec la tête & les palpes jaunâtres. Les antennes ſont ferrugineuſes.

Priſe dans les grands bois de la Cafrerie par M. de Lalande.

D'après Drury, elle ſe trouve auſſi ſur la côte de Guinée.

49. Nymphale Lycurgue.

Nymphalis Lycurgus.

Nym. alis ſuprà atro-cœruleis, limbo poſtico lunularum cœruleſcentium ſerie : poſticis ſubtùs punctis marginalibus albis.

Papilio N. Lycurgus, *alis caudatis, nigris, lunulis marginalibus cœruleis poſticiſque punctis albis.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 67. *n°.* 209.

Papilio Lycurgus. Jon. *Fig. pict.* 5. *tab.* 69. *fig.* 1.

Papilio Laodice. Drury, *Inſ. tom.* 3. *pl.* 26. *fig.* 1. 2.

Elle a environ trois pouces & demi d'envergure. Le deſſus des ailes eſt d'un bleu-noir, avec le bord poſtérieur obſcur & longé par un rang de lunules d'un bleu-pâle.

Le deſſous eſt d'un brun-violâtre, avec deux bandes communes d'un brun-foncé. Outre cela, les ailes inférieures ont parallèlement au bord terminal une ſuite de cinq ou ſix points blancs, leſquels ſe reproduiſent en deſſus dans l'un des ſexes.

De Sierra-Leone.

50. Nymphale Portia.

Nymphalis Portia.

Nym. alis denticulatis, ſuprà fulvis, ſtrigâ angulatâ limboque poſtico fuſcis : ſubtùs griſeis, poſticis ad caudam punctis nigris.

Papilio N. Portia, *alis dentato-caudatis : ſubtùs griſeis, nigro irroratis.* Fab. *Syſt. ent. p.* 507. *n°.* 268. — *Spec. Inſ. tom.* 2. *p.* 95. *n°.* 413. — *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 50. *n°.* 498. — *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 78. *n°.* 242.

Papilio Aſtianax. Cram. *Pap. pl.* 337. *fig.* A. B.

Papilio Aſtianax. Herbst, *Pap. tab.* 57. *fig.* 5. 6.

Elle a environ trois pouces d'envergure. Le deſſus des ailes eſt fauve, avec une ligne tranſverſe, anguleuſe, & le bord terminal, d'un brun-noirâtre. La ligne des premières ailes eſt précédée intérieurement d'un gros point noir, voiſin du milieu de la côte. La ligne des ſecondes ailes deſcend à peine juſqu'au niveau du diſque.

En deſſous, la majeure partie des ailes de devant & la totalité de celles de derrière ſont d'un gris-cendré, avec des atomes bruns. Indépendamment de cela, les ſecondes ailes ont, entre l'angle de l'anus & la queue, un rang de deux à trois points noirs, bien diſtincts. Le corps eſt fauve en deſſus, griſâtre en deſſous. Les antennes ſont noires.

Des Antilles.

N. B. Le deſſus du mâle jette un reflet rouge.

51. Nymphale Troglodyte.

Nymphalis Troglodyta.

Nym. alis dentato-caudatis, rufis, ſtrigâ margineque poſtico-fuſcis. Fab.

Papilio N. *Troglodyta.* Fab. *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 47. *n°.* 464. — *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 77. *n°.* 240.

D'après la deſcription de Fabricius, ce lépidoptère ne ſe diſtingue du *Portia* que parce que le point noir du deſſus des premières ailes eſt remplacé par une tache diſcoïdale de la couleur; & parce que le deſſous des ſecondes n'offre aucun point noir entre la queue & l'angle de l'anus.

De l'Amérique.

N. B. Eſt-ce bien une eſpèce diſtincte?

52. Nymphale Ryphéa.

Nymphalis Ryphea.

Nym. alis integerrimis, ſuprà fuſcis, violaceo micantibus, anticarum faſciis duabus, poſticarum maculâ ſubdiſcoidali, calthaceis.

Papilio Ryphea. Cram. *pl.* 48. *fig.* G. H.

Son envergure eſt d'environ deux pouces & demi.

Le mâle a le deſſus des premières ailes d'un brun-noirâtre à reflet violet vif, avec deux bandes ſouci-ponceau, ſe dirigeant obliquement de la côte au bord terminal qu'elles n'atteignent pas. La bande antérieure eſt très-large, & ſinuée à ſon côté externe. La bande poſtérieure eſt étroite, & comprimée vers ſon extrémité inférieure qui eſt arrondie. Le deſſus des ſecondes ailes eſt brun, avec le milieu glacé de violet-pourpre, & précédé au dehors d'une tache ſouci qu'entoure du noirâtre : il y a en outre vers l'angle anal une rangée de trois à quatre petits points d'un blanc-bleuâtre.

Le deſſus de la femelle reſſemble à celui du mâle quant au deſſin, mais le fond des ailes ne jette qu'un léger reflet violet; les deux bandes des ſupérieures & la tache des inférieures ſont d'un fauve-jaunâtre, au lieu d'être ſouci-ponceau.

Le deſſous des deux ſexes eſt d'un brun-ferrugineux, avec une multitude de petits traits griſâtres ou cendrés, leſquels forment ſur les premières ailes une ligne plus claire allant du ſommet au milieu du bord interne, & ſur les ſecondes une bande ſinuée & preſque diſcoïdale, également plus claire. Ces dernières ailes offrent, vers le milieu de la côte, un gros point blanchâtre ou jaunâtre, &, entre la queue & l'angle de l'anus, une ſuite de trois à quatre petits points noirs preſque oculaires.

De la Guyane & du Bréſil.

Nota. On trouve, mais plus rarement, des individus qui n'ont point de queue; d'autres qui l'ont extrêmement courte, comme celui qu'a figuré Cramer.

53. Nymphale Néſée.

Nymphalis Neſea.

Nym. alis integerrimis, ſuprà fuſcis : anticis violaceo micantibus, faſciis duabus calthaceis; poſticis immaculatis.

Nymphalis Neſſus, *alis integerrimis; poſticis ſubpentagonis, unicaudatis; his & ſuperis fuſcis : anticis maculis duabus elongatis, faſcias æmulantibus, phœniceis, violaceo nitentibus : alis omnibus infrà brunneis, argutiſſimè maximèque ſtrigatis; poſticis faſciâ tranſverſâ dilutiore punctoque nigro originem caudæ verſùs.* Recueil d'obſervations de zool. & d'anat. comp. par Alex. de Humboldt & A. Bonpland, *vol.* 2. *p.* 76. *pl.* 35. *fig.* 5. 6.

Elle diffère de la précédente en ce que le deſſus de ſes ſecondes ailes eſt entièrement brun, ſans taches & ſans reflet; en ce que la bande plus claire, qui les traverſe en deſſous au-delà du milieu, eſt droite; enfin, en ce que ces ailes n'ont qu'un ſeul point oculaire, lequel eſt placé vers l'origine de la queue.

Du Pérou.

Nota. Ne ſeroit-ce pas plutôt une variété de climat qu'une eſpèce diſtincte?

---

g. Bord interne des premières ailes avec une échancrure plus ou moins profonde, au moins dans les mâles.

54. Nymphale Hélié.

Nymphalis Helie.

Nym. alis dentatis, ſuprà corticinis : anticis apice fuſco, maculis ochreaceis faſciam tranſverſam angulatamque efformantibus.

Papilio Helie. Clerck, *Icon. tab.* 34. *fig.* 3. (Var.)

Elle a environ deux pouces & demi d'envergure. Le deſſus des ailes eſt d'un brun-tanné, avec l'extrémité noirâtre, & offrant aux ſupérieures, où cette couleur occupe preſque le tiers de la ſurface, cinq taches d'un jaune d'ocre-pâle, diſpoſées en une bande tranſverſe & flexueuſe qui atteint les deux bords. Les ailes inférieures ont, entre l'angle de l'anus & la queue, deux points noirs, ſurmontés chacun d'un point blanc plus petit.

Le deſſous des quatre ailes eſt d'un gris finement entrecoupé de brun-obſcur, avec une bande commune & diſcoïdale d'atomes argentés, plus vifs dans certains individus que dans d'autres. On voit en outre aux ailes inférieures deux points noirs correſpondant à ceux de deſſus. Le corps eſt de part & d'autre du même ton que les ailes, & celles-ci ont aſſez ſouvent les échancrures du bord poſtérieur blanches.

L'individu figuré par Clerck diffère de ceux que nous décrivons, en ce que la bande jaune du deſſus des premières ailes eſt continue, & qu'elle ne deſcend pas au-delà du niveau du diſque.

De l'Amérique.

55. Nymphale Halice.

Nymphalis Halice.

Nym. alis integerrimis, ſuprà ruſis : anticis dimidio apicali cæruleſcenti-nigro, faſciâ niveâ, angulatâ, in medio interruptâ.

Nous n'avons vu que des femelles de ce lépidoptère. Elles ont beaucoup de rapport avec celles de l'eſpèce précédente, mais leurs ailes ſont entières, & le bord interne des ſupérieures n'a point d'échancrure. Outre cela, la bande anguleuſe du deſſus de ces mêmes ailes eſt très-blanche, & interrompue ſeulement vers ſon milieu; les ſecondes ailes offrent plus de points noirs entre l'angle anal & la queue.

Le deſſous des quatre ailes eſt verdâtre, avec une bande blanchâtre vers le milieu.

Du Bréſil.

56. Nymphale Pléione.

Nymphalis Pleione.

Nym. alis denticulatis, ſuprà fulvis, anticarum apice nigro : ſubtùs ferrugineo reticulatis, ſtrigâ mediâ fuſcâ.

Elle a entre deux pouces & deux pouces & demi d'envergure. Le deſſus des ailes eſt d'un fauve-foncé, avec le ſommet des ſupérieures d'un noir-brun & marqué de deux taches fauves, plus ou moins apparentes. Le bord poſtérieur des ſecondes ailes eſt longé par une ligne noirâtre, flexueuſe, & double vis-à-vis de l'angle externe.

Le deſſous des quatre ailes eſt jaunâtre, maillé de ferrugineux, & traverſé au milieu par une raie brune, le long du côté interne de laquelle il y a une teinte légèrement nacrée, teinte que l'on voit auſſi à l'origine du bord antérieur des premières ailes. Le corps eſt fauve en deſſus, jaunâtre en deſſous, avec quatre points blancs ſur la tête. Les antennes ſont ferrugineuſes.

Nous ſoupçonnons qu'elle habite les Antilles.

Nota. La queue des ſecondes ailes eſt très-courte, du moins dans les individus que nous avons vus.

57. Nymphale Eribote.

Nymphalis Eribotes.

Nym. alis integerrimis, ſuprà fulvis aut ferrugineis, baſi violaceo micantibus : poſticis utrinquè punctis marginalibus ſubocellatis.

Papilio N. Eribotes, *alis ſubcaudatis, fulvis, baſi cæruleſcentibus : ſubtùs griſeis.* Fab. *Syſt. Ent. p.* 484. *n°.* 183. — *Spec. Inſ. tom.* 2. *p.* 29. *n°.* 308. — *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 73. *n°.* 229.

Papilio Eribotes. Donow. *Of an Epit. of the Nat. Hiſt. Inſ. of India, cah.* 9. *pl.* 1. *fig.* 3.

Papilio Leonida. Cram. *pl.* 338. *fig.* C. D.

Stoll, *Suppl. à* Cram. *pl.* 6. *fig.* 2. A. (La chenille.) *fig.* 2. B. (La chryſalide.)

Elle a un peu plus de deux pouces d'envergure. Le deſſus des ailes eſt tantôt ferrugineux, tantôt d'un fauve-brun, avec un reflet violet à la baſe. Le milieu de la côte & le ſommet des ailes ſupérieures ſont en outre plus ou moins noirs, ſelon la couleur du fond, & les inférieures ont, vers l'angle anal, un rang de quatre à cinq points noirs, ſurmontés chacun d'un point blanc très-petit.

Le deſſous des quatre ailes eſt ferrugineux, avec des atomes gris ou violâtres : aux points noirs des inférieures correſpondent ici des points ſemblables, & les ſupérieures ont le long du bord terminal une ſérie de points blancs, plus ou moins diſtincts. Les antennes ſont noires, annelées de blanchâtre, avec la ſommité ferrugineuſe.

La chenille, ſuivant Stoll, eſt noire, avec de petits poils & une multitude de points blancs. Elle vit ſur une eſpèce de *prunier ſauvage*.

La chryſalide eſt courte, ramaſſée, ſans éminences angulaires, griſe, avec des mouchetures rougeâtres. On la trouve, ſuſpendue par la queue, ſur la tige de l'arbriſſeau dont les feuilles ont ſervi de nourriture à la chenille.

De la Guyane.

58. Nymphale Polycarme.

Nymphalis Polycarmes.

Nym. alis integris, suprà nigris, subtùs brunneis, immaculatis. Fab.

Papilio N. Polycarmes. Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 158. *n°.* 472.

Papilio Odilla. Cram. *pl.* 329. *fig.* C. D.

Papilio Odilia. Stoll, *Suppl. à* Cram. *pl.* 6. *fig.* 4 & 4. D. (La chenille & la chrysalide.)

Nous ne connoissons cette nymphale que par l'individu qu'a figuré Cramer, & quoiqu'il soit sans queue, nous la placons ici à cause de sa grande analogie avec l'espèce suivante.

Elle a environ deux pouces & demi d'envergure. Ses ailes supérieures sont dentelées, à peine concaves, & paroissent avoir le bord interne échancré. Les inférieures sont entières. Le dessus des unes & des autres est d'un noir-violet, sans taches. Leur dessous est ferrugineux, avec des hachures bleuâtres le long du bord interne & du bord terminal des inférieures.

La chenille est d'un violet-purpurin, avec deux lignes latérales & en même temps longitudinales, dont la supérieure blanche & maculaire, l'inférieure jaunâtre & continue. Sur les second, cinquième & onzième anneaux s'élèvent deux épines noires, assez longues, légèrement ciliées, courbes en arrière. La tête est noire, avec deux lunules d'un blanc-luisant. Cette chenille vit sur le *goyavier.*

La chrysalide est ovoïde, courte, ramassée, avec des taches dorées.

De Cayenne.

Nota. Stoll donne la chenille de la danaïde *Erésime* pour celle de la nymphale *Odilla*, & réciproquement la chenille de l'*Odilla* pour celle de l'*Erésime.*

59. Nymphale Laertia.

Nymphalis Laertia.

Nym. alis integerrimis, suprà fuscis, basi violaceo-nitidè-cœruleis : subtùs anticis punctis marginalibus albis.

Papilio N. Laertes, *alis caudatis, fuscis, basi cœruleis : posticis suprà punctis quinque albis, subtùs quatuor ocellaribus.* Fab. *Spec. Inf. tom.* 2. *p.* 29. *n°.* 310. — *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 73. *n°.* 226.

Papilio Laertes. Cram. *pl.* 73. *fig.* C. D. (La femelle.)

Elle a entre deux pouces & deux pouces & demi d'envergure. Le dessus des ailes est d'un brun-noirâtre, avec environ la moitié antérieure glacée de bleu-violet. On voit en outre, vers l'extrémité des supérieures, des taches du même bleu, formant dans la femelle un groupe de trois, & dans le mâle un groupe semblable, puis un groupe de deux. Les ailes inférieures ont la queue saupoudrée de gris, & il y a vers leur angle anal un rang de cinq points noirs, surmontés chacun d'un point blanc plus petit.

Le dessous des ailes est ferrugineux dans le mâle, cendré dans la femelle, avec des atomes gris vers la base, une bande violâtre & luisante entre le milieu & le bord postérieur. Ce bord offre aux premières ailes une série transverse de six à sept petits points blancs, & aux secondes, une suite de cinq points noirs, dont les trois intermédiaires environnés de verdâtre en dehors. La bande violâtre susdite est bordée intérieurement par une raie plus intense que le fond de l'aile, & représentant en quelque sorte un V oblique. A ces caractères il faut ajouter une tache blanchâtre ou jaunâtre, placée au milieu de la côte des ailes inférieures.

De la Guyane & du Brésil.

N. B. Nous avons vu, dans la collection de M. le chevalier de Langsdorff, un individu qui, par le dessus des ailes, semblerait appartenir à l'espèce suivante, mais qui, en raison de leur dessous & de la forme du bord terminal des supérieures, doit être rapporté ici.

60. Nymphale Morvus.

Nymphalis Morvus.

Nym. alis integerrimis, suprà nigris, basi viridi-nitidè-cœruleis : subtùs anticis margine postico immaculato.

Papilio N. Morvus ? *alis caudatis, suprà fuscis, basi cœruleis : subtùs griseo-virescentibus.* Fab. *Spec. Inf. tom.* 2. *p.* 61. *n°.* 270. — *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 29. *n°.* 311. — *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 73. *n°.* 277.

Papilio D. F. Morvus ? *alis integris, subcaudatis, suprà fuscis, cœruleo nitentibus : subtùs griseis.* Fab. *Syst. Ent. p.* 484. *n°.* 184.

Papilio Arachne ? Cram. *pl.* 48. *fig.* A. B.

Papilio Basilea ? Cram. *pl.* 329. *fig.* C. D.

Nymphalis Iphis, *alis integerrimis : superis subfalcatis, margine interno profundè emarginato ; inferis unicaudatis : utrisque suprà nigris basi maculisque nonnullis cœruleis : infrà brunneis, nitidis, maculis griseis; superis margine postico strigâque ab angulo apicali marginis postici medium versus rectà currente pariter coloratis; inferarum margine postico maculis duabus parvis subocelliformibus.* Recueil d'observ. de zool. & d'anat. comp. par Alex. de Humboldt & A Bonpland, *vol.* 2. *p.* 80. *pl.* 36. *fig.* 1. 2.

Nous n'avons vu que des mâles de cette espèce. Ils ont à peu près la même taille que ceux de l'espèce précédente, mais le bord terminal de

leurs ailes supérieures est concave, au lieu d'être presque droit comme dans le *Laertia*.

Le dessus de toutes les ailes est noir, avec environ la moitié antérieure glacée de bleu-verdâtre. Il y a en outre, vers l'extrémité des supérieures, quatre taches du même bleu ou d'un blanc-bleuâtre, séparées les unes des autres & formant une ligne courbe & transverse. Les ailes inférieures ont, parallèlement à leur bord de derrière, de deux à cinq points blancs, appuyés parfois sur un cordon de taches bleues.

Le dessous des ailes est d'un brun-cendré-luisant, nuancé de gris-violâtre, avec une raie blanchâtre allant du sommet des supérieures au milieu de leur bord interne, & un croissant entier ou interrompu, également blanchâtre, au milieu de la côte des inférieures. Ces dernières ont, en correspondance des points du dessus, des points noirs, dont deux ou trois, selon le nombre, environnés de verdâtre en dehors. Les premières ailes n'ont pas de points sur le bord postérieur, & ce bord est teinté de verdâtre jusqu'à la raie blanchâtre dont nous avons parlé.

Le *Morvus* de Fabricius, ou *Arachne* de Cramer, ne paroît différer du nôtre que parce que le dessus de ses premières ailes n'offre qu'une seule tache bleue à l'extrémité.

Quant au *Basilea* de Cramer, c'est, autant que nous pouvons le soupçonner, le même que notre *Morvus*, mais il n'a point de queue.

Du Brésil.

61. Nymphale Octavius.

Nymphalis Octavius.

Nym. alis caudatis, nigris, fasciâ abbreviatâ viridi : subtùs griseis, strigâ fuscâ. Fab.

Papilio N. *Octavius.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 73. *n°.* 228.

Papilio Octavius. Jon. *Fig. pict.* 5. *tab.* 101. *fig.* 1.

Papilio Octavius. Donow. *Of an Epit. of the Nat. Hist. Ins. of India, cah.* 2. *pl.* 4. *fig.* 2.

Ne seroit-ce pas la femelle ou une variété du *Morvus?*

Voici ce qu'en dit Fabricius : le dessus des ailes est noir, avec une bande verte, transverse, discoïdale, courbe en arrière. La bande des ailes inférieures est très-large; celle des supérieures est séparée de la côte par une tache de sa couleur.

Le dessous des quatre ailes est gris, avec une ou deux lignes brunes, transversales.

De l'Amérique équinoxiale.

H. Bord postérieur des premières ailes plus ou moins concave. Angle anal des secondes prolongé & replié en dessous.

γ. Bord interne des premières ailes sans échancrure.

62. Nymphale Orion.

Nymphalis Orion.

Nym. alis integris, suprà fusco-nigris : anticis fasciâ longitudinali; posticis basi, fulvis; omnium margine postico utrinquè albicante.

Papilio F. Orion, *alis repandis : anticis falcatis, rufis, apice nigris maculâ marginali albâ.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 55. *n°.* 170.

Papilio E. A. Odius, *alis falcatis, subdentatis, fuscis : anticis disco flavo.* Fab. *Syst. Ent. p.* 457. *n°.* 60. — *Spec. Ins. tom.* 2. *p.* 25. *n°.* 95. — *Mant. Ins. tom.* 2. *p.* 12. *n°.* 11.

Papilio Odius. Sulz. *Ins. edit.* Rœm. *tab.* 13. *fig.* 2.

Papilio Odius. Herbst, *Pap. tab.* 35. *fig.* 1. 2.

Papilio Danae. Cram. *pl.* 84. *fig.* A. B.

Elle a de quatre pouces & demi à cinq pouces d'envergure. Le dessus des premières ailes est d'un noir-brun, avec une bande fauve, longitudinale, qui couvre environ tout le tiers antérieur de la surface, puis va, en se rétréciissant, aboutir à peu de distance du bord postérieur. Vers l'extrémité du bord antérieur des mêmes ailes, il y a une tache blanche, ovale, disposée longitudinalement. Le dessus des secondes ailes est d'un noir-brun, avec la base d'un fauve un peu obscur.

Le dessous des quatre ailes est d'un brun nuancé de grisâtre, avec deux bandes transverses plus foncées près de la base : viennent ensuite deux lignes noires, également transverses, qui se réunissent vers le bord interne des ailes inférieures. A la tache blanche de la côte des premières ailes, correspond ici une tache semblable. Outre cela, le bord terminal des quatre ailes est blanchâtre de part & d'autre. Le corps a le dessus roussâtre, avec le bout de l'abdomen noirâtre. Les antennes sont ferrugineuses.

De la Guyane & du Brésil.

63. Nymphale? Cocyte.

Nymphalis Cocytus.

Nym. alis falcatis, suprà nigris, margine postico cinereo. Fab.

Papilio F. *Cocytus.* Fab. *Mant. Ins. tom.* 2. *p.* 29. *n°.* 316. — *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 55. *n°.* 171.

Elle est de moyenne taille, noire en dessus, avec le bord postérieur cendré. Les premières ailes, qui sont concaves, ont en outre, vers le bout de la côte, un large point de cette dernière couleur.

Le dessous des quatre ailes est d'un cendré-pâle, avec

avec une ligne obscure & transverse à l'extrémité des supérieures.

Du royaume de Siam.

(*Traduction de Fabricius.*)

64. Nymphale ? Odin.

Nymphalis Odin.

Nym. alis integerrimis, uniangulatis, obscuris : posticis utrinquè pari punctorum atrorum subocellatorum. Fab.

Papilio F. *Odin.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 56. *n°.* 175.

Le corps est petit, brun. Les ailes supérieures sont obscures vers la base, avec une petite ligne transverse plus obscure sur le milieu; elles sont pâles à l'extrémité. Leur dessous ressemble au dessus.

Les ailes inférieures sont unianguleuses, ou plutôt échancrées au bas du bord interne. Leur dessus est obscur, avec des lignes cendrées, transversales. Leur dessous est pareillement obscur, avec une petite ligne plus foncée à la base & des lignes pâles à l'extrémité. Indépendamment de cela, elles ont de part & d'autre un couple de points noirs presqu'ocellés, & l'on voit un autre point plus petit vers la côte.

De la Chine.

(*Traduction de Fabricius.*)

65. Nymphale Mycérine.

Nymphalis Mycerina.

Nym. alis suprà violaceo-nigris, fusciâ communi cyaneâ : subtùs anticis punctis baseos duobus ocellatis.

Elle a près de trois pouces d'envergure. Le dessus des ailes est d'un noir-violet, avec une bande commune, une tache longitudinale à l'origine de la côte des supérieures, & un rang de points sur le bord terminal des inférieures, d'un bleu-ardoisé-pâle. La bande susdite est courbe & maculaire aux premières ailes; elle est presque continue aux secondes.

Le dessous des quatre ailes est d'un brun plus ou moins foncé & nuancé de gris-luisant, avec deux lignes transverses, flexueuses, blanches, & bordées de noirâtre sur un de leurs côtés. Outre cela, on voit à la base des premières ailes deux points noirs, cerclés de blanc, & sur le bord postérieur des secondes, une suite de points blancs peu distincts. Le corps est noirâtre en dessus, grisâtre en dessous, avec quatre points blancs sur la tête. Les antennes sont ferrugineuses. Les palpes ont le dessus obscur, le dessous blanc.

Elle habite.....

N. B. Nous avons vu un individu dont le dessus des premières ailes est sans tache bleue à l'origine de la côte.

66. Nymphale Posthume.

Nymphalis Posthumus.

Nym. alis falcatis, integerrimis, fuscis, disco cæruleo : posticis subtùs griseis, immaculatis. Fab.

Papilio N. *Posthumus.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 149. *n°.* 458.

Papilio Saturnus. Jon. *Fig. pict.* 5. *tab.* 77. *fig.* 2.

Elle est de moyenne taille, & elle a les ailes concaves. Le dessus des quatre est d'un brun-noirâtre, avec le disque largement bleu. Le dessous des supérieures est brun à la base, avec des taches blanches; gris à l'extrémité. Le dessous des inférieures est gris, sans aucune tache.

Elle habite.....

(*Décrite d'après Fabricius.*)

67. Nymphale Cymodoce.

Nymphalis Cymodoce.

Nym. alis suprà fuscis, basi cæruleo micantibus : posticis utrinquè ocello anali unico.

Papilio N. Cymodoce, *alis subcaudatis, fuscis, basi cæruleo nitidis : posticis ocello utrinquè unico.* Fab. *Spec. Inf. tom.* 2. *p.* 29. *n°.* 313. — *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 74. *n°.* 231.

Papilio Cymodoce. Cram. *Pap. pl.* 99. *fig.* G. H.

Papilio Cymodoce. Herbst, *Pap. tab.* 152. *fig.* 1. 2.

Elle a environ deux pouces & demi d'envergure. Le dessus des ailes est d'un brun-obscur, avec un reflet d'un bleu-violet à la base, & une ligne noire le long du bord terminal. Il y a en outre, vis-à-vis du sommet des supérieures, une petite ligne transverse, puis un petit point, blanchâtres; &, vers l'angle anal des inférieures, un œil noir à prunelle blanche & à iris ferrugineux.

Le dessous des quatre ailes est d'un brun un peu plus clair que le dessus, avec l'extrémité légèrement glacée de violet, & divisée transversalement par deux lignes noires, dont l'intérieure oblique & bordée de bleu du côté de la base; l'extérieure courbe, ondulée. Entre ces lignes, les secondes ailes ont quatre à cinq points noirs, s'aligant avec un œil semblable à celui de la surface opposée; & les premières ailes offrent, en face du sommet, une tache blanchâtre.

Fabricius la dit de Surinam, & Cramer des Indes orientales.

68. Nymphale Egeste.

Nymphalis Egesta.

Nym. alis integris, suprà fulvis, singularum margine postico posticarumque disco fuscis : subtùs carneo-fuscescentibus, strigâ communi ferrugineâ.

Papilio Egesta. Cram. *pl.* 46. *fig.* B. C.

Papilio Egestus. Herbst, *Pap. tab.* 151. *n°.* 5. 6.

Elle a environ trois pouces & demi d'envergure. Le dessus des ailes est fauve, avec le bord terminal des quatre & le milieu des inférieures d'un brun-obscur. Ces dernières ont parfois l'espace brun du milieu divisé par une bandelette jaune, transversale, & il y a toujours avant leur bord postérieur une ligne de points noirs. Les premières ailes ont aussi des points semblables, mais ils n'existent pas dans tous les individus.

Le dessous de toutes les ailes est d'un brun-violâtre-luisant, avec quelques hiéroglyphes noirâtres vers la base; une ligne ferrugineuse, oblique & un peu ondulée, sur le milieu. On aperçoit en outre l'empreinte des points noirs de la surface opposée. Le corps est de la couleur des ailes en dessus & en dessous. Les antennes sont noires.

De la Guyane.

69. Nympaale Bisaltide.

Nymphalis Bisaltide.

Nym. alis suprà fulvis, anticarum apice nigro alboque punctato : subtùs anticis ocellis duobus obsoletis, posticis tribus.

Papilio N. Bisaltide, *alis subcaudatis, fulvis, apice nigris : subtùs punctis ocelluribus, anticis duobus, posticis tribus.* Fab. *Spec. Inf. tom.* 2. *p.* 61. *n°.* 273. — *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 29. *n°.* 314.—*Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 74. *n°.* 232.

Papilio Bisaltide. Cram. *pl.* 102. *fig.* C. D.

Papilio Polibete. Cram. *pl.* 234. *fig.* D. E.

Papilio Polibete. Cram. *pl.* 235. *fig.* C. D.

Papilio Bisaltides. Herbst, *tab.* 150. *fig.* 5. 6.

Papilio Polibetes. Herbst, *tab.* 149. *fig.* 5-8.

Seba, *Muf.* 4. *tab.* 35. *fig.* 15. 16.

Elle a de deux pouces & demi à trois pouces d'envergure. Le dessus des ailes supérieures est d'un fauve plus ou moins jaunâtre, suivant le sexe, avec l'extrémité noire, & offrant vis-à-vis du sommet, où cette couleur s'étend davantage, une tache oblique, fauve ou jaune, derrière laquelle il y a un arc transversal de trois à cinq points, dont l'inférieur jaunâtre, les autres blancs. Le dessus des secondes ailes est d'un fauve-brun, avec une double ligne noire, terminale, que précèdent, du côté du corps, trois points noirs, inégalement éloignés l'un de l'autre.

Le dessous des quatre ailes est d'un ferrugineux nuancé de verdâtre ou de violâtre, avec une ligne noire, commune, discoïdale, oblique, suivie en dehors de trois yeux aux ailes inférieures & de deux aux supérieures. Ces yeux ont la prunelle partie noire, partie bleuâtre, & l'iris noirâtre. Indépendamment de cela, les premières ailes ont en face du sommet des points correspondans à ceux de dessus. Les deux surfaces du corps sont de la couleur de celles des ailes. Les antennes sont brunes, avec la sommité fauve ou d'un jaune-paille. Les palpes ont le dessus ferrugineux, le dessous blanc.

Cette espèce varie, 1°. en ce que la double ligne noire qui termine le dessus des secondes ailes est remplacée par une large bande de cette couleur; 2°. en ce que le dessous de certains mâles offre à la base des quatre ailes quelques taches d'un blanc-argenté.

Elle se trouve à Surinam.

N. B. Cramer en a fait deux espèces : l'une sous le nom de *Bisaltide*, & l'autre sous celui de *Polibète*. La première, selon lui, est de Surinam, la seconde d'Amboine. Il faut qu'il y ait erreur à ce sujet, car en les comparant bien, on ne trouve entr'elles aucune différence caractéristique.

♂. Bord interne des premières ailes avec une échancrure, du moins dans les mâles.

70. Nymphale Itys.

Nymphalis Itys.

Nym. alis suprà fulvis : anticis apice nigro fusciâ albidâ, angulatâ : posticis subtùs basi cærulescentibus.

Papilio N. Itys, *alis subcaudatis, fulvis, apice flavo nigris : subtùs basi variegatis, posticis basi cæruleis.* Fab. *Spec. Inf. tom.* 2. *p.* 60. *n°.* 268. — *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 29. *n°.* 309. — *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 73. *n°.* 230.

Papilio Itys. Cram. *pl.* 119. *fig.* F. G.

Papilio Itys. Herbst, *Pap. tab.* 151. *fig.* 1. 2.

Elle a près de trois pouces d'envergure. Le dessus des premières ailes a environ la moitié antérieure d'un fauve-vif & sans taches; l'autre moitié noire, avec une bande blanchâtre ou jaunâtre, transverse, anguleuse, très-large, & coupée dans le sens de sa longueur par une ligne ferrugineuse en zig-zag. Le dessus des secondes ailes est d'un fauve-tanné, avec l'extrémité rembrunie.

Le dessous des ailes supérieures diffère du dessus en ce que tout le fond & la bande blanchâtre sont finement mouchetés de noirâtre; en ce que la côte est pointillée de bleu, & le sommet marqué de deux petits points blancs. Le dessous des ailes inférieures est d'un bleu-pâle depuis la base jusqu'au milieu, avec des atomes cendrés; ensuite d'un brun-obscur jusqu'au bout, avec deux bandes

blanchâtres, dont l'intérieure oblique, sinuée, & contiguë à la partie bleue, l'extérieure chargée d'un rang de points noirs, oculaires.

De Surinam.

71. Nymphale Isidora.

Nymphalis Isidora.

Nym. alis suprà fulvis, anticarum maculâ costali apiceque fuscis : posticis subtùs punctis marginalibus ocellatis.

Papilio N. Isidora, *alis falcato-caudatis, fulvis : anticis punctis duobus mediis pallidis apiceque nigris.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 78. *n°.* 244. (La femelle.)

Papilio Isidora. Cram. *Pap. pl.* 235. *fig.* A. B. E. F.

Papilio Isidora. Herbst, *Pap. tab.* 150. *fig.* 1. 2.

Papilio Isidora. Jon. *Fig. pict.* 5. *tab.* 7. *fig.* 1.

Papilio Isidora. Donow. *Of an Epit. of the Nat. Hist. of the Insects of India, cah.* 9. *pl.* 1. *fig.* 4.

Quoique Fabricius rapporte son *Isidora* à celui de Cramer, nous avons d'abord eu des doutes sur l'identité, à cause du mot *magnus* dont il se sert pour désigner la taille; mais la description qu'il en donne les a fait disparoître.

Son envergure est d'environ deux pouces & demi. Le dessus des ailes est d'un fauve-brun dans le mâle, d'un fauve-clair ou jaunâtre dans la femelle, avec le sommet ainsi que le bord terminal des premières noirâtres, & une ligne brune, transverse & flexueuse, sur les secondes. Les ailes de devant ont en outre, près du milieu de la côte, une tache noire lunulée, au dessous de laquelle il y a, mais seulement dans les femelles, deux points diaphanes & luisans comme du talc.

Le dessous du mâle est d'un brun-ferrugineux, le dessous de la femelle d'un brun-jaunâtre, avec des nuances d'un gris-luisant. Indépendamment de cela, les secondes ailes des deux sexes offrent, sur le milieu, une ligne obscure allant obliquement du bord antérieur à l'angle anal, &, le long de leur bord postérieur, une rangée de six à sept points noirs, bordés de blanchâtre. Ces points paroissent quelquefois en dessus.

De la Guyane & du Brésil.

72. Nymphale Marthésius.

Nymphalis Mathesius.

Nym. alis integerrimis, suprà nigris, strigâ posticâ punctorum alborum : anticis basi late fulvis.

Papilio N. Marthesius, *alis integris, atris : anticis disco fulvo, posticis strigâ punctorum alborum.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 153. *n°.* 469.

Papilio Marthesius. Herbst, *Pap. tab.* 132. *fig.* 1. 2.

Papilio Marthesia. Cram. *pl.* 191. *fig.* A. B.

Elle a environ trois pouces & demi d'envergure. Le dessus des ailes est noir, avec une rangée postérieure de points blancs, oblongs sur les secondes ailes, arrondis sur les premières. Celles-ci ont à la base un large espace fauve, & dont la couleur s'affoiblit en arrière. Leur dessous est d'un gris-jaunâtre avec le sommet d'un brun-obscur & ponctué de bleuâtre. Le dessous des secondes ailes est nuancé de brun & de verdâtre.

De la Guyane.

73. Nymphale Roger.

Nymphalis Rogerii.

Nym. alis integerrimis, suprà nigris, anticarum fasciis duabus, posticarum maculâ mediâ, sanguineis : subtùs grisescenti ferrugineoque variis.

Nous avons dédié cette nymphale à M. Théodore Roger, amateur distingué de la ville de Bordeaux.

Elle a environ trois pouces d'envergure. Le dessus des premières ailes est noir, avec deux bandes obliques d'un rouge-vermillon vif, & dont l'antérieure plus large : le bord du sommet est en outre ferrugineux & précédé d'un double point blanc. Le dessus des secondes ailes est de la couleur de celui des premières, avec une tache rouge vers le milieu de la surface, des points & des atomes bleuâtres sur la moitié postérieure du bord terminal.

Le dessous des quatre ailes est nuancé de gris-violâtre & de ferrugineux, & il y a sur le milieu des inférieures une ligne oblique d'atomes bleuâtres. Le corps est noir, avec la tête, le dessus des palpes & les antennes, ferrugineux.

La femelle ressemble au mâle.

De l'île de Cuba.

I. Bord postérieur des premières ailes droit ou à peine convexe. Angle anal des secondes prolongé & obtus.

74. Nymphale Dircé.

Nymphalis Dirce.

Nym. alis fuscis : anticis utrinquè fasciâ flavâ : subtùs omnibus albido striatis.

Papilio N. Dirce, *alis angulatis, fuscis : primoribus fasciâ flavâ : subtus nigro undulatis.* Linn. *Syst. Nat.* 2. *edit.* 12. *p.* 778. *n°.* 177. — *Mus. Lud. Ulr. p.* 287. *n°.* 105.

β. *Papilio* Butes, *alis subcaudatis, fuscis : primoribus fasciâ flavescenti-albidâ : omnibus subtùs albidis, nigro striatis.* Linn. *Syst. Nat. edit.* 10. *p.* 485.

Papilio Butes. Clerck, *Icon. tab.* 36. *fig.* 3.

Papilio N. Dirce, *alis angulatis, fuscis, fasciâ anticarum flavescente : subtùs nigro undulatis.* Fab. *Syst. Ent. p.* 506. *n°.* 264. — *Spec. Inst. tom.* 2. *p.* 93. *n°.* 407. — *Mant. Inst. tom.* 2. *p.* 50. *n°.* 492. — *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 123. *n°.* 376.

Papilio Dirce. Cram. *pl.* 212. *fig.* C. D.

Stoll, *Suppl. à* Cram. *pl.* 2. *fig.* 3. A. 3. B. *fig.* 4. A. 4. B. (La chen. & la chrys.)

Papilio Dirce. Herbst, *tab.* 153. *fig.* 1. 2.

Papilio Dirce. Sulz. *Inst. tab.* 17. *fig.* 11. 12.

Seba, *Mus.* 4. *tab.* 10. *fig.* 1. 2. 7. 8.

Seba, *Mus.* 4. *tab.* 13. *fig.* 9. 10.

Elle a de deux à trois pouces d'envergure. Le dessus des ailes est d'un brun-obscur, avec une bande d'un jaune-soufre, large & oblique, sur le milieu des supérieures, & deux points bleus à l'extrémité du prolongement anal des inférieures.

Le dessous diffère du dessus en ce que l'on y voit une multitude de lignes blanchâtres ou jaunâtres qui s'entre-croisent ; en ce que la bande des ailes supérieures est beaucoup plus pâle ; en ce que les inférieures ont vers l'angle de l'anus un petit espace fauve, & vers l'extrémité de la côte, une ligne transverse de quelques points bleus oculaires, plus distincts dans la femelle que dans le mâle.

La chenille, suivant Stoll, est noire, fouvent annelée de jaune, avec un grand nombre d'épines fauves & branchues, dont les deux antérieures plus grandes & parfois blanches. L'anus est bifide. Elle vit sur la *casse*.

La chrysalide est alongée, épineuse, brune, ponctuée de blanc.

De la Guyane & du Brésil.

75. Nymphale Phorcys.

Nymphalis Phorcys.

Nym. alis dentatis, fuscis, suprà immaculatis : subtùs strigis aliquot nigris, posticis punctis duobus griseis.

Papilio N. Phorcys, *alis dentato-subcaudatis, fuscis : subtùs obscurùs strigosis, posticis punctis duobus cinereis.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 80. *n°.* 248.

Papilio Phorcys. Jon. *Fig. pict.* 3. *tab.* 78. *fig.* 1.

Papilio Phorcys. Donow. *Of an Epitome of the Nat. Hist. of Insects of India, cah.* 9. *pl.* 1. *fig.* 2.

Si la figure de Donowan est exacte, ce lépidoptère doit être mis parmi les *Nymphales*, attendu que ses secondes ailes ont la cellule du disque ouverte postérieurement.

Il a près de trois pouces d'envergure. Les quatre ailes sont dentées, d'un brun-obscur de part & d'autre. Leur dessus est sans taches. Leur dessous a quelques lignes noires, transverses, ondulées, indépendamment desquelles les secondes ailes ont deux points gris, bien distincts, & rapprochés de l'angle anal. Cet angle est à peine prolongé. Le corps est gros & de la couleur des ailes.

Des Indes.

K. Bord terminal des ailes supérieures droit ou à peine concave. Ailes inférieures alongées dans le sens de la longueur du corps.

76. Nymphale Mésentéria.

Nymphalis Mesenteria.

Nym. alis denticulatis, fuscis : anticis suprà fasciâ fulvâ, transversâ, bifidâ ; subtùs basi flavescente, punctis nitido-cærulescentibus.

Papilio N. Mesenteria, *alis dentatis, fuscis : anticis suprà fasciâ fulvâ ; subtùs maculis centralibus cæruleis.* Fab. *Spec. Inst. tom.* 2. *p.* 105. *n°.* 462. — *Mant. Inst. tom.* 2. *p.* 57. *n°.* 564. — *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 141. *n°.* 435.

Papilio Mesentina. Cram. *pl.* 162. *fig.* B. C.

Papilio Mesenteria. Herbst, *Pap. tab.* 147. *fig.* 1. 2.

Elle a de deux pouces & demi à trois pouces d'envergure. Le dessus des ailes est d'un brun-noirâtre, avec des lignes transverses plus foncées. Indépendamment de cela, les supérieures ont, en tirant vers l'extrémité, une bande fauve, transverse, large, bifide près de la côte, un peu rétrécie vers le bord opposé.

Le dessous des quatre ailes est jaunâtre à la base, avec cinq ou six points bleuâtres, luisans & cerclés de noir, sur les supérieures ; avec trois lignes noires, transverses, sur les inférieures. Ces dernières sont ensuite brunes jusqu'au bout, avec une multitude de lignes grisâtres, longitudinales, que coupent transversalement trois raies obscures. Les premières ailes offrent une bande correspondante à celle du dessus, mais elle est ici d'une teinte incarnate, & précédée en dehors d'un double rang de taches grisâtres que fait ressortir la couleur brune du bord terminal.

De Surinam.

77. Nymphale Cocala.

Nymphalis Cocala.

Nym. alis denticulatis, suprà fuscis, fasciâ

tranſverſâ, mediâ : anticarum fulvâ, bifidâ; poſticarum albâ.

Papilio Cocala. Cram. *pl.* 242. *fig.* F. G.

Papilio Cocala. Herbst, *tab.* 147. *fig.* 5. 6.

Fabricius la rapporte à la nymphale *Cythéréa*, mais elle paroit former une eſpèce diſtincte.

Elle a environ deux pouces d'envergure. Le deſſus des ailes eſt d'un brun-noirâtre, avec le milieu des ſupérieures entièrement traverſé par une bande orangée, & celui des inférieures par une bande blanche. La bande des ailes ſupérieures eſt plus large, bifide à ſon origine, ſinuée ſur le côté externe, droite ou preſque droite ſur le côté oppoſé. La bande des ailes inférieures eſt terminée en pointe aiguë à l'angle anal, lequel eſt ſans tache dans le mâle, & marqué d'une petite tache orangée dans la femelle.

Le deſſous des deux ſexes eſt ferrugineux, avec une bande blanche, allant du milieu de la côte des premières ailes à l'angle interne des ſecondes. Les unes & les autres ont à la baſe trois lignes obliques, & le long du bord poſtérieur deux rangs de lunules bleuâtres, luiſantes. On aperçoit en outre l'empreinte de la bande fauve du deſſus des ailes de devant. Le corps eſt noirâtre en deſſus, griſâtre en deſſous. Les antennes ſont noires.

De la Guyane & du Bréſil.

78. Nymphale Phliaſſa.

Nymphalis Phliaſſa.

Nym. alis dentatis, ſuprà fuſcis, fuſciâ albâ, mediâ : anticarum abbreviatâ, faciei fulvæ & intùs uniemarginatæ innatâ; poſticarum ad angulum ani mucronatâ.

Elle eſt un peu plus grande que la précédente. Le deſſus des ailes eſt d'un brun-noirâtre, avec une bande blanche, diſcoïdale, terminée en pointe aiguë à l'angle anal des inférieures par un point fauve; ſe perdant, vers le bord interne des ſupérieures, dans une bande orangée, tranſverſe & plus large, dont le côté externe eſt ſinueux, le côté interne profondément échancré vers ſon origine.

Le deſſous des quatre ailes eſt comme dans l'*Iphiclu* (*voyez* n°. 80); mais la bande blanche eſt moins vive, & elle ſe prolonge juſqu'à la côte des ailes ſupérieures, au lieu de finir en pointe arrondie vers leur milieu.

De la Guyane & du Bréſil.

N. B. Nous avons vu une femelle ayant la bande fauve du deſſus des premières ailes bifide à ſa naiſſance; ou, ſi l'on veut, précédée extérieurement d'une ligne tranſverſe de trois points de ſa couleur.

79. Nymphale Cythéréa.

Nymphalis Cytherea.

Nym. alis denticulatis, ſuprà fuſcis, fuſciâ albâ, mediâ, apicibus mucronatâ : anticarum abbreviatâ, faciei fulvæ & intùs integræ innatâ.

Papilio N. Cytherea, *alis crenatis, flavis, fuſciâ communi argenteâ : ſubtùs fuſciâ lanceolatâ argenteâ.* Linn. *Syſt. Nat.* 2. *p.* 785. *n°.* 210. — *Muſ. Lud. Ulr. p.* 305. *n°.* 123. (Mâle.)

Papilio Cytherea. Clerck, *Icon. tab.* 39. *fig.* 3.

Papilio N. Elea, *alis dentatis, fuſco-nebulofis, concoloribus : fuſciâ primoribus flavâ, poſticis albâ.* Linn. *Syſt. Nat.* 2. *p.* 781. *n°.* 183. (Fem. Var.)

Papilio N. *Eleus.* Linn. *Muſ. Lud. Ulr. p.* 312. *n°.* 130.

Papilio N. Cytherea, *alis crenatis, fuſcis : anticis fuſciâ fulvâ, poſticis communi argenteâ : ſubtùs fuſciâ argenteâ, lanceolatâ.* Fab. *Syſt. Ent. p.* 516. *n°.* 309. — *Spec. Inſ. tom.* 2. *p.* 109. *n°.* 474. — *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 62. *n°.* 588. — *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 144. *n°.* 441.

Papilio N. Elea, *alis dentatis, fuſcis : anticis fuſciâ fulvâ, poſticis albâ.* Fab. *Syſt. Ent. p.* 513. *n°.* 300. — *Spec. Inſ. tom.* 2. *p.* 105. *n°.* 460. — *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 57. *n°.* 562. — *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 141. *n°.* 434.

Papilio Elea. Cram. *pl.* 242. *fig.* D. E.

Papilio Eleus. Herbst, *Pap. tab.* 147. *fig.* 3. 4.

Après avoir bien médité la deſcription du *Cytherea* de Linnæus, & celle de ſon *Elea*, nous ſommes reſtés convaincus que ces deux lépidoptères ne ſont qu'une ſeule & même eſpèce, dont le premier paroît être le mâle; le ſecond la femelle, ou du moins une variété femelle.

Fabricius a connu l'un & l'autre; mais il a ſans fondement confondu le *Cytherea* de Cramer avec celui de Linnæus.

L'envergure des ailes eſt la même que dans le *Cocala*. Leur deſſus eſt d'un brun-noirâtre, avec une bande blanche, commune, diſcoïdale, oblique, aiguë à chaque bout. Cette bande commence au milieu des premières ailes & s'y aligne immédiatement au côté interne & très-entier d'une large bande orangée, également oblique : elle finit ſur les ſecondes ailes à une petite tache fauve, anale & marquée de deux points noirs.

Le deſſous des quatre ailes eſt d'un fauve-jaunâtre, avec une bande blanche, correſpondante & conforme à celle du deſſus. Indépendamment de cela, il y a près de la baſe trois lignes obliques, & parallèlement au bord terminal, deux rangs de lunules d'un blanc-bleuâtre-luiſant. Les lunules des ſecondes ailes ſont ſéparées de la bande par une ligne ferrugineuſe, tranſverſe, maculaire, plus ou moins prononcée. Le corps eſt comme dans le *Cocala*. Les antennes ſont noires, avec le deſſous de la maſſue ferrugineux.

De la Guyane & du Brésil.

N. B. Nous avons vu une femelle dont le dessus a du fauve à l'origine des ailes supérieures & vers l'extrémité des inférieures, comme l'individu que Linnæus donne sous le nom d'*Elea*.

80. Nymphale Iphicla.

Nymphalis Iphicla.

Nym. alis denticulatis, suprà fuscis, fasciâ albâ, mediâ, antrorsùm rotundatâ, retrorsùm mucronatâ : anticis maculâ apicis fulvâ, solitariâ.

Papilio N. Iphicla, *alis dentatis, suprà fuscis, fasciâ communi albâ maculâque ferrugineâ anguli ani.* Linn. *Syst. Nat.* 2. *p.* 780. *n°.* 181.

Papilio N. *Iphiclus.* Linn. *Mus. Lud. Ulr. p.* 311. *n°.* 129.

Papilio Iphiclus. Clerck, *Icon. tab.* 41. *fig.* 3.

Papilio N. *Iphicla.* Fab. *Syst. Ent. p.* 510. *n°.* 283. — *Spec. Inst. tom.* 2. *p.* 99. *n°.* 438. — *Mant. Inst. tom.* 2. *p.* 54. *n°.* 533. — *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 135. *n°.* 417.

Papilio Basilea. Cram. *pl.* 188. *fig.* D. (Le mâle.)

Papilio Cytherea. Cram. *pl.* 376. *fig.* C. D. (La femelle.)

Papilio Iphicla. Cram. *pl.* 188. *fig.* E. F. (Var. ?)

Papilio Iphicla. Drury, *Inst. tom.* 1. *pl.* 14. *fig.* 3. 4.

Papilio Cythereus. Herbst, *Pap. tab.* 148. *fig.* 1. 2.

Papilio Iphiclus. Herbst, *Pap. tab.* 148. *fig.* 3. 4.

Sa taille est approchant la même que celle du *Cocala*. Le dessus des ailes est d'un brun-noirâtre, avec une bande blanche, commune, discoïdale, oblique, arrondie à son extrémité antérieure, aiguë ou presqu'aiguë à l'extrémité opposée. Le dessus des premières ailes a en outre, vis-à-vis du sommet, une tache orangée plus ou moins orbiculaire dans le mâle; formant dans la femelle un triangle renversé, mais toujours isolée de la bande blanche qui monte un peu au-delà du disque. Le dessus des secondes ailes est marqué, à l'angle de l'anus, d'une petite tache fauve sur laquelle il y a deux points noirs.

Le dessous de toutes les ailes est d'un brun-ferrugineux, avec une bande blanche de la même forme & de la même longueur qu'en dessus; plus des raies transverses d'un blanc-violâtre-luisant. Les raies sont au nombre de sept, savoir : trois à la base; quatre, dont l'extérieure ondulée & maculaire, en avant du bord terminal. La bande finit aux secondes ailes par une tache fauve & ponctuée de noir comme en dessus : elle est surmontée aux premières de quatre traits blanchâtres, longitudinaux, derrière lesquels on voit une tache également blanchâtre, partagée par trois nervures rousses, & suivie de deux points noirâtres, oblongs.

De la Guyane & du Brésil.

N. B. Si l'on peut s'en fier à une figure, l'*Iphicla* de Cramer paroît devoir être rapporté ici comme variété. En effet, il a seulement le dessous plus obscur; ce qui absorbe la ligne la plus voisine de chacun des côtés de la bande discoïdale, & les deux points noirs de l'angle interne des ailes inférieures.

81. Nymphale Mythra.

Nymphalis Mythra.

Nym. alis suprà fuscis, fasciâ albâ, mediâ, apicibus mucronatâ : anticis maculâ apicis fulvâ : subtùs omnibus luteis, fasciâ strigisque duabus albis.

Nous n'avons vu qu'un seul échantillon de cette espèce. C'est un mâle. Voici ce qui le distingue du *Cythéréa* : le dessus des premières ailes offre, à la place de la bande orangée, une tache triangulaire, également orangée, qui, quoiqu'assez grande, ne touche aucunement la bande blanche discoïdale. En dessous, cette même bande monte tout-à-fait jusqu'en haut, & n'est accompagnée que de deux lignes blanches, dont l'antérieure double sur les premières ailes, la postérieure bordée de brun-cendré sur les quatre. L'angle anal des secondes ailes a d'ailleurs deux points noirs comme du côté opposé, tandis qu'ils n'existent qu'en dessus dans le *Cytherea*.

Du Brésil.

L. Bord postérieur des premières ailes plus ou moins concave, ou tronqué au sommet. Bord correspondant des secondes ayant, au moins dans les mâles, l'une des trois dents postérieures plus prononcée que les autres.

* Dernière dent des secondes ailes plus prononcée que les autres.

82. Nymphale Syma.

Nymphalis Syma.

Nym. alis dentatis, suprà fuscis, fasciâ communi albâ : anticis maculâ apicis aurantiacâ : subtùs omnibus ferrugineis, strigis plurimis albis.

Elle a environ deux pouces d'envergure. Le dessus des ailes est d'un brun-noirâtre, avec une bande blanche, commune, discoïdale, étroite, aiguë à chaque bout. Cette bande commence au milieu des premières ailes, où elle s'unit presqu'au

côté interne d'une tache orangée, très-grande & à peu près orbiculaire.

Le deſſous de toutes les ailes eſt ferrugineux, avec des raies ou bandes blanches, tranſverſes, bordées de noirâtre : il y en a ſix aux ailes ſupérieures, & cinq aux inférieures.

Du Bréſil.

83. Nymphale Fatime.

Nymphalis Fatima.

Nym. alis ſubcaudatis, atris, faſciâ communi flavâ, poſticarum abbreviatâ maculiſque rubris. Fab.

Papilio N. *Fatima.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 81. *n°.* 252.

Papilio Fatima. Jon. *Fig. pict.* 5. *tab.* 12. *fig.* 1.

Elle a le port de l'*Iphicla*. Le deſſus de ſes ailes eſt d'un noir-enfumé, avec une bande fauve, commune, mais plus courte ſur les inférieures, dont le milieu offre quatre taches rouſſes. Les ailes ſupérieures ont au ſommet pareil nombre de points jaunes.

Le deſſous de toutes les ailes eſt brun, avec une bande jaune, continue. Cette bande eſt ſuivie extérieurement aux premières ailes d'une ligne jaune, tranſverſale, & précédée intérieurement aux ſecondes d'une bande rouſſe, interrompue. Le corps eſt noir.

Des Indes.

(*Traduction du texte de Fabricius.*)

84. Nymphale Libéria.

Nymphalis Liberia.

Nym. alis dentatis, ſuprà fulvis, anticarum apice fuſcefcente : poſticis ſubtùs ſtrigâ mediâ è punctis quatuor ocellaribus.

Papilio N. Liberia, *alis dentatis, fulvis : anticis arcu apicis ; poſticis ſuprà puncto, ſubtùs tribus ocellaribus.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 135. *n°.* 418.

Papilio Liberia. Donow. *Of an Epitome of the Nat. Hiſt. Inſ. of India, cah.* 2. *pl.* 1. *fig.* 4.

Papilio Liberia. Jon. *Fig. pict.* 5. *tab.* 15. *fig.* 1.

Papilio N. Agatha, *alis dentatis, ſuprà fulvis, ſubtùs glaucis : poſticis puncto nigro, ſuprà unico, ſubtùs tribus.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 134. *n°.* 414.

Papilio N. Merione, *alis dentatis, fulvis, margine fuſco : poſticis ſubtùs fuſcis, maculis ſtrigiſque albis cæruleiſque.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom* 3. *pars* 1. *p.* 125. *n°.* 382.

Papilio Merione. Herbst, *tab.* 171. *fig.* 1. 2.

Papilio Laothoe. Herbst, *tab.* 170. *fig.* 5. 6.

Papilio Ariadne. Cram. *pl.* 180. *fig.* E. F.

Papilio Laothoe. Cram. *pl.* 132. *fig.* A. B.

Stoll, *Suppl. à* Cram. *pl.* 4. *fig.* 4. A. (La chen.) *fig.* 4. B. (La chryſ.)

Les papillons *Liberia*, *Agatha*, *Merione* de Fabricius appartiennent à cette eſpèce.

Elle a environ deux pouces d'envergure. Le deſſus du mâle eſt d'un fauve à reflet purpurin, le deſſus de la femelle d'un fauve-jaunâtre & ſans reflet. Dans l'un & dans l'autre, les premières ailes ont le ſommet brunâtre, avec une tache fauve ; & les ſecondes ailes offrent vers l'angle de l'anus un point noir très-petit, indépendamment duquel il y a le long du bord poſtérieur une ligne brune plus ou moins prononcée.

Le deſſous des ailes de devant eſt d'un fauve-pâle, avec le milieu coupé tranſverſalement par deux lignes rouſſes, courtes ; le ſommet obſcur & marqué d'un point oculaire que précède en dehors une raie violâtre, tranſverſe & flexueuſe.

Le deſſous des ailes de derrière eſt d'un ferrugineux nuancé de bleuâtre, avec trois taches blanches vers l'origine de la côte, une rangée oblique de quatre points oculaires ſur le milieu, une ligne violâtre en zig-zag en avant du bord poſtérieur.

La femelle a quelquefois tous le deſſus des ailes inférieures d'un noir-brun, comme l'individu que Cramer a figuré ſous le nom de *Laothoe*.

La chenille, d'après Stoll, eſt d'un vert-obſcur, avec la tête bleuâtre, les pattes & la petite fourche de l'anus jaunes. Son corps eſt chargé d'épines noirâtres, branchues, dont les deux antérieures beaucoup plus grandes. Elle vit ſur le *citronier*.

La chryſalide eſt alongée, bifide antérieurement, verte, avec des mouchetures ferrugineuſes.

De la Guyane & du Bréſil.

85. Nymphale Bella.

Nymphalis Bella.

Nym. alis ſuprà fulvis, anticarum apice nigro, albo maculato : poſticis ſubtùs griſeo reticulatis, ocellis quatuor.

Papilio N. Bella, *alis ſubcaudatis, teſtaceis : anticis apice atris faſciâ flavâ maculiſque albis ; poſticis margine flavo, nigro ſtrigoſo.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 79. *n°.* 245.

Papilio Bella. Jon. *Fig. pict.* 5. *tab.* 83. *fig.* 1.

Elle a environ trois pouces & demi d'envergure. Le deſſus des premières ailes eſt d'un fauve-foncé à la baſe ; traverſé au milieu par une bande jaune qui ſe fond quelquefois dans le fauve ; noir à l'extrémité, avec une rangée oblique de trois taches blanches faiſant face au ſommet.

Le deſſus des ſecondes ailes eſt d'un fauve-foncé, avec le limbe poſtérieur plus clair, & longé par une ligne noire, un peu flexueuſe, & terminée à l'angle anal par un point blanc.

Le deſſous des premières ailes eſt noir, avec la baſe & le ſommet variés de gris; le milieu coupé obliquement par une bande jaunâtre, large & bifide antérieurement.

Le deſſous des ſecondes ailes eſt d'un brun-noirâtre, réticulé de gris, avec une rangée poſtérieure de quatre yeux très-rapprochés, dont les deux intermédiaires ſans prunelle & fablés de verdâtre; l'extérieur noir, avec l'iris jaune & la prunelle blanche; l'intérieur d'un brun-jaunâtre, avec la prunelle bleuâtre, l'iris noir & entouré d'un double cercle griſâtre. Le deſſus du corps eſt de la couleur des ailes, avec des points blanchâtres ſur la tête. Les antennes ſont brunes, avec le bout de la maſſue jaunâtre.

De l'Amérique méridionale.

86. Nymphale Laurence.

Nymphalis Laurentia.

Nym. alis ſuprà nigris, faſciâ communi cyaneâ, nitidâ : poſticis ſubtùs argenteo-griſeis, puncto baſeos fuſco.

Elle a près de deux pouces & demi d'envergure. Le deſſus des ailes eſt d'un noir-brun, avec une bande commune & diſcoïdale, qui eſt d'un bleu-verdâtre-luiſant lorſqu'on la voit de face, & d'un vert-doré qu'accompagne un reflet bleu d'outre-mer lorſqu'on la regarde de côté. Les premières ailes, dont la bande ſuſdite n'atteint point la côte, ont vis-à-vis du ſommet une ligne arquée de trois points blancs, diaphanes.

Le deſſous des premières ailes eſt d'un fauve-jaunâtre vers la baſe, avec trois lignes noires, tranſverſes, dont la poſtérieure flexueuſe & bordée en arrière par une ſuite de taches blanchâtres; d'un gris-luiſant à l'extrémité, avec une rangée tranſverſe de trois gros points noirs près de l'angle interne.

Le deſſous des ſecondes ailes eſt d'un gris-luiſant, avec deux bandes un peu plus claires, entre leſquelles il y a une ſuite de points bleuâtres, peu diſtincts : outre cela, on voit, vers la baſe, un point d'un brun-noirâtre. Le corps a le deſſus de cette dernière couleur, & le deſſous blanchâtre. Les antennes ſont brunes en deſſus, ferrugineuſes en deſſous.

Du Bréſil.

Nota. Nous n'avons vu que des mâles.

87. Nymphale Laure.

Nymphalis Laura.

Nym. alis ſuprà nigris, faſciâ mediâ : anticarum fulvâ, interruptâ; poſticarum albâ & à latere cæruleo nitidâ.

Papilio N. Laura, *alis angulato-dentatis, fuſcis, faſciâ communi dimidiato-fulvâ : poſticis ſubtùs argenteis, faſciâ niveâ.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 134. *n°.* 415.

Papilio Laure. Drury, *Inſ. tom.* 2. *pl.* 17. *fig.* 5. 6.

Ne ſeroit-ce pas la femelle de la précédente? Elle en a le port & la taille, & elle lui reſſemble en deſſous.

Le deſſus de ſes ailes eſt d'un noir-brun, avec une bande tranſverſe ſur le milieu. La bande des ſecondes ailes eſt blanche & environnée d'un beau reflet bleu. Celle des premières ailes eſt fauve & interrompue en deux endroits. Il y a en outre une tache de cette couleur au ſommet des mêmes ailes.

Des Indes occidentales.

N. B. Fabricius dit que la bande des ailes eſt fauve antérieurement, blanche poſtérieurement. Cette manière de s'exprimer pourroit faire croire qu'elle eſt fauve du côté de la baſe, & blanche du côté du bord terminal.

88. Nymphale Thoé.

Nymphalis Thoe.

Nym. alis utrinquè faſciâ communi albâ & ocello cæco : poſticis ſubtùs argenteo-griſeis.

Elle a le port & la taille de la nymphale *Laurence.* Le deſſus du mâle eſt d'un brun-noirâtre à reflet violet, avec une bande blanche, commune, oblique & maculaire ſur le milieu; avec deux lignes noires, ondulées, en avant du bord poſtérieur. On voit en outre, vers l'angle anal des quatre ailes, une tache fauve chargée d'un point noir; &, ſur la dernière dent des inférieures, une ligne bleuâtre en forme de V, & ſurmontée d'une pouſſière verdâtre.

Le deſſous de toutes les ailes eſt comme dans la nymphale *Laure*, mais il n'y a que deux points noirs près de l'angle interne des ſupérieures. Le corps eſt de part & d'autre de la même couleur que les ailes inférieures. Les antennes ſont noires, avec la maſſue ferrugineuſe.

Nous n'avons vu que deux femelles. Elles ne diffèrent point du mâle quant au deſſin; mais elles ſont ſans reflet, & leur deſſus eſt d'un fauve un peu obſcur. Cette couleur eſt-elle conſtante dans toutes les femelles; ou bien les deux ſexes ſont-ils tantôt plus ou moins fauves, tantôt d'un brun-noirâtre en deſſus, comme cela a lieu dans l'*Ilia* ou *petit Mars?*

De l'Amérique.

89. Nymphale Pavon.

Nymphalis Pavon.

Nym. alis ſuprà fuſcis, faſciis duabus dilutioribus : anticis maculâ apicis fulvâ : poſticis ſubtùs punctis tribus cæruleſcentibus ocellatis.

Nymphalis

Nymphalis Pavon, *alis dentatis; superiorum margine postico concavo, ad apicem producto, truncato : alis quatuor supra fusco-brunneis, fasciis duabus dilutioribus, maculâque rubescenti superiorum apicem versus : infrà rubescenti-brunneis, fasciis rubescenti-griseis; superiorum basi fulvâ litteris duabus nigris; inferioribus puncto cœrulescenti, nigro marginato, fasciæ brunneæ impositio.* Recueil d'obſerv. de zool. & d'anat. comp. par Alex. de Humboldt & A. Bonpland, *vol.* 1. *p.* 197. *pl.* 18. *fig.* 3. 4.

Elle a le port & la taille de la nymphale *Laurence*. Le deſſus des quatre ailes eſt d'un brun-noirâtre à reflet violet, avec deux bandes plus claires, tranſverſes & parallèles, dont l'une diſcoïdale, l'autre plus étroite, maculaire & voiſine du bord poſtérieur. Les premières ailes ont en outre, près du ſommet, une tache fauve, ovale, aſſez grande, coupée par les nervures.

Le deſſous de toutes les ailes a la moitié poſtérieure d'un brun-rougeâtre, avec deux bandes d'un gris de perle, correſpondant à celles de la ſurface oppoſée, plus une ſérie de taches marginales, colorées comme ces bandes. La baſe des premières ailes eſt d'un fauve-jaunâtre, mais un peu plus pâle près de la côte, avec deux caractères noirs, dont l'un en forme d'S, l'autre en forme d'I. Il y a encore trois taches noirâtres, triangulaires, & alignées tranſverſalement près de l'angle anal des mêmes ailes. Les ſecondes ailes ont, entre les deux bandes, un rang de trois points bleuâtres, bordés de noir; &, à la baſe, qui eſt d'un gris-rougeâtre, un point & un petit trait bruns. Le corps eſt noirâtre en deſſus, griſâtre en deſſous.

Priſe dans les bois de Loxa, & dédiée à M. Pavon, naturaliſte eſpagnol, célèbre par ſes travaux ſur les plantes du Pérou.

90. Nymphale Vacuna.

Nymphalis Vacuna.

Nym. alis denticulatis, ſuprà fuſcis (*in mare violaceo micantibus*) : *anticis utrinquè faſciâ calthaceâ : poſticis ſubtùs puncto ocellari cœruleo.*

Elle a un peu plus de deux pouces d'envergure. Le deſſus du mâle eſt d'un brun-noirâtre à reflet violet, avec une bande oblique & maculaire d'un jaune-ſouci au-delà du milieu, un arc de trois points blancs vis-à-vis du ſommet, une ligne d'un gris-obſcur en avant du bord poſtérieur. Cette ligne ſe prolonge juſqu'à l'angle anal des ſecondes ailes.

Le deſſus de la femelle reſſemble à celui du mâle, mais il eſt ſans reflet; la bande ſouci des premières ailes eſt continue, beaucoup plus large, & ſuivie ſeulement de deux points blancs. Les dents des ſecondes ailes ſont en outre uniformes, tandis que dans le mâle la dernière eſt plus ſaillante que les autres.

Le deſſous des ailes ſupérieures des deux ſexes eſt fauve à la baſe, avec trois raies noires, courtes & tranſverſales; enſuite noirâtre, avec une bande & des points comme en deſſus, plus une teinte d'un gris-violâtre au ſommet. Le deſſous des ailes inférieures, dans le mâle & dans la femelle, eſt d'un gris-violâtre-luiſant, avec des eſpaces maculaires d'un brun-marron peu prononcé, ſans compter un point noir à prunelle bleue, placé vers l'angle de l'anus. La tranche du bord poſtérieur des quatre ailes eſt ferrugineuſe de part & d'autre. Cette couleur eſt auſſi celle du devant du corſelet & du deſſous des antennes.

Du Bréſil.

91. Nymphale Agathis.

Nymphalis Agathis.

Nym. alis denticulatis, ſuprà fuſcis (*in mare violaceo micantibus*) : *anticis utrinquè ad apicem ſtrigis duabus macularibus albis : poſticis ſubtùs cœcis.*

Papilio Agathina. Cram. *pl.* 167. *fig.* E. F. (Le mâle.)

Elle eſt de la taille de la précédente. Le deſſus du mâle eſt d'un brun-noirâtre à reflet violet, avec point ſolitaire, puis deux rangées obliques de points blancs, vers l'extrémité des ailes ſupérieures, & une ligne obſcure le long du bord terminal des quatre.

La femelle eſt plus pâle, ſans reflet, & ſes ailes inférieures, dont toutes les dents ſont égales, offrent à l'angle de l'anus un croiſſant lilas.

Le deſſous des ailes ſupérieures, dans les deux ſexes, eſt jaunâtre à la baſe, avec trois points & une petite raie tranſverſe noirs; enſuite noirâtre, avec le même nombre de points blancs qu'en deſſus, & le ſommet d'un ferrugineux teinté de violâtre. Le deſſous des ſecondes ailes du mâle & de la femelle a environ tout le tiers antérieur d'un gris-lilas, le reſte de la ſurface d'un ferrugineux légèrement teinté de violâtre & ſans aucune tache oculaire. La tranche du bord poſtérieur des quatre ailes, le devant du corſelet & le deſſous des antennes, ſont ferrugineux.

Du Bréſil.

92. Nymphale Zunilda.

Nymphalis Zunilda.

Nym. alis denticulatis, ſuprà fuſcis (*in mare violaceo micantibus*) : *anticis utrinquè ad apicem ſtrigis duabus macularibus albis : poſticis ſubtùs punctis duobus ocellaribus cœruleis.*

Nous n'avons vu que le mâle de cette eſpèce. Il eſt plus petit que celui de la précédente, & il lui reſſemble en deſſus.

Le deſſous des premières ailes a la moitié antérieure fauve, avec deux taches, dont l'une ferrugineuſe, l'autre noire; la moitié poſtérieure d'un gris de lin, avec des points blancs comme en deſſus, & dont les plus intérieurs environnés de noir.

Le deſſous des ſecondes ailes eſt d'un gris de lin, avec deux petites taches à la baſe, & une ligne flexueuſe ſur le milieu, d'un ferrugineux-pâle, & deux points noirs à prunelle bleue vers l'angle de l'anus. La tranche du bord poſtérieur eſt entrecoupée de blanc & de ferrugineux.

Du Bréſil.

---

g. Avant-dernière dent des ſecondes ailes plus prononcée que les autres.

93. Nymphale Gélanie.

Nymphalis Gelania.

Nym. alis dentatis, fuſcis, utrinquè fuſciâ communi albâ: ſubtùs maculis baſeos ferrugineis alboque cinctis.

Son envergure eſt d'environ deux pouces & demi. Le deſſus des ailes eſt d'un brun-noirâtre, avec une bande blanche, commune, oblique, diſcoïdale, moins diviſée aux inférieures qu'aux ſupérieures. Ces dernières ont vers l'origine de la côte trois taches d'un rouge-ferrugineux, tranſverſales, encadrées de noir, & ſéparées l'une de l'autre par du cendré-bleuâtre. Les ailes inférieures ont à l'angle de l'anus une tache fauve, marquée de deux points noirs.

Le deſſous des quatre ailes diffère du deſſus en ce qu'il eſt moins foncé, & qu'il préſente parallèlement au bord terminal deux lignes ferrugineuſes, entre leſquelles règne une ligne blanche; en ce que les nervures ſont bordées de ferrugineux depuis la bande du milieu juſqu'à la ligne intérieure de l'extrémité; en ce que les taches rouges de la baſe des ailes ſupérieures ont l'encadrement entouré de blanc; enfin, en ce qu'il y a deux taches ſemblables à la baſe des ailes inférieures.

Elle habite l'Amérique équinoxiale.

---

h. Antépénultième dent des ſecondes ailes plus prononcée que les autres.

94. Nymphale Acilia.

Nymphalis Acilia.

Nym. alis dentatis, fuſcis, ſtrigis griſeis, fuſciâ communi albâ ſenequè poſticâ ocellorum cœcorum.

Elle a environ deux pouces & demi d'envergure. Le deſſus des ailes eſt d'un brun-noirâtre, avec une bande blanche, commune, large, oblique, diſcoïdale, précédée & ſuivie de pluſieurs lignes griſâtres, tranſverſes. Entre les lignes de l'extrémité, il y a une ſérie d'yeux noirs, ſans prunelle, & ayant pour la plupart un iris rouſſâtre. Indépendamment de cela, l'angle anal des ailes inférieures offre un eſpace fauve, dans lequel ſe perd la bande blanche ſuſdite.

Le deſſous ne diffère du deſſus que parce que les lignes tranſverſes ſont blanchâtres, au lieu d'être griſes.

Décrite d'après un individu unique, pris à la terre des Papous par M. le capitaine Freycinet.

95. Nymphale Stélénès.

Nymphalis Stelenes.

Nym. alis utrinquè fuſciis duabus vireſcentibus, poſticarum priori integrâ: ſubtùs anticis Z coſtali cæruleſcente.

Papilio D. F. Stenelus, *alis ſubcaudatis, ſuprà fuſcis, fuſciâ vireſcente, obtuſâ, interruptâ.* Linn. *Syſt. Nat.* 2. *p.* 750. *n°.* 30.

Papilio E. A. *Stelenes.* Linn. *Muſ. Lud. Ulr. p.* 219. *n°.* 37.

Papilio N. Stelenes, *alis dentatis, fuſcis, fuſciis duabus viridibus, alterâ poſticarum integrâ.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 84. *n°.* 263.

Papilio E. A. *Stelenes.* Fab. *Syſt. Ent. p.* 456. *n°.* 57. — *Spec. Inſ. tom.* 2. *p.* 23. *n°.* 92. — *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 12. *n°.* 108.

Papilio Stelenes. Clerck, *Icon. tab.* 35. *fig.* 2.

Merian, *Surin. Inſ. tab.* 11.

Petiv. Gazoph. *tab.* 134. *fig.* 1.

Hottuin, *Nat. Hiſt.* 1. D. 11. *ſtuk. plaat.* 87. *fig.* 4. 5.

Sloan. *Hiſt. Jam. tom.* 2. *p.* 219. *tab.* 239. *fig.* 9. 10.

Papilio Stelenes. Cram. *pl.* 79. *fig.* A. B.

Papilio Stelenes. Herbst, *tab.* 47. *fig.* 3. 4.

Le Verd-d'eau. Daubenton, *pl. enlum.* 95. *fig.* 1. 2.

Elle a entre trois pouces & demi & quatre pouces d'envergure. Le deſſus des ailes eſt d'un noir-brun, avec deux bandes d'un vert-céladon, communes, obliques. La bande antérieure, qui eſt beaucoup plus large, eſt fortement interrompue aux premières ailes. La bande poſtérieure eſt maculaire aux quatre, & terminée au bord interne des ſecondes par une tache fauve plus ou moins alongée.

Le deſſous de toutes les ailes eſt ferrugineux, avec des bandes vertes, ſemblables à celles du deſſus, mais plus pâles, & ſéparées l'une de l'autre, du moins dans les femelles, par une raie blanche. Les premières ailes ont, vers l'origine de la côte,

une raie également blanche, coupée par une ligne bleuâtre, tranſverſale & en forme de Z. Le corps eſt noir en deſſus, avec les côtés de l'abdomen rouſſâtres. Les antennes ſont noires, avec la ſommité ferrugineuſe.

De la Guyane.

96. Nymphale Epaphéa.

Nymphalis Epaphea.

Nym. alis utrinquè corticinis, faſciâ communi albâ : anticis ſuprà dimidio apicali fulvo.

Quoique nous ayons déjà donné la deſcription de cette eſpèce à la *page* 299, *n°.* 10, nous croyons devoir la reproduire ici, avec les modifications qui nous ont paru néceſſaires.

Elle a le port & la taille du *Stélénès*. Le deſſus des premières ailes a la moitié antérieure d'un brun-tanné, l'autre moitié tabac d'Eſpagne. Ces deux couleurs ſont ſéparées par une bande blanche, tranſverſe, près de l'origine du côté interne de laquelle il y a une ligne également tranſverſe de quatre ou cinq points bleuâtres. Le deſſus des ſecondes ailes eſt entièrement d'un brun-tanné, avec une bande blanche, poſtérieure, courbe, maculaire, faiſant ſuite à celle des ailes de devant.

Le deſſous des quatre ailes reſſemble beaucoup au deſſus, mais l'extrémité des ſupérieures eſt à peu près du même ton que la baſe, & les inférieures ont deux bandes blanches, dont l'une diſcoïdale & fortement interrompue dans ſon milieu, l'autre correſpondant à celle de la ſurface oppoſée, & renfermée entre deux ſéries de taches rouſſes. Le corps eſt fauve, avec des points blancs ſur la tête & ſur le devant du corſelet; plus, des lignes longitudinales de cette couleur ſur le ventre. La poitrine eſt rayée de blanc & de rouge. Les antennes ſont noires, annelées de blanchâtre, avec le bout de la maſſue ferrugineux.

Du Pérou.

97. Nymphale Symachia.

Nymphalis Symachia.

Nym. alis fuſcis, ſuprà faſciâ communi albâ, ſubtùs quatuor rufis totidemque albis alternantibus.

Papilio Sulpitia. Cram. *pl.* 328. *fig.* A. B.

Elle a environ deux pouces & demi d'envergure. Le deſſus de ſes ailes eſt d'un brun-noirâtre, avec une bande blanche, commune, oblique, diſcoïdale, continue aux inférieures, maculaire aux ſupérieures.

Le deſſous eſt à peu près du même brun que le deſſus, avec huit bandes alternativement rouſſes & blanches. Les bandes des ailes de devant ſont interrompues, à l'exception de celle qui avoiſine le bord terminal. Le corps & les antennes ſont d'un brun-noirâtre.

De la Guyane.

N. B. Le deſſus des ſecondes ailes offre parfois, derrière la bande blanche, une ligne rouſſâtre, ondulée & tranſverſale.

98. Nymphale Typha.

Nymphalis Typha.

Nym. alis dentatis, fuſco-nigris, ſuprà faſciâ communi, ſubtùs diſco baſeos, albis : anticarum diſco bipartito.

Papilio N. Tipha, *alis ſubcaudatis, nigris : primoribus maculis duabus, poſticis diſco rubro emarginato, albis.* Linn. *Syſt. Nat.* 2. *p.* 776. *n°.* 164. — *Muſ. Lud. Ulr. p.* 308. *n°.* 126.

Papilio Tiphus. Clerck, *Icon. tab.* 32. *fig.* 3.

Papilio N. Neærea, *alis dentatis, ſuprà fuſcis, albo maculatis : ſubtùs maculis albis lineâ rubrâ cinctis.* Linn. *Syſt. Nat.* 2. *p.* 782. *n°.* 190. — *Muſ. Lud. Ulr. p.* 297. *n°.* 115.

Edwards, *Av. tab.* 3.

β. Papilio Tipha. Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 138. *n°.* 424.

Papilio Tipha. Cram. *Pap. pl.* 8. *fig.* D. E.

Papilio Tiphus. Herbst, *Pap. tab.* 237. *fig.* 5. 6.

Papilio Tiphus. Hottuin, *Nat. Hiſt.* 1. *p.* 382.

Seba, *Muſ.* 4. *tab.* 12. *fig.* 19. 20.

Seba, *Muſ.* 4. *tab.* 19. *fig.* 1. 2.

Quoiqu'il y ait beaucoup de vague dans la deſcription du *Neærea* de Linnæus, on ne peut pas douter, quand on a comparé cette deſcription avec la figure d'Edwards, à laquelle il renvoie, que ledit *Neærea* n'appartienne à la même eſpèce que le *Typha*.

L'envergure des ailes eſt de deux pouces & demi. Leur deſſus eſt d'un noir-brun, avec une bande blanche, commune, large & diſcoïdale. La bande des ailes inférieures eſt terminée à l'angle de l'anus par un point d'un rouge-écarlate. Celle des ſupérieures eſt interrompue vers ſon milieu, & ſouvent ſéparée du bord terminal par une ligne tranſverſe de quatre à cinq points blancs. Le deſſous de ces premières ailes offre à la baſe un large eſpace blanc que diviſe une raie brune, longitudinale, à l'extrémité de laquelle aboutit une ligne rouge, crochue & longeant la côte juſqu'à ſon origine; immédiatement après cette ligne vient une tache blanche, grande & orbiculaire, derrière laquelle on voit une ligne rouge, arquée, puis une rangée tranſverſe de ſix points blancs.

Le deſſous des ſecondes ailes a le diſque blanc, à partir de la baſe, & bordé dans tout ſon contour extérieur par une ligne rouge, qui eſt continue ſur la côte; maculaire & adoſſée à une ſérie de

points noirs, piqués de bleu, en face du bord poſtérieur. Ce bord eſt brun & chargé d'un rang de points blancs qui ſont ſuite à ceux des ailes ſupérieures. Les antennes ſont noires & annelées de blanc. Le corps eſt brun en deſſus, blanchâtre en deſſous.

De la Guyane & du Bréſil.

N. B. Nous avons vu une variété ayant la bande du deſſus des ailes étroite, particulièrement aux ſupérieures.

99. Nymphale Néérée.

Nymphalis Neœrea.

Nym. alis dentatis, ſuſco-nigris, ſuprà ſaſciâ communi, ſubtùs diſco baſeos, glaucis : anticarum diſco integro.

Papilio N. *Neœrea.* Fab. *Syſt. Ent. p.* 510. *n°.* 286. — *Spec. inſ. tom.* 2. *p.* 100. *n°.* 441. — *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 54. *n°.* 336. — *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 137. *n°.* 424.

Papilio Neœrea. Cram. *Pap. pl.* 75. *fig.* C. D.

Stoll, *Pap. Suppl. à* Cram. *pl.* 4. *fig.* 3. A. (La chenille.) *fig.* 3. B. (La chryſalide.)

Papilio Neœreus. Herbst, *Pap. tab.* 237. *fig.* 3. 4.

Fabricius a connu cette eſpèce, du moins par la figure de Cramer, mais il l'a confondue avec le *Typha*.

Elle en diffère cependant par les caractères que voici : en deſſus la bande des quatre ailes eſt d'un vert-pâle & beaucoup plus large; les inférieures n'ont pas de point rouge à l'angle de l'anus : en deſſous l'eſpace blanc, ou plutôt verdâtre, de la baſe des premières ailes, n'eſt pas diviſé par une ligne brune, longitudinale; le diſque des ſecondes ailes n'eſt pas bordé de rouge ſur la côte, mais ſeulement dans la partie qui fait face au bord poſtérieur; les points de ce bord, ainſi que ceux du bord correſpondant des ailes ſupérieures, forment une ligne preſque continue & d'un ton violâtre.

Même patrie.

La chenille, ſuivant Stoll, eſt d'une couleur ferrugineuſe, avec la tête, le devant du corps, le dos & les fix pattes antérieures, d'un jaune-clair; les autres pattes & les trois derniers anneaux d'un jaune-obſcur. Elle a des épines noires, branchues, dont deux plus longues ſur le col. On la trouve ſur le *cafier*.

La chryſalide eſt perpendiculaire, verte, mouchetée de fauve, avec une éminence obtuſe ſur la partie antérieure du dos. L'inſecte parfait en ſort au bout de neuf à dix jours.

100. Nymphale Lamina.

Nymphalis Lamina.

Nym. alis dentatis, fuſcis, utrinquè faſciâ communi albâ ſtrigiſque duabus lunularum cœruleſcentium : ſubtùs rufo maculatis.

Papilio N. Lamina? *alis angulatis, nigris, faſciâ utrinquè communi albâ : ſubtùs rufo maculatis.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 118. *n°.* 561.

Papilio Lamina? Jon. *Fig. pict.* 5. *tab.* 32. *fig.* 1.

Papilio Arthemis. Drury, *Inſ.* 2. *pl.* 10. *fig.* 3. 4.

Elle a entre deux pouces & demi & trois pouces d'envergure. Le deſſus des ailes eſt d'un noir-brun, avec une bande blanche, commune, ſur le milieu, & un double cordon de lunules d'un vert-bleuâtre le long du bord terminal. Indépendamment de cela, les ailes ſupérieures ont parallèlement au ſommet une ligne tranſverſe de deux à trois petites taches blanches, & les inférieures offrent entre la bande & les lunules une rangée courbe & tranſverſe de ſept points roux.

Le deſſous diffère du deſſus en ce que le fond eſt d'un brun-pâle, excepté ſur le bord poſtérieur qui reſte noir; en ce qu'il y a à la baſe de chaque aile quelques taches bleuâtres, accompagnées de quelques gros points roux; enfin, en ce que les premières ailes ont une férie de points de cette dernière couleur avant les lunules bleues de l'extrémité. Les échancrures de toutes les ailes ſont blanches de part & d'autre. Le corps eſt noir, avec trois lignes blanches le long du ventre. Les antennes ſont noires.

De l'Amérique ſeptentrionale, & principalement de l'état de New-Yorck.

Nota. Fabricius ne dit pas ſi le deſſus des ſecondes ailes a une rangée de points roux. C'eſt la ſeule différence qu'il y ait entre ſon *Lamina* & le nôtre.

101. Nymphale Urſule.

Nymphalis Urſula.

(*Voyez* Pap. Epheſtion, *p.* 42. *n°.* 51.)

Papilio N. Urſula, *alis dentatis, nigris : poſticis limbo cœruleſcente faſciâ nigrâ : ſubtùs fulvo maculatis.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 82. *n°.* 257.

Papilio E. A. *Aſyanax.* Fab. *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 4. *n°.* 29.

Papilio N. *Urſula.* Smith-Abbot, *the Nat. Hiſt. of the rarer Lepid. Inſ. of Georgia, &c., tom.* 1. *p.* 19. *tab.* 10.

Papilio Epheſtion. Stoll, *Pap. Suppl. à* Cram. *p.* 121. *pl.* 25. *fig.* 1.

Nous avons, mais à tort, placé cette eſpèce dans le genre Papillon. C'eſt une véritable *Nym-*

phale, qui habite plusieurs parties de l'Amérique septentrionale, & non la côte de Guinée, comme nous l'avons dit, sur la foi de Stoll.

Sa chenille est ferrugineuse, avec des nuances blanchâtres. Elle a, près du col, deux épines noires, un peu branchues, & presque convergentes à leur base. On la trouve sur l'*airelle à écorce verte* (*vaccinium stamineum*); sur le *saule* & sur le *cerisier sauvage*.

La chrysalide, dont les couleurs sont absolument les mêmes que celles de la chenille, a sur le dos une bosse ronde, assez prononcée. L'insecte parfait paroît en avril & en juin.

102. Nymphale Oisis.

Nymphalis Oisis.

Nym. alis dentatis, suprà nigris (in mare cæruleo micantibus), strigis tribus macularibus albis, primâ & secundâ abdomen secantibus.

Papilio N. Oisis, *alis angulatis, cæruleis, margine anticarumque maculâ atris: subtùs obscuris.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 124. *n°.* 378. (Le mâle.)

Papilio Oisis. Jon. *Fig. pict.* 5. *tab.* 101. *fig.* 2.

Papilio Oisis. Drury, *Inf.* 3. *pl.* 16. *fig.* 3.

Papilio N. Blandina, *alis dentatis, atris, albo maculatis: anticis striâ basèos, posticis strigâ marginali, cæruleis.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 129. *n°.* 397. (La femelle.)

Papilio Blandina. Jon. *Fig. pict.* 5. *tab.* 10. *fig.* 1.

Papilio Blandina. Donow. *Of an Epit. of the Nat. Hist. of the Inf. of India, cah.* 2. *pl.* 1. *fig.* 3.

Fabricius & d'autres auteurs ont donné le mâle de cette espèce sous le nom d'*Oisis*, & la femelle sous celui de *Blandina*.

Elle a environ deux pouces d'envergure. Le dessus des ailes est noir, avec trois bandes blanches, maculaires, dont les deux antérieures traversant le dessus du corps. Ces bandes sont moins apparentes dans le mâle, parce qu'elles y sont absorbées par un reflet d'un bleu-violet vif. L'un & l'autre sexe ont au sommet des premières ailes une tache ferrugineuse, & la femelle offre parallèlement au bord terminal des secondes une ligne bleuâtre, sinuée.

Le dessous des premières ailes est brunâtre vers la base, ferrugineux vers l'extrémité, avec des bandes maculaires comme en dessus.

Le dessous des secondes ailes est d'un ferrugineux tirant au gris ou au violâtre, avec des bandes plus ou moins distinctes, correspondant à celles de la surface opposée. Les échancrures des ailes sont blanches dans la femelle. Le corps est de part & d'autre du même ton que les ailes. Les antennes sont noires, avec des anneaux blancs.

Du Brésil.

103. Nymphale Sylvina.

Nymphalis Sylvina.

Nym. alis suprà nigro flavidoque variis, subtùs virescentibus: anticis utrinquè fasciâ albâ, transversâ, maculari.

Papilio Sylvia. Cram. *pl.* 43. *fig.* F. G.

Papilio Sylvia. Herbst, *Pap. tab.* 247. *fig.* 2. 3.

Elle a de trois à quatre pouces d'envergure. Le dessus des premières ailes est noir, varié de jaune-obscur dans tous les sens, & coupé transversalement au-delà du milieu par une bande blanche, maculaire, partant de la côte, mais n'atteignant pas le bord interne. Le dessus des secondes est pareillement noir, avec du jaune-obscur qui y forme six bandes étroites & transversales, dont les trois antérieures se réunissant près de la côte; la quatrième rayonnée en dehors; les deux autres, la cinquième surtout, composées de lunules.

Le dessous des quatre ailes est d'un brun, tantôt très-pâle, tantôt verdâtre, & présente, vers l'extrémité, trois séries transverses de taches noires, dont les antérieures bifides & un peu plus grandes. Indépendamment de cela, les secondes ailes ont sur le milieu une ligne noire, flexueuse; & les premières une bande blanche comme en dessus, sans compter deux anneaux & un trait noirs qui avoisinent la base. Les échancrures du bord postérieur de toutes les ailes sont liserées de blanc. Le corps a le dessus noir & annelé de jaune depuis la tête jusqu'à l'anus. Les antennes sont noires, avec la sommité roussâtre.

Des îles de Java & d'Amboine.

104. Nymphale Opis.

Nymphalis Opis.

Nym. alis suprà fuscis, fasciâ communi caracteribusque ochreaceis: anticis strigâ punctorum albarum.

Papilio N. Opis, *alis dentatis, fuscis: anticis flavo reticulatis, posticis fasciatis.* Fab. *Spec. Inf. tom.* 2. *p.* 97. *n°.* 428. — *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 53. *n°.* 521. — *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 131. *n°.* 405.

Papilio Opis. Cram. *pl.* 138. *fig.* A. B.

Papilio Opis. Drury, *Inf. tom.* 2. *pl.* 18. *fig.* 5. 6.

Papilio Opis. Herbst, *Pap. tab.* 143. *fig.* 3. 4.

Papilio N. Crithea, *alis dentatis, fuscis, maculis ocellaribus: posticis subtùs cinereis, punctis*

duobus ſtrigâque poſticâ fuſcis. Fab. *Spec. Inſ. tom. 2. p. 98. n°. 429. — Mant. Inſ. tom. 2. p. 53. n°. 522. — Ent. Syſt. em. tom. 3. pars 1. p. 132. n°. 406.*

Papilio Crithea. Cram. *pl. 138. fig.* C. D.

Papilio Crithea. Drury, *Inſ. tom. 2. pl. 16. fig. 5. 6.*

Papilio Crithea. Herbst, *Pap. tab. 143. fig. 1. 2.*

L'*Opis* & le *Crithea* des auteurs diffèrent ſi peu l'un de l'autre que Fabricius les auroit ſans doute réunis, s'il en avoit donné la deſcription d'après nature, au lieu de la donner, ce qu'on reconnoît très-aiſément, d'après les figures de Cramer. On objectera peut-être que le *Crithea* a le bord poſtérieur des ailes moins ſinué que l'*Opis*; mais cela prouveroit ſeulement une différence de ſexe. Nous avons dit plus d'une fois que, lorſque les ailes ſont dentées, elles le ſont plus fortement dans les individus femelles que dans les individus mâles.

L'envergure des ailes eſt d'environ deux pouces & demi. Leur deſſus eſt d'un brun-obſcur, avec des anneaux, une ligne baſilaire & une bande diſcoïdale, d'un jaune d'ocre. La bande traverſe tout-à-fait les ailes inférieures; elle monte plus ou moins ſur les ſupérieures, vers l'extrémité deſquelles il y a une ſérie tranſverſe de ſix à ſept points blancs. Le deſſous de ces premières ailes ne diffère du deſſus que parce qu'il eſt plus pâle, & un peu glacé de violâtre aux taches annulaires.

Le deſſous des ſecondes ailes a la baſe d'un brun mêlé de gris & marqué de quelques caractères noirâtres; tout le reſte de la ſurface jaunâtre, avec trois lignes obſcures & tranſverſales, dont les deux poſtérieures maculaires.

De Sierra-Leone en Afrique.

105. Nymphale Cupavius.

Nymphalis Cupavius.

Nym. alis fuſco-nigris : anticis utrinquè faſciis duabus macularibus albidis, poſticis diſco ochreaceo.

Papilio F. Cupavius, *alis integris, atris, albo maculatis : poſticis ſubtùs griſeis, faſciâ utrinquè albâ.* Fab. *Spec. Inſ. tom. 2. p. 60. n°. 263. — Mant. Inſ. tom. 2. p. 28. n°. 302. — Ent. Syſt. em. tom. 3. pars 1. p. 152. n°. 467.*

Papilio Cupavia. Cram. *pl. 193. fig.* E. F.

Papilio Cupavia. Herbst, *tab. 137. fig. 3. 4.*

Elle a de deux pouces à deux pouces & demi d'envergure. Le deſſus des ailes eſt d'un noir-brun, avec deux rangées obliques de taches blanches ou d'un blanc-jaunâtre vers le bout des ſupérieures, & une tache d'un jaune d'ocre, plus ou moins grande & plus ou moins foncée, ſur le diſque des inférieures. Celles-ci ont en outre, parallèlement au bord poſtérieur, un double rang de taches cendrées, petites & peu apparentes.

Le deſſous des premières ailes ne diffère du deſſus que parce que le fond eſt un peu plus pâle, & le ſommet d'une teinte ferrugineuſe.

Le deſſous des ſecondes ailes eſt lavé de brun-jaunâtre, avec un eſpace diſcoïdal plus clair & ſurmonté immédiatement de deux points noirs, tantôt ſéparés, tantôt réunis.

La femelle a le milieu des ſecondes ailes d'un jaune plus foncé en deſſus.

De la côte de Guinée.

106. Nymphale Iapis.

Nymphalis Iapis.

Nym. alis repandis, ſuprà nigro-fuſcis, ſubtùs dilutè corticinis : utrinquè faſciâ poſticâ cæruleſcenti-albâ.

Papilio Laocoon. Vélins du Muſéum. (Le mâle.)

Papilio Ganimède. Vélins du Muſéum. (La femelle.)

Elle a de deux pouces & demi à trois pouces d'envergure. Le deſſus du mâle eſt d'un noir-brun, avec une bande blanche, largement bordée de bleu-cendré, commençant en pointe aiguë au ſommet des ailes ſupérieures, & allant toujours en s'élargiſſant aboutir à l'angle anal des inférieures.

Le deſſus de la femelle eſt d'un brun-obſcur, avec deux bandes blanches, tranſverſes & rapprochées, dont l'intérieure maculaire, beaucoup moins large aux ſecondes ailes qu'aux premières; l'extérieure ſemblable à celle du mâle, mais quelquefois ſans bordure bleue.

Le deſſous des deux ſexes eſt d'un brun-tanné pâle, avec une bande d'un blanc-violâtre, double ou ſimple ſuivant le ſexe, & correſpondant à celle du deſſus. Il y a en outre, à la baſe des ailes ſupérieures, quatre ou cinq traits noirâtres, tranſverſaux. Le bord poſtérieur de toutes les ailes eſt liſéré de blanc de part & d'autre. Les deux ſurfaces du corps ſont de la couleur de celles des ailes. Les antennes ſont noires.

De Java.

N. B. Nous avons vu une variété mâle, dont la bande du deſſus des ailes eſt entièrement d'un bleu-cendré, & s'étend juſqu'au liſéré du bord. Cette variété vient auſſi de l'île de Java.

107. Nymphale? Cocyta.

Nymphalis Cocyta.

Nym. alis repando-dentatis, fuſcis : poſticis apice cæruleſcentibus. Fab.

Papilio N. *Cocyta.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom. 3. pars 1. p. 127. n°. 388.*

Papilio Cocyta. Jon. *Fig. pict.* 4. *tab.* 64. *fig.* 2.

Fabricius signale ainsi ce lépidoptère : il a beaucoup d'affinité avec le *Bella* (n°. 85); cependant il s'en distingue en ce que ses ailes ne sont ni concaves, ni en queue, mais simplement dentées.

Il vaudroit mieux ne rien dire que de s'exprimer ainsi. Ce n'est pas le moyen de faire reconnoître une espèce que de la comparer à une autre qui ne lui ressemble ni par la forme, ni par les couleurs. Ceux qui verront les dessins de Jones reconnoîtront peut-être quelle doit être la place de celle-ci. En attendant nous la mettrons à côté de l'espèce dont elle nous paroît le plus se rapprocher.

Des Indes orientales.

108. Nymphale? Monime.

Nymphalis Monima.

Nym. alis dentatis, fuscis : posticis brunneis, angulo ani cærulescente strigâ nigrâ. Fab.

Papilio N. *Monima.* Fab. *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 51. *n°.* 502. — *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 127. *n°.* 390.

Fabricius la décrit ainsi : elle est de moitié plus petite que l'*Ondulée*, c'est-à-dire qu'elle n'a guère plus de quinze lignes d'envergure. Ses premières ailes sont noirâtres, avec des taches ferrugineuses peu prononcées à la base, & une liture ou petite raie bleuâtre à l'angle interne. Les secondes ailes ont la base noirâtre; l'extrémité brune, & offrant, vers l'angle de l'anus, un large espace bleuâtre sur lequel il y a une ligne noire, ondulée.

Le dessous de toutes les ailes est cendré, avec des lunules noires à la base, & une ligne transverse de cette couleur vers l'extrémité.

Des Indes orientales.

M. Bord postérieur des premières ailes plus ou moins concave, ou tronqué au sommet. Bord correspondant des secondes arrondi.

109. Nymphale Aconthéa.

Nymphalis Aconthea.

Nym. alis supra fuscis, subtùs apice margaritaceis : utrinque fasciâ communi albâ, valdè angulatâ.

Papilio Aconthea. Fem. Cram. *pl.* 134. *fig.* F. G.

Elle a environ deux pouces & demi d'envergure. Le dessus des ailes est d'un brun-obscur, annelé de noirâtre à la base, & traversé, au-delà du milieu, par une bande blanche, commune, très-anguleuse, coupée par les nervures. Cette bande est toujours oblitérée ou comme bifide près de la côte des premières ailes : elle est parfois divisée sur les quatre par un rang de taches noires & presqu'en forme de cœur.

Le dessous de toutes les ailes offre le même dessin que le dessus, mais la base est tantôt d'une teinte verdâtre, tantôt d'une teinte jaunâtre, & l'extrémité constamment d'un gris de perle. Le corps est de la couleur des ailes en dessus & en dessous. Les antennes sont noires.

De Java.

110. Nymphale Péléa.

Nymphalis Pelea.

Nym. alis dentatis, fuscis : anticis maculis fagittatis albis nigrisque : subtùs omnibus cinereis, lunulis nigris. Fab.

Papilio N. *Pelea.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 133. *n°.* 409.

Ce lépidoptère n'est peut-être qu'une variété de l'*Aconthea*. Voici ce qu'en dit Fabricius : il est de moyenne taille. Les premières ailes ont le dessus d'un brun-obscur, avec quelques lunules noires près de la base; avec une large bande, composée de taches blanches & de taches noires en fer de flèche, vers l'extrémité. Les secondes ailes sont d'un brun-obscur, avec des lunules noires, plus une liture blanche faisant suite à la bande des ailes supérieures.

Le dessous des quatre ailes est cendré, avec un grand nombre de lunules noires, surtout aux inférieures : la bande blanche des supérieures est ici moins apparente que du côté opposé. Le corps est de la couleur des ailes.

Des Indes orientales.

111. Nymphale Althéa.

Nymphalis Althea.

Nym. alis dentatis, supra fuscis, fasciâ crenatâ strigâque angulatâ albis : subtùs strigâ communi ferrugineâ.

Papilio N. Althea, *alis dentatis, fuscis, fasciâ strigâque angulato dentatis albis.* Fab. *Spec. Inf. tom.* 2. *p.* 88. *n°.* 389. — *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 47. *n°.* 469. — *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 113. *n°.* 347.

Papilio Althea. Cram. *pl.* 89. *fig.* E. F.

Papilio Althea. Herbst, *Pap. tab.* 249. *fig.* 1. 2.

Papilio Althea. Drury, *Inf. tom* 3. *pl.* 20. *fig.* 1. 2.

Elle est à peu près de la taille de l'*Aconthea*. Le dessus des ailes est d'un brun-obscur, avec la base marquée de quelques zig-zags noirs, & parfois lavée de ferrugineux. Sur le milieu de la sur-

face, il y a une bande blanche, commune, oblique, fortement dentée en arrière, & suivie d'une ligne blanche en feston, dans chacun des creux de laquelle est une tache noire en fer de flèche.

Le dessous ressemble au dessus, mais il est beaucoup plus pâle, & la bande blanche est bordée à son côté interne par une ligne d'un ferrugineux-obscur.

De la côte de Guinée.

N. B. Nous avons vu une variété dont la bande du dessus des ailes inférieures est absorbée par la teinte ferrugineuse de la base.

112. Nymphale Alciméda.

Nymphalis Alcimeda.

Nym. alis dentatis, suprà nigro-fuscis, fusciâ crenatâ strigâque punctiformi albis : posticis maculis marginalibus fulvis.

Elle a environ deux pouces d'envergure. Le dessus des ailes est d'un brun-noirâtre, avec une bande d'un blanc-jaunâtre, commune, oblique, discoïdale, dentée en arrière, & suivie d'une rangée de points blancs. Il y a en outre, près du milieu de la côte des premières ailes, deux taches blanches, transversales; &, sur le bord postérieur des secondes, un cordon de lunules blanchâtres, puis une série de taches fauves.

Le dessous offre les mêmes caractères que le dessus; mais le fond des quatre ailes est d'un gris-perlé, & l'on remarque à leur base quelques anneaux ferrugineux. Le corps est brun en dessus, grisâtre en dessous. Les antennes sont brunes, avec la massue fauve.

De la Cafrerie.

113. Nymphale Amphicéda.

Nymphalis Amphiceda.

Nym. alis albis, suprà marginis postici undis nigris, subtùs caracteribus baseos strigâque communi fuscis.

Papilio N. Amphiceda, *alis dentatis, fuscis, disco communi cinereo, fusco undato : subtùs apice griseis, lunulis nigris.* Fab. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 113. n°. 348.* (La femelle.)

Papilio Amphiceda. Cram. *pl. 146. fig.* D. E. (La femelle.)

Papilio Cœnis. Drury, *Inf. tom. 2. pl. 19. fig. 1. 2.* (Le mâle.)

Nous avons, mais à tort, placé cette espèce parmi les Piérides. (*Voyez* la *description du mâle, p. 142. n°. 85.*)

La femelle s'en distingue en ce que le dessus de toutes ses ailes offre, avant la ligne anguleuse de l'extrémité, une ligne semblable, mais plus large, au lieu d'offrir sur les supérieures une rangée de points, & sur les inférieures une suite de quelques chevrons, noirâtres. La base des unes & des autres est en outre plus obscure que dans le mâle, lequel n'a été connu ni de Fabricius, ni de Cramer.

Elle se trouve, comme nous l'avons dit, sur la côte de Guinée.

114. Nymphale Sangaris.

Nymphalis Sangaris.

Nym. alis suprà sanguineis, limbo postico punctis nigris : subtùs dilutè corticinis, strigâ communi ferrugineâ.

Elle a environ deux pouces & demi d'envergure. Le dessus des ailes est d'un rouge-vermillon un peu chatoyant, avec une rangée presque terminale de points noirs, peu prononcés aux supérieures, & liés aux inférieures par une ligne anguleuse également noire.

Le dessous des quatre ailes est d'un brun-tanné-clair, avec des hiéroglyphes noirs à la base; une ligne ferrugineuse, commune & oblique, sur le milieu; des chevrons obscurs, surmontés de points violâtres, à l'extrémité. Le corps est brun en dessus, jaunâtre en dessous. Les antennes manquent.

Décrite d'après un individu mâle & unique que nous soupçonnons avoir été pris sur la côte occidentale d'Afrique.

115. Nymphale Disconthéa.

Nymphalis Disconthea.

Nym. alis suprà pallido-æneis, basi strigâque maculari posticâ fuscis : anticis costam versùs strigâ è maculis albis.

Papilio Aconthea. Mas. Cram. *pl. 134. fig.* D. E.

Cramer donne, avec doute il est vrai, le mâle de cette espèce pour celui de l'*Aconthea.*

Elle a environ deux pouces & demi d'envergure. Le dessus des ailes est obscur à la base, avec quelques taches annulaires plus foncées; ensuite d'un bronzé-pâle jusqu'au bout, avec une rangée postérieure de points obscurs, moins gros aux ailes inférieures qu'aux supérieures. Ces dernières ont, un peu au-delà du milieu, une raie blanche, transverse, courte, maculaire, appuyée sur la côte, & suivie de deux points blancs faisant face au sommet.

Le dessous de toutes les ailes offre le même dessin que le dessus, mais le fond en est généralement très-pâle, & le bord postérieur est un peu lavé de violet. Le corps est de la couleur des ailes. Les antennes sont ferrugineuses.

De Java.

116. Nymphale Alphéda.

Nymphalis Alpheda.

Nym.

Nym. alis supràæneis, subtùs glaucis : utrinquè basi caracteribus, apice strigis duabus undulatis, fuscis.

Nous ne connoiſſons ce lépidoptère que par un ſeul individu, dont nous n'avons pu déterminer le ſexe.

Il a environ deux pouces d'envergure. Le deſſus des quatre ailes eſt d'un vert-bronzé, leur deſſous d'un vert-blanchâtre. Chaque ſurface offre à la baſe des hiéroglyphes noirs, & vers l'extrémité deux lignes obſcures, tranſverſes & flexueuſes.

Du Bengale.

117. Nymphale Arcadius.

Nymphalis Arcadius.

Nym. alis integerrimis : anticis nigris, cæruleo alboque maculatis ; posticis fuscis : subtùs (ſingulis) *brunneis.* Fab.

Papilio N. *Arcadius.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 151. *n°.* 463.

Papilio Arcadius. Jon. *Fig. pict.* 5. *tab.* 38. *fig.* 1.

Le corps eſt de moyenne grandeur, d'un brun-obſcur. Les ailes ſupérieures ſont noires, avec la baſe bleue & coupée de brun, l'extrémité tachetée de blanc. Les ailes inférieures ſont d'un brun-obſcur, avec des taches bleues, marginales.

Le deſſous des quatre ailes eſt brun.

De l'Afrique.

(*Traduction de Fabricius.*)

118. Nymphale Véronique.

Nymphalis Veronica.

Nym. alis supràviolaceo-virescentibus, strigis margineque posticoſuscescentibus : subtùs strigâ punctorum alborum.

Papilio N. Veronica, *alis dentatis, supràvirescentibus : subtùs ferrugineis, strigâ punctorum alborum.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 136. *n°.* 421.

Papilio Veronica. Cram. *pl.* 325. *fig.* C. D.

Papilio Veronica. Herbst, *tab.* 142. *fig.* 1. 2.

Papilio Veronica. Jon. *Fig. pict.* 5. *tab.* 36. *fig.* 2.

Elle a environ deux pouces d'envergure. Le deſſus des ailes eſt d'un verdâtre-luiſant & prenant à certains aſpects une teinte violette, avec des raies tranſverſes, & particulièrement le bord terminal, obſcurs.

Le deſſous eſt ferrugineux, avec deux bandes légèrement griſâtres, courbes & tranſverſes, ſur la poſtérieure deſquelles il y a une ſérie de points blancs. Ces points ſe reproduiſent en deſſus, tantôt aux quatre ailes, tantôt aux inférieures ſeulement. Le corps eſt de la couleur des ailes. Les antennes ſont noirâtres en deſſus, rouſſâtres en deſſous.

De la côte de Guinée.

119. Nymphale Æthiopa.

Nymphalis Æthiopa.

Nym. alis supràviolaceo-cæruleis, margine posticonigro : anticis utrinquè strigâ apicali punctorum alborum.

Papilio N. Æthiopa, *alis dentatis, cæruleis : anticis apice atris, albo punctatis.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 136. *n°.* 420.

Papilio Æthiopa. Jon. *Fig. pict.* 5. *tab.* 36. *fig.* 1.

Papilio Afer. Drury, *Inſ. tom.* 3. *pl.* 36. *fig.* 1. 2.

Papilio Afer. Stoll, *Suppl. à* Cram. *pl.* 27. *fig.* 3 & 3. B.

Ce lépidoptère pourroit bien être la femelle ou une variété du précédent. Nous n'oſons point l'y réunir, parce que nous ne l'avons vu qu'en mauvais état.

Le deſſus des ailes eſt d'un bleu-luiſant, qui paroît azuré ou violâtre ſelon les aſpects, avec le bord poſtérieur d'un noir-brun. Vis-à-vis du ſommet des ſupérieures, il y a une ligne tranſverſe & tortueuſe de ſix points blancs, dont les deux inférieurs plus gros. Ces points reparoiſſent en deſſous, où le fond des quatre ailes eſt d'un brun-obſcur, avec des taches violâtres, annulaires.

De Sierra-Leone.

120. Nymphale Honorius.

Nymphalis Honorius.

Nym. alis integerrimis, cæruleis : anticis apice atris costâque fuscâ ; posticis basi nigro punctatis, apice striatis. Fab.

Papilio N. *Honorius.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 151. *n°.* 464.

Papilio Honorius. Jon. *Fig. pict.* 6. *tab.* 67. *fig.* 1.

Le deſſus des quatre ailes eſt bleu. Les ſupérieures ont le ſommet très-noir, avec la côte d'un brun-obſcur & terminée vis-à-vis du ſommet par une rangée de taches bleues. Les ailes inférieures ont le bord terminal noir.

Le deſſous des quatre ailes eſt obſcur, avec des points bleus à la baſe & à l'extrémité des premières; avec des points noirs à la baſe des ſecondes, & des raies de cette couleur à leur extrémité.

Elle habite.....

(*Traduction de Fabricius.*)

121. Nymphale Cyrna.

Nymphalis Cyrna.

Nym. alis ſuprà virescenti-cœruleis : ſubtùs flavidis, ſtrigis duabus marginalibus, alterâ punctiformi, alterâ undulatâ, fuſcis.

Elle n'eſt peut-être auſſi qu'une variété de la nymphale *Véronique*.

Le deſſus des ailes eſt d'un bleu-ardoiſé-luiſant, avec tout le bord terminal des ſupérieures, & le ſommet des inférieures, d'un brun-obſcur.

Le deſſous des quatre ailes eſt d'un brun-jaunâtre, avec quelques taches lie-de-vin-foncé vers la baſe; & une rangée tranſverſe de points noirâtres, puis une ligne ondulée de cette couleur, à l'extrémité.

De la côte occidentale d'Afrique.

122. Nymphale Atlita.

Nymphalis Atlita.

Nym. alis dentatis, fuſcis, cœruleo micantibus: ſubtùs fulvis, ſtrigis undatis glaucis, poſticis ocellis quinque cœcis. Fab.

Papilio N. *Atlita.* Fab. *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 37. *n°.* 388. — *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 97. *n°.* 300.

Elle eſt de moyenne taille. Le deſſus de ſes ailes eſt d'un brun-noirâtre à reflet violet, avec trois taches fauves, preſque marginales, aux inférieures.

Le deſſous des quatre ailes eſt d'un fauve-obſcur, avec des raies violâtres, tranſverſes & ondulées. Indépendamment de cela, les ailes ſupérieures ont vers le ſommet un point violâtre, diſtinct; & les inférieures cinq yeux ſans prunelle, yeux qui prennent une teinte violâtre du côté du bord poſtérieur.

Des Indes orientales.

(*Traduction de Fabricius.*)

123. Nymphale Gnidie.

Nymphalis Gnidia.

Nym. alis corticinis : anticis utrinquè faſciâ punctiſque apicis albis; poſticis ſuprà faſciâ fulvâ nigro maculatâ.

Papilio N. Gnidia? *alis dentatis, teſtaceis : anticis apice faſcis faſciâ albâ; poſticis ſtrigâ fulvâ lunulis nigris.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 137. *n°.* 422.

Papilio Gnidia? Jon. *Fig. pict.* 5. *tab.* 37. *fig.* 2.

Papilio Gnidia? Donow. *Of an Epitome of the Nat. Hiſt. Inſ. of India, cah.* 9. *pl.* 3. *fig.* 2.

Nous n'avons vu qu'un ſeul échantillon de cette eſpèce, encore étoit-il en mauvais état.

Son envergure eſt d'environ deux pouces & demi. Le deſſus des premières ailes eſt d'un brun-tanné vers la baſe, avec deux anneaux noirâtres; d'un brun-noirâtre vers l'extrémité, avec une bande blanche ſe dirigeant du milieu de la côte à l'angle interne, & une rangée tranſverſe de quatre points blancs faiſant face au ſommet.

Le deſſus des ſecondes ailes eſt d'un brun-tanné, avec une bande fauve, tranſverſe, poſtérieure, courbe, dentée à ſon côté interne, & chargée dans toute ſa longueur d'une double ſérie de taches noires, dont les antérieures triangulaires, les poſtérieures lunulées.

Le deſſous des premières ailes ne diffère du deſſus que parce que l'origine du bord d'en haut eſt marquetée de blanc.

Le deſſous des ſecondes ailes eſt un peu plus pâle que le deſſus, avec un point noir à la baſe, puis quatre raies violâtres, tranſverſales, dont les deux antérieures ſinuées, les deux autres, notamment l'avant-dernière, formées par des points.

Priſe dans l'expédition du capitaine Baudin.

N. B. L'individu décrit par Fabricius & figuré par Donowan diffère du nôtre en ce que le deſſous des ſecondes ailes n'offre qu'une ſeule rangée de points blancs, & en ce que ces points ſont appuyés chacun ſur un point noir.

124. Nymphale Doriclée.

Nymphalis Doriclea.

Nym. alis luteſcenti-fuſcis, ſuprà ſtrigis duabus punctorum nigrorum : poſticis ſubtùs puncto baſeos atro.

Papilio S. Doriclea, *alis repandis, fuſcis : poſticis faſciâ fulvâ nigro punctatâ, ſubtùs puncto atro.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 248. *n°.* 772.

Papilio Doriclea. Drury, *Inſ. tom.* 3. *pl.* 36. *fig.* 5. 6.

Papilio Doriclea. Jon. *Fig. pict.* 4. *tab.* 71. *fig.* 1.

Elle a environ deux pouces d'envergure. Le deſſus des ailes eſt d'un brun-jaunâtre, avec deux rangs de points noirâtres, placés parallèlement au bord poſtérieur ſur un fond plus clair. Les premières ailes ont en outre, vers l'origine de la côte, quelques petites lignes tranſverſes, également noirâtres.

Le deſſous des quatre ailes eſt à peu près du même brun que le deſſus, avec quelques lignes noirâtres, tranſverſes, à la baſe des ſupérieures; & une ſemblable, mais plus longue, à la baſe des inférieures. Ces dernières ont un gros point noir vers l'origine de leur bord interne.

Des Indes, ſelon Fabricius.

De Sierra-Leone, ſelon Drury.

125. Nymphale Lyſandra.

Nymphalis Lyſandra.

Nym. alis integris, luteſcenti-fuſcis, ſuprà ſtrigis duabus punctorum nigrorum, ſubtùs unicâ alborum.

Papilio Lyſandra. Stoll, *Pap. Suppl. à* Cram. *pl.* 29. *fig.* 3 & 3. C.

Elle ſe diſtingue du *Doriclée* en ce qu'elle a les ailes plus arrondies & traverſées en deſſous par une rangée poſtérieure de points blancs; en ce que de ce même côté les lignes noires de la baſe des ſupérieures & le point de la baſe des inférieures ſont encadrés de blanc.

De Sierra-Leone en Afrique.

126. Nymphale Augé.

Nymphalis Auge.

Nym. alis ſuprà luteſcenti-fuſcis : anticis ſtrigis tribus viridibus, poſticis ſerie punctorum nigrorum.

Papilio S. Auge, *alis dentatis, fuſcis : anticis fuſciis viridibus; poſticis fulvâ nigro maculatâ, ſubtùs puncto baſeos atro.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 248. *n°.* 773.

Papilio Auge. Jon. *Fig. pict.* 4. *tab.* 71. *fig.* 2.

Papilio Auge. Donow. *Of an Epitome of the Nat. Hiſt. Inſ. of India, cah.* 2. *pl.* 2. *fig.* 4.

Elle a le port & la taille du *Doriclée*. Le deſſus de ſes ailes eſt auſſi d'un brun-jaunâtre. Les premières ont trois raies vertes, tranſverſales; les ſecondes ont parallèlement au bord poſtérieur, qui eſt un peu plus clair que le reſte de la ſurface, une rangée de points noirs.

Le deſſous de toutes les ailes eſt nuancé de ferrugineux & de violâtre, & la baſe des inférieures offre un point d'un noir-foncé.

Des Indes, ſelon les auteurs cités da la ſynonymie.

127. Nymphale Heſpérus.

Nymphalis Heſperus.

Nym. alis repandis, fuſcis, nigro undatis : anticis punctis quatuor albis. Fab.

Papilio F. *Heſperus.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 47. *n°.* 143.

Papilio Heſperus. Jon. *Fig. pict.* 4. *tab.* 73. *fig.* 1.

Le corps eſt obſcur. Les quatre ailes ſont brunâtres, avec des ondes plus foncées. Les ailes ſupérieures ont, vers le bord, quatre points blancs, appuyés ſur des points noirs; & le long du bord même une raie noire, ondée, plus diſtincte.

Le deſſous eſt plus pâle que le deſſus.

Elle habite.....

(*Traduction de Fabricius.*)

128. Nymphale Chrémès.

Nymphalis Chremes.

Nym. alis integerrimis, obſcuris : poſticis rubris, ſuprà faſciis atris, ſubtùs puncto medio niveo. Fab.

Papilio F. *Chremes.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 47. *n°.* 144.

Papilio Chremes. Jon. *Fig. pict.* 3. *tab.* 72. *fig.* 2.

Le corps eſt de moyenne grandeur, brun, avec les antennes jaunâtres. Les premières ailes ſont d'un brun-foncé, avec deux bandes près de la baſe, & l'extrémité, noirâtres. Leur deſſous eſt preſque comme le deſſus, mais plus clair.

Le deſſus des ſecondes ailes eſt d'un rouge-obſcur, avec deux bandes noires, dont l'une courte derrière le milieu, l'autre arquée & ſe liant par des veines noires au bord terminal qui eſt auſſi de cette couleur. En deſſous les mêmes ailes ſont rouſſâtres, avec un petit point blanc, diſcoïdal.

De l'Afrique.

(*Décrite d'après Fabricius.*)

129. Nymphale Mirus.

Nymphalis Mirus.

Nym. alis repandis, fuſcis, teſtaceo ſubfaſciatis : poſticis ſubtùs baſi fuſcis, apice variegatis. Fab.

Papilio F. *Mirus.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 48. *n°.* 146.

Fabricius la décrit ainſi : elle a le port de l'*Heſperus*. Le corps eſt obſcur. Les ailes ſont également obſcures, avec pluſieurs bandes d'une couleur tannée, & dont quelques-unes maculaires.

Le deſſous des ailes ſupérieures eſt brunâtre, avec des bandes jaunes, & la partie interne variée de cendré, de brun & de bleu.

Le deſſous des ailes inférieures eſt brun à la baſe, varié à l'extrémité.

Elle ſe trouve.....

130. Nymphale Méléagris.

Nymphalis Meleagris.

Nym. alis ſuprà fuſcis, ſubtùs luteſcentibus; utrinquè albo multipunctatis.

Papilio N. Meleagris, *alis ſubdentatis, albo punctatis, ſuprà fuſcis, ſubtùs flaveſcentibus.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 128. *n°.* 393.

Papilio Meleagris. Cram. *pl.* 66. *fig.* A. B.

Papilio Meleagris. Drury, *Inf. tom.* 3. *pl.* 27. *fig.* 3. 4.

Papilio Meleagris. Herbst, *tab.* 145. *fig.* 1. 2.

Elle a environ deux pouces & demi d'envergure. Le deſſus des ailes eſt d'un brun-obſcur, avec une multitude de points blancs, dont les antérieurs épars, les autres formant trois rangées courbes, parallèles entr'elles & au bord poſtérieur. Il y a en outre quelques lignes blanches, tranſverſales, à la baſe des ailes ſupérieures.

Le deſſous des quatre ailes eſt d'un jaune-fauve, avec des points blancs comme en deſſus, mais ceux de la rangée intermédiaire ont le milieu, & tous les autres le pourtour, noirs.

Décrite ſur un individu pris à Sierra-Leone.

131. Nymphale Dédale.

Nymphalis Dœdalus.

Nym. alis integris, ſuprà fuſcis, albo multipunctatis : ſubtùs pallidè brunneis, immaculatis.

Papilio F. Dœdalus, *alis integerrimis, fuſcis, albo maculatis : ſubtùs brunneis.* Fab. *Syſt. Ent. p.* 482. *n°.* 174. — *Spec. Inſ. tom.* 2. *p.* 57. *n°.* 250. — *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 27. *n°.* 289. — *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 55. *n°.* 162.

Elle a le port & approchant la taille du *Méléagris*. Le deſſus de ſes ailes eſt d'un brun-obſcur. Les premières ont des taches blanches, dont les quatre antérieures lunulées & plus grandes, les autres en forme de points & diſpoſées ſur trois lignes tranſverſales. Les ſecondes ailes ont trois rangs de points bleuâtres, chargés chacun d'un point noir.

Le deſſous de toutes les ailes eſt d'un brun-pâle, ſans taches. Le corps eſt entièrement obſcur.

De la Guinée.

132. Nymphale Mélantha.

Nymphalis Melantha.

Nym. alis dentatis, ſuprà fuſcis, albo punctatis : ſubtùs brunneis. Fab.

Papilio N. *Melantha.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 128. *n°.* 394.

Le deſſus des quatre ailes eſt d'un brun-noirâtre, avec quelques lignes blanches à la baſe, & trois rangs de points de cette couleur vers l'extrémité.

Le deſſous eſt brun, avec une rangée poſtérieure de points plus obſcurs.

De la Guinée.

(*Traduction du texte de Fabricius.*)

133. Nymphale Marthe.

Nymphalis Martha.

Nym. alis dentatis, fuſco fulvoque variis : anticis lunulis ternatis, poſticis faſciâ, albis. Fab.

Papilio N. *Martha.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 139. *n°.* 429.

Elle eſt de moyenne taille. Les antennes ſont noires, avec la baſe de la maſſue blanche. Les ailes ſupérieures ſont tachetées de fauve & de brun, & elles ont, vers le bord terminal, des lunules blanches, diſpoſées ſur trois rangs, dont l'intérieur commun aux ſecondes ailes. Celles-ci ſont fauves, variées de brun, avec une bande (parfois une raie) blanche, tranſverſe, diſcoïdale : vers leur bord poſtérieur il y a une ligne noire, ondée, placée contre le rang de lunules blanches dont nous avons parlé.

Le deſſous de toutes les ailes eſt pâle, faſcié de blanc, avec la baſe & des litures noires.

Du royaume de Siam.

(*Décrite d'après Fabricius.*)

134. Nymphale Abſalon.

Nymphalis Abſalon.

Nym. alis integerrimis, fulvis, fuſco faſciatis : ſubtùs aurantiis, fuſco undatis. Fab.

Papilio F. *Abſalon.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 56. *n°.* 175.

Voici ce qu'en dit Fabricius : le corps eſt petit, brun. Le deſſus des quatre ailes eſt d'un fauve-obſcur, avec des bandes plus obſcures. Leur deſſous eſt d'un jaune-orangé, avec pluſieurs ondes noirâtres.

De la Guinée.

135. Nymphale Amulia.

Nymphalis Amulia.

Nym. alis ſuprà fuſcis, immaculatis : ſubtùs luteis, poſticis ſtrigis tribus punctiſque cœruleis, nigro notatis.

Papilio N. Amalia, *alis dentatis, ſuprà fuſcis, ſubtùs flavis : poſticis ſtrigis duabus punctiſque cœruleis, nigro notatis.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 129. *n°.* 398.

Papilio Amalia. Jon. *Fig. pict.* 5. *tab.* 11. *fig.* 1.

Papilio Amulia. Cram. *pl.* 180. *fig.* C. D.

Papilio Amulius. Herbst, *tab.* 140. *fig.* 3. 4.

Elle a environ deux pouces & demi d'envergure. Le deſſus des ailes eſt d'un brun légèrement chatoyant, & ſans taches. Leur deſſous eſt d'un jaune-fauve, avec le bord poſtérieur des quatre, deux raies tranſverſes & une rangée de points ſur les inférieures, d'un bleu-violet. Les raies & les points des ailes inférieures ſont marqués de noir,

& il y a deux taches de cette couleur vis-à-vis du sommet des supérieures.

Décrite d'après un seul individu pris à Sierra-Leone.

136. Nymphale Haquinus.

Nymphalis Haquinus.

Nym. alis subintegris, fuscis : subtùs aurantiis, maculis cœrulescenti-argenteis nigro notatis. Fab.

Papilio F. *Haquinus.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 55. *n°.* 169.

Nous ne connoissons ce lépidoptère que par la description de Fabricius.

Il est de moyenne taille. Les antennes sont obscures, annelées de gris, avec la massue noire & terminée de fauve. Le corps est brun. Les ailes sont à peine sinuées, d'un brun-noirâtre en dessus, sans taches & sans reflet, mais avec une légère teinte jaunâtre aux supérieures.

Le dessous des quatre ailes est fauve, avec des taches d'un argenté-bleuâtre, nombreuses, éparses, marquées de noir. Il y a en outre, le long du bord postérieur, deux lignes blanchâtres, interrompues. Les pieds sont jaunâtres.

Trouvé à Tranquebar.

137. Nymphale Amasia.

Nymphalis Amasia.

Nym. alis suprà argenteo-virescentibus, apice saturatiore : subtùs gramineis, punctis marginalibus nigris, ocellatis.

Papilio N. Amasia, *alis dentatis, viridibus : posticis suprà punctis marginalibus nigris, subtùs ocellaribus.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 136. *n°.* 419.

Papilio Amasia. Jon. *Fig. pict.* 5. *tab.* 15. *fig.* 2.

Papilio Eupale. Drury, *Inf. tom.* 3. *pl.* 6. *fig.* 3.

Elle a presque deux pouces & demi d'envergure. Le dessus des ailes est d'un vert-argentin-luisant, terminé aux supérieures par un grand espace triangulaire d'un vert-obscur, & aux inférieures par une bande nébuleuse sur laquelle il y a une rangée de points noirs.

Le dessous des quatre ailes est d'un vert-pré, avec quelques taches rouilleuses sur le milieu, de légères nuances argentées au bord interne & vers l'extrémité. Il y a en outre six à sept points noirs, ocellés, le long du bord postérieur des secondes ailes, & deux vis-à-vis du sommet des premières. Le corselet est d'un vert-olivâtre, l'abdomen d'un vert-blanchâtre. Les antennes sont verdâtres; les palpes bruns en dessus, blancs en dessous.

Décrite d'après un individu mâle & unique, pris sur la côte occidentale d'Afrique.

N. B. La figure de Drury est si mauvaise que, sans le texte qui l'accompagne, on ne sauroit pas qu'elle représente cette espèce.

138. Nymphale Démétra.

Nymphalis Demetra.

Nym. alis integris, suprà fuscis obsoletèque obscuriùs fasciatis, subtùs glaucis : anticis margine apicis albo.

Elle a près de deux pouces & demi d'envergure. Le dessus des ailes est d'un brun-obscur, chatoyant, avec quatre bandes transverses plus obscures, mais néanmoins peu prononcées.

Le dessous est d'un vert-argentin, avec une bande olivâtre, large, commençant au sommet des ailes supérieures, & allant se perdre vers l'extrémité du bord interne des inférieures. Celles-ci ont une tache blanchâtre sur le milieu du bord antérieur. Les premières ont l'origine de la côte blanche, & le bout de leur sommet est de cette couleur en dessus & en dessous.

De l'Afrique occidentale.

139. Nymphale Argénissa.

Nymphalis Argenissa.

Nym. alis integris, suprà æneo-cœrulescentibus, subtùs obscurè virescentibus, utrinquè strigis quinque undulatis nigris.

Papilio Argenissa. Stoll, *Suppl. à* Cram. *pl.* 27. *fig.* 4 & 4. C.

Elle a un peu plus d'un pouce & demi d'envergure. Le dessus des ailes est d'un bleu-bronzé, avec cinq lignes noires, transverses & ondulées, plus courtes sur les inférieures que sur les supérieures.

Le dessous est d'un vert-obscur, avec des lignes comme en dessus, mais il n'y en a que quatre aux ailes de devant, & celles des ailes de derrière traversent entièrement la surface.

De la Cafrerie.

140. Nymphale Médon.

Nymphalis Medon.

Nym. alis dentatis, suprà æneo-nigris : anticis fasciâ obliquâ, posticis disco, inaurato seu cœrulescenti-viridibus.

Papilio E. A. Medon, *alis suprà nigris : primoribus fasciâ luteâ apiceque albo ; posticis disco cœruleo-virescentibus.* Linn. *Syst. Nat.* 2. *p.* 753. *n°.* 43. — *Amœn. Acad. tom.* 6. *p.* 402. *n°.* 53.

Papilio N. Janassa, *alis dentatis, suprà nigris, fasciâ flavâ discoque cœruleo-virescente : singulis sub-*

tùs punctis tribus atris. Linn. *Syst. Nat.* 2. *p.* 781. — *Mus. Lud. Ulr. p.* 294. *n°.* 112.

Papilio N. *Medon.* Fab. *Syst. Ent. p.* 456. *n°.* 53.—*Spec. Inf. tom.* 2. *p.* 22. *n°.* 89.—*Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 11. *n°.* 102. — *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 81. *n°.* 254.

Papilio N. Janassa, *alis repandis, viridi-æneis : anticis punctis nigris : subtùs flavescentibus, punctis baseos nigris.* Fab. *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 49. *n°.* 487. — *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 121. *n°.* 371.

Papilio Medon. Cleerck, *Icon. tab.* 28. *fig.* 1.

Papilio Medon. Cram. *pl.* 205. *fig.* B. C.

Papilio Medon. Herbst, *Pap. tab.* 130. *fig.* 4. 5.

Papilio N. Ceres, *alis dentatis, nigris : anticis fasciâ albâ, posticis disco cœrulescente puncto atro.* Fab. *Spec. Inf. tom.* 2. *p.* 90. *n°.* 396. — *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 11. *n°.* 104. — *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 82. *n°.* 256.

Papilio Lucille. Cram. *pl.* 156. *fig.* A. C.

Papilio N. Cato, *alis dentatis, nigris, disco communi virescente : subtùs nigro punctatis, posticis maculâ baseos rufâ.* Fab. *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 11. *n°.* 105. — *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 83. *n°.* 258.

Papilio Cyparissa. Cram. *pl.* 39. *fig.* D. E.

Papilio Cyparissa. Cram. *pl.* 156. *fig.* B.

Papilio Cyparissa. Herbst, *Pap. tab.* 139. *fig.* 1. 2. 3.

Cette nymphale varie beaucoup. Aussi Linnæus en a-t-il fait deux espèces, & Fabricius quatre.

Son envergure est de trois pouces à trois pouces & demi. Toutes ses ailes sont plus ou moins dentées, selon le sexe, & finement bordées de blanc aux échancrures. Leur dessus est d'un noir-verdâtre, avec le milieu des inférieures, à prendre de leur origine, & la majeure partie du bord interne des supérieures, d'un vert-métallique, tirant tantôt sur le bleuâtre, tantôt sur le jaunâtre. Les premières ailes, dont le sommet a le bout blanc de part & d'autre, offrent, entre le milieu de la côte & le milieu du bord terminal, une bande oblique de l'une des nuances vertes que nous venons d'indiquer.

Le dessous des quatre ailes est d'un cendré-verdâtre-luisant, avec des taches noires, dont sept à huit, tant rondes qu'alongées vers la base; les autres disposées sur deux rangs le long du bord postérieur, mais oblitérées ou manquant quelquefois, comme dans le *Janassa* de Linnæus. Dans certains individus, tels que le *Medon* & le *Ceres* de Fabricius, on voit reparoître la bande oblique du dessus des premières ailes, & les secondes ont les taches noires de leur base éclairées en dehors par de petits rayons blanchâtres. Dans d'autres individus, comme le *Cato* du même auteur, ou *Cyparissa* de Cramer, la bande des ailes de devant ne se reproduit pas ou est absorbée par le fond qui est plus vert; & les ailes de derrière ont le milieu d'un jaune-fauve, avec la naissance de la côte glacée de rouge-violet. Il est des femelles où la base des quatre ailes est rouge en dessous; & des mâles qui, de ce côté, n'ont pas de rouge aux premières ailes, tandis qu'ils en ont sur la plus grande partie du bord antérieur & du disque des secondes. Enfin, quelques-uns des points noirs de la naissance des ailes percent parfois en dessus : ou bien il y en a trois à la base des supérieures, comme dans le *Janassa* de Fabricius; ou bien un seul à la base des inférieures, comme dans le *Ceres* du même auteur. Le corps est noir, avec les palpes & l'extrémité des antennes fauves. Celles-ci sont noires.

D'après ce que nous venons de dire, on voit que la forme & le dessin des ailes font toujours les mêmes, & que les différences tiennent uniquement aux couleurs. Or, ces différences n'étant pas constantes, on ne peut point, ce nous semble, les regarder comme caractéristiques.

De la côte de Guinée.

141. Nymphale Francine.

Nymphalis Francina.

Nym. alis dentatis, suprà æneo-nigris : anticis fasciâ obliquâ lutescente ; posticis disco maculisque marginalibus cœrulescenti-viridibus.

Elle a bien du rapport avec le *Medon*. Mais ce qui l'en distingue surtout, c'est que le dessus des secondes ailes a parallèlement au bord terminal une rangée de six à sept taches rondes d'un vert-bleuâtre, & sur le milieu deux points noirs, dont le postérieur très-gros : c'est que le dessous de toutes les ailes est d'un vert beaucoup plus sombre & sans éclat; que les taches noires y sont moins nombreuses, puisqu'il n'y en a que deux ou au plus quatre vers la base, & que celles du bout ne forment qu'une seule rangée.

De la côte de Guinée.

142. Nymphale Erithonius.

Nymphalis Erithonius.

Nym. alis dentatis, suprà fuscis : postici fasciâ violaceo-cœrulescente, ad angulum ani dilatatâ.

Papilio F. Eupalus, *alis integerrimis, fuscis ; posticis fasciâ cœruleâ : subtùs viridibus puncto atro.* Fab. *Spec. Inf. tom.* 2. *p.* 54. *n°.* 241. — *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 27. *n°.* 279. — *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 48. *n°.* 148.

Papilio N. Erithonius, *alis dentatis, nigris; posticis fasciâ cœruleâ: subtùs viridibus strigâ punctorum albornm.* Fab. *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 11. *n°.* 103. — *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 82. *n°.* 255.

Papilio Harpalyce. Cram. *pl.* 145. *fig.* D. E.

Papilio Medon. Drury, *Inf. tom.* 2. *pl.* 15. *fig.* 1. 2.

Fabricius a donné cette espèce comme *Danaïde bigarrée* sous le nom d'*Eupalus*, & comme *Nymphale* sous celui d'*Erithonius*.

Elle est un peu plus grande que les deux précédentes. Ses quatre ailes sont plus ou moins sinuées, selon le sexe. Leur dessus est d'un brun-noirâtre, jetant un léger reflet doré, avec une bande d'un bleu-violet-pâle aux inférieures. Cette bande est placée transversalement au-delà du milieu, & aboutit à l'angle anal, aux approches duquel elle s'élargit d'une manière sensible. Quelquefois même, elle anticipe un peu sur les premières ailes. Celles-ci ont la côte foiblement violâtre, & leur sommet, qui a toujours le bout blanc de part & d'autre, est précédé parfois d'une ligne ou d'une bande jaunâtre, oblique.

Le dessous des quatre ailes est d'un vert-pâle & luisant, avec un ou deux points noirs près de la base, & une rangée transverse de points blanchâtres sur le milieu. Le corps est brun. Les palpes sont fauves, avec la sommité obscure.

De la côte de Guinée.

N. B. C'est à cette espèce que doit être rapporté le *Medon* de Drury, & non pas au *Medon* de Linnæus, comme l'ont dit certains auteurs.

143. Nymphale Narva.

Nymphalis Narva.

Nym. alis dentatis, atris, strigâ posticâ punctorum alborum: anticis maculis, posticis disco, flavis. Fab.

Papilio S. *Narva.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 249. *n°.* 775.

Papilio Narva. Jon. *Fig. pict.* 4. *tab.* 67. *fig.* 1.

Fabricius place cette espèce parmi les *Satyres*, tandis qu'il fait une *Nymphale* de la suivante qui en est très-voisine.

Le corps est noir, ponctué de blanc. Les premières ailes sont d'un noir-foncé, avec quatre taches jaunes, & une rangée postérieure de points blancs. Les secondes ailes, qui ont une semblable rangée de points, sont également d'un noir-foncé, avec le milieu jaune & marqué d'un ou deux points noirs.

Le dessous ressemble au dessus, mais derrière la rangée de points blancs, il y a une raie jaune, maculaire & transverse.

De l'Afrique.

(*Traduction de Fabricius.*)

144. Nymphale Perséa.

Nymphalis Perseа.

Nym. alis dentatis, utrinquè nigris, disco communi testaceo: anticis maculis duabus fasciaque, posticis punctis marginalibus, ochreaceis.

Papilio N. Perseа, *alis dentatis, oblongis, atris, flavo maculatis, disco communi rubro.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 137. *n°.* 423.

Papilio Perseа. Jon. *Fig. pict.* 5. *tab.* 90. *fig.* 2.

Papilio Perseis. Drury, *Inf. tom.* 2. *pl.* 21. *fig.* 3. 4.

Papilio Perseis. Herbst, *tab.* 137. *fig.* 5. 6.

Elle a environ trois pouces d'envergure. Les premières ailes sont noires, avec la majeure partie du bord interne d'un fauve-briqueté: on voit en outre sur leur milieu deux taches orbiculaires, & vis-à-vis de leur sommet une bande oblique, d'un jaune d'ocre. Les secondes ailes sont d'un fauve-briqueté, avec les bords antérieur & postérieur noirs: le bord postérieur est coupé par une série arquée de points jaunes, & les échancrures sont blanches, ainsi que celles du bord correspondant des ailes supérieures. Le dessous de ces premières ailes est tout-à-fait semblable au dessus.

Le dessous des secondes ailes ne diffère du dessus que parce qu'il a un point noir vers la base, & que la couleur briquetée passe au jaune d'ocre près de la côte. Le corps est noir en dessus & tacheté de jaune depuis la tête inclusivement jusqu'à l'anus. Les antennes sont noires; les palpes fauves, avec la sommité obscure.

De Sierra-Leone. — Fabricius la dit des Indes.

N. B. Nous n'avons vu que des mâles.

145. Nymphale Eléus.

Nymphalis Eleus.

Nym. alis dentatis, utrinquè testaceis, apice æneo, anticarum fasciâ, posticarum punctis in simplici serie, albis.

Papilio F. Eleus, *alis integerrimis, fulvis, margine atro, anticarum fasciâ, posticarum punctis, albis.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 51. *n°.* 156.

Papilio Eleus. Drury, *Inf. tom.* 3. *pl.* 12. *fig.* 1. 2.

Papilio Eleus. Jon. *Fig. pict.* 5. *tab.* 22. *fig.* 2.

Il seroit difficile de dire pourquoi Fabricius a mis cette espèce parmi les *Danaïdes bigarrées*, lorsque le Perséa, qui s'en rapproche si fort, est pour lui une *Nymphale*.

Elle a le port & la taille de la précédente. Les quatre ailes sont foiblement dentées & bordées de blanc aux échancrures. Leur dessus est d'un fauve-

foncé, avec tout le contour extérieur d'un noir-bronzé. Vis-à-vis du sommet des supérieures, où cette couleur s'étend davantage, il y a une bande blanche, oblique, coupée par les nervures. Les secondes ailes ont, sur le noir du bord postérieur, une rangée courbe de gros points blancs.

En dessous, on retrouve les caractères du dessus, mais le noir y est très-pâle, & les secondes ailes offrent, parallèlement à la côte, une bande blanche, continue & un peu arquée. Le corps est noir en dessus, avec des taches d'un blanc-bleuâtre sur la tête, sur le corselet & sur les côtés de l'abdomen. Les antennes sont noires; les palpes fauves, avec la sommité obscure.

Fabricius dit qu'elle est de l'Amérique, mais on la trouve à Sierra-Leone.

N. B. Nous n'avons vu que des mâles. Dans le nombre, il s'en est rencontré un dont le dessous offroit trois points noirs à la base des ailes supérieures, & un seul à celle des inférieures.

146. Nymphale Janaïs.

Nymphalis Janais.

Nym. alis subdentatis, nigris : anticis utrinquè albo punctatis : posticis suprà disco rubro, subtùs basi flavâ, nigro punctatâ.

Papilio Janais. Drury, *Inf.* 3. *pl.* 17. *fig.* 5. 6.

Elle est de la taille du *Sémire*. Les quatre ailes sont noires de part & d'autre, & liserées de blanc aux échancrures. Les supérieures, dont les deux surfaces se ressemblent, ont une quinzaine de points blancs, épars.

Le dessus des inférieures a une tache rouge, grande, discoïdale, orbiculaire. Leur dessous en a également une rouge, mais beaucoup plus petite, précédée immédiatement d'un espace jaune sur lequel il y a des taches noires, & suivie d'un rang de points blancs. Le corps & les antennes sont noirs, & la tête est ponctuée de blanc.

De Sierra-Leone en Afrique.

147. Nymphale Sémire.

Nymphalis Semire.

Nym. alis subdentatis, fuscis, fasciâ utrinquè viridi, interruptâ : posticis ad angulum ani ferrugineo maculatis : subtùs omnibus basi luteis, nigro punctatis.

Papilio N. Semire, *alis dentatis, subconcoloribus, fasciâ viridi flavoque maculatis, basi fulvis nigro punctatis.* Fab. *Spec. inf. tom.* 2. *p.* 88. *n°.* 391. — *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 48. *n°.* 472. — *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 114. *n°.* 351.

Papilio Semire. Cram. *pl.* 194. *fig.* B. C.

Papilio Hyppolite. Drury, *Inf.* 3. *pl.* 14. *fig.* 3. 4.

Elle a environ deux pouces & demi d'envergure. Le dessus des ailes est d'un brun-obscur, avec des points noirs à la base, & une bande maculaire & transverse d'un vert-céladon sur le milieu. La bande des premières ailes est précédée & suivie de points de sa couleur; celle des secondes ailes s'appuie sur un rang de taches ferrugineuses.

Le dessous offre les mêmes caractères que le dessus, mais les points noirs de la base des quatre ailes se détachent sur un fond d'un jaune-fauve, & il y a tout le long de leur bord postérieur des points blanchâtres, oblongs, longitudinaux, rapprochés deux à deux contre chaque nervure.

De la côte de Guinée.

148. Nymphale Lucrétia.

Nymphalis Lucretia.

Nym. alis subdentatis, fuscis, fasciâ utrinquè albâ, interruptâ : subtùs basi luteis, nigro punctatis.

Papilio Lucretia. Cram. *pl.* 45. *fig.* C. D.

Papilio Lucretia. Herbst, *tab.* 241. *fig.* 3. 4.

Elle a le port & la taille de la précédente. Le dessus des ailes est d'un brun-obscur, avec une bande blanche, commune, discoïdale, & interrompue. Cette bande est précédée intérieurement aux premières ailes de deux ou trois points de sa couleur.

Le dessous diffère du dessus en ce que la bande susdite est plus large & plus claire; en ce que le bord terminal offre une série de petites taches blanches; en ce que la base de toutes les ailes est d'un jaune-fauve, avec des points noirs, surtout aux inférieures. Le corps est noirâtre, & entièrement ponctué de blanc en dessus.

De la côte de Guinée.

149. Nymphale Sulpitia.

Nymphalis Sulpitia.

Nym. alis dentatis, nigris, fasciâ communi albâ : posticis subtùs flavescentibus, punctis baseos nigris, fasciâ mediâ punctisque apicis albis. Fab.

Papilio S. *Sulpitia.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 245. *n°.* 765.

Papilio Sulpitia. Jon. *Fig. pict.* 5. *tab.* 30. *fig.* 1.

Ce lépidoptère est peut-être le même que le *Lucretia*, du moins il paroît s'en rapprocher infiniment.

Voici ce qu'en dit Fabricius : le dessus des quatre ailes est d'un noir-luisant, avec une bande blanche, commune, mais interrompue sur les supérieures. Le dessous de ces dernières ailes ressemble au dessus. Le dessous des inférieures est jaune

à la base, avec des points noirs; puis blanc; enfin, fauve, avec des veines noires, & une rangée transverse de points blancs.

Fabricius le dit des Indes, mais il doit être de l'Afrique.

150. Nymphale Hoſtilia.

Nymphalis Hoſtilia.

Nym. alis dentatis, ſubconcoloribus, ſulvis, baſi nigro maculatis : anticarum apice ſuſco punctis flaveſcentibus.

Papilio N. Hoſtilia, *alis dentatis, ſuſcis, baſi ſulvis nigro punctatis : anticis apice flavo maculatis.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 130. *n°.* 399.

Papilio Hoſtilia. Drury, *Inſ. tom.* 3. *pl.* 28. *fig.* 5. 6.

Papilio Hoſtilia. Jon. *Fig. pict.* 5. *tab.* 81. *fig.* 1.

Elle a environ deux pouces & demi d'envergure. Le deſſus de ſes ailes eſt d'un fauve-brun, avec des taches à la baſe des ſupérieures, & des litures tranſverſales à celle des inférieures, noires. Les premières ont à peu près la moitié poſtérieure d'un brun-noirâtre & parſemée de points jaunâtres. Les ſecondes ont une bordure noire, dentée, avec un rang de lunules fauves.

Le deſſous des quatre ailes reſſemble au deſſus, mais il eſt beaucoup plus pâle vers la baſe. Le corps eſt noirâtre, avec deux croiſſans roux ſur le corſelet.

De Sierra-Leone en Afrique.

151. Nymphale Aſſimilée (1).

Nymphalis Aſſimilis.

Nym. alis ſubintegris, concoloribus, nigris, lineis albo-vireſcentibus : poſticis ad apicem ſtrigâ macularum coccinearum.

Papilio N. Aſſimilis, *alis ſubrepandis, nigris, concoloribus, punctis cæruleſcenti-albidis : poſticis punctis coccineis.* Linn. *Syſt. Nat.* 2. *p.* 782. *n°.* 194. — *Muſ. Lud. Ulr. p.* 300. *n°.* 118.

Papilio N. *Aſſimilis.* Fab. *Syſt. ent. p.* 511. *n°.* 280. — *Spec. Inſ. tom.* 2. *p.* 101. *n°.* 444. — *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 54. *n°.* 540.

Papilio E. A. *Aſſimilis.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 39. *n°.* 114.

Papilio Aſſimilis. Clerck, *Icon. tab.* 16. *fig.* 1. 2.

Papilio Aſſimilis. Cram. *pl.* 154. *fig.* A.

Papilio Aſſimilis. Drury, *Inſ. tom.* 1. *pl.* 17. *fig.* 3. 4.

Papilio Aſſimilis. Herbst, *Pap. tab.* 126. *fig.* 4. 5.

Papilio Aſſimilis. Esp. *Pap. exot. tab.* 57. *fig.* 1.

Fabricius avoit d'abord placé cette eſpèce parmi les *Nymphales*, auxquelles elle appartient réellement; mais il l'a miſe enſuite parmi les *Chevaliers*, dont ſe compoſe notre genre Papillon proprement dit.

Elle a environ trois pouces & demi d'envergure. Ses quatre ailes ſont noires de part & d'autre, avec des lignes d'un vert-blanchâtre, convergeant à la baſe, & des points du même vert alignés ſur le bord poſtérieur. Les lignes des premières ailes ſont interrompues; celles des ſecondes ſont entières, & ſéparées des points marginaux par une ſérie tranſverſale de cinq taches écarlates, elliptiques, dont l'anale double, les deux ſuivantes ayant le milieu noir, la cinquième ou l'extérieure plus petite que toutes les autres. Le corps eſt noir, avec des lignes verdâtres le long du ventre, des points blancs ſur la tête & ſur la poitrine.

De la Chine.

152. Nymphale Diſippe.

Nymphalis Diſippe.

Nym. alis denticulatis, ſulvis, venis limboque poſteriori albo maculato nigris : poſticis ſtrigâ nigrâ, recurvâ.

Papilio F. Miſippus, *alis repandis, ſulvis, margine nigro, albo punctato : poſticis arcu nigro.* Fab. *Syſt. ent. p.* 481. *n°.* 171. — *Spec. Inſ. tom.* 2. *p.* 55. *n°.* 244. — *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 27. *n°.* 283. — *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 50. *n°.* 153.

Papilio Archippus. Cram. *pl.* 16. *fig.* A. B.

Fabricius l'a rapportée mal-à-propos à notre *Miſippe* ou *Miſippus* de Linnæus.

Elle a près de trois pouces d'envergure. Le deſſus des ailes eſt fauve, avec les nervures & les bords noirs. Le bord terminal eſt chargé de deux rangs de points blancs, dont les extérieurs plus petits & placés ſur les échancrures. Vis-à-vis du ſommet des premières ailes, où la couleur noire ſe dilate, il y a encore trois points blancs, ſuivis d'une bande maculaire & tranſverſe de quatre taches fauves. Les ſecondes ailes ſont traverſées au-delà du milieu, & de la côte à l'angle anal, par une ligne noire, courbée en arrière.

Le deſſous des quatre ailes diffère du deſſus en ce que tout le fond des inférieures & les taches fauves du ſommet des ſupérieures ſont plus pâles; en ce que les points intérieurs du bord terminal ſont remplacés par une double ſérie de lunules

(1) N'ayant pas d'adjectif pour rendre le mot *aſſimilis*, nous avons employé le participe.

blanches; enfin, en ce qu'il y a deux taches de cette dernière couleur à l'origine de la côte des ailes de devant. Les antennes ſont noires, ainſi que le corps : celui-ci eſt ponctué de blanc ſur la tête, ſur la poitrine & ſur le ventre.

On la trouve à la Guyane & dans pluſieurs parties de l'Amérique ſeptentrionale.

Nous n'avons pas vu la femelle.

153. Nymphale Miſippe.

Nymphalis Miſippe.

(*Voyez* p. 188. n°. 40.)

Nym. alis dentatis, fulvis, margine poſteriori nigro macularum albarum ſerie duplici : poſticis ſuprà maculâ nigrâ, ſubtùs tribus.

Papilio D. F. *Miſippus.* Linn. *Syſt. Nat.* 2. *p.* 767. *n°.* 118. — *Muſ. Lud. Ulr. p.* 264. *n°.* 83.

Papilio Diocippus. Cram. *pl.* 28. *fig.* B. C.

Papilio Inaria. Cram. *pl.* 214. *fig.* A. B. (Fem.?)

Papilio Diocippus. Herbst, *Pap. tab.* 155. *fig.* 3. 4.

Papilio Inaria. Herbst, *Pap. tab.* 157. *fig.* 5. 6.

Nous avions placé conditionnellement cette eſpèce parmi les *Danaïdes*. Nous l'en retirons aujourd'hui, parce que les palpes, & l'ouverture de la cellule diſcoïdale des ſecondes ailes, nous font voir que c'eſt une *Nymphale*.

Elle a pour identique le *Diocippus* de Cramer. L'*Inaria* du même iconographe en eſt peut-être la femelle; car il n'en diffère que par la groſſeur du corps, par moins de noir & par le manque de bande blanche au ſommet des ailes ſupérieures : encore aperçoit-on la trace de cette bande.

On la trouve, avec l'*Inaria*, dans les îles de Java & d'Amboine.

154. Nymphale Calliſto.

Nymphalis Calliſto.

Nym. alis dentatis, fuſco-nigris : poſticis utrinquè faſciâ fulvâ maculis ſeptem ovatis, atris, cæruleo pupillatis.

Papilio N. Calliſto, *alis dentatis, atris : poſticis faſciâ ſanguineâ ocellis ſuprà quinque, ſubtùs ſeptem.* Fab. *Gen. Inſ. Mant.* 263. — *Spec. Inſ. tom.* 2. *p.* 86. *n°.* 381. — *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 46. *n°.* 459. — *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 109. *n°.* 338. (Le mâle.)

Papilio Calliſto. Cram. *pl.* 24. *fig.* A. B.

Papilio Calliſto. Herbst, *Pap. tab.* 219. *fig.* 3. 4.

Seba, *Muſ. tom.* 4. *tab.* 44. *fig.* 12. 13.

La Palatine. Daubenton, *pl. enlum.* 20. *fig.* 2. 3.

Papilio N. Pipleis, *alis crenatis, nigris, concoloribus : poſticis diſco fulvo ocellis ſeptem.* Linn. *Syſt. Nat.* 2. *p.* 775. *n°.* 159. — *Muſ. Lud. Ulr. p.* 285. *n°.* 103. (La femelle.)

Papilio N. *Pipleis.* Fab. *Syſt. ent. p.* 499. *n°.* 242. — *Spec. Inſ. tom.* 2. *p.* 84. *n°.* 368. — *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 45. *n°.* 444. — *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 105. *n°.* 324.

Papilio Pipleis. Clerck, *Icon. tab.* 26. *fig.* 2. 3.

Papilio Pipleis. Cram. *pl.* 60. *fig.* A. B.

Papilio Pipleis. Herbst, *Pap. tab.* 219. *fig.* 1. 2.

Seba, *Muſ. tom.* 4. *tab.* 46. *fig.* 13.

Papilio Pandarus. Esp. *Pap. exot. tab.* 40. *fig.* 1.

Le *Calliſto* & le *Pipleis* des auteurs ne font bien certainement qu'une eſpèce, dont le premier eſt le mâle, le ſecond la femelle.

Elle a de quatre pouces & demi à cinq pouces d'envergure. Le deſſus des deux ſexes eſt d'un noir-enfumé, & traverſé, entre le milieu & le bord poſtérieur des ſecondes ailes, par une bande fauve que diviſe dans toute ſa longueur une rangée courbe de ſept taches très-noires, grandes, ovales, ayant toutes, même l'anale qui eſt double & plus petite, un point bleu ſur leur milieu. Dans le mâle, la bande fauve dont il vient d'être queſtion eſt moins large, & ſurmonté immédiatement d'une grande tache lilas, un peu luiſante. Celui-ci a aux premières ailes, en alignement des taches oculaires des ſecondes, une rangée de ſept à huit points violâtres. Ces points ſe retrouvent aux premières ailes de la femelle; mais, outre qu'ils y ſont plus gros, ils y ſont encore accompagnés d'une bande & de taches d'un blanc-jaunâtre. La bande eſt maculaire, courte, placée tranſverſalement au milieu de la ſurface; les taches longent le bord poſtérieur ſur deux rangs : celles du rang inférieur ſont réniformes, celles du rang extérieur lunulées.

Le deſſous des deux ſexes ne diffère du deſſus de la femelle que parce qu'il eſt généralement plus pâle; parce que les premières ailes ont, vers l'origine de la côte, quelques points & des atomes blancs, & les ſecondes un cordon de lunules blanchâtres, terminales. Les échancrures du bord poſtérieur ont le milieu blanc. Le corps eſt de la couleur des ailes. Les antennes ſont noires.

Des îles de Java & d'Amboine.

N. B. Fabricius dit que les ſecondes ailes de ſon papillon *Calliſto* ont une bande d'un *rouge-ſanguin* (*faſciâ ſanguineâ*). C'eſt ſans doute une faute typographique dont il ne s'eſt pas aperçu,

car toutes les figures auxquelles il renvoie rendent cette bande comme elle eſt dans la nature.

Eſper appelle le mâle *Pandarus*, & il donne le nom de *Pſeudo-Pandarus* au véritable *Pandarus* de Linnæus.

155. Nymphale Laſinaſſa.

Nymphalis Laſinaſſa.

Nym. alis dentatis, ſubtùs fuſcis, apice punctis, maculis ſagittatis lunuliſque albidis : alis omnibus ſuprà (mas) *maculâ mediâ albo-violaceâ.*

Papilio N. Laſinaſſa, *alis dentatis, atris, macula cyaneâ, n tidâ : ſubtùs fuſcis, lunulis albis.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 127. *n°.* 386. (Le mâle.)

Papilio Liſianaſſe. Cram. *pl.* 205. *fig.* A. B.

Papilio Auge. Cram. *pl.* 190. *fig.* A. B.

Papilio Liſianaſſe. Herbst, *tab.* 243. *fig.* 1. 2.

Papilio Auge. Herbst, *tab.* 244. *fig.* 1. 2.

Papilio Auge. Clerck, *Icon. tab.* 21. *fig.* 1. 2.

Papilio N. Nerina, *alis dentatis, atris, faſciâ albâ : anticarum terminatâ maculâ rufâ.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 133. *n°.* 410. (La femelle.)

Papilio Nerina. Donow. *Gen. Illuſt. of Entom. part.* 1. *an Epitome of the Inſ. of Aſia, pl.* 27. *fig.* 1.

Papilio Iphigenia. Cram. *pl.* 67. *fig.* D. E. (Var. fem.)

Papilio Proſerpina. Cram. *pl.* 218. *fig.* C. D. (Var. fem.)

Papilio Alcmene. Cram. *pl.* 67. *fig.* A. (Var. fem.)

Papilio Antigone. Cram. *pl.* 67. *fig.* C. (Var. fem.)

Papilio Manilia. Cram. *pl.* 255. *fig.* A. B. (Var. fem.)

Papilio Porphyria. Cram. *pl.* 255. *fig.* C. D. (Var. fem.)

Papilio Eriphile. Cram. *pl.* 376. *fig.* A. B. (Var. fem.)

Papilio Melita. Cram. *pl.* 28. *fig.* D. E. (Var. fem.)

Papilio Iphigenia. Herbst, *tab.* 246. *fig.* 3. 4.

Papilio Alcmene. Herbst, *tab.* 246. *fig.* 5.

Papilio Antigone. Herbst, *tab.* 247. *fig.* 1.

Papilio Melita. Herbst, *tab.* 242. *fig.* 3. 4.

Papilio Porphyria. Herbst, *tab.* 159. *fig.* 1. 2.

Papilio Eriphile. Herbst. *tab.* 159. *fig.* 3. 4.

Papilio Manilia. Herbst, *tab.* 158. *fig.* 5. 6.

Papilio Proſerpina. Herbst, *tab.* 158. *fig.* 7. 8.

Ce lépidoptère a depuis deux pouces & demi juſqu'à quatre pouces d'envergure ; mais ſa taille la plus ordinaire eſt de trois pouces & un quart.

Le deſſus du mâle eſt d'un brun-noir, & préſente vers le milieu de chaque aile une tache blanche, entourée d'un reflet violet, & coupée par les nervures. La tache des ailes inférieures eſt arrondie, celle des ſupérieures oblongue & oblique. Il y a en outre, au ſommet de celles-ci, une tache ſemblable, mais beaucoup plus petite ; &, à l'angle anal de celles-là, quelques atomes bleuâtres.

Le deſſous des quatre ailes eſt d'un brun-noirâtre-chatoyant, avec une bande blanchâtre, diſcoïdale, oblique, derrière laquelle ſont trois rangées courbes & parallèles de taches dont les intérieures bleuâtres & en forme de points, les intermédiaires blanchâtres & comme ſagittées, les extérieures en croiſſans & de la couleur des précédentes. La baſe des premières ailes eſt plus ou moins ferrugineuſe, avec la côte noire, ponctuée & ſaupoudrée de blanc. Les ſecondes ailes ont encore trois taches blanchâtres, ſavoir : une orbiculaire à l'extrémité ſupérieure de la bande diſcoïdale, & deux lunulées à ſon extrémité inférieure. Indépendamment de cela, les échancrures de toutes les ailes ſont bordées de blanc.

La femelle, que Fabricius a donnée ſous le nom de *Nerina*, & dont Cramer a fait huit eſpèces, comme on le voit dans la ſynonymie, la femelle, diſons-nous, reſſemble au mâle en deſſous. Elle en diffère en deſſus en ce qu'elle eſt d'un brun moins noir, & toujours traverſée à l'extrémité par trois ſéries de taches correſpondantes à celles du deſſous ; en ce que la grande tache du milieu des ailes ſupérieures eſt remplacée par une bande maculaire, tantôt blanche, tantôt violâtre, tantôt rouſſâtre, & au bas de laquelle il y a le plus ſouvent un eſpace fauve ; en ce que les ailes inférieures ont ſur le milieu une bande tranſverſe qui eſt fauve dans certains individus, blanche & bordée de bleuâtre ou de rouſſâtre dans d'autres, toute bleue, mais à peine diſtincte dans quelques-uns. Cette bande, lorſqu'elle eſt fauve, communique parfois ſa couleur aux taches de l'extrémité, ſans néanmoins en altérer la forme. Le corps eſt d'un brun-noirâtre dans les deux ſexes, avec des points blancs ſur la tête, ſur la poitrine & ſur le ventre. Les antennes ſont noires, avec la ſommité d'un roux-vif.

De Java & de quelques-unes des Moluques.

156. Nymphale Liria.

Nymphalis Liria.

Nym. alis dentatis, ſubtùs fuſcis, apice punctis, faſciâ intùs crenatâ lunuliſque albidis : alis

omnibus ſuprà (mas) *maculâ mediâ albo-violaceâ.*

Papilio N. Liria, *alis dentatis, atris, maculâ albo-cyaneâ omnibuſque ſtrigâ punctorum : ſubtùs fuſcis, faſciâ albidâ.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 126. *n°.* 385. (Le mâle.)

Papilio Alcithoe. Cram. *pl.* 80. *fig.* A. B.

Papilio Alcithoe. Herbst, *tab.* 243. *fig.* 3. 4.

Papilio F. Jacintha, *alis repando-dentatis, fuſcis : anticis ſtrigâ punctorum alborum; poſticis apice albis.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 60. *n°.* 187. (Fem.?)

Papilio N. Avia, *alis dentatis, ſubconcoloribus, nigris, ſtrigâ punctorum fuſciâque maculari marginali pallidis.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 111. *n°.* 342. (Fem.?)

Papilio Jacintha. Drury, *tom.* 2. *pl.* 21. *fig.* 1. 2.

Papilio Perimale. Cram. *pl.* 65. *fig.* C. D.

Papilio Perimale. Cram. *pl.* 67. *fig.* B.

Papilio Velleda. Cram. *pl.* 349. *fig.* C. D. (Var. fem.)

Papilio Perimale. Herbst, *tab.* 241. *fig.* 5. 6. 7.

Papilio Velleda. Herbst, *tab.* 242. *fig.* 3. 4.

Seba, *Muſ.* 4. *tab.* 41. *fig.* 21. 22.

Le mâle de cette eſpèce reſſemble en deſſus au mâle de la précédente, mais le milieu de ſes ailes eſt marqué d'une tache plus grande, plus vivement glacée de violet, & leur extrémité offre trois ſéries de taches, dont les intermédiaires moins apparentes. Il y a en outre des atomes bleus vers l'origine de la côte des ailes ſupérieures.

Le *Jacintha* de Fabricius ou *Perimale* de Cramer, que nous ſoupçonnons être la femelle, a le deſſous des ailes d'un brun-noirâtre, avec l'extrémité un peu plus claire, & diviſée par trois rangs de taches d'un blanc-ſale. Les taches du rang intérieur ſont en forme de points, celles du rang extérieur en forme de lunules. Les taches intermédiaires compoſent par leur rapprochement une bande crénelée à ſon côté interne, & ſenſiblement plus large aux ſecondes ailes qu'aux premières. Celles-ci ont des atomes bleus vers la naiſſance de la côte, & une petite bande violette, plus ou moins diſtincte, au-delà du milieu.

Le deſſous des deux ſexes eſt comme dans le *Lafinaſſa*, avec cette différence que les taches qui précèdent immédiatement les lunules marginales ſont plus longues & crénelées à leur côté interne; caractère conſtant qui empêchera de prendre une eſpèce pour l'autre.

Du Bengale & de l'île d'Amboine.

N. B. Le *Velleda* de Cramer ne paroît différer du *Jacintha* que parce que le deſſous de ſes premières ailes a des atomes bleus vers l'angle interne.

Quant au papillon *Avia*, c'eſt le même que le *Jacintha*. Il ſe trouve à Amboine, & non en Afrique, comme le dit Fabricius.

157. Nymphale Bolina.

Nymphalis Bolina.

Nym. alis dentatis, ſubtùs corticinis, fuſciâ albâ; poſticarum liturâ nigrâ apicibus notatâ : alis omnibus ſuprà (mas) *maculâ mediâ violaceo-albâ.*

Papilio N. Bolina, *alis dentatis, nigris : primoribus maculis duabus, poſticis ſolitariâ albo-cæruleis.* Linn. *Syſt. Nat.* 2. *p.* 781. *n°.* 188. — *Muſ. Lud. Ulr. p.* 295. *n°.* 113.

Papilio N. *Bolina.* Fab. *Syſt. Entom. p.* 507. *n°.* 269. — *Spec. Inſ. tom.* 2. *p.* 95. *n°.* 414. — *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 50. *n°.* 499. — *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 126. *n°.* 384.

Papilio Bolina. Clerck, *Icon. tab.* 21. *fig.* 3. 4.

Papilio Bolina. Cram. *pl.* 65. *fig.* E. F.

Papilio Bolina. Drury, *tom.* 1. *pl.* 14. *fig.* 1. 2.

Papilio Bolina. Herbst, *tab.* 244. *fig.* 3. 4.

Seba, *Muſ.* 4. *tab.* 25. *fig.* 15. 16.

Nous ne connoiſſons que le mâle de cette eſpèce. Il reſſemble beaucoup au mâle du *Lafinaſſa*. Mais ce qui l'en diſtingue principalement, c'eſt que la tache du deſſus de ſes quatre ailes eſt plus grande & moins glacée de violet; que la bande qui traverſe en deſſous leur milieu eſt plus large & plus continue; c'eſt qu'en outre celle des inférieures eſt marquée à chaque extrémité d'une liture noire.

De Cayenne.

158. Nymphale Aliména.

Nymphalis Alimena.

Nym. alis dentatis, ſubconcoloribus, nigris, fuſciâ communi mediâ maculiſque marginalibus in triplici ſerie cæruleis.

Papilio N. Alimena, *alis dentatis, atris, faſciâ cæruleâ interruptâ : ſingulis punctis ſeptem albidis, marginalibus.* Linn. *Syſt. Nat.* 2. *p.* 780. *n°.* 178. — *Muſ. Lud. Ulr. p.* 291. *n°.* 109.

Papilio N. *Alimena.* Fab. *Syſt. Ent. p.* 509. *n°.* 279. — *Spec. Inſ. tom.* 2. *p.* 98. *n°.* 432. — *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 53. *n°.* 526. — *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 134. *n°.* 412.

Papilio Alimena. Clerck, *Icon. tab.* 31. *fig.* 1. 2.

Papilio Alimena. Cram. *pl.* 221. *fig.* A. B. C.

Papilio Alimena. Herbst, *tab.* 245. *fig.* 1. 2.

Seba, *Muſ.* 4. *tab.* 11. *fig.* 13. 14.

Elle a de trois pouces à trois pouces & demi d'envergure. Le deſſus des ailes eſt d'un noir-chatoyant, avec une bande bleue, commune, diſcoïdale, arquée, derrière laquelle ſont trois cordons de taches également bleues, & dont les intérieures en forme de coins, les extérieures lunulées & placées vis-à-vis des échancrures, leſquelles ſont bordées de blanc de part & d'autre.

Le deſſous offre le même deſſin que le deſſus; mais le fond eſt brun, la bande & les taches ſont d'un blanc-bleuâtre, & la côte des ailes ſupérieures eſt ponctuée & ſaupoudrée de blanc vers ſon origine. Le corps eſt de la couleur des ailes, avec des points blancs ſur la tête & ſur la poitrine. Les antennes ſont noires avec la ſommité rouſſâtre.

La femelle ne diffère du mâle que parce que la bande du deſſus de ſes ailes eſt d'un bleu-verdâtre, & que les taches de l'extrémité ſont preſque blanches.

De Java & d'Amboine.

159. Nymphale Salmaſis.

Nymphalis Salmaſis.

Nym. alis dentatis, ſuprà nigris, diſco cæruleo radiatis : ſubtùs ſuſcis, faſciâ ſtrigâque maculari albidis. (Fem.)

Papilio N. Salmaſis, *alis dentatis, atris, cæruleo radiatis : ſubtùs ſuſcis faſciâ albâ.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 132. *n°.* 408.

Papilio Salmaſis. Drury, *tom.* 2. *pl.* 8. *fig.* 1. 2.

Papilio Salmaſis. Jon. *Fig. pict.* 5. *tab.* 63. *fig.* 1.

Papilio Salmacis. Herbst, *tab.* 166. *fig.* 5. 6.

Papilio Omphale. Stoll, *Suppl. à* Cram. *pl.* 26. *fig.* 1 & 1. A.

Nous n'avons vu que la femelle de cette eſpèce. Elle a près de quatre pouces d'envergure. Le deſſus de ſes ailes eſt noir, avec une bande commune & diſcoïdale, ayant la majeure partie du côté interne blanc, & tout le côté externe d'un bleu-ardoiſé qui s'étend en rayons juſqu'au bord poſtérieur. Ce bord offre des points blancs, dont les intérieurs oblongs & diſpoſés en une ligne arquée, les extérieurs placés ſur les échancrures.

Le deſſous des quatre ailes eſt d'un brun-obſcur, avec deux rangs de points marginaux comme en deſſus, & une bande d'un blanc-violâtre. La bande des premières ailes deſcend du milieu de la côte à l'angle poſtérieur; celle des ſecondes ailes atteint le milieu du bord interne & le bout du bord antérieur. Le corps eſt de la couleur des ailes, avec des points blancs ſur la tête & ſur la poitrine.

De la Guinée, ſuivant Drury.

D'Amboine, ſuivant Stoll.

160. Nymphale Antilope.

Nymphalis Antilope.

Nym. alis denticulatis, ſuſcis, limbo poſtico utrinquè ſtrigis tribus punctorum alborum : anticis ſuprà (mas) *apice violaceo micantibus.*

Papilio Antilope. Cram. *pl.* 183. *fig.* E. F.

Papilio Antilope. Herbst, *tab.* 242. *fig.* 5. 6.

Elle a de trois pouces à trois pouces & demi d'envergure. Le deſſus des ailes eſt d'un brun-noirâtre, avec trois rangées terminales de points blancs ou bleuâtres, dont les intérieurs ronds, les autres un peu en forme de lunules & plus rapprochés entr'eux.

Le deſſous eſt comme le deſſus, excepté que la côte des premières ailes eſt ponctuée & ſaupoudrée de blanc vers ſon origine, & que le milieu de la côte des ſecondes offre une tache blanchâtre, plus groſſe que les points arrondis avec leſquels elle s'aligne. Le corps eſt brun, avec des points blancs ſur la tête & ſur la poitrine. Les antennes ſont noirâtres, avec la ſommité ferrugineuſe.

Le deſſus du mâle jette un reflet violet vers l'extrémité des premières ailes. Le deſſus de la femelle eſt plus pâle dans cette partie que vers la baſe.

Il eſt des individus des deux ſexes qui ont de part & d'autre une éclaircie blanchâtre entre le milieu & la première rangée de points des ailes inférieures.

De Java & des Moluques.

161. Nymphale Vitellia.

Nymphalis Vitellia.

Nym. alis denticulatis, ſuſcis : ſubtùs punctis diſcoidalibus lineoliſque marginalibus cæruleſcenti-albis.

Papilio N. Vitellia, *alis dentatis, nigris : ſubtùs albo maculatis.* Fab. *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 48. *n°.* 474. — *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 115. *n°.* 353.

Papilio Vitellia. Cram. *pl.* 349. *fig.* E. F.

Elle a entre trois pouces & demi & quatre pouces d'envergure. Le deſſus des ailes eſt d'un brun-obſcur, tantôt abſolument ſans taches, tantôt avec deux points arrondis & deux taches ovales d'un ton violâtre vers le ſommet des ſupérieures.

Le deſſous eſt également d'un brun-obſcur, avec une dixaine de gros points d'un blanc-bleuâtre

épars sur le milieu, & un assez grand nombre de petits traits de cette couleur à la base & sur le bord terminal de chaque aile. Ce bord a les sinus blancs. Le corps est brun, avec des points blancs sur la tête. Les antennes sont noires.

D'Amboine.

162. Nymphale Eurinome.

Nymphalis Eurinome.

Nym. alis subdentatis, concoloribus, nigris, maculis pennultis posticarumque disco baseos albis.

Papilio N. Eurinome, *alis dentatis, nigris, albo maculatis : posticis basi albis.* Fab. *Spec. Inf. tom.* 2. *p.* 101. *n°.* 443. — *Mant. Inf. tom. p.* 54. *n°.* 538.

Papilio F. *Eurinome.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 57. *n°.* 178.

Papilio Eurinome. Cram. *pl.* 70. *fig.* A.

Papilio Eurinome. Herbst, *tab.* 123. *fig.* 1.

Son envergure est d'environ quatre pouces. Elle a le dessus noir, avec des taches blanches de différentes formes, éparses sur toute la surface des ailes supérieures, disposées sur trois rangs à l'extrémité des inférieures. Celles-ci ont en outre tout le milieu blanc, à partir de la base.

Le dessous ne diffère du dessus que parce que l'origine des quatre ailes est d'un brun-rougeâtre. Le corps est jaunâtre, avec le corselet noir.

Des Indes orientales.

163. Nymphale? Philomèle.

Nymphalis Philomela.

Nym. alis repandis, nigris, albo maculatis : posticis basi flavo radiatis. Fab.

Papilio F. *Philomela.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 57. *n°.* 179.

Papilio Philomela. Jon. *Fig. pict.* 3. *tab.* 46. *fig.* 1.

Fabricius la décrit de la manière suivante : elle a les plus grands rapports avec l'*Eurinome*, mais elle forme une espèce séparée & distincte. Les premières ailes, dont le dessous ressemble au dessus, sont noires, avec des points & des lignes blancs. Les secondes ailes sont sinuées, noires, avec des rayons jaunes à la base, & des points blancs à l'extrémité.

Des Indes.

164. Nymphale? Pinthæus.

Nymphalis Pinthœus.

Nym. alis integerrimis, fuscis, concoloribus : primoribus maculis tribus flavis; posticis dimidiato albis. Linn.

Papilio D. F. *Pinthœus.* Linn. *Syst. Nat.* 2. *p.* 766. *n°.* 114. — *Mus. Lud. Ulr. p.* 258. *n°.* 77.

Papilio F. *Pinthœus.* Fab. *Spec. Inf. tom.* 2. *p.* 55. *n°.* 242. — *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 27. *n°.* 280. — *Entom. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 48. *n°.* 149.

Linnæus place ce lépidoptère parmi ses *Danaïdes bigarrées*, & le décrit de la manière suivante : il est de quatrième taille. Le corps est obscur, les antennes sont noirâtres. Les premières ailes sont d'un brun-obscur, avec trois taches jaunes, dont l'antérieure oblongue & contiguë à la base; la suivante, grande, transverse, oblique, discoïdale; la troisième, petite & avoisinant le sommet. Les secondes ailes sont entières, & elles ont la moitié antérieure blanche, la moitié postérieure noirâtre. La couleur blanche prend une teinte jaunâtre en approchant de la couleur noire.

Linnæus le dit des Indes. C'est ainsi qu'il s'exprime ordinairement lorsqu'il ne connoît pas la véritable patrie d'une espèce exotique.

165. Nymphale? Zoïle.

Nymphalis Zoilus.

Nym. alis integerrimis, atris : anticis maculis tribus, posticis disco, albis. Fab.

Papilio F. *Zoilus.* Fab. *Syst. Ent. p.* 480. *n°.* 163. — *Spec. Inf. tom.* 2. *p.* 53. *n°.* 230. — *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 25. *n°.* 265. — *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 42. *n°.* 128.

Les antennes sont noires, le corselet & l'abdomen bruns & tachetés de blanc. Les ailes supérieures sont d'un noir-brun, avec trois taches, & un point vers le bord postérieur, blancs. Leur dessous ressemble au dessus, mais la base offre une petite ligne, & l'extremité cinq points, blancs.

Les ailes inférieures sont noires, avec le disque blanc. Leur dessous est comme le dessus, excepté que le noir du limbe terminal est ponctué de blanc.

De la Nouvelle-Hollande.

(*Traduction de Fabricius.*)

166. Nymphale Siva.

Nymphalis Siva.

Nym. alis integris : anticis supra nitidè fuscis, virescenti multimaculatis; subtùs costâ baseos maculisque tribus argenteis.

Nous ne connoissons cette espèce que par un individu unique & mutilé.

Il a environ trois pouces & demi d'envergure. Le dessus de ses premières ailes est d'un brun-noirâtre-chatoyant, avec la base ferrugineuse, une vingtaine de taches d'un vert-bleuâtre, & le bout

du sommet blanchâtre. Le dessous des secondes ailes est d'un ferrugineux à reflet purpurin, avec une rangée de taches orbiculaires, & le bord postérieur, plus foncés.

Le dessous des quatre ailes est d'un brun-tanné, pâle & luisant, avec des taches obscures, dont les unes éparses vers la base, les autres formant un cordon en avant du bord terminal & suivies d'une ligne ondulée également obscure. Les ailes supérieures ont en outre des taches argentées, savoir : une linéaire & longitudinale à l'origine de la côte, & trois disposées en une petite bande transverse au-delà de son milieu.

Il habite.....

167. NYMPHALE ? Sophus.

NYMPHALIS Sophus.

Nym. alis integerrimis : anticis nigris, disco fulvo, nigro maculato; posticis fuscis, punctis strigâque nigris. FAB.

Papilio F. *Sophus.* FAB. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 46. *n°.* 141.

Papilio Sophus. JON. *Fig. pict.* 4. *tab.* 72. *fig.* 1.

Elle est de moyenne taille. Ses premières ailes sont noires, avec le milieu fauve, & marqué de plusieurs taches, dont une jaune, les autres noires. Leur dessous est varié de cendré & de jaune à la base, vert à l'extrémité.

Les secondes ailes sont d'un brun-obscur, avec plusieurs points, & une ligne postérieure, noirs. Leur dessous est gris, avec une tache jaune à la base; une bande verte courte, plus trois points jaunes sur le milieu, & le bord terminal verdâtre.

Elle habite.....

(*Traduction de Fabricius.*)

168. NYMPHALE ? Sisamnus.

NYMPHALIS Sisamnus.

Nym. alis integerrimis, atris, albo punctatis, fasciâ communi albâ : anticarum abbreviatâ. FAB.

Papilio F. *Sisamnus.* FAB. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 44. *n°.* 132.

Papilio Sisamnus. JON. *Fig. pict.* 2. *tab.* 44. *fig.* 1.

Le corps est noir. Le dessus des quatre ailes est d'un noir-brun, avec une bande blanche, transverse, discoïdale, veinée de noir, n'atteignant pas la côte. Derrière cette bande, il y a une ou deux lignes transverses de points blancs.

Le dessous est comme le dessus, excepté que les ailes inférieures sont ponctuées de roux à la base, & que la bande de leur milieu est jaune.

Elle habite.....

(*Décrite d'après Fabricius.*)

169. NYMPHALE Polyxo.

NYMPHALIS Polyxo.

Nym. alis subdentatis, supra teslaceis disco ochreaceo : anticis apice, posticis maculis sex ocellaribus, nigris.

Papilio Polixena. CRAM. *pl.* 54. *fig.* A. B.

Elle a près de quatre pouces d'envergure. Le dessus des premières ailes est d'un fauve-briqueté à la base, avec quelques petites taches noirâtres; traversé au milieu par une bande d'un jaune d'ocre pâle; noir à l'extrémité, avec quelques points roussâtres faisant face au sommet. Le dessus des secondes ailes est d'un fauve-briqueté, avec un espace jaunâtre sur le milieu, & une rangée de six taches noires, orbiculaires & marquées chacune d'une lunule blanche, en avant du bord postérieur.

Le dessous des quatre ailes est nuancé de brun & de jaunâtre, & l'on voit sur les inférieures un cordon de six lunules blanches correspondant à celles du dessus.

De la Chine.

N. B. Décrite d'après un individu unique.

170. NYMPHALE Æropus.

NYMPHALIS Æropus.

Nym. alis subdentatis, fuscis, utrinquè fasciâ communi luteâ aut albâ : anticis subtùs ocello baseos cœrulescente.

Papilio D. F. Æropus, *alis integerrimis, fuscis, fasciâ luteâ : primoribus subtùs basi ocello unico.* LINN. *Syst. Nat.* 2. *p.* 768. *n°.* 128. — *Mus. Lud. Ulr. p.* 256. *n°.* 75. (Le mâle.)

Papilio Æropa. CLERCK, *Icon. tab.* 39. *fig.* 1. 2.

Papilio D. F. *Æropus.* FAB. *Syst. Ent. p.* 486. *n°.* 190. — *Spec. Inf. tom.* 2. *p.* 64. *n°.* 287. — *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 31. *n°.* 332.

Papilio. N. *Æropus.* FAB. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 154. *n°.* 473. (Le mâle.)

Papilio Æropus. HERBST, *tab.* 132. *fig.* 3. 4. (Le mâle.)

Papilio Æropus. HERBST, *tab.* 133. *fig.* 1. 2. (La femelle.)

Papilio Æropa. CRAM. *pl.* 111. *fig.* F. G. (Le mâle.)

Papilio Æropa. CRAM. *pl.* 254. *fig.* A. B. (La femelle.)

SEBA, *Mus.* 4. *tab.* 9. *fig.* 3. 4.

Linnæus & Fabricius n'ont connu que le mâle de cette espèce.

Elle a entre trois & quatre pouces d'envergure. Le dessus des ailes est d'un brun-noirâtre, avec

une bande d'un jaune-orangé dans le mâle, blanche ou d'un blanc un peu jaunâtre dans la femelle. La bande des premières ailes eſt bifide antérieurement dans les deux ſexes; elle eſt en outre maculaire dans la femelle.

Le deſſous des premières ailes eſt d'un brun-pâle ou jaunâtre, avec une bande comme en deſſus, & quelques taches bleuâtres, dont la plus antérieure oculaire.

Le deſſous des ſecondes ailes eſt conſtamment d'un brun-jaunâtre, & traverſé par une bande ſemblable à celle du deſſus. La baſe offre en outre des taches noirâtres, entrecoupées de bleuâtre, & il y a parallèlement au bord poſtérieur une rangée de ſept points noirs, plus ou moins gros.

D'Amboine.

171. Nymphale Tulbagh.

Nymphalis Tulbaghia.

Nym. alis ſubdentatis, ſuſceſcentibus : anticis utrinquè faſciis duabus luteis, poſticis unicâ ſerieque ocellorum.

Papilio N. Tulbaghia, *alis dentatis, ſubconcoloribus, ſuſceſcentibus, faſciis luteis : poſticis ocellis quinque.* Linn. *Syſt. Nat.* 2. *p.* 775. *n°.* 158. — *Muſ. Lud. Ulr. p.* 284. *n°.* 102. (Le male.)

Papilio N. *Tulbaghia.* Fab. *Syſt. Ent. p.* 499. *n°.* 241. — *Spec. Inſ. tom.* 2. *p.* 83. *n°.* 367. — *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 45. *n°.* 443. — *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 105. *n°.* 323.

Papilio Tulbaghia. Cram. *pl.* 3. *fig.* E. F. (Le mâle.)

Papilio Tulbachius. Herbst, *tab.* 214. *fig.* 5. 6.

Cette nymphale a été dédiée par Linnæus à ſon ami Tulbagh, gouverneur du Cap de Bonne-Eſpérance.

Elle eſt de la taille de la précédente. Le deſſus des ailes eſt d'un brun-ferrugineux vers la baſe; d'un brun-noirâtre vers l'extrémité, avec deux bandes fauves & tranſverſales ſur les ſupérieures, avec une ſeule ſur les inférieures. La bande poſtérieure des ailes de devant eſt compoſée de taches pour la plupart orbiculaires, & l'antérieure eſt fortement interrompue vers le bord d'en haut. La bande des ſecondes ailes s'aligne à la bande antérieure des premières, & elle a le côté externe précédé d'une ſuite de quatre yeux noirs, dont les deux intermédiaires rapprochés l'un de l'autre, l'anal plus petit & bipupillé. Ces yeux ont l'iris jaunâtre, la prunelle d'un bleu-violet avec le milieu blanc. Parallèlement au bord terminal, qui eſt blanchâtre & légèrement denté, il y a une double raie d'un brun-obſcur.

Le deſſous des quatre ailes diffère du deſſus en ce que le fond & les bandes ſont beaucoup plus pâles; en ce que les ſupérieures ont, en approchant de la baſe, une tache jaunâtre, tranſverſale, tache qu'on voit de part & d'autre dans la femelle; enfin, en ce que les ailes inférieures ont vers leur origine quelques lignes noires, ondulées, & à leur extrémité cinq yeux colorés comme ceux du deſſus, mais à double iris. Le corps & les antennes ſont bruns.

De la Cafrerie.

172. Nymphale Lubentina.

Nymphalis Lubentina.

Nym. alis ſubdentatis, ſuſco-vireſcentibus : anticis utrinquè faſciâ albâ, maculari; poſticis apice punctis chermeſinis, ſerie duplici digeſtis.

Papilio N. Lubentina, *alis dentatis, obſcurè vireſcentibus, albo, nigro rufoque maculatis.* Fab. *Spec. Inſ. tom.* 2. *p.* 91. *n°.* 403. — *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 49. *n°.* 486. — *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 121. *n°.* 370.

Papilio Lubentina. Cram. *pl.* 155. *fig.* C. D.

Papilio Lubentina. Herbst, *tab.* 146. *fig.* 1. 2.

Elle a de deux pouces & demi à trois pouces d'envergure. Ses ailes ſont foiblement dentées, d'un vert-obſcur, particulièrement vers la baſe. Les premières, dont le deſſous reſſemble à peu près au deſſus, ont entre le milieu & le bord poſtérieur une bande blanche, maculaire, tranſverſe & très-étroite dans le mâle; oblique, large & bifide dans la femelle. Il y a en outre vis-à-vis de leur ſommet une ligne tranſverſe de trois à quatre points blancs; vers le milieu de leur bord antérieur deux taches rouges, bordées de noir; & à leur baſe deux points de cette dernière couleur.

Le deſſus des ſecondes ailes offre à ſon origine un point & un anneau noirs; à ſon extrémité deux rangs parallèles de ſept taches noires, leſquelles ont le milieu d'un rouge-carmin, à l'exception toutefois des quatrième, cinquième & ſixième du ſecond rang, à partir d'en haut. Le deſſous des mêmes ailes diffère du deſſus en ce que la naiſſance du bord antérieur & preſque tout le bord interne ſont d'un rouge-carmin, en ce qu'il y a près de la baſe quatre taches pareillement rouges & encadrées de noir.

De la Chine.

N. B. Cramer n'a figuré que la femelle; & Fabricius, à ce qu'il paroît, a décrit un individu altéré, puiſqu'il dit, en parlant des ailes : *rufo maculatis.*

173. Nymphale Adonia.

Nymphalis Adonia.

Nym. alis ſubdentatis, ſuſco-vireſcentibus, utrinque

utrinquè fasciâ communi albâ : posticis apice punctis chermesinis, serie unicâ digestis.

Papilio Adonia. Cram. *pl.* 255. *fig.* C. D.

Papilio Adonius. Herbst, *tab.* 237. *fig.* 1. 2.

A en juger par l'individu que Cramer a figuré, & que nous croyons être une femelle, ce lépidoptère ne se distingue du précédent qu'en ce que la bande blanche des premières ailes se prolonge de part & d'autre jusqu'au bord interne des secondes, & remplace sur ces mêmes ailes la rangée intérieure de taches noires à centre rouge.

De Java, selon Cramer.

174. Nymphale Evélina.

Nymphalis Evelina.

Nym. alis integris, suprà cæneis, fasciâ mediâ saturatiore : anticis utrinquè maculâ baseos carneâ, posticis subtùs duabus.

Papilio Evelina. Stoll, *Suppl. à* Cram. *pl.* 28. *fig.* 2. *et* 2. B.

Elle est de la taille du *Lubentina*. Le dessus de ses ailes est d'un vert-bronzé, avec une bande plus foncée sur le milieu. Les supérieures ont en outre, vers l'origine de la côte, une tache d'un incarnat vif & encadrée de noir.

Le dessous des quatre ailes est d'un vert-blanchâtre, avec deux bandes olivâtres, dont une discoïdale; l'autre terminale, plus large, & chargée d'un rang de gros points blanchâtres. La tache incarnate des premières ailes reparoît ici, & les secondes en ont deux semblables à la base, sans compter quelques anneaux noirs dont l'empreinte est visible en dessus. Le corps est de la couleur des ailes. Les antennes sont noires.

Du Bengale.

N. B. Nous n'avons vu qu'un seul individu de cette espèce.

175. Nymphale du Peuplier.

Nymphalis Populi.

Nym. alis subdentatis, suprà fuscis, fasciâ maculari albâ, serie lunularum fulvarum strigâque geminâ cæruleſcente.

Papilio N. Populi, *alis dentatis, fuscis, albo fasciatis maculatisque : subtùs luteis, albo fasciatis, maculis cæruleſcentibus.* Linn. *Syst. Nat.* 2. *p.* 776. *n°.* 162. — *Faun. Suec. edit.* 2. *p.* 277. *n°.* 1055.

Papilio mediæ magnitudinis, elegantissima, alis supinis nigris cum areâ transversâ albâ : pronis variis coloribus depictis. Rai. *Inf.* 127. *n°.* 3.

Uddman, *Diss.* 54. *fig.* 15.

Clerck, *Act. Holm.* 1752. *p.* 278. *tab.* 7.

Papilio N. *Populi.* Fab. *Syst. Ent. p.* 502. *n°.* 251. — *Spec. Inf. tom.* 2. *p.* 87. *n°.* 386. — *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 47. *n°.* 466. — *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 111. *n°.* 343.

Roes. *Inf. part.* 1. *tab.* 31. *fig.* 1. 5. (La chenille & la chrysalide.)

Roes. *Inf. part.* 3. *tab.* 33. *fig.* 1. 2. (Le papillon.)

Papilio Populi. Esp. *part.* 1. *tab.* 12. *fig.* 1.

Papilio Populi. Esp. *part.* 1. *tab.* 31. *Suppl.* 7. *fig.* 1.

Esp. *Pap. tab.* 106. *cont.* 61. *fig.* 1-4. (La chenille & la chrysalide.)

Esp. *Pap. tab.* 114. *cont.* 69. *fig.* 1. 2. (Papilio Populi.) *fig.* 3. 4. *(Papilio Tremulæ.)*

Papilio Populi. Bergestr. *Nomencl. tab.* 15. *fig.* 1-4. — *tab.* 19. *fig.* 1-4. — *tab.* 31. *fig.* 1-3.

Papilio Populi. Herbst, *tab.* 234. *fig.* 1. 2.

Panz. *Faun. Germ.* 28. 22.

Papilio Populi. Borkh. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 3. *et* 193. *n°.* 1. — *part.* 2. *p.* 185.

Borkh. *Rhein. Magaz. tom.* 1. *p.* 254. *n°.* 42.

Schneid. *Syst. Beschr. p.* 141. *n°.* 74.

Papilio Semiramis. Schrank, *Faun. Boïc. tom.* 2. *part.* 1. *p.* 188. *n°.* 1325.

Papilio Populi. Schrank, *Faun. Boïc. tom.* 2. *p.* 189. *n°.* 1326.

Papilio Populi. Fuessl. *Suiss. Inf. p.* 29. *n°.* 571.

Papilio Populi. Rossi, *Faun. Etrus. tom.* 2. *p.* 150. *n°.* 1015.

Papilio Populi. Brahm, *Inf. Calend. p.* 429. *n°.* 300.

Papilio Populi. Lang. *Verz.* 2. *p.* 30. *n°.* 213-218.

Papilio Populi. Schwarz, *Raup. Calend. p.* 42.

Papilio Populi. Wien. *Verz. p.* 172. *fam.* H. *n°.* 1.

Papilio Populi. Illig. *N. Aufg. Dess. tom.* 2. *p.* 207. *n°.* 1.

Illig. *Magaz. tom.* 3. *p.* 202. — *tom.* 4. *p.* 38.

Papilio Populi. Hubn. *tab.* 23. *fig.* 108. (Le mâle.) *fig.* 109. 110. (La femelle.)

Papilio Populi. Ochsenh. *Pap. Eur. tom.* 1. *p.* 145. *n°.* 5.

Le Sylvain. Engram. *Pap. d'Europe, tom.* 1. *p.* 26. *pl.* 9. *fig.* 10. a-d. (Le mâle.)

Le grand Sylvain. Engram. *Pap. d'Europe, tom.* 1. *p.* 27. *pl.* 10. *fig.* 11. a-d. (La femelle.)

Engram. *Pap. d'Europe, tom.* 1. *p.* 235. *pl.* 57. *Suppl.* 3. *fig.* 11. e. f. (Var.)

Elle a de trois pouces à trois pouces & demi d'envergure. Ses ailes sont légèrement dentées. Leur dessus est d'un brun-noirâtre, avec une bande blanche, transverse, discoïdale, puis une rangée de lunules fauves, & ensuite deux lignes marginales d'un bleu-ardoisé. La bande des premières ailes est maculaire, tortueuse, accompagnée de quatre à cinq taches pareillement blanches, dont une intérieure, quadrangulaire, appuyée obliquement sur la côte entre deux taches rousses plus ou moins apparentes; les autres extérieures, plus petites, formant un arc transversal vis-à-vis du sommet. La bande des secondes ailes est oblique, coupée par les nervures, toujours plus large & plus claire dans les femelles que dans les mâles. Ceux-ci n'ont même assez souvent que la bande des ailes supérieures; encore manque-t-elle dans quelques individus, ainsi que la tache blanche qui la précède du côté de la base.

Le dessous diffère du dessus en ce qu'il est d'un fauve-gai, excepté vers le bord interne des ailes supérieures, où la couleur brune se reproduit; en ce que le bord correspondant des inférieures est d'un bleu-cendré; en ce qu'il y a près de la base des quatre une tache de cette nuance, & en avant de leur bord terminal une rangée de points noirs qui remplacent les lunules fauves de la surface opposée. Les échancrures des ailes sont blanches de part & d'autre. Le corps est brun en dessus, gris en dessous. Les antennes sont noires, avec le bout de la massue fauve.

Cette espèce est propre aux contrées septentrionales de l'Europe, & habite les grands bois, où il y a du *tremble* & du *peuplier-blanc*. Elle n'aime que les chemins battus, parce que, recherchant la fiente des bestiaux, & surtout celle des vaches, elle en trouve plus facilement là qu'ailleurs. Fabricius dit qu'elle est fort commune en Russie. Il paroît qu'elle ne l'est guère moins dans la forêt de *Mormale* (département du Nord); car elle y a été prise abondamment par MM. de Brecourt & de Villiers, officiers qui consacrent avec fruit leurs momens de loisir à l'étude de l'entomologie. Elle fréquente aussi les forêts de *Compiègne*, de *Senlis*, de *Fontainebleau*, d'*Annainvilliers*, de *Senart*; mais elle est rare aux environs de Paris. Elle n'a encore été trouvée qu'une seule fois à Saint-Germain, & c'est à M. Ménétriés, élève naturaliste au Jardin des Plantes, que l'on en doit la découverte. Pour l'avoir fraîche, il faut se la procurer entre le dix & le vingt juin, du moins dans nos climats. Elle plane plutôt qu'elle ne vole. On ne doit jamais la poursuivre, attendu qu'elle a l'habitude de revenir à l'endroit d'où elle est partie, & que, quand elle est posée, on peut l'attraper à la main, sans l'endommager.

La chenille est verte, nuancée de brun, avec la tête & l'anus fauves ou rougeâtres. L'anus est un peu fourchu. Le dos offre des éminences charnues & épineuses, dont les deux antérieures plus grandes, les deux postérieures un peu recourbées en arrière. Elle vit sur le *tremble* & sur les *peupliers noir & blanc*.

La chrysalide est ovoïde, obtuse antérieurement, jaunâtre, mouchetée de noir, avec une bosse arrondie vers le milieu du dos.

N. B. Quelquefois la femelle a l'extrémité des secondes ailes glacée de verdâtre en dessus.

176. Nymphale Sibylla.

Nymphalis Sibylla.

Nym. alis subdentatis, suprà fuscis, fasciâ maculari albâ : posticis subtùs basi cinereo-cœrulescente, nigro punctatâ.

Papilio N. Sibilla, *alis dentatis, fuscis, concoloribus, fasciâ albâ : subtùs lutescentibus.* Linn. *Syst. Nat.* 2. *edit.* 12. *p.* 781. *n°.* 186. (Le male.)

Papilio N. *Prorsa.* Linn. *Mus. Lud. Ulr. p.* 303. *n°.* 128. (Le mâle.)

Roes. *Inf. part.* 3. *tab.* 70. *fig.* 3.

Papilio N. Camilla, *alis dentatis, fuscis, subconcoloribus, albo fasciatis maculatisque, angulo ani rubro.* Linn. *Syst. Nat.* 2. *edit.* 12. *p.* 781. *n°.* 187. — *Mus. Lud. Ulr. p.* 304. *n°.* 122. (La femelle.)

ξ. *Papilio* Amphion, *alis dentatis, fuscis : primoribus maculis albis, tergeminis; posticis fex tranversis.* Linn. *Syst. Nat.* 2. *edit.* 10. *p.* 486. *n°.* 177.

Roes. *Inf. part.* 3. *tab.* 33. *fig.* 3. 4.

Papilio S. Sibilla, *alis dentatis, suprà fuscis, subtùs ferrugineis nigro maculatis : fasciâ utrinquè maculari albâ.* Fab. *Syst. Ent. p.* 512. *n°.* 294. — *Spec. Inf. tom.* 2. *p.* 102. *n°.* 451. — *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 55. *n°.* 547. — *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 246. *n°.* 766.

Papilio Sibilla. Esp. *part.* 1. *tab.* 14. *fig.* 2. 3.

Esp. *part.* 1. *tab.* 106. *cont.* 61. *fig.* 6. (La chenille.)

Papilio Sibilla. Fuessl. *Suiff. Inf. p.* 30. *n°.* 577.

Papilio Camilla. Fuessl. *Ent. Magaz. tom.* 1. *p.* 254.

Papilio Sibilla. Schrank, *Faun. Boïc. tom.* 2. *part.* 1. *p.* 190. *n°.* 1327.

Papilio Sibylla. Herbst, *tab.* 234. *fig.* 3-6.

Papilio Sibylla. Panz. *Faun. Germ.* 87. 23.

Papilio Sibylla. Borkh. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 24. *n°.* 20. *& p.* 210.

Borkh. *Rhein. Magaz. tom.* 1. *p.* 255. *n°.* 43.

Papilio Sibylla. Schneid. *Syſt. Beſchr. p.* 143. *n°.* 75.

Papilio Sibylla. Schwarz, *Raup. Calend. p.* 171. *n°.* 343.

Schæff. *Icon. tab.* 153. *fig.* 1. 2.

Lang. *Verz.* 2. *p.* 30. *n°.* 219-221.

Papilio Sibylla. Bergstr. *Nomencl. tab.* 67. *fig.* 1-4.

Papilio Camilla. Bergstr. *Icon. Pap. diurn. dec.* 2. *tab.* 8. *fig.* 1-4.

Papilio Sibylla. Rossi, *Faun. Etruſ. tom.* 2. *p.* 153. *n°.* 1023.

Papilio Rivularis. Var. 3. Scop. *Ent. Carn. p.* 165. *n°.* 443.

Papilio Sibylla. Wien. *Verz. p.* 172. *fam.* H. *n°.* 2.

Papilio Sibylla. Illig. *N. Auſg. Deſſ. tom.* 2. *p.* 208. *n°.* 2.

Illig. *Magaz. tom.* 3. *p.* 204. — *tom.* 4. *p.* 39.

Papilio Sibylla. Hubn. *Pap. tab.* 22. *fig.* 103. (Mas.) *fig.* 104. 105. (Fem.)

Hubn. *Larv. Lepid.* 1. *Pap.* 1 *Nymph.* D. b. *fig.* 1. a. b.

Papilio Sibylla. Var. Hubn. *Beitr. tom.* 2. *part.* 3. *tab.* 1. *fig.* B. 1. 2.

Papilio Sibylla. Ochsenh. *Pap. Eur. tom.* 1. *p.* 139. *n°.* 3.

Le Deuil. Geoffr. *Hiſt. Inſ. tom.* 2. *p.* 73. *n°.* 45.

Le petit Silvain. Engram. *Pap. d'Europe, tom.* 1. *p.* 29. *pl.* 11. *fig.* 13. a-f.

Engram. *Pap. d'Europe, tom.* 1. *p.* 236. *pl.* 57. *Suppl.* 3. *fig.* 13. g. h. (Var.)

Linnæus, d'après les figures ſuſmentionnées de Roëſel, a donné le mâle de cette eſpèce ſous le nom de *Sibilla*, & la femelle ſous celui de *Camilla.*

Elle a de deux pouces à deux pouces & un quart d'envergure. Les quatre ailes ſont légèrement dentées & bordées de blanc aux échancrures. Leur deſſus eſt d'un brun-noirâtre, avec une bande blanche, commune & diſcoïdale. Cette bande eſt diviſée ſur les ailes inférieures en ſept taches; & ſur les ſupérieures en huit, dont la cinquième, à partir d'en haut, beaucoup plus petite & précédée en dehors d'un point de ſa couleur. Les premières ailes ont encore trois taches blanches, ſavoir: une plus ou moins diſtincte vers le milieu de la côte, les deux autres vers ſon extrémité, où elles s'alignent avec deux taches ferrugineuſes. L'angle anal des ſecondes ailes a une tache également ferrugineuſe, ſur laquelle ſont deux points noirs.

Le deſſous de toutes les ailes, excepté cependant vers l'angle interne des ſupérieures, eſt ferrugineux, avec une bande & des taches blanches comme en deſſus, plus une double rangée poſtérieure & tranſverſe de points noirs dont l'empreinte paroît ſur la ſurface oppoſée. Ces points ſont ſuivis extérieurement de quelques taches blanches, & les ſecondes ailes ont tout le bord interne d'un bleu cendré-luiſant, avec la baſe tachetée de noir. Le corps a le deſſus d'un brun-noirâtre, & le deſſous d'un gris-cendré. Les antennes ſont noires en deſſus, avec la ſommité ferrugineuſe; & au contraire ferrugineuſe en deſſous, avec la baſe noirâtre.

Le deſſus des femelles eſt un peu fouetté de roux vers l'origine des ailes ſupérieures.

Engramelle a repréſenté, *pl.* 11, *fig.* 13, e. f., une variété ſans bande blanche.

Ce lépidoptère habite les bois d'une grande partie de l'Europe; mais on ne le trouve point dans le midi de la France. Il paroît depuis la mi-juillet juſqu'au commencement d'août, ſuivant les localités. Les amateurs pariſiens ſe le procureront aiſément à Vincennes & à Meudon. On le voit auſſi quelquefois dans le parc de Boulogne, près de la porte d'Auteuil. Il ſe tient ſur les bords des avenues, & ſe poſe ſur les fleurs de *ronces*, & ſur la fiente des beſtiaux.

La chenille, d'après Eſper, eſt verte, avec la tête, des épines dorſales & le bas du corps, rougeâtres ou ferrugineux. Les épines ſont ciliées de noir. Elle vit, au dire des auteurs, ſur pluſieurs eſpèces de *chèvrefeuilles.* Nous ſoupçonnons qu'elle vit auſſi ſur le *chêne*, car nous avons vu ſouvent des femelles dépoſer leurs œufs ſur les feuilles de cet arbre.

La chryſalide eſt anguleuſe, verdâtre, avec des taches dorées.

Nota. D'après quels caractères Fabricius met-il cette eſpèce dans les *Satyres*, lorſque la précédente eſt pour lui une *Nymphale?*

177. Nymphale Camilla.

Nymphalis Camilla.

Nym. alis ſubdentatis, ſuprà atro-cœruleis, faſciâ albâ maculari: poſticis ſubtùs baſi cinereo-cœruleſcente, immaculatâ.

Papilio S. Camilla, *alis dentatis, atris, cœruleo micantibus, faſciâ utrinquè maculari albâ:*

poſticis ſubtùs baſi argenteâ, immaculatâ. Fab. *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 55. *n°.* 584. — *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 246. *n°.* 767.

Papilio Camilla. Wien. *Verz. p.* 172. *fam.* H. *n°.* 2.

Papilio Camilla. Illig. *N. Auſg. Deſſ. tom.* 2. *p.* 210. *n°.* 3.

Illig. *Mag. tom.* 3. *p.* 188.

Papilio Camilla. Schrank, *Faun. Boïc. tom.* 2. *part.* 1. *p.* 191. *n°.* 1328.

Papilio Camilla. Lang. *Verz.* 2. *p.* 31. *p.* 222. 223.

Papilio Camilla. Herbst, *tab.* 235. *fig.* 1. 2.

Papilio Camilla. Hubn, *Pap. tab.* 22. *fig.* 106. 107. (Fem.)

Hubn. *Larv. Lepid.* 1. *Pap.* 1. *Nymph.* D. b. *fig.* 2. a. b.

Drury, *Inſ. tom.* 2. *pl.* 16. *fig.* 1. 2.

Papilio Camilla. Ochsenh. *Pap. Eur. tom.* 1. *p.* 142. *n°.* 4.

Papilio Lucilla. Esp. *part.* 1. *tab.* 38. *Suppl.* 14. *fig.* 2.

Esp. *tab.* 106. *cont.* 61. *fig.* 5-7. (La chen. & la chryſ.)

Papilio Lucilla. Schneid. *Syſt. Beſchr. p.* 145. *n°.* 76.

Papilio Lucilla. Borkh. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 25. *n°.* 21 & *p.* 211.

Papilio Lucilla. Schwarz, *Raup. Calend. p.* 190.

Papilio Sibylla. Fuessl. *Ent. Magaz. tom.* 1. *tab.* 2. *fig.* 4. 5. (La chen. & la chryſ.) *fig.* 6. 7. (Le pap.)

Papilio Sibylla. Cram. *pl.* 114. *fig.* C. D.

Papilio Druſilla. Bergstr. *Nomencl. tab.* 67. *fig.* 5. 6.

Begstr. *Icon. Pap. diurn. dec.* 2. *tab.* 8. *fig.* 5. 6.

Papilio Rivularis. Scop. *Ent. Carn. p.* 165. *n°.* 443.

Le Silvain azuré. Engram. *Pap. d'Europe, tom.* 1. *p.* 32. *pl.* 11. *fig.* 14. a. b.

Engram. *Pap. d'Europe, tom.* 1. *p.* 300. *pl.* 80. 2°. *Suppl. pl.* 1. *fig.* 14. c. d. (La chen. & la chryſ.)

Elle ſe diſtingue principalement du *Sibylla* en ce que le deſſus des quatre ailes, au lieu d'être d'un brun-noirâtre, eſt d'un bleu-foncé chatoyant & un peu verdâtre, avec une ligne tranſverſe & preſque terminale de points d'un bleu plus clair; en ce que leur deſſous n'a qu'une rangée poſtérieure de points noirs, leſquels ſont entourés de brun-cendré aux ſecondes ailes; en ce que ces dernières ailes ont la baſe ſans taches.

Il eſt des femelles dont le deſſus a quelques petites taches rouges.

Cette eſpèce ſe trouve en juillet & en août dans l'Aſie mineure, l'Italie, l'Autriche, &c., & dans pluſieurs départemens du midi & du centre de la France. Elle habite les bois & ſe repoſe ſouvent ſur les aulnes. Scopoli lui a donné le nom de *Rivularis*. Nous avons remarqué en effet qu'elle ſe plaiſoit le long des ruiſſeaux & des petites rivières. On la prend aſſez facilement; mais il faut bien prendre garde de l'effaroucher.

La chenille reſſemble beaucoup à celle du *Sibylla*; mais elle a de plus ſur chaque côté du corps une ſérie longitudinale de points ferrugineux. Elle vit auſſi, diſent les auteurs, ſur pluſieurs eſpèces de *chèvrefeuille*. Il pourroit bien ſe faire qu'elle mangeât les feuilles de l'*aulne*; car, comme nous l'avons dit plus haut, elle fréquente de préférence les endroits peuplés de cet arbre.

La chryſalide eſt anguleuſe, brunâtre, avec une boſſe arrondie ſur le milieu du dos.

Le papillon ne donne qu'une fois par an.

178. Nymphale Procris.

Nymphalis Procris.

Nym. alis dentatis, rufis, faſciâ communi albâ, mediâ: ſubtùs baſi cinero-virеſcente, nigro ſtrigoſâ.

Papilio N. Procris, *alis dentatis, fulvis, nigro maculatis, faſciâ albâ: ſubtùs variegatis.* Fab. *Spec. Inſ. tom.* 2. *p.* 103. *n°.* 452. — *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 56. *n°.* 550. — *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 138. *n°.* 425.

Edwards, *Av. tab.* 299.

Papilio Procris. Cram. *pl.* 106. *fig.* E. F.

Les mâles ont un peu plus de deux pouces d'envergure, & les femelles environ trois. Les quatre ailes ſont dentées. Leur deſſus eſt d'un roux-foncé, avec une bande blanche, commune, diſcoïdale, légèrement teintée d'incarnat, & ſe détachant ſur un fond noirâtre. A la baſe, il y a de petites lignes tranſverſes, & vers l'extrémité deux rangées de points, noirs. Outre cela, le bord poſtérieur eſt longé par une double ligne blanchâtre & en feſton.

Le deſſous ſe diſtingue du deſſus en ce que la bande eſt environnée de vert-griſâtre-luiſant, qui en arrière forme une ſimple ligne ondulée, tandis qu'en avant il ſe prolonge juſqu'à la baſe des ailes, mais avec ſolution de continuité ſur les ſupérieures, & ſans interruption ſur les inférieures; en ce que de plus les points noirs de la rangée extérieure

des unes & des autres ſont cerclés de blanc. Le corps eſt rouſſâtre en deſſus, blanc en deſſous. Les antennes ſont noires, avec la ſommité fauve.

De la Chine & de l'île de Java.

N. B. La bande blanche eſt fortement bifide près de la côte des premières ailes.

179. Nymphale Epione.

Nymphalis Epione.

Nym. alis integris, fuſcis : anticis utrinquè faſciâ mediâ albâ : poſticis ſubtùs ſtrigis quinque nigris, maculiſque baſeos duabus albis.

Nous ne connoiſſons cette eſpèce que par des individus mâles.

Leur envergure eſt d'environ deux pouces. Le deſſus des premières ailes eſt d'un brun-obſcur, avec quelques anneaux noirs à la baſe, & une bande blanche tranſverſe ſur le milieu.

Le deſſus des ſecondes ailes eſt du même brun que celui des premières, avec trois lignes noirâtres tranſverſes vers l'extrémité.

Le deſſous des ailes ſupérieures eſt d'un brun-pâle, avec une bande ſemblable à celle de la ſurface oppoſée, plus des taches blanches à la baſe & au ſommet. Les taches du ſommet ſont au nombre de ſix, dont deux extérieures; celles de la baſe au nombre de huit, dont une encadrée de roux. Il y a en outre du roux à l'origine de la côte, & contre les nervures à partir de la bande juſqu'au bord terminal.

Le deſſous des ailes inférieures eſt d'un brun-pâle, avec cinq lignes rouſſes tranſverſes, dont deux à la baſe, deux au milieu, & une le long du bord poſtérieur. Les lignes de la baſe ſont accompagnées de deux taches blanches, inégales; celles du milieu ſont ſéparées par un eſpace noirâtre, & elles ſe réuniſſent à leur extrémité inférieure; celle du bord eſt ſurmontée d'un rang de points blanchâtres, dont les deux antérieurs plus prononcés.

Du Bréſil.

180. Nymphale Lycorias.

Nymphalis Lycorias.

Nym. alis repandis, ſuprà nigro-fuſcis : anticis faſciâ ſanguineâ, obliquâ; poſticis antè marginem ſtrigâ geminâ albidâ.

Nous ne connoiſſons cette eſpèce que par un individu mâle & unique.

Il a environ deux pouces d'envergure. Le deſſus des premières ailes eſt d'un brun-noirâtre, avec une bande oblique d'un rouge-vermillon ſur le milieu, quatre taches inégales du même rouge vers l'origine de la côte, une petite raie blanchâtre & tranſverſe vis-à-vis du ſommet. Ces ailes ont le bord poſtérieur entier.

Le deſſus des ſecondes ailes eſt d'un brun-noirâtre, avec deux lignes blanchâtres, maculaires, ſituées parallèlement au bord poſtérieur qui eſt ſinueux & liſeré de blanc.

Le deſſous des premières ailes reſſemble au deſſus, mais il eſt généralement plus pâle, & l'origine de la côte eſt du même ton que la bande du milieu & les taches qui la précèdent intérieurement.

Le deſſous des ſecondes ailes eſt d'un brun-griſâtre, avec une tache roſe à la baſe, puis trois lignes obliques & quelques veines longitudinales d'un brun-foncé : aux lignes blanchâtres de la ſurface oppoſée correſpondent ici deux lignes ſemblables, mais moins prononcées. Le corps & les antennes ſont de la couleur des ailes.

Du Bréſil.

181. Nymphale Eumée.

Nymphalis Eumeus.

Nym. alis integerrimis, fuſcis, faſciâ albâ : poſticarum utrinquè terminatâ maculâ fulvâ. Fab.

Papilio N. *Eumeus.* Fab. *Spec. Inſ. tom.* 2. *p.* 53. *n°.* 280. — *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 30. *n°.* 323. — *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 156. *n°.* 481.

Les quatre ailes, dont les deux ſurfaces ſe reſſemblent, ſont d'un brun-obſcur, avec une bande blanche, qui eſt terminée au bord antérieur & au bord interne des inférieures par une tache fauve. Le ſommet de l'aile eſt un peu blanchâtre.

De Cayenne.

(*Traduction de Fabricius.*)

182. Nymphale Cocalia.

Nymphalis Cocalia.

Nym. alis dentatis, fuſcis : anticis nigro flavoque maculatis : ſubtùs omnibus griſeis, ſtrigâ punctorum alborum. Fab.

Papilio S. *Cocalia.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 250. *n°.* 777.

Papilio Cocalia. Jon. *Fig. pict.* 4. *tab.* 70. *fig.* 2.

Papilio Cocalia. Donow. *Of an Epit. of the Nat. Hiſt. Inſ. of India, cah.* 2. *pl.* 2. *fig.* 1.

Elle a de deux pouces & demi à trois pouces d'envergure. Ses ailes ſont un peu dentées, d'un brun-obſcur en deſſus. Les premières ont à la baſe des taches noires; vers le milieu de la côte une bande jaunâtre, tranſverſe, courte & ſinuée; avant le bord terminal une rangée de taches oculaires, obſcures & longées en dehors par une ligne noire. Les ſecondes ailes ont vis-à-vis du ſommet une tache oculaire, & parallèlement au bord poſtérieur une ligne noire.

Le deſſous de toutes les ailes eſt gris, avec une rangée de points blancs, contigus intérieurement

à des points noirâtres, & suivis extérieurement d'une ligne obscure.

Des Indes.

Décrite d'après Fabricius & la figure de Donowan.

183. Nymphale ? Phégéa.

Nymphalis Phegea.

Nym. alis dentatis, fuscis : anticis fasciâ, posticis disco ferrugineo aut albo : subtùs pallidioribus, nigro undatis. Fab.

Papilio N. *Phegea.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 132. *n°.* 407.

Papilio Phegea. Jon. *Fig. pict.* 5. *tab.* 21.

Voici ce qu'en dit Fabricius : elle est grande, & elle a le corps noir, avec des points blancs & l'abdomen ferrugineux. Le dessus des quatre ailes est d'un brun-obscur, ondé de noir, avec une bande maculaire, blanche ou ferrugineuse, sur les supérieures.

Le dessous ressemble au dessus, mais il est plus pâle, ce qui fait ressortir davantage les ondes noires. D'après la phrase spécifique, les secondes ailes doivent avoir le milieu blanc ou ferrugineux.

De l'Inde.

Nota. Ne seroit-ce pas une Morpho à cellule discoïdale fermée ?

184. Nymphale Marguerite.

Nymphalis Margarita.

Nym. alis subdentatis, suprà argenteis, apice nigro, albo maculato : posticis subtùs fusco irroratis, strigâ punctorum ocellatorum.

Elle a près de deux pouces d'envergure. Le dessus des premières ailes est d'un blanc-argenté-luisant à la base ; traversé au milieu par une large bande d'un blanc un peu incarnat ; noir à l'extrémité, avec trois ou quatre points blancs vis-à-vis du sommet.

Le dessus des secondes ailes est d'un blanc-argenté, avec le limbe postérieur noir & divisé dans toute sa longueur par une ligne blanche ondulée.

Le dessous des ailes supérieures est grisâtre à la base & au sommet ; noir au milieu, avec une bande blanche correspondant à celle de la surface opposée.

Le dessous des secondes ailes est gris, aspergé de brun, avec une tache violette peu prononcée vers la base, & une rangée transverse de quatre points ocellés derrière le milieu. Les deux surfaces du corps sont de la couleur des ailes.

La femelle ressemble au mâle.

Du Brésil.

185. Nymphale Flavilla.

Nymphalis Flavilla.

Nym. alis subdentatis, luteis, apice suprà fuescente : subtùs strigis tribus ferrugineis, punctisque ocellaribus niveis, anticarum duobus, posticarum quinque.

Elle a un peu plus d'un pouce & demi d'envergure. Le dessus des ailes est d'un jaune-fauve, avec le sommet des supérieures brunâtre, & précédé d'une tache de cette nuance.

Le dessous est plus pâle que le dessus, avec trois lignes ferrugineuses, transversales & communes, dont l'antérieure droite, discoïdale, les deux autres flexueuses. Entre la ligne discoïdale & la suivante, les premières ailes ont deux points oculaires très-blancs, & les secondes cinq, dont deux gros près du bord antérieur, & trois petits près de l'angle de l'anus. Le corps est jaunâtre. Les antennes sont noires, annelées de blanc, avec le bout de la massue roussâtre.

La femelle ne diffère du mâle que parce que le dessus de ses ailes offre sur le bord terminal une rangée de croissans noirâtres, concaves en dehors.

Du Brésil.

186. Nymphale Liriſſa (1).

Nymphalis Liriſſa.

Nym. alis repandis, suprà fusco-cinereis, undis nigris : anticis utrinquè fasciâ, posticis punctis ocellaribus, albis.

Papilio S. Liria, *alis subdentatis, cinereis, fusco undatis : anticis fasciâ albâ, posticis punctis quatuor albis.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 239. *n°.* 747.

Papilio Liria. Jon. *Fig. pict.* 2. *tab.* 23. *fig.* 2.

Elle a environ deux pouces d'envergure. Le dessus des ailes est d'un cendré plus ou moins obscur, avec plusieurs lignes noires, maculaires, transverses & ondulées. Indépendamment de cela, les ailes de devant ont entre le milieu & l'extrémité une bande blanche, oblique, large, sinuée, marquée de deux petits anneaux noirâtres ; & vis-à-vis du sommet un point blanc. Les secondes ailes offrent, parallèlement au bord postérieur, une rangée de quatre à cinq points blancs, oculaires.

Le dessous diffère du dessus en ce que la moitié antérieure des premières ailes & toute la surface des secondes sont d'un gris-verdâtre-fale. Le corps est de la couleur des ailes, avec les antennes noires & annelées de blanc.

La femelle ressemble au mâle.

Du Brésil.

187. Nymphale Laſſus.

Nymphalis Laſſus.

(1) Fabricius a deux papillons *Liria* ; c'est pourquoi nous avons changé le nom de celui-ci.

Nym. alis integerrimis, fuſcis, ſtrigis nigris : anticis maculâ marginali albâ : ſubtùs (omnibus) *pallidis, ſtrigis fuſcis.* Fab.

Papilio F. *Laſſus.* Fab. *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 26. *n°.* 269. — *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 44. *n°.* 135.

Fabricius met cette eſpèce parmi ſes *Danaïdes bigarrées*, tandis qu'il fait un *Satyre* de la précédente dont elle paroît être ſi voiſine.

Elle eſt à peu près de la taille du *Liriſſa*. Le deſſus de toutes les ailes eſt d'un brun-obſcur, avec pluſieurs lignes tranſverſes plus obſcures. Outre cela, il y a une tache blanche vers la côte des ailes ſupérieures.

Le deſſous des quatre ailes eſt pâle, avec des lignes tranſverſes, & une bande poſtérieure, obſcures. A la tache blanche des premières ailes correſpond ici une tache ſemblable, mais accompagnée de quelques points de ſa couleur.

Elle ſe trouve à Cayenne.

(*Décrite d'après Fabricius.*)

188. Nymphale? Dyndima.

Nymphalis Dyndima.

Nym. alis integerrimis, ſuprà chalybdineis, ſubtùs flaveſcentibus, utrinquè nigro undatis : anticarum apice maculis duabus albis.

Papilio Dyndima. Cram. *pl.* 271. *fig.* G. H.

Elle a environ deux pouces d'envergure. Le deſſus des ailes eſt couleur d'acier, leur deſſous jaunâtre, avec ſept à huit lignes noires, ondulées & tranſverſales. Il y a en outre au ſommet des ailes ſupérieures deux taches blanches, dont l'extérieure beaucoup plus petite & en forme de point.

De Surinam.

189. Nymphale Démophon.

Nymphalis Demophon.

Nym. alis ſuprà nigris, faſciâ communi vireſcenti-cœruleâ, nitidâ, ſubtùs griſeo variis, punctis baſeos unico, tunc ſtrigâ undulatâ, nigris.

Papilio E. A. Demophon, *alis dentatis, ſuprà nigris, faſciâ viridi : ſubtùs griſeo marmoratis.* Linn. *Syſt. Nat.* 2. *p.* 753. *n°.* 47.

Papilio Demophon. Mas. Linn. *Muſ. Lud. Ulr. p.* 215. *n°.* 34.

Papilio Demophon. Clerck, *Icon. tab.* 29. *fig.* 3. 4.

Papilio N. *Demophon.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 83. *n°.* 265.

Papilio E. A. *Demophon.* Fab. *Syſt. Ent. p.* 457. *n°.* 61. — *Spec. Inſ. tom.* 2. *p.* 24. *n°.* 97. — *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 12. *n°.* 114.

Papilio Demophon. Esp. *Pap. exot. tab.* 53. *fig.* 1.

Papilio Siſyphus. Cram. *pl.* 158. *fig.* C.

Papilio Pheridamas. Cram. *pl.* 158. *fig.* A. B. (Var.)

Papilio Siſyphus. Herbst, *tab.* 28. *fig.* 3.

Papilio Pheridamas. Herbst, *tab.* 28. *fig.* 2.

Seba, *Muſ.* 4. *tab.* 26. *fig.* 11. 12.

Seba, *Muſ.* 4. *tab.* 18. *fig.* 2. 3.

Elle a de quatre pouces à quatre pouces & demi d'envergure. Le deſſus des ailes eſt noir, avec une bande d'un bleu-verdâtre-luiſant, commune, oblique, diſcoïdale, cambrée & interrompue près de la côte des ſupérieures, terminée en pointe ſur les inférieures.

Le deſſous eſt brunâtre, avec trois bandes tranſverſes d'un gris de perle; un point noir à la baſe de chaque aile, puis une ligne ondulée de cette couleur. La ligne ondulée des ſecondes ailes deſcend du quart antérieur de la côte à l'angle interne, en ſe courbant en arrière vers le milieu de ſa longueur. On voit en outre, parallèlement au bord poſterieur des mêmes ailes, une rangée de ſix points, dont l'anal double, points qui ſont blancs & entourés de rouſſâtre. Sur le bord correſpondant des premières ailes, il y a une ligne griſâtre, peu prononcée & fourchue vers ſon origine. Le corps & les antennes ſont noirs.

De la Guyane.

N. B. Fabricius rapporte ici la *figure* 1, *tab.* 6 du *tom.* 4 de Roëſel. Cette figure repréſente le *Sarpedon*, eſpèce tout-à-fait différente & appartenant au genre Papillon proprement dit.

190. Nymphale Amphitoé.

Nymphalis Amphitoe.

Nym. alis ſuprà nigris, faſciâ communi vireſcenti-cœruleâ, nitidâ : ſubtùs griſeo variis, punctis baſeos duobus, tunc ſtrigâ valdè angulatâ, nigris.

Papilio Amphimacus. Sulz. *Inſ. edit.* Roem. *tab.* 14. *fig.* 2. 3.

Papilio Amphimacus. Herbst, *Pap. tab.* 27. *fig.* 3.

Fabricius l'a confondue avec ſon papillon *Amphimacus*.

Elle eſt de la taille du *Démophon*, & elle lui reſſemble en deſſus.

Le deſſous de ſes ailes eſt diverſement nuancé de gris, avec deux points à la baſe de chacune, puis une ligne très-anguleuſe, noirs. La ligne des ſecondes ailes deſcend du milieu de la côte à l'angle anal, où aboutit une rangée courbe de ſept points

bleuâtres, entourés de ferrugineux. Les premières ailes ſont noires à l'angle interne, avec un gros point d'un gris-rouſſâtre.

De l'Amerique méridionale.

N. B. La ligne noire qui traverſe en deſſous le milieu des ſecondes ailes forme par ſes ſinuoſités une ſorte de profil humain, ce qui n'a jamais lieu dans le *Démophon*.

191. Nymphale Lycomède.

Nymphalis Lycomedes.

Nym. alis ſuprà nigris, faſciâ communi virescenti-cœruleâ, nitidâ : ſubtùs flavidis, punctis baſeos duobus, tunc ſtrigis totidem angulatis, nigris.

Papilio Licomedes. Cram. *pl.* 158. *fig.* D.

Papilio Licomedes. Herbst, *Pap. tab.* 28. *fig.* 4

Fabricius la réunit au *Démophon*. Elle lui reſſemble beaucoup, il eſt vrai. Néanmoins elle en diffère en ce qu'elle a le deſſous des ailes plutôt jaunâtre que gris; en ce que l'on y voit deux lignes noires anguleuſes, dont l'antérieure diſcoïdale, la poſtérieure rapprochée des points marginaux des ſecondes ailes; en ce que l'angle interne des premières ailes eſt jaunâtre avec deux points noirâtres, au lieu d'être noir avec un point rouſſâtre.

De la Guyane.

192. Nymphale Amphimaque.

Nymphalis Amphimacus.

Nym. alis ſuprà nigris, faſciâ communi virescenti-cœruleâ, nitidâ : ſubtùs dimidio baſilari punctoque griſeo-albidis.

Papilio E. A. Amphimacus, *alis dentatis, atris, faſciâ cœruleâ, nitidâ : ſubtùs anticè albis, poſticè cinereis.* Fab. *Syſt. Ent. p.* 457. *n°.* 59. — *Spec. Inſ. tom.* 2. *p.* 23. *n°.* 94. — *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 12. *n°.* 110. — *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 37. *n°.* 110.

Papilio Meander. Cram. *pl.* 12. *fig.* A. B.

Papilio Meander. Herbst, *Pap. tab.* 28. *fig.* 5. 6.

Fabricius dit que ce lépidoptère a le port du *Machaon* (*ſtatura Machaonis*). Une telle aſſertion eſt propre à dérouter, lorſqu'on a ſouvent bien de la peine à reconnoître des eſpèces dont la forme eſt bien déterminée.

Sa taille eſt la même que celle du *Démophon*, auquel il reſſemble en deſſus.

Le deſſous des quatre ailes a la moitié antérieure d'un blanc-griſâtre; l'autre moitié brune, mais avec le bord poſtérieur plus clair. La partie blanche eſt foiblement tachetée de noir, & forme un triangle renverſé dont le côté externe eſt droit. La partie brune offre un gros point blanc vers l'angle interne des premières ailes, & un ſemblable près de la côte des ſecondes. Ces dernières ont en outre, parallèlement à leur bord de derrière, une rangée courbe de huit points bleuâtres, entourés de brun.

De la Guyane & du Bréſil.

193. Nymphale Démodice.

Nymphalis Demodice.

Nym. alis ſuprà nigris, faſciâ communi virescenti-cœruleâ, nitidâ : ſubtùs anticis ſtrigis annuliſque nigris, poſticis ocellis duobus remotis.

Papilio Demophon. Femina. Linn. *Muſ. Lud. Ulr. p.* 215. *n°.* 34.

Papilio Demophon. Cram. *pl.* 158. *fig.* E.

Papilio Demophon. Herbst, *tab.* 27. *fig.* 4.

Papilio Demophon. Herbst, *tab.* 28. *fig.* 1.

Seba, *Muſ.* 4. *tab.* 26. *fig.* 15. 16.

Linnæus a pris cette eſpèce pour la femelle du *Démophon*.

Les deux ſexes du *Démophon* reſſemblent effectivement à la femelle de notre *Démodice* par le deſſus des ailes; mais le mâle de ce dernier a la bande bleue environnée d'un large reflet violet, & elle finit en pointe un peu au-delà du diſque des premières ailes, au lieu d'être interrompue & cambrée près de leur bord d'en haut.

Le deſſous des quatre ailes a un peu plus de la moitié antérieure d'un blanc-griſâtre, & ſinuée en dehors, avec quelques points à la baſe, puis une ligne anguleuſe, noirs; le reſte de la ſurface d'un gris-obſcur, avec des lignes tortueuſes & des anneaux noirâtres ſur les ailes de devant, & deux yeux aſſez grands ſur celles de derrière. Les yeux, dont l'un eſt ſitué près du ſommet de l'aile, l'autre près de l'angle anal, ſont partie noirs, partie violets, avec la prunelle blanche, l'iris roux & entouré d'un cercle blanc que borde antérieurement un arc noirâtre.

Dans la femelle, ces yeux s'alignent avec cinq points bleuâtres, dont trois intermédiaires; & l'œil poſtérieur ſe reproduit en deſſus.

De la Guyane & du Bréſil.

194. Nymphale Déiphile.

Nymphalis Deiphile.

Nym. alis ſuprà nigris, diſco violaceo, apice faſciâ communi è maculis fulvis : ſubtùs baſi margaritaceâ, ferrugineo-maculatâ.

Nous ne connoiſſons ce lépidoptère que par un individu unique, appartenant à M. le chevalier de Langſdorff.

Il

Il a le port & la taille du *Démophon*. Le deſſus de ſes ailes eſt noir, avec une large bande violette ſur le milieu, & une bande de taches fauves parallèlement au bord poſtérieur. L'avant-dernière tache de la bande fauve des ſecondes ailes eſt marquée d'un gros point noir.

Le deſſous des quatre ailes a environ le tiers antérieur d'un blanc-violâtre-luiſant, avec des points & des traits ferrugineux; le reſte de la ſurface nuancé de brun-tanné & de brun plus foncé, avec une ligne noire, poſtérieure, commune, légèrement flexueuſe, & immédiatement ſuivie aux ſecondes ailes de deux yeux très-écartés, noirs, ayant la prunelle bleuâtre & l'iris pâle. Le blanc-violâtre de la baſe forme un triangle renverſé dont le côté externe eſt très-ſinueux.

De l'intérieur du Bréſil.

195. Nymphale Ancæa.

Nymphalis Ancæa.

Nym. alis ſuprà atris aut fuſcis, anticarum faſciâ cyaneâ, obliquâ : ſubtùs viridibus, poſticarum ſtrigis tribus ferrugineis.

Papilio N. Ancæa, *alis dentatis, atris : primoribus fuſciâ cæruleâ, poſticis luteâ.* Linn. *Syſt. Nat.* 2. *p.* 781. *n°.* 184. — *Muſ. Lud. Ulr. p.* 307. (Le mâle.)

Papilio D. F. Obrinus, *alis integerrimis, ſuprà nigris, faſciâ cyaneâ : ſubtùs viridibus, faſciâ albâ.* Linn. *Syſt. Nat.* 2. *p.* 766. *n°.* 113. — *Muſ. Lud. Ulr. p.* 255. (La femelle.)

Papilio N. Ancæus, *alis integerrimis, atris, faſciâ anticarum cæruleâ, poſticarum ferrugineâ : ſubtùs viridibus.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 154. *n°.* 474. (Le mâle.)

Papilio D. F. *Obrinus.* Fab. *Syſt. Ent. p.* 485. *n°.* 186. — *Spec. Inſ. tom.* 2. *p.* 62. *n°.* 275. — (*Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 30. *n°.* 317.?)

Papilio N. Obrinus, *alis integerrimis, ſuprà fuſcis, faſciâ cæruleâ maculâque ferrugineâ : ſubtùs viridibus, faſciâ albicante.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 154. *n°.* 475. (La femelle.)

Papilio D. F. *Ancæus.* Fab. *Syſt. Ent. p.* 485. *n°.* 187. — *Spec. Inſ. tom.* 2. *p.* 62. *n°.* 276. — *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 30. *n°.* 318.

Papilio Ancæa. Cram. *pl.* 338. *fig.* C. D.

Papilio Obrinus. Cram. *pl.* 49. *fig.* E. F.

Papilio Obrinus. Stoll, *Suppl. à* Cram. *pl.* 6. *fig.* 5. (La chenille.)

Papilio Ancæus. Herbst, *tab.* 138. *fig.* 3. 4.

Papilio Obrinus. Herbst, *tab.* 139. *fig.* 4. 5.

Papilio Obrinus. Var. Sulz. *p.* 143. *tab.* 16. *fig.* 1. 2.

Papilio Obrinus. Clerck, *Icon. tab.* 31. *fig.* 2. (Mas.) *fig.* 3. (Femina.)

Hiſt. nat. Inſ. Tome IX.

Naturf. 6. *p.* 128. *tab.* 6. *fig.* 1. 2.

L'*Ancæa* & l'*Obrinus* des auteurs appartiennent bien certainement à la même eſpèce. Stoll l'avoit déjà dit, mais il s'eſt mépris ſur les ſexes.

Le mâle, ou l'*Ancæa* de Linnæus, a environ deux pouces & demi d'envergure. Le deſſus de ſes ailes eſt d'un noir-foncé, avec une bande d'un bleu-pâle & verdâtre ſur les ſupérieures, & une bande orangée ſur les inférieures. La bande de celles-ci eſt plus large, un peu courbe, & placée tranſverſalement ſur le milieu de la ſurface. La bande de celles-là eſt ſinuée & diſpoſée obliquement entre le milieu de la côte & l'extrémité du bord poſtérieur.

La femelle, ou l'*Obrinus*, eſt un peu plus grande, & elle a le deſſus d'un brun-noirâtre. Ses premières ailes ont une bande bleue comme celles du mâle, plus une tache de cette couleur au ſommet, & une lunule ferrugineuſe vers la baſe. Les ſecondes ailes ont le bord du ſommet d'un bleu-pâle, & elles ſont entièrement traverſées par trois lignes & un rang de points plus obſcurs que le fond.

Le deſſous des deux ſexes préſente les caractères que voici : les premières ailes ont toute la partie poſtérieure brunâtre; la partie antérieure d'un vert-pomme, avec une bande bleue correſpondante à celle du deſſus, mais plus pâle, & quelques traits ferrugineux tranſverſaux vers l'origine de la côte. Les ſecondes ailes ſont partout d'un vert-pomme, avec trois lignes ferrugineuſes, parallèles & tranſverſes, dont l'antérieure foiblement éclairée de blanchâtre en dehors; la ſuivante preſqu'adoſſée à une ſuite de quatre points, parmi leſquels les deux extrêmes ſont noirs, & les deux intermédiaires blancs avec le contour rouſſâtre; il y a en outre à la baſe deux petites taches de cette dernière couleur. Chaque ſurface du corps eſt du même ton que chaque ſurface des ailes. Les antennes ſont noires & annelées de blanc.

La chenille, ſelon Stoll, eſt verte, avec une ligne briquetée le long de chaque côté du corps. Sa tête eſt ferrugineuſe & armée de deux épines branchues également ferrugineuſes. Son dos en offre d'autres qui ſont vertes & beaucoup plus courtes. Elle vit ſur le *citronier*, & ſe tranſforme en une chryſalide grifâtre, ſuſpendue par la queue.

De la Guyane & du Bréſil.

N. B. La phraſe ſpécifique de l'*Obrinus* du Mantiſſa de Fabricius n'eſt pas conforme à celle de ſes autres ouvrages; c'eſt pourquoi nous avons mis un point de doute.

196. Nymphale Antiochus.

Nymphalis Antiochus.

Nym. alis integris, ſuprà holoſericeo-nigris, faſciâ communi nitidè aurantiâ : anticarum abbreviatâ.

Papilio F. Antiochus, *alis integerrimis, rotun-*

datis, nigris, suprà fasciâ communi fulvâ. Fab. *Syst. Ent. p.* 480. *n°.* 164. — *Spec. Inst. tom.* 2. *p.* 53. *n°.* 233. — *Mant. Inst. tom.* 2. *p.* 26. *n°.* 270. — *Entom. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 44. n°. 134.

Papilio Antiochus. Drury, *Inst. tom.* 3. *pl.* 7. *fig.* 3. 4.

Papilio Antiochus. Herbst, *tab.* 133 *fig.* 3. 4.

Papilio Eupalemon. Cram. *pl.* 143. *fig.* B. C.

Stoll, *Suppl. à* Cram. *pl.*..... *fig.*..... (La chenille.)

Le Velouté. Daubenton, *pl. enlum.* 68. *fig.* 3. 4.

Son envergure eſt d'environ deux pouces & demi. Le deſſus des ailes eſt d'un noir-velouté, avec une bande orangée, luiſante, diſcoïdale, un peu courbe, ne montant guère au-delà du centre des ſupérieures.

Le deſſous de ces dernières ailes eſt d'un brun-noirâtre-luiſant, avec la moitié poſtérieure de la côte d'un gris-violâtre, le diſque jaunâtre & garni de poils noirs couchés parallèlement.

Le deſſous des ſecondes ailes eſt d'un brun légèrement nuancé de gris, avec une ligne tranſverſe & arquée de quelques points noirâtres, non ocellés.

La chenille, ſuivant Stoll, eſt d'un vert-pré, avec le ventre & toutes les pattes fauves. Sa tête eſt noire, marquée de deux taches blanches, & armée de deux épines noires, branchues, très-longues. Il y a en outre ſur tout ſon corps d'autres épines ſemblables, mais très-courtes. Elle vit ſur le *tamarin* (*tamarindus*).

De la Guyane & du Bréſil.

N. B. Nous n'avons vu que des mâles.

197. Nymphale Antinoé.

Nymphalis Antinoe.

Nym. alis ſubdentatis, ſuprà holoſericeo-nigris, faſciâ nitidè aurantiâ : anticarum marginem internum verſùs attenuatâ.

Nous n'avons vu que le mâle de ce lépidoptère. De prime abord, on ſeroit tenté de le prendre pour une variété de l'*Antiochus ;* mais il s'en diſtingue par les caractères que voici : ſes premières ailes ont le bord interne & le bord terminal à peu près droits; leur bande orangée eſt fortement rétrécie à ſa partie inférieure, & ſurmontée à ſa partie ſupérieure d'une tache orbiculaire également orangée; le deſſous des mêmes ailes n'a point de poils ſur le jaune du diſque : le deſſous des ſecondes ailes offre une bande blanchâtre, correſpondant à la bande orangée du deſſus, & les points qui la précèdent en dehors ſont ocellés.

Du Bréſil.

198. Nymphale Numilius.

Nymphalis Numilius.

Nym. alis repandis, ſuprà holoſericeo-nigris, poſticarum diſco, anticarum maculis duabus, nitidè aurantiis : poſticis apice cæruleſcente.

Papilio F. Numilius, *alis integerrimis, atris : anticis maculis duabus, poſticis unicâ, fulvis.* Fab. *Spec. Inst. tom.* 2. *p.* 28. *n°.* 291. — *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 53. *n°.* 164.

Papilio Numilia. Cram. *pl.* 81. *fig.* E. F.

Elle eſt de la taille de l'*Antiochus*, d'un noir-velouté en deſſus, avec trois taches orangées, luiſantes, grandes & orbiculaires, dont deux ſur les premières ailes, l'autre vers le milieu des ſecondes. Celles-ci ſont un peu alongées dans le ſens de la largeur du corps, & elles ont le ſommet violâtre, & le limbe poſtérieur foiblement tacheté de bleu.

Le deſſous des ailes ſupérieures eſt d'un jaune-fauve depuis la baſe juſqu'au-delà du milieu; enſuite noir, avec l'extrémité d'un brun-pâle & violâtre.

Le deſſous des ailes inférieures eſt d'un gris-violâtre vers la baſe, avec deux lignes brunes, tranſverſes & ondulées; d'un brun légèrement verdâtre vers l'extrémité, avec trois lignes tranſverſes un peu plus claires, entre les deux antérieures deſquelles on remarque une rangée de quatre à cinq points preſqu'ocellés. Le corps eſt noir, avec les inciſions du dos jaunâtres. Les antennes ſont noirâtres en deſſus, brunes en deſſous.

De la Guyane & du Bréſil.

N. B. Nous n'avons pas vu la femelle.

199. Nymphale Erminia.

Nymphalis Erminia.

Nym. alis ſubdentatis : anticis ſuprà nigris, baſi inaurato-viridi, ad apicem faſciâ albâ maculari; poſticis ocello ſeſquialtero.

Papilio Erminia. Cram. *pl.* 196. *fig.* A. B. (Le mâle.)

Papilio Erminia. Cram. *pl.* 241. *fig.* A. B. (La femelle.)

Papilio Erminius. Herbst, *tab.* 220. *fig.* 3. 4.

Papilio Erminius. Herbst, *tab.* 221. *fig.* 1. 2.

Elle a environ quatre pouces d'envergure. Le deſſus des premières ailes eſt noir, avec la baſe d'un vert-doré, & une bande blanche, maculaire, qui deſcend du milieu de la côte à l'angle interne. Il y a en outre deux points blancs vis-à-vis du ſommet.

Le deſſus des ſecondes ailes eſt d'un bleu-verdâtre-luiſant dans le mâle, d'un ferrugineux-mat dans la femelle, avec une double ligne noire, anguleuſe, le long du bord terminal, & deux yeux, dont l'antérieur plus petit, vers l'angle de l'anus.

Ces yeux ſont noirs, ainſi que leur iris, & leur prunelle eſt bleuâtre. La couleur du fond des ſecondes ailes s'étend ſur le bord interne des premières, ou, ce qui revient au même, ce bord eſt ferrugineux ou d'un bleu-verdâtre.

Le deſſous des deux ſexes eſt parfaitement ſemblable, & préſente les caractères ci-après : les ailes ſupérieures ſont d'un brun-cendré, avec une bande maculaire & deux points blancs comme en deſſus ; vers le bas du côté interne de la bande, il y a un œil noir à prunelle bleue & à iris roux, œil qui ſe reproduit quelquefois en deſſus ; le milieu offre un eſpace noir ſablé de vert-doré, & ſurmonté de deux *ſigmas* noirs, tranſverſaux. Les ailes inférieures ſont nuancées de brun & de cendré, marquées vers la baſe de deux points noirs, au-delà du milieu de quelques points blancs, près de l'angle anal d'un ſeul œil noir à prunelle bleue & à iris jaune.

Du Bengale & de l'île d'Amboine.

200. Nymphale Iris.

Nymphalis Iris.

Nym. alis dentatis, fuſcis (in mare violaceo micantibus), anticarum maculis, poſticarum faſciâ unidentatâ, albis : anticis ſuprà cæcis.

Papilio N. Iris, *alis ſubdentatis, ſubtùs griſeis, faſciâ utrinque albâ interruptâ : poſticis ſuprà uniocellatis.* Linn. *Syſt. Nat.* 2. *p.* 775. *n°.* 161.

Papilio N. Iris, *alis dentatis, fuſcis, cæruleo micantibus, utrinquè faſciâ albidâ interruptâ ocelloque unico : anticis ſuprà cæcis.* Fab. *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 46. *n°.* 460. — *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 110. *n°.* 339. (Le mâle.)

Papilio N. Beroe, *alis dentatis, fuſcis, cæruleo micantibus : poſticis ocello unico, ſubtùs brunneis margine rubente.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 111. *n°.* 341. (Var. mâle.)

Papilio Iris vulgaris major. Esp. *part.* 1. *tab.* 11. *fig.* 1. (Le mâle.)

Esp. *part.* 1. *tab.* 71. *cont.* 21. *fig.* 4. (La femelle.)

Papilio Iole. Esp. *part.* 1. *tab.* 46. *Suppl.* 22. *fig.* 1.

Papilio Iris. Var. Esp. *part.* 1. *tab.* 71. *cont.* 21. *fig.* 1. — *tab.* 72. *cont.* 22. *fig.* 1.

Roes. *Inſ. part.* 3. *tab.* 42. *fig.* 2.

Papilio Iris. Panz. *Faun. Germ.* 79. 23.

Sulz. *Inſ. tab.* 14. *fig.* 86.

Lewin, *Inſ. tab.* 16. *fig.* 1-5.

Papilio Iris. Hufnag. *tab. imp. Berl. Mag. tom.* 2. *pag.* 62 & 87.

Schneid. *Syſt. Beſchr. p.* 133. *n°.* 69.

Schneid. *Syſt. Beſchr. p.* 140. *n°.* 73. (Var.)

Papilio Iris. Var. 1. Scop. *Ent. Carn. p.* 15. *n°.* 430.

Papilio Iris. Rossi, *Mant. tom.* 2. *p.* 9. *n°.* 344.

Papilio Iris. Bergstr. *Nomençl. tab.* 70. *fig.* 1. 2.

Bergstr. *Icon. Pap. diurn. dec.* 3. *tab.* 2. *fig.* 1. 2.

Papilio Iris. Herbst, *tab.* 226. *fig.* 6. — *tab.* 227. *fig.* 1. 2.

Papilio Beroe. Herbst, *tab.* 229. *fig.* 3-6. — *tab.* 230. *fig.* 1. 2.

Papilio Iris Junonia. Borkh. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 194. — *part.* 2. *p.* 185.

Papilio Iole. Borkh. *part.* 1. *p.* 195. — *part.* 2. *p.* 186.

Borkh. *Rhein. Magaz. tom.* 1. *p.* 253. *n°.* 41.

Papilio Iris. Lang. *Verz.* 2. *p.* 27. *n°.* 194-196. *p.* 28. *n°.* 197. 198.

Lang. *Verz.* 2. *p.* 28. *n°.* 199. (Var.)

Maniola Iris. Schrank, *Faun. Boic. tom.* 2. *part.* 1. *p.* 187. *n°.* 1323.

Papilio Iris. Illig. *N. Aufg. Deſſ. tom.* 2. *p.* 201. *n°.* 1.

Illig. *Magaz. tom.* 3. *p.* 196. — *tom.* 4. *p.* 37.

Papilio Iole. Illig. *N. Aufg. Deſſ. tom.* 2. *p.* 205. *n°.* 3.

Illig. *Magaz. tom.* 4. *p.* 37.

Papilio Iris. Wien. *Verz. p.* 171. *fam.* G. *n°.* 1.

Papilio Iole. Wien. *Verz. p.* 172. *fam.* G. *n°.* 3.

Papilio Iris. Hubn. *Pap. tab.* 25. *fig.* 117. 118. (Mas.) — *tab.* 114. *fig.* 584. (Fem.)

Papilio Iole. Hubn. *Pap. tab.* 122. *fig.* 622. 623. (Var.)

Papilio Iris. Ochsenh. *Pap. Eur. tom.* 1. *p.* 154. *n°.* 2.

Harris, *Aurelian or Nat. Hiſt. of English Inſects. pl.* 3.

Suſpirans. Poda, *Muſ. Græc. p.* 70. *n°.* 23.

Le grand Mars changeant. Engram. *Pap. d'Europe, tom.* 1. *p.* 137. *pl.* 31. *fig.* 62. a. b. (Le mâle.)

Le grand Mars non changeant. Engram. *tom.* 1 *p.* 143. *pl.* 33. *fig.* 65. a. b. (La femelle.)

Engram. *tom.* 1. *p.* 268. *pl.* 68. *Suppl.* 14. *fig.* 62. f. g. (Var. mâle.) *fig.* e. (La chryſ.)

Engram. *tom.* 1. *p.* 271. *pl.* 69. *Suppl.* 15. *fig.* 62. h. i. (Var.) *fig.* 62. l. (Var.)

Engram. *tom.* 1. *pl.* 33. *fig.* 65. c. d. (Var.)

Le Mars bleu-foncé-changeant. Engram. *tom.* 1. *p.* 145. *pl.* 33. *fig.* 67. a. b. (Var. mâle.)

Engramelle fait de ce lépidoptère trois eſpèces diſtinctes, ſavoir : le *grand Mars changeant*, le *Mars bleu-foncé changeant*, & le *grand Mars non changeant*. Les deux premières le rapportent au mâle dont le deſſus a un reflet d'un bleu-violet, tantôt aux quatre ailes à la fois, tantôt aux deux antérieures ſeulement, tantôt enfin à celles de droite ou de gauche, ſelon le point d'où vient le jour. La troiſième eſt la femelle dont le deſſus eſt ſans reflet.

L'envergure du mâle eſt de deux pouces & demi; celle de la femelle d'environ trois pouces. Le deſſus des quatre ailes, qu'il y ait un reflet ou qu'il n'y en ait pas, eſt d'un brun-noirâtre, avec une bande blanche tranſverſe ſur le milieu, & une bande cendrée moins large & maculaire en avant du bord poſtérieur, lequel eſt liſeré de blanc aux échancrures. La bande du milieu des ailes ſupérieures eſt formée de ſix taches inégales qui ſe groupent ſéparément trois à trois; elle eſt en outre précédée en dehors d'une ligne tortueuſe & tranſverſe de quatre à ſix points de ſa couleur. La bande du milieu des ailes inférieures eſt oblique, finement coupée par les nervures, terminée en pointe près de la gouttière abdominale, & dilatée en angle aigu vers le milieu de ſon côté externe. Entre l'extrémité inférieure de cette dernière bande & celle du bord, il y a un œil noir à iris fauve & à prunelle bleuâtre, ſans compter deux petites taches rouſſes, dont l'une placée ſur l'angle anal, l'autre ſur la dent la plus voiſine de ce même angle. Les premières ailes n'ont point d'œil en deſſus.

Le deſſous de ces ailes eſt noirâtre, avec toute la côte ferrugineuſe, le bord terminal d'un gris de perle, une bande & des points blancs comme en deſſus. Indépendamment de cela, la baſe préſente un eſpace blanchâtre ſur lequel ſont quatre points noirs, rapprochés deux à deux; & il y a vers l'angle poſtérieur un grand œil à prunelle bleue & à iris fauve.

Le deſſous des ſecondes ailes eſt d'un cendré un peu verdâtre, avec le milieu ferrugineux & diviſé par une bande blanche, ſemblable à celle de la ſurface oppoſée, mais plus large, du moins antérieurement; on y voit auſſi un œil pareil à celui du deſſus, mais qui paroît plus petit parce que ſon iris ſe perd dans la couleur ferrugineuſe. A ces caractères du deſſous des ailes inférieures, il faut encore ajouter une ligne obſcure & ondulée, longeant tout le bord poſtérieur, lequel, ainſi que celui des ailes de devant, eſt d'une teinte violâtre ou gris de perle. Le corps a le deſſus d'un brun-noirâtre, & le deſſous d'un gris-bleuâtre. Les antennes ſont noires, avec la ſommité fauve. Les yeux ſont d'un ferrugineux-foncé.

Parlons actuellement des variétés. La plus remarquable & la plus rare eſt celle qui a été nommée *Berœ* par Fabricius, *Iole* par Hubner, *Mars bleu-foncé changeant* par Engramelle. C'eſt un mâle totalement dépourvu de bande blanche, & n'ayant que deux taches de cette couleur vers le ſommet des premières ailes. On ne l'auroit jamais rapportée à l'*Ilia*, ſi on avoit eu l'attention de remarquer que le ferrugineux du deſſous des ſecondes ailes ſubſiſte toujours malgré l'abſence de la bande blanche.

Les autres variétés ramènent plus ou moins de celle-ci aux individus ordinaires.

L'Iris habite toujours les parties baſſes des bois, & ſe tient ſur la cime des *chênes*. Mais il en deſcend entre onze & deux heures, & vient, en planant, ſe repoſer ſur de la *fiente*, ſur des *arbres qui ſuintent*, ou ſur des *corps en putréfaction*. C'eſt alors le véritable moment de le prendre. Si on le manque, on doit bien ſe garder de le pourſuivre, parce qu'on le perdroit bientôt de vue, tandis qu'en le laiſſant aller, on eſt preſque ſûr de le revoir l'inſtant d'après. Il reſte caché pour peu que le temps ſoit incertain. Il ne donne qu'une ſeule fois par an, & c'eſt du vingt juin à la mi-juillet. On le trouve dans beaucoup de parties de l'Europe & dans toute la France, excepté dans les départemens les plus méridionaux. Aux environs de Paris, on le voit à Meudon, à Bondi, à Saint-Germain.

La chenille, d'après les figures qu'on en a données, paroît différer très-peu de celle de l'eſpèce ſuivante. Elle vit au haut des *chênes*. On a prétendu qu'elle vivoit auſſi ſur le *peuplier*, le *ſaule* & le *marceau*. Pourquoi donc alors ſon papillon ne fréquente-t-il jamais les prairies, dans leſquelles l'*Ilia* eſt quelquefois ſi commun? Objecterà-t-on que ces deux eſpèces ont de l'antipathie l'une pour l'autre? Mais elles ſympathiſent à merveille dans les bois, où l'*Ilia* ſe fixe volontiers quand il y trouve du *peuplier*, du *ſaule* & du *marceau*.

201. Nymphale Ilia.

Nymphalis Ilia.

Nym. alis dentatis, fuſcis (in mare violaceo micantibus), anticarum maculis, poſticarum faſciâ ſinuatâ, albidis aut luteis : anticis ocello utrinquè conſpicuo.

Papilio N. Iris, *alis dentatis, utrinquè faſciâ albidâ interruptâ ocelloque unico.* Fab. *Syſt. Ent. p.* 501. *n°.* 248.—*Spec. Inſ. tom.* 2. *p.* 86. *n°.* 382.

Papilio N. Ilia, *alis dentatis, cœruleo micantibus, utrinquè faſciâ albâ interruptâ.* Fab. *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 46. *n°.* 461. — *Ent. Syſt. em tom.* 3 *pars* 1. *p.* 110. *n°.* 340.

Papilio Iris minor. Esp. *Pap. part.* 1. *tab.* 37. *Suppl.* 13. *fig.* 1. (Le mâle.)

Esp. *Pap. part.* 1. *tab.* 11. *fig.* 2. (La femelle.)

Esp. *Pap. part.* 1. *tab.* 25. *Suppl.* 1. *fig.* 4. (Var. mâle.)

Esp. *Pap. part.* 1. *tab.* 43. *Suppl.* 19. *fig.* 1.

Papilio Iris rubeſcens, *alis denticulatis, rubeſcentibus, ſuprà maculis magnis contiguis nigris, in mare cœruleo variantibus : poſticis ſerie macularum nigrarum tranſverſâ, ſubtùs teſtacearum pupillis partim albis.* Esp. *Pap. tab.* 71. *cont.* 21. *fig.* 2. 3.

Papilio Ilia. Panz. *Faun. Germ.* 79. 24.

Roes. *Inſ. part.* 3. *tab.* 42. *fig.* 3. 4. — *part.* 4. *tab.* 31. *fig.* 6. (La chenille.)

Papilio Ilia. Herbst, *Pap. tab.* 226. *fig.* 5. (Le mâle.)

Herbst, *Pap. tab.* 228. *fig.* 5. 6. (Le mâle.)

Herbst, *Pap. tab.* 229. *fig.* 1. 2. (La femelle.)

Papilio Iris lutea. Herbst, *Pap. tab.* 227. *fig.* 3-6.

Papilio Iris rubeſcens. Herbst, *Pap. tab.* 228. *fig.* 1-4.

Bergstr. *Nomencl. tab.* 33. *fig.* 3. 4. (Le mâle.)

Bergstr. *Nomencl. tab.* 69. *fig.* 1. 2.

Bergstr. *Icon. Pap. diurn. dec.* 3. *tab.* 1. *fig.* 1. 2.

Bergstr. *Nomencl. tab.* 34. *fig.* 1. 2. (Le mâle, var.)

Bergstr. *Nomencl. tab.* 64. *fig.* 1. (Le mâle, var.)

Bergstr. *Nomencl. tab.* 69. *fig.* 3. 4. (La femelle, var.)

Bergstr. *Icon. Pap. diurn. dec.* 3. *tab.* 1. *fig.* 3. 4. (Var.)

Donow. *Nat. Hiſt. vol.* 2. *pl.* 37.

P. Ilia. Lang. *Verz.* 2. *p.* 29. *n°.* 209-211.

P. Clythia. Lang. *Verz.* 2. *p.* 28. *n°.* 200-204.

P. Eos. Lang. *Verz.* 2. *p.* 29. *n°.* 205-208.

P. Ilia. Schneid. *Syſt. Beſchr. p.* 136. *n°.* 70.

P. Clythia. Schneid. *Syſt. Beſchr. p.* 137. *n°.* 71.

P. Eos. Schneid. *Syſt. Beſchr. p.* 138. *n°.* 72.

P. Iris ilia. Borkh. *Pap. Eur. part* 1. *p.* 8 *et* 195. b. — *part.* 2. *p.* 186.

P. Iris lutea. Borkh. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 9. 195. c. — *part.* 2. *p.* 186. c.

P. Iris rubeſcens. Borkh. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 10 *et* 195. d. — *part.* 2. *p.* 186.

Man. Ilia. Schrank, *Faun. Boïc. tom.* 2. *part.* 1. *p.* 186. *n°.* 1322.

Man. Julia. Schrank, *Faun. Boïc. tom* 2. *part.* 1. *p.* 186. *n°.* 1321.

Man. Clytie. Schrank, *Faun. Boïc. tom.* 2. *part.* 1. *p.* 187. *n°.* 1324.

Schæff. *Icon. tab.* 152. *fig.* 1. 2. (Le mâle.) *fig.* 3. (La femelle, var.)

P. Iris. Var. 2. Scop. *Ent. Carn. p.* 153. *n°.* 430.

P. Iris. Var. 3. Scop. *Ent. Carn. p.* 154.

P. Clythia. Rossi, *Faun. Etr. Mant. tom.* 2. *p.* 9. *n°.* 354. β.

P. Ilia. Illig. *N. Aufg. Deſſ. tom.* 2. *p.* 203. *n°.* 2.

Illig. *Magaz. tom.* 3. *p.* 195. — *tom.* 4. *p.* 37.

P. Clitie. Illig. *N. Aufg. Deſſ. tom.* 2. *p.* 204. *n°.* 2. 3.

Illig. *Magaz. tom.* 3. *p.* 190. — *tom.* 4. *p.* 37.

P. Ilia. Wien. *Verz. p.* 172. *fam.* G. *n°.* 2.

P. Clitie. Wien. *Verz. p.* 321. *fam.* G.

P. Ilia. Hubn. *Pap. tab.* 25. *fig.* 115. 116. (Le mâle.)

P. Clitie. Hubn. *Pap. tab.* 24. *fig.* 113. 114. (Le mâle.)

P. Ilia. Ochsenh. *Pap. Eur. tom.* 1. *p.* 160. *n°.* 3. — *p.* 161. var. A. — *p.* 162. var. B.

Le Mars. Geoffr. *Hiſt. Inſ. tom.* 2. *p.* 61. *n°.* 29.

Le petit Mars changeant. Engram. *Pap. d'Europe, tom.* 1. *p.* 141. *pl.* 31. *fig.* 62. c. d. (La femelle.) — *pl.* 32. *fig.* 64. e. f. (Le mâle.)

Engram. *Pap. d'Europe, tom.* 1. *p.* 326. *pl.* 69. *Suppl.* 15. *fig.* 62. k. — *pl.* 5. 3e. *Suppl. fig.* 64. k.

Le petit Mars orangé. Engram. *Pap. d'Europe, tom.* 1. *p.* 143. *pl.* 32. *fig.* 64. c. d. g. — *p.* 144. *pl.* 33. *fig.* 66. a. b. — *p.* 272. *pl.* 70. *Suppl.* 16. *fig.* 65. e. — *p.* 273. *fig.* 64. h. i. — *pl.* 5. 3e. *Suppl. fig.* 64. l.

Le grand Mars orangé. Engram. *Pap. d'Eu-*

rope, tom. 1. p. 140. pl. 31. fig. 63. a. b. — p. 271. pl. 69. Suppl. 15. fig. 65. c. d.

L'Ilia & le *Clytie* de plusieurs auteurs, ou, si l'on veut, le *petit Mars changeant* & le *petit Mars orangé* d'Engramelle sont variétés l'un de l'autre, & constituent principalement l'espèce que nous donnons ici sous le nom d'*Ilia*.

Cette espèce est un peu plus petite que l'*Iris*, & elle s'en distingue, quelle que soit la couleur des deux bandes du dessus de ses ailes, par les caractères ci-après : 1°. l'œil des premières ailes se reproduit en dessus, à la prunelle près; 2°. la bande discoïdale des secondes ailes est rétrécie intérieurement vers son milieu, au lieu d'être dilatée extérieurement en angle aigu; 3°. elle est toujours plus pâle en dessous, & placée, non sur du ferrugineux, mais sur le fond même de l'aile, entre deux lignes brunâtres, dont la postérieure plus large & plus longue; 4°. cette dernière ligne offre un gros point violâtre qui surmonte la tache oculaire, & la ligne antérieure est précédée du côté de la base par un point noir dans le mâle, par deux ou trois dans la femelle.

Nous avons donné à entendre que les bandes du dessus des ailes n'étoient pas d'une couleur constante. En effet, celles de la première variété sont comme dans l'*Iris*; c'est-à-dire que l'une est blanche & l'autre cendrée. Celles de la seconde variété au contraire sont toutes deux d'un jaune-fauve, ainsi que les alentours de la base.

Il existe une troisième variété, sous le nom de *Iris lutea* ou de *grand Mars orangé*; mais elle se réduit à quelques femelles dont le dessus est entièrement fauve, avec la bande du milieu plus claire.

La chenille, qui produit ces différentes variétés, vit, dans les prairies & dans les bois, sur plusieurs espèces de *peupliers* & de *saules*. Elle est chagrinée, d'un vert-tendre. Sur chacun de ses côtés, à partir du milieu du corps jusqu'au bout, sont quatre lignes obliques, dont les trois postérieures blanchâtres; l'antérieure jaunâtre, & terminée sur le dos par une petite verrue noirâtre. Son anus finit en une pointe aiguë, bordée de jaunâtre. Les deux angles supérieurs de sa tête se prolongent verticalement en manière de cornes longues, tronquées, légèrement bifides & rougeâtres à la troncature, marquées, dans le sens de leur longueur, d'une ligne jaune qui se continue jusqu'au troisième anneau du corps.

La chrysalide est carénée, d'un vert pâle & jaunâtre.

L'*Ilia* a les mêmes mœurs que l'*Iris*, & paroît aux mêmes époques que celui-ci. La variété à *bandes blanches* & celle à *bandes jaunes* sont aussi communes l'une que l'autre dans beaucoup de contrées de l'Europe; mais, dans quelques départemens du midi de la France, on ne trouve que celle à *bandes jaunes*, encore y est-elle souvent plus petite.

Devillers reproche à Engramelle d'avoir trop multiplié les espèces de *Mars*. Nous ne le reprenons pas pour cela, puisqu'il nous est bien démontré qu'il n'y en a que deux; mais nous soutenons hardiment qu'il s'est trompé en disant que *des œufs d'une même ponte* lui ont donné *des chenilles* dont il a obtenu l'*Iris* & la *variété jaune de l'Ilia*. Ce qui prouve encore qu'il s'est trompé, c'est que ces chenilles, ajoute-t-il, ne mangeoient que du *peuplier*, du *tremble* & du *saule*. La chenille de l'*Iris* n'en mange pas; on ne l'a trouvée jusqu'à présent que sur le *chêne* & dans les bois d'une certaine étendue.

N. B. Le *Papilio Iris* du *Systema Entomologiæ* & du *Species* de Fabricius doit être rapporté ici, attendu que c'est une variété de l'*Ilia*.

202. Nymphale Cyanippe.

Nymphalis Cyanippe.

Nym. alis dentatis, suprà fuscis, apice strigis duabus obscurioribus, interruptis : posticis disco argenteo-cærulescente.

Nymphalis Cyane, *alis dentatis, suprà fuscis, lineis duabus obscurioribus macularibus marginem posticum ponè, alarumque posticarum disco cæruleo : infrà pallidè achatino-griseis, ut suprà lineatis, primorum dimidio antico flavescenti, fusco maculato.* Recueil d'observ. de zool. & d'anat. comp. par Alex. de Humboldt & A. Bonpland, *vol. 2. p. 82. pl. 36. fig. 3. 4.*

Elle a le port & à peu près la taille de l'*Ilia*. Le dessus de ses ailes est d'un brun-obscur, avec deux raies presque noires, parallèles, maculaires, & situées le long du bord postérieur. Les ailes de devant ont sur leur milieu quelques taches également noirâtres, & à leur sommet deux ou trois points blancs. Le disque des ailes de derrière est d'un bleu-argenté-brillant, ce qui y forme une très-grande tache ovale.

Le dessous de ces dernières ailes & l'extrémité des supérieures sont d'un gris de perle, clair & luisant, avec deux raies marginales correspondant à celles du dessus, mais plus pâles & moins prononcées. Le milieu des ailes inférieures est encore coupé transversalement par une petite bande noirâtre, anguleuse. Le milieu des supérieures, à partir de la base, est jaunâtre, avec de petites taches noirâtres, dont les unes en forme d'S, les autres orbiculaires, & s'apercevant toutes en dessus.

Du Pérou.

203. Nymphale Leucophthalme.

Nymphalis Leucophthalma.

Nym. alis dentatis, suprà nigricantibus : anticis utrinquè fasciâ ochreaceâ, posticis disco maculâ orbiculari niveâ.

Nymphalis Leucophthalma, *antennis sensim elongato-capitatis ; alis superioribus integris, inferioribus crenatis : his & illis suprà nigricantibus ; primoribus utrinquè fasciâ diluto-ochreaceâ, latâ, transversâ ; posteriorum disco maculâ candidâ, orbiculatâ, in medio ex utrâque parte notato : alis omnibus infrà diluto-castaneis, lineis pallidioribus maculisque cœrulescenti-griseis.* Recueil d'obfervat. de zool. & d'anat. comp. par Alex. de Humboldt & A. Bonpland, *vol.* 1. *p.* 247. *pl.* 25. *fig.* 3. 4.

Elle a un peu plus de deux pouces d'envergure. Le deffus des ailes eft noirâtre, avec des lignes & des efpaces maculaires plus pâles & tirant fur le jaunâtre. Les premières ailes font entières, & traverfées de part & d'autre par une bande d'un jaune d'ocre pâle, aſſez large, finuée, allant du milieu de la côte à l'angle interne, vers lequel elle fe termine en pointe. Les fecondes ailes font crénelées, & offrent fur leur milieu, tant en deſſus qu'en deſſous, une tache orbiculaire d'un beau blanc. Cette couleur eſt auſſi celle des échancrures.

Le deſſous des ailes eſt d'un brun-marron-clair. Celui des fupérieures a, indépendamment de la bande jaune dont nous avons parlé, cinq taches d'un gris-bleuâtre, & bordées de brun-foncé : il y en a trois, triangulaires & inégales, près de la baſe ; les deux autres, petites & arrondies, font face au fommet. Le deſſous des ailes inférieures a également des taches d'un gris-bleuâtre, mais elles ſont plus nombreuſes ; la baſe en préſente cinq ou ſix de forme & de grandeur différentes, & le bord poſtérieur une rangée de cinq qui ſont ovales ; on voit en outre un point blanc fur le milieu de la côte, & derrière la tache blanche diſcoïdale, des lignes tranſverſes, alternativement fauves & jaunâtres. Le corps eſt noir, avec des lignes blanches ſur le ventre. Les antennes ſont noirâtres.

Du Pérou.

204. Nymphale Médée.

Nymphalis Medea.

Nym. alis subdentatis, suprà nigris, fasciis tribus macularibus flavis, primâ & secundâ abdomen secantibus.

Papilio N. Medea, *alis dentatis, falcatis, fasciis tribus macularibus flavis, angulo ani rubro.* Fab. *Syſt. Ent. p.* 508. *n°.* 273. — *Spec. Inſ. tom.* 2. *p.* 96. *n°.* 422. — *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 52. *n°.* 512. — *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 129. *n°.* 396.

Papilio Chione. Cram. *pl.* 96. *fig.* E. F.

Elle a près de trois pouces d'envergure. Le deſſus des ailes eſt noir, avec trois bandes jaunes, maculaires, dont les deux antérieures traverſant le deſſus du corps, la poſtérieure très-étroite & preſque terminale. Il y a en outre une tache ferrugineuſe au ſommet des premières ailes, & une ſemblable à l'angle anal des fecondes.

Le deſſous des premières ailes eſt noirâtre, avec toute la côte & le ſommet d'un gris de perle, & des bandes maculaires correſpondant à celles du deſſus, mais plus pâles.

Le deſſous des fecondes ailes eſt d'un gris de perle, avec un croiſſant noirâtre à la baſe, puis deux bandes tranſverſes d'un jaune très-pâle, & dont la ſupérieure bordée de noirâtre antérieurement, l'inférieure marquée de deux à quatre points noirs. Les deux ſurfaces du corps ſont colorées comme celles des ailes, & le corſelet a un collier ferrugineux. Les antennes ſont noires & annelées de blanc.

De la Guyane & du Bréſil.

205. Nymphale Micalia.

Nymphalis Micalia.

Nym. alis subdentatis, suprà nigris, omnium lunulis apicalibus anticarumque fasciâ mediâ flavis : posticis subtùs maculâ castaneâ.

Papilio N. Micalia, *alis dentatis, atris, flavo maculatis : posticis medio fulvo nigroque maculato.* Fab. *Spec. Inſ. tom.* 2. *p.* 103. *n°.* 453. — *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 56. *n°.* 551.

Papilio Micalia. Cram. *pl.* 108. *fig.* C. D.

Papilio Micalia. Herbst, *tab.* 166. *fig.* 1. 2.

Nous avons, mais à tort, placé ce lépidoptère parmi les Vanefſes (*pag.* 315. *n°.* 44.). Comme la deſcription que nous en avons donnée n'eſt point ſuffiſante, nous en offrons ici une nouvelle.

Son envergure eſt la même que celle de la nymphale *Médée*. Le deſſus des ailes eſt noir, avec deux rangs de petites lunules jaunâtres à l'extrémité des inférieures, & un & demi à l'extrémité des ſupérieures. Ces dernières ailes ont au ſommet deux taches ferrugineuſes ; ſur le milieu une bande jaune, oblique, finuée, & terminée inférieurement en pointe ; à la baſe un trait jaunâtre, longitudinal.

Leur deſſous eſt noirâtre, avec tout le pourtour d'un gris de perle, & une bande & un trait longitudinal jaunes comme en deſſus.

Le deſſous des fecondes ailes eſt d'un gris de perle avec un croiſſant brun à la baſe, & une rangée courbe de cinq points noirs inégaux au-delà du milieu. Entre le croiſſant & les points ſuſdits, eſt un eſpace brun, très-grand, profondément bifide à ſon côté externe, & marqué près de la côte d'une tache marron, ſémilunaire. On voit en outre ſur le limbe poſtérieur une ligne arquée d'un gris plus clair que le fond de l'aile. Le corps eſt noir en

deſſus, & préſente derrière la tête quatre points, dont les deux intermédiaires blanchâtres, les deux autres ferrugineux. Les antennes ſont comme dans l'eſpèce précédente.

Du Bréſil.

Nota. L'individu figuré par Cramer & décrit par Fabricius eſt le mâle. Il diffère des femelles, en ce que la bande jaune des premières ailes eſt moins alongée de part & d'autre; en ce que le deſſus des inférieures a tout le milieu ferrugineux & coupé tranſverſalement en arrière par une ligne noire, tantôt maculaire, tantôt continue.

206. Nymphale Volumna.

Nymphalis Volumna.

Nym. alis ſubdentatis, ſuprà cæruleſcenti-nigris: ſubtùs anticis annulis fuſciâque nitidè vireſcentibus, poſticis ocellis tribus, anteriori bipupillato.

Nous n'avons vu de cette eſpèce qu'un ſeul échantillon, dont nous n'avons pu déterminer le ſexe.

Son envergure eſt d'environ trois pouces. Le deſſus des ailes eſt noir, avec une teinte bleuâtre qui forme ſur le limbe terminal des inférieures une ligne peu prononcée.

Le deſſous des premières ailes eſt noirâtre, avec deux taches annulaires d'un vert-bleuâtre-luiſant, & ſéparées par une bande tortueuſe de leur couleur. Le bord poſtérieur eſt en outre d'un gris-violâtre.

Le deſſous des ſecondes ailes eſt d'un gris-violâtre, avec des chevrons noirâtres à la baſe & à l'extrémité; une bande verdâtre, tranſverſe & ſinuée au-delà du milieu. La bande ſuſdite eſt chargée de trois yeux, dont l'antérieur plus grand, ſolitaire & bipupillé. La prunelle de ces yeux eſt colorée comme la bande, & leur iris eſt d'un brun-rouſſâtre. Le corps eſt de part & d'autre du même ton que les ailes. Les antennes ſont noires, avec le deſſous de la maſſue jaunâtre.

Du Bréſil.

207. Nymphale Sydonia.

Nymphalis Sydonia.

Nym. alis ſubdentatis, ſuprà fuſco-nigris, immaculatis, baſi violaceo micantibus: ſubtùs pallidioribus, punctis quatuor vireſcentibus.

Nous n'avons vu que des mâles de cette eſpèce. Leur envergure eſt d'environ deux pouces & demi. Le deſſus des ailes eſt d'un noir-brun, avec un reflet violet à la baſe. Le reflet des ſecondes ailes a peu d'étendue; celui des premières au contraire longe au moins les deux tiers de la côte, & s'étend juſqu'au milieu de la ſurface.

Le deſſous des ailes ſupérieures eſt d'un gris-obſcur, avec un point, & deux bandes obliques, noirâtres. Il y a en outre vis-à-vis du ſommet, qui eſt d'une teinte violâtre, une rangée courbe & tranſverſe de quatre points verdâtres.

Le deſſous des ailes inférieures eſt d'un brun-violâtre, avec quelques lignes obſcures, flexueuſes & peu prononcées, puis quatre points verdâtres, rapprochés deux à deux. Le bord poſtérieur des quatre ailes eſt foiblement entrecoupé de blanchâtre. Le corps eſt de la couleur des ailes. Les antennes ſont brunes, annelées de gris, avec la ſommité de la maſſue jaunâtre.

Du Bréſil.

208. Nymphale Mygdonia.

Nymphalis Mygdonia.

Nym. alis ſubdentatis, ſuprà nigro-fuſcis: poſticis ſubtùs maculis caſtaneis ocelliſque quatuor obſoletis, geminatis.

Nous n'avons vu que des femelles. Leur envergure eſt d'environ deux pouces & demi. Le deſſus des ailes eſt d'un brun-noirâtre, foiblement teinté de violet, avec cinq taches blanchâtres peu diſtinctes à l'extrémité des ſupérieures, & une ligne ondulée obſcure ſur le limbe terminal des inférieures.

Le deſſous des ailes de devant eſt d'un brun-cendré à la baſe & ſans aucune tache; noirâtre au milieu, avec ſix taches blanchâtres dont l'antérieure ſolitaire, les cinq autres répondant à celles du deſſus; violâtre au ſommet, avec une pouſſière cendrée.

Le deſſous des ailes de derrière eſt d'un brun-violâtre, avec deux taches marron vers l'origine de la côte, & deux lignes flexueuſes noirâtres au-delà du milieu. Ces deux lignes renferment quatre yeux rouſſâtres, rapprochés deux à deux, & ayant chacun un iris noirâtre & une prunelle violâtre. Le corps eſt de la couleur des ailes. Les antennes ſont brunes, annelées de blanchâtre en deſſous, avec le bout de la maſſue jaunâtre.

Du Bréſil.

Nota. Ne ſeroit-ce pas la femelle du *Sydonia*?

209. Nymphale Alpaïs.

Nymphalis Alpais.

Nym. alis ſubdentatis, fuſcis: anticis apice cæruleſcenti-nigro alboque maculato: poſticis ſubtùs ocellis tribus, anteriori bipupillato.

Nous n'avons vu qu'un ſeul individu, dont il nous a été impoſſible de reconnoître le ſexe, vu le mauvais état de l'abdomen.

Son envergure eſt preſque de trois pouces. Le deſſus des ailes eſt brun, avec le ſommet des ſupérieures glacé de bleu-violet & marqué de cinq taches blanches, le bord terminal des inférieures précédé d'une ligne noirâtre ondulée.

Le deſſous des premières ailes reſſemble beaucoup

coup au dessus, mais il offre vers la base un croissant blanchâtre solitaire, & le sommet est d'un gris-violâtre, avec six points noirâtres, dont les quatre postérieurs disposés en une ligne courbe & transversale.

Le dessous des secondes ailes est d'un gris-violâtre, avec deux taches, puis deux lignes tortueuses, d'un brun-puce. Entre les deux lignes susdites, sont trois yeux noirs à prunelle blanche & à iris jaunâtre. L'œil antérieur est séparé des autres & bipupillé; le second est moitié moins gros que l'anal, auquel il est presque contigu.

Du Brésil.

210. Nymphale Maia.

Nymphalis Maia.

Nym. alis subdentatis, supra fuscis (in mare violaceo micantibus) : subtùs anticis puncto baseos nigricante, posticis quatuor virescentibus geminatis, secundo majore.

Papilio N. Maia, *alis dentatis, fuscis : anticis albo maculatis, posticis immaculatis.* Fab. *Syst. Ent. p.* 512. *n°.* 295. — *Spec. Inf. tom. 2. p.* 103. *n°.* 454. — *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 56. *n°.* 552. — *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 138. *n°.* 426.

Papilio Anna. Cram. *pl.* 281. *fig.* A. B. (Le mâle.)

Papilio Anna. Herbst, *tab.* 223. *fig.* 6.

Fabricius s'est trompé, non-seulement en prenant la femelle pour le mâle, mais encore en rapportant à cette espèce notre *Agathis mâle* ou *Agathina* de Cramer.

Elle a entre deux pouces & un quart & deux pouces & demi d'envergure. Le dessus du mâle est d'un brun-noirâtre, glacé de violet à la base des quatre ailes, & chargé vers l'extrémité des supérieures de six taches blanches peu prononcées.

Le dessus de la femelle est d'un brun plus clair & sans reflet, avec l'extrémité des premières ailes noirâtre & chargée de six taches blanches très-distinctes. Ces taches sont disposées ainsi : 1, 3, 2.

Le dessous des ailes supérieures, du mâle comme de la femelle, est d'un gris-cendré à la base, avec un seul point noirâtre; traversé au-delà du milieu par une bande sinuée, également noirâtre, & sur laquelle sont des taches blanches ou blanchâtres correspondant à celles du dessus; d'un gris-violâtre au sommet, avec une ligne transverse de quatre chevrons bruns dont la convexité est tournée en dedans.

Le dessous des secondes ailes, dans les deux sexes, est d'un gris légèrement glacé de violet, avec deux points noirâtres vers la base; deux lignes brunes, transverses & flexueuses, au-delà du milieu; quatre points noirs, sablés de vert, rapprochés deux à deux, & dont le second plus gros & plus brillant, entre les lignes brunes susdites. Le corps est de la couleur des ailes. Les antennes sont brunes, annelées de gris, avec le bout de la masse jaunâtre.

Du Brésil.

Nota. Quelquefois les points verts des ailes inférieures ont un iris jaunâtre, mais moins prononcé que dans la figure de Cramer.

211. Nymphale Orphise.

Nymphalis Orphise.

Nym. alis integerrimis, supra fuscis (in mare violaceo micantibus) : subtùs anticis puncto baseos nigricante, posticis quatuor virescentibus geminatis, anteriori majore.

Papilio Orphise. Cram. *pl.* 42. *fig.* E. F. (Le mâle.)

Elle ressemble extrêmement à la nymphale *Maia*, mais elle est toujours plus petite; ses quatre ailes sont arrondies & entières; l'extrémité des supérieures n'offre que cinq taches blanches de part & d'autre, & elles sont ordinairement aussi distinctes dans le mâle que dans la femelle; les quatre petites taches brunes du sommet des ailes supérieures en dessous sont en croissans, & non en chevrons; la ligne brune antérieure du dessous des secondes ailes est bien moins flexueuse, ou plutôt en forme de V très-ouvert; le premier œil de ces mêmes ailes, à partir d'en haut, est plus gros & plus brillant que le second, tandis que c'est le contraire dans la nymphale *Maia*. Ces différences sont très-minutieuses, sans doute; mais puisqu'elles sont constantes, elles peuvent, ce nous semble, être regardées comme caractéristiques.

Nous avons vu un mâle dont le dessus des premières ailes est absolument sans taches, & dont le dessous en a cinq blanchâtres peu prononcées.

De l'Amérique équinoxiale. — Suivant Cramer, elle se trouveroit à Surinam & au Cap de Bonne-Espérance.

212. Nymphale Macris.

Nymphalis Macris.

Nym. alis subdentatis, supra fuscis (in mare violaceo micantibus) : subtùs anticis ocellis tribus obsoletis, posticis septem.

Elle a environ deux pouces d'envergure. Le dessus du mâle est d'un brun-foncé, avec un reflet violet; le dessus de la femelle d'un brun-cendré & sans reflet. Dans l'un & dans l'autre, l'extrémité des premières ailes est noirâtre, avec cinq points blancs; & le limbe terminal des secondes ailes offre deux lignes noirâtres, dont l'antérieure formée par des points, la postérieure ondulée.

Le dessous des premières ailes est gris à la base, avec trois petites taches noirâtres, rangées obliquement; noirâtre au-delà du milieu, avec cinq points blancs conformes à ceux du dessus; gris au sommet, avec trois points noirs à prunelle bleuâ-

tre ; puis une ligne de quatre chevrons bruns dont la convexité eſt tournée en dehors.

Le deſſous des ſecondes ailes eſt d'un gris légèrement nuancé de violet, avec trois lignes brunes, tranſverſes & très-flexueuſes, dont la première avoiſinant la baſe, les deux autres ſéparées par une ſérie de ſept yeux peu prononcés, & ayant, à l'exception du quatrième qui eſt plus petit, une prunelle bleuâtre ou verdâtre.

Cette eſpèce nous a fourni une variété mâle dont le deſſous des ſecondes ailes eſt d'un brun très-obſcur, excepté à l'angle externe où il y a un grand eſpace jaunâtre, ſemi-circulaire.

Du Bréſil.

213. Nymphale Myrto.

Nymphalis Myrto.

Nym. alis integris, ſuprà fuſcis : ſubtùs anticis baſi immaculatâ, poſticis ocellis quinque obſoletis.

Papilio Monima. Cram. *pl.* 387. *fig.* F. G.

Nous ne connoiſſons de cette eſpèce que l'individu figuré par Cramer ſous le nom de *Monima*.

Il reſſemble en deſſus à la femelle du *Maia*, mais il n'a que cinq taches blanches à l'extrémité des ailes ſupérieures. En deſſous, le fond de ces mêmes ailes eſt d'un gris-rouſſâtre, ſans aucune tache à la baſe, & l'on ne compte que quatre taches blanches au ſommet. Le deſſous des ailes inférieures eſt d'un gris-bleuâtre, avec deux traits, & une tache annulaire, bruns à la baſe, puis deux lignes brunes, flexueuſes, entre leſquelles il y a une rangée tranſverſe de cinq points noirs, cerclés de jaunâtre.

Cramer dit qu'elle habite la côte de Guinée. — Eſt-ce bien ſa patrie ?

N. Bord poſtérieur des quatre ailes arrondi.

214. Nymphale Marſolia.

Nymphalis Marſolia.

Nym. alis integerrimis, ſuprà fuſcis (in mare violaceo micantibus) : ſubtùs anticis punctis baſeos nigricantibus, poſticis ocellis ſeptem obſoletis.

Elle a un peu plus d'un pouce & demi d'envergure. Les deſſus du mâle eſt d'un brun-foncé à reflet violet, ſans taches aux ailes ſupérieures (du moins dans l'individu que nous avons vu), avec une rangée de points & une ligne ondulée noirâtres ſur le bord terminal des inférieures.

Le deſſus de la femelle eſt d'un brun-cendré, avec cinq taches blanches à l'extrémité des premières ailes, un rang de points & une ligne noirâtre à l'extrémité des ſecondes.

Le deſſous des ailes ſupérieures eſt griſâtre à la baſe, avec deux points noirâtres dans le mâle, & trois dans la femelle ; noirâtre au-delà du milieu, avec cinq taches blanches ou blanchâtres, ſuivies d'une ligne tranſverſe de quatre croiſſans bruns, placés ſur un fond griſâtre.

Le deſſous des ſecondes ailes eſt d'un gris plus ou moins clair & légèrement nuancé de violet, avec trois lignes ferrugineuſes très-ſinuées, & dont les deux poſtérieures ſéparées par une ſérie de ſept yeux de leur couleur, & ayant tous, à l'exception de l'anal, une prunelle violâtre.

Du Bréſil.

215. Nymphale Amélie.

Nymphalis Amelia.

Nym. alis integerrimis, ſuprà fuſco-corticinis : anticis apice nigro faſciâ punctiſque albis : poſticis ſubtùs maculis ocellaribus caſtaneis.

Papilio Amelia. Cram. *pl.* 136. *fig.* B. C.

Nous n'avons vu qu'un ſeul échantillon de cette eſpèce, & nous ſoupçonnons que c'eſt une femelle.

Il a près de deux pouces d'envergure. Le deſſus de ſes ailes eſt d'un brun-tanné-obſcur, avec environ la moitié poſtérieure des premières noire & offrant une bande tranſverſe, puis deux points, très-blancs. Le deſſous des ailes ſupérieures eſt griſâtre à la baſe, avec un point noirâtre ; enſuite noir juſqu'au bout, avec une bande & deux points comme en deſſus.

Le deſſous des ailes inférieures eſt d'un brun-violâtre-chatoyant, avec des taches marron, dont les poſtérieures preſqu'oculaires. Outre cela, le bord terminal eſt jaunâtre & diviſé par une ligne obſcure, flexueuſe.

De Surinam.

216. Nymphale Euphémie.

Nymphalis Euphemia.

Nym. alis integris, ſuprà nitidè cyaneis diſco nigro : ſubtùs fuſcis, poſticis ocellis quatuor geminatis.

Papilio Eurota. Cram. *pl.* 24. *fig.* C. D.

Nous ne connoiſſons cette eſpèce que par un ſeul individu, qui paroît être un mâle. Il a près de deux pouces & demi d'envergure. Le deſſus des premières ailes eſt d'un bleu-luiſant, tirant un peu ſur le violet, avec tous les bords, & un grand eſpace ſur le milieu, noirs.

Le deſſus des ſecondes ailes eſt noir depuis la baſe juſqu'au-delà du milieu ; enſuite d'un bleu-luiſant, avec le bord poſtérieur légèrement noir.

Le deſſous des premières ailes eſt d'un brun-pâle, avec le milieu tacheté de noirâtre.

Le deſſous des ailes inférieures eſt du même brun que celui des précédentes, avec trois lignes

obſcures, tranſverſes & ondulées, dont l'antérieure plus courte, les deux autres renfermant quatre yeux noirâtres à prunelle bleuâtre, & rapprochés deux à deux. Le corps & les antennes ſont d'un brun-noirâtre.

Du Bréſil.

217. Nymphale Irénéa.

Nymphalis Irenea.

Nym. alis integerrimis, nigro-fuſcis, ſuprà fuſciâ mediâ albâ : ſubtùs tribus albis, anteriori rufo cinctâ.

Papilio Irenea. Cram. *pl.* 328. *fig.* C. D.

Elle a près de deux pouces d'envergure. Les quatre ailes ſont entières, d'un brun-noirâtre en deſſus, avec une bande blanche diſcoïdale, & deux lignes poſtérieures plus claires que le fond. La bande des ſecondes ailes eſt terminée à l'angle de l'anus par un groupe d'atomes bleuâtres. La bande des premières ailes ne monte pas juſqu'au bord antérieur, mais elle eſt précédée en dehors d'une tache blanche oblongue & faiſant face au ſommet.

Le deſſous offre trois bandes blanches, dont l'antérieure correſpondant à celle du deſſus, mais plus large & renfermée entre deux lignes rouſſes; la poſtérieure maculaire & étroite. Il y a en outre à la baſe des premières ailes une ligne blanche longitudinale, ſurmontée d'une ligne rouſſe également longitudinale.

Nous ignorons ſi les deux ſexes ſe reſſemblent. Celui que nous avons vu paroît être le mâle.

De Surinam.

218. Nymphale Poſtverta.

Nymphalis Poſtverta.

Nym. alis ſubdentatis, maris ſuprà æneo-viridibus, fœminæ fuſcis alboque fuſciatis : poſticis ſubtùs violaceo-albis, ſtrigis ſex ferrugineis ocelliſque duobus.

Papilio N. Poſtverta, *alis dentatis, viridibus, maculis margineque fuſcis : poſticis ſubtùs faſciis albis, ocellis duobus.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 100. *n°.* 311. (Le mâle.)

Papilio Poſtverta. Cram. *pl.* 254. *fig.* C. D. (Le mâle.)

Papilio Poſtverta. Herbst, *tab.* 223. *fig.* 4. 5.

Papilio N. Mylitta, *alis dentatis, nigris, faſciis tribus macularibus albis : poſticis ocellis duobus.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 101. *n°.* 312. (La femelle.)

Papilio Mylitta. Cram. *pl.* 253. *fig.* C. D. (La femelle.)

Papilio Mylitta. Jon. *Fig. pict.* 6. *tab.* 31. *fig.* 3.

Les auteurs ont donné le mâle de cette eſpèce ſous le nom de *Poſtverta*, & la femelle ſous celui de *Mylitta*.

Le mâle, dont l'envergure eſt d'environ un pouce & demi, a le deſſus de toutes les ailes d'un vert-bronzé-luiſant, avec le bord poſtérieur noir. Il y a en outre quatre taches de cette dernière couleur entre le milieu & le ſommet des ailes de devant.

La femelle eſt de la taille du mâle, & elle a le deſſus des ailes d'un brun-noirâtre, avec trois bandes blanches, communes, maculaires aux ſupérieures, continues aux inférieures. Ces dernières ailes offrent contre le côté interne de leur bande poſtérieure, & aſſez loin l'un de l'autre, deux yeux très-noirs à prunelle d'un bleu-métallique.

Le deſſous des premières ailes, dans les deux ſexes, eſt d'un brun-noirâtre, avec huit taches blanches, dont deux obliques & alongées près de la baſe, les autres plus ou moins arrondies, & accompagnées vers la côte de petites litures d'un bleu-brillant.

Le deſſous des ailes inférieures, dans le mâle comme dans la femelle, eſt d'un blanc-violâtre, avec ſix raies ferrugineuſes, tranſverſales, dont la troiſième fourchue, la quatrième plus courte & appuyée ſur deux yeux, la cinquième & la ſixième arquées & parallèles au bord poſtérieur. Les deux yeux dont il vient d'être queſtion ſont noirs, avec l'iris d'un jaune-paille, la prunelle d'un bleu-métallique & de forme ſemi-lunaire. Le corps a le deſſus verdâtre ou noirâtre, ſelon le ſexe, & le deſſous griſâtre. Les antennes ſont noires, annelées de blanc, avec la ſommité de la maſſue jaunâtre.

De la Guyane & du Bréſil.

219. Nymphale Sérina.

Nymphalis Serina.

Nym. alis ſubdentatis, maris ſuprà æneo-viridibus, fœminæ fuſcis alboque maculatis : poſticis ſubtùs albis, faſciis quatuor luteis fuſco marginatis ocelliſque duobus.

Papilio N. Serina, *alis ſubdentatis, ſuprà viridibus : poſticis ſubtùs diſco albo ocellis duobus.* Fab. *Syſt. Ent. p.* 497. *n°.* 232. — *Spec. Inſ. tom.* 2. *p.* 80. *n°.* 352. — *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 43. *n°.* 426. — *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 100. *n°.* 310. (Le mâle.)

Papilio N. Egæa, *alis dentatis, ſuprà nigris, faſciâ communi albâ : poſticis ſubtùs ocellis duobus.* Fab. *Syſt. Ent. p.* 496. *n°.* 231. — *Spec. Inſ. tom.* 2. *p.* 79. *n°.* 351. — *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 43. *n°.* 424. — *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 100. *n°.* 309. (La femelle.)

Les papillons *Serina* & *Egœa* de Fabricius ne ſont qu'une ſeule eſpèce, dont le premier eſt le mâle, & le ſecond la femelle.

Elle a environ un pouce & demi d'envergure. Le

deſſus du mâle eſt comme dans le *Poſtverta*, avec cette différence que les ailes ſupérieures n'ont que trois taches noires vers le ſommet, & que le bord terminal des inférieures eſt entièrement diviſé par une ligne courbe du même vert que le reſte de la ſurface.

Le deſſus de la femelle eſt d'un vert-bronzé à la baſe, puis d'un brun-noirâtre juſqu'au bout, avec cinq taches ſur les ſupérieures, & deux bandes tranſverſes ſur les inférieures, blanches. Les taches des ailes de devant ſont diſpoſées ainſi : 1, 2, 2. La bande antérieure des ailes de derrière eſt droite & diſcoïdale, leur bande poſtérieure moins prononcée & un peu flexueuſe.

Le deſſous eſt le même dans le mâle & dans la femelle. Celui des premières ailes eſt d'un brun-noirâtre-pâle, avec cinq taches blanches, plus quatre litures & une ligne marginale d'un blanc-luiſant. Il y a en outre à l'origine de la côte une tache jaune, longitudinale, & ſe courbant derrière la tache blanche antérieure. Le deſſous des ſecondes ailes eſt blanc, avec quatre bandes jaunes, dont la deuxième marquée de pluſieurs litures, & la poſtérieure d'une ligne, bleues; la troiſième bilobée en arrière, plus courte que les autres, & offrant deux yeux noirs à prunelle orbiculaire d'un bleu-luiſant. Toutes ces bandes ſont bordées de brun-obſcur. Le corps & les antennes ſont comme dans l'eſpèce précédente.

Du Bréſil.

Nota. M. le chevalier de Langſdorff poſſède un mâle & deux femelles plus petits, & qui ſe diſtinguent des individus ordinaires en ce que le jaune de la bande bilobée du deſſous des ſecondes ailes ne forme pas iris autour des deux yeux. Les femelles ne paroiſſent pas avoir eu le deſſus des ailes vert à la baſe. Ces légères différences ſuffiſent-elles pour conſtituer une eſpèce ſéparée?

220. Nymphale Artémiſia.

Nymphalis Artemiſia.

Nym. alis dentatis, nigris : anticis maculis, poſticis faſciâ, albis : poſticis ſubtùs ocellis duobus argenteis. Fab.

Papilio N. *Artemiſia.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 101. *n°.* 313.

Papilio Artemiſia. Jon. *Fig. pict.* 6. *tab.* 32. *fig.* 1.

Si ce lépidoptère n'eſt point une variété femelle de l'eſpèce précédente, il doit être au moins la femelle d'une eſpèce extrêmement voiſine.

Voici ce qu'en dit Fabricius : ſon port eſt le même que celui du *Serina*. Ses quatre ailes ſont noires, avec une tache (des taches ſelon la phraſe ſpécifique) blanche ſur les premières, & une bande de cette couleur ſur les ſecondes.

Le deſſous des ailes de devant reſſemble au deſſus, mais il y a à la baſe une tache jaune, oblongue.

Le deſſous des ailes de derrière eſt blanc, & préſente à la baſe une raie jaune, tranſverſale; au milieu une bande bleue, bordée de noir & ayant des litures argentées; plus bas une bande brune, courte, ſur laquelle ſont deux taches argentées qu'entoure un cercle noir. Le bord poſtérieur eſt jaune, & diviſé par une ligne argentée.

De l'Amérique.

221. Nymphale Johanna.

Nymphalis Johanna.

Nym. alis ſubdentatis, ſuprà æneo-viridibus, anticarum apice fuſco maculis ſex albis : poſticis utrinquè ocellatis.

Nous n'avons vu de cette eſpèce que deux individus qui nous paroiſſent être des femelles.

Ils ont le port & preſque la taille du *Poſtverta*. Le deſſus des premières ailes eſt d'un brun-noirâtre, avec la baſe d'un vert-bronzé; le milieu & l'extrémité chargés de ſix taches blanches, diſpoſées ainſi : 1, 2, 3.

Le deſſus des ſecondes ailes eſt d'un vert-bronzé, avec le bord poſtérieur entièrement noirâtre. Le milieu de la ſurface offre en outre une bande blanchâtre, derrière laquelle il y a une rangée tranſverſe de quatre yeux noirâtres à prunelle verdâtre.

Le deſſous des premières ailes reſſemble au deſſus, mais la baſe eſt jaune, avec des litures d'un blanc-luiſant, & le bord poſtérieur eſt violâtre, avec une ligne obſcure qui deſcend de la côte à l'angle interne.

Le deſſous des ſecondes ailes eſt blanc, avec ſix lignes tranſverſes, dont les trois antérieures d'un brun-rouſſâtre, les trois autres d'un gris-violâtre. La quatrième & la cinquième lignes embraſſent ſix yeux noirs à prunelle d'un bleu-argenté & à iris jaune-paille. Les deux yeux extrêmes, & le troiſième, à partir d'en haut, ſont plus petits que les autres.

Du Bréſil.

222. Nymphale Irma.

Nymphalis Irma.

Nym. alis ſubdentatis, ſuprà æneo-viridibus, anticarum apice fuſco maculis cinereſcentibus : poſticis ſubtùs griſeis, ſtrigis tribus ferrugineis, anteriori bifidâ.

Elle eſt un peu plus petite que le *Poſtverta*. Le deſſus des premières ailes eſt d'un vert-bronzé depuis la baſe juſque vers le milieu; enſuite d'un brun-noirâtre juſqu'au bout, avec cinq taches dont les trois antérieures cendrées & formant une ligne oblique, les deux poſtérieures blanchâtres & plus petites.

Le deſſus des ſecondes ailes eſt d'un vert-bronzé, avec trois lignes noires, courbes, à l'extrémité.

Le deſſous des ailes de devant eſt jaune à la baſe, avec des litures bleues, dont une longitudinale; d'un brun-noirâtre au milieu, avec quatre taches blanches; d'un gris-violâtre au ſommet, avec une ligne tranſverſe & le bord poſtérieur ferrugineux.

Le deſſous des ailes de derrière eſt d'un gris-ſatiné & légèrement teinté de violet, avec trois lignes ferrugineuſes, tranſverſes, dont l'antérieure fortement bifide; les deux autres courbes, parallèles entr'elles & au bord poſtérieur, lequel eſt lui-même entrecoupé de ferrugineux.

Du Bréſil.

Nota. La femelle reſſemble au mâle, du moins autant que nous avons pu en juger par des individus deſſéchés.

223. Nymphale Inès.

Nymphalis Ines.

Nym. alis ſubdentatis, ſuprà æneo-viridibus: anticis utrinquè apice fuſco, albo maculato: poſticis ſubtùs albis, ſtrigis quinque fuſcis.

Nous ne connoiſſons ce lépidoptère que par un individu unique, ſans corps & ſans antennes.

Il a approchant la taille du *Poſtverta*. Le deſſus des premières ailes eſt d'un vert-bronzé à la baſe; enſuite d'un brun-noirâtre, avec cinq taches blanches, diſpoſées ainſi: 2, 2, 1.

Le deſſus des ſecondes ailes eſt d'un vert-bronzé, avec deux taches blanches à l'angle externe, & trois lignes courbes d'un brun-noirâtre à l'extrémité.

Le deſſous des ailes ſupérieures eſt d'un brun-obſcur, avec ſix taches blanches, dont la plus antérieure longitudinale & bordée près de la côte par une ligne jaune que terminent deux litures d'un bleu-argenté.

Le deſſous des ſecondes ailes eſt blanc, avec cinq lignes brunes, tranſverſes, dont la ſeconde & la troiſième, à partir d'en haut, ſe réuniſſant près du bord antérieur de l'aile.

Du Bréſil.

224. Nymphale Cadma.

Nymphalis Cadma.

Nym. alis denticulatis, luteis: anticis utrinquè areâ apicis nigrâ maculis duabus flaveſcentibus: poſticis ſubtùs ocellis duobus cæruleis.

Papilio N. Cadma, *alis dentatis, fulvis: poſticis ſubtùs diſco albo ocellis duobus pupilli didymâ cæruleâ.* Fab. *Syſt. Ent. p.* 497. *n°.* 234. — *Spec. Inſ. tom.* 2. *p.* 80. *n°.* 356. — *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 44. *n°.* 431.

Papilio S. *Cadma.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 241. *n°.* 751.

Papilio Cadmus. Drury, *Inſ. tom.* 2. *pl.* 18. *fig.* 1. 2.

Fabricius avoit d'abord mis cette eſpèce parmi les *Nymphales*, mais il l'a reportée en dernier lieu dans ſa famille des *Satyres*.

Elle a environ un pouce & demi d'envergure. Le deſſus de ſes ailes eſt d'un jaune-fauve. Les ſupérieures, dont les deux ſurfaces ſont à peu près ſemblables, ont vers le bout de la côte un grand eſpace noir, ſur lequel il y a deux taches d'un jaune-pâle; & à l'angle interne un point noir très-gros.

Les ailes inférieures ſont ſans taches en deſſus, ſeulement leur ſommet eſt un peu obſcur. En deſſous, ces mêmes ailes ſont d'un brun-jaunâtre, avec une bande cendrée, tranſverſale & offrant deux yeux bleus, dont l'antérieur à iris brun, le poſtérieur à iris jaune. Le corps eſt noirâtre en deſſus, grisâtre en deſſous. Les antennes ſont noires.

De la Jamaïque, ſelon Drury.

De l'Amérique méridionale, ſelon Fabricius.

225. Nymphale Iſis.

Nymphalis Iſis.

Nym. alis fuſco-nigris: anticis integris, utrinquè maculâ diſci chermeſinâ; poſticis dentatis, ſuprà ſtrigâ marginali albidâ.

Papilio N. Iſis, *alis dentatis: anticis atris, maculâ diſci ſanguineâ: omnibus ſubtùs viridi lineatis.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 124. *n°.* 377.

Papilio Iſis. Jon. *Fig. pict.* 5. *tab.* 34. *fig.* 2.

Papilio Iſis. Donow. *Of an Epit. of the Nat. Hiſt. Inſ. of India, cah.* 9. *pl.* 1. *fig.* 1.

Papilio Iſis. Drury, *Inſ. tom.* 3. *pl.* 7. *fig.* 1. 2.

Nous n'avons vu qu'un ſeul individu de cette eſpèce. Il a environ deux pouces & demi d'envergure. Ses premières ailes ſont entières, noires en deſſus, avec une tache cramoiſie, diſcoïdale, ſinuée, ſe prolongeant en pointe juſqu'à la baſe. Les ſecondes ailes ſont dentées, d'un brun-obſcur, avec une ligne blanchâtre ſur le bord poſtérieur.

Le deſſous des quatre ailes eſt obſcur, avec des lignes verdâtres, longitudinales & peu prononcées. A la tache rouge des premières ailes correſpond une tache ſemblable, mais moins vive.

Du Bréſil.

226. Nymphale Claudine.

Nymphalis Claudina.

Nym. alis ſubdentatis, nigris, ſingularum ſuprà areâ lunari chermeſinâ: poſticis ſubtùs baſi marmoratis, apice ſeptem ocellatis.

Papilio N. Claudia, *alis crenatis, nigris, areâ*

ſanguineâ : poſticis ſubtùs marmoratis, ocellis ſeptem. Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 105. *n°.* 325.

Papilio Claudia. Naturf. 9. *tab.* 2.

Elle a près de trois pouces & demi d'envergure. Le deſſus des ailes eſt noir, avec une tache tranſverſale & ſemi-lunaire d'un rouge-carmin-chatoyant. La tache des premières ailes eſt très-grande & elle s'étend de la baſe à l'angle interne. Celle des ſecondes ailes eſt placée entre le diſque & le milieu du bord poſtérieur qu'elle n'atteint pas.

Le deſſous des ailes ſupérieures diffère du deſſus, en ce que la tache rouge eſt moins vive, qu'elle eſt marquée près de la côte de deux gros points noirs & d'une petite liture jaunâtre; en ce que l'extrémité a deux bandes courbes & obliques, dont l'antérieure cendrée & plus courte, la poſtérieure blanchâtre.

Le deſſous des ailes inférieures eſt noir, & préſente les caractères que voici : à la baſe eſt un eſpace cendré, ponctué de noir, & qu'entoure un anneau jaune, ouvert à ſa partie ſupérieure & ayant le côté interne teinté de rouge; vient enſuite une ligne cendrée, tranſverſe & flexueuſe, laquelle eſt ſuivie d'une rangée marginale de ſept yeux très-noirs à prunelle bleue & à iris jaune. L'œil anal eſt bipupillé. Le corps eſt noir, avec des points blanchâtres ſur la tête, ainſi que ſur le devant du corſelet, & une ligne jaune longitudinale ſur le milieu du ventre.

Du Bréſil.

Nota. L'individu d'après lequel nous avons fait cette deſcription, a vers le milieu de la gouttière des ſecondes ailes une touffe de poils jaunes.

227. Nymphale Pyrame.

Nymphalis Pyramus.

Nym. alis ſubdentatis, nigris (in mare ſuprà violaceo micantibus) : anticis utrinquè faſciâ miniatâ : poſticis ſubtùs irroratis, punctis ocellaribus ſtrigâque marginali cæruleſcentibus.

Papilio Pyramus. Drury, *Inſ. tom.* 3. *pl.* 23. *fig.* 3. 4. (Le mâle.)

Papilio Pyramus. Stoll, *Suppl. à* Cram. *pl.* 32. *fig.* 3 & 3. c.

Elle a un peu plus d'un pouce & demi d'envergure.

Le deſſus du mâle eſt d'un noir-glacé de violet, avec une bande d'un rouge-coquelicot, deſcendant du milieu de la côte des premières ailes juſqu'au niveau du diſque des ſecondes.

Le deſſus de la femelle eſt ſans reflet, & ſa bande rouge, qui eſt d'ailleurs plus étroite, ne ſe prolonge pas ſur les ſecondes ailes.

Le deſſous des ailes ſupérieures, dans les deux ſexes, eſt noir au milieu, avec une bande rouge correſpondant à celle de la ſurface oppoſée; griſâtre à l'extrémité, avec deux points noirs & une ligne ondulée bleuâtre. La baſe eſt auſſi griſâtre.

Le deſſous des ailes inférieures eſt d'un brun-noirâtre, aſpergé de gris, avec deux taches blanchâtres vers la baſe, une rangée de points oculaires & une ligne ondulée bleuâtres à l'extrémité. Vers le ſommet ou angle externe, le fond prend une teinte rouſſâtre qui s'étend plus dans certains individus que dans d'autres. Le bord poſtérieur des quatre ailes eſt entrecoupé de blanc.

Du Bréſil.

228. Nymphale Galanthis.

Nymphalis Galanthis.

Nym. alis integerrimis, nigris : faſciis anticarum duabus, poſticarum unicâ, ſuprà chermeſinis, ſubtùs pallidioribus.

Papilio F. Galanthis, *alis integerrimis, ſuprà atris, ſanguineo faſciatis : anticis punctis duobus apicis albis.* Fab. *Gen. Inſ. Mant.* 257. — *Spec. Inſ. tom.* 2. *p.* 54. *n°.* 238. — *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 27. *n°.* 276. — *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 46. *n°* 142.

Papilio Galanthis. Cram. *pl.* 25. *fig.* D. E.

Papilio Galanthis. Herbst, *pl.* 138. *fig.* 1. 2.

Cette nymphale reſſemble beaucoup en deſſus à celle que nous avons donnée ſous le nom de *Rogerii* (*n°* 73), mais elle en diffère par la forme & par le deſſous des ailes.

Elle a de deux pouces & demi à trois pouces d'envergure. Le deſſus de ſes ailes eſt d'un noir-foncé, avec deux bandes cramoiſies ſur les ſupérieures, & une ſur les inférieures. La bande antérieure des premières ailes occupe tout l'eſpace compris entre la baſe & le milieu de la ſurface; la poſtérieure eſt courbe, & elle ſe dirige obliquement de la côte vers l'extrémité du bord terminal, lequel eſt marqué de deux points blancs vis à vis du ſommet. La bande des ſecondes ailes les traverſe preſqu'entièrement par le milieu.

Le deſſous des quatre ailes offre les mêmes caractères que le deſſus, mais le fond eſt d'un brun ferrugineux, & les bandes rouges, qui ſont beaucoup plus pâles, ont le côté externe largement bordé par une teinte verdâtre.

De Surinam. — Rare dans les collections.

229. Nymphale Sorana.

Nymphalis Sorana.

Nym. alis ſubdentatis, nigris, violaceo micantibus : anticis utrinquè faſciis duabus chermeſinis, anteriore ſuprà communi : poſticis ſubtùs ocellis duobus ſtrigâque valdè angulatâ cæruleſcentibus.

Elle a près de deux pouces & demi d'envergure.

Le deſſus des premières ailes eſt d'un noir glacé de violet, avec deux bandes cramoiſies, tranſverſales, dont l'antérieure ſinuée en dehors, la poſtérieure courbe & plus étroite. Il y a en outre au ſommet une raie jaune, oblique.

Le deſſus des ſecondes ailes eſt auſſi d'un noir glacé de violet, avec une bande cramoiſie, plus ou moins longue, & faiſant ſuite à celle de la baſe des ailes ſupérieures.

Le deſſous de ces dernières ailes reſſemble au deſſus, mais l'origine de la côte eſt jaune, & le bord poſtérieur eſt preſqu'entièrement longé par une ligne bleue.

Le deſſous des ailes inférieures eſt noir, avec un 8 jaune, diſcoïdal, ouvert à ſa partie ſupérieure, & renfermant deux yeux noirs à prunelle & à iris bleus, mais dont le poſtérieur bipupillé. Après ces yeux vient une ligne bleue, très-anguleuſe, & s'appuyant ſur un arc jaune parallèle au bord poſtérieur. La baſe offre en outre un arc ſemblable qui ſe réunit inférieurement au 8 dont nous venons de parler. Les échancrures des quatre ailes ſont blanches, & l'on voit des points de cette couleur ſur la tête & ſur la poitrine. Les antennes ſont tout-à-fait noires.

La femelle eſt comme le mâle, excepté que le deſſus des ailes ſupérieures a la bande rouge moins prononcée, & le reflet violet plus circonſcrit.

Du Bréſil.

230. Nymphale Pithéas.

Nymphalis Pitheas.

Nym. alis integerrimis, nigris : anticis utrinquè faſciis duabus chermeſinis, anteriore ſuprà communi : poſticis ſubtùs diſco pallidè roſeo ocellis duobus pupillâ cæruleſcente.

Erycina Pitheas, *alis integerrimis, rotundatis : anticis penitùs poſticiſque ſuprà nigris ; anticis faſciis duabus miniatis, illarum unâ communi : alarum poſticarum medio infero pallidè roſaceo, lineis tribus circularibus circumſcripto, alterâ flavâ & intermediâ.* Recueil d'obſerv. de zool. & d'anat. comp. par Alex. de Humboldt & A. Bonpland, *vol.* 2. *p.* 90. *pl.* 37. *fig.* 5. 6.

Elle eſt de la taille de la précédente, à laquelle elle reſſemble à peu près par le deſſus des quatre ailes & par le deſſous des ſupérieures.

Le deſſous de ſes ailes inférieures a le milieu d'un roſe-pâle, avec deux taches noires, rondes, aſſez grandes, écartées l'une de l'autre, offrant chacune à leur centre un point bleuâtre. La couleur roſe eſt entourée par du noir que diviſent deux arcs jaunes, dont l'un longeant le bord interne de l'aile, l'autre le bord poſtérieur. Il y a en outre à l'angle de l'anus deux petits traits bleuâtres.

Du Pérou.

231. Nymphale Condomanus.

Nymphalis Condomanus.

Nym. alis integris, violaceo-nigris : anticis utrinquè faſciis duabus chermeſinis, anteriore ſuprà communi : poſticis ſubtùs annulis duobus liturâque mediâ flavis.

Papilio F. Condomanus, *alis integerrimis, atris, ſanguineo faſciatis : poſticis ſubtùs lineis annularibus flavis punctiſque cæruleis.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 53. *n°.* 165.

Papilio Aſtarte. Cram. *pl.* 256. *fig.* C. D.

Quoique Fabricius ne rapporte ſon *Condomanus* à aucune figure, il n'y a point de doute que ce ne ſoit le même que l'*Aſtarte* de Cramer.

Il eſt à peu près de la taille des deux précédens, auxquels il reſſemble beaucoup par le deſſus des quatre ailes & par le deſſous des ſupérieures.

Le deſſous de ſes ailes inférieures eſt noir, avec un anneau jaune, diſcoïdal, ovalaire, renfermant trois points bleus, dont le poſtérieur ſéparé des deux autres par un trait jaune. Après l'anneau ſuſdit vient une ligne bleue maculaire, puis une ligne jaune longeant tout le bord poſtérieur. Il y a une autre ligne jaune vers la baſe, mais elle ne ſe réunit pas à l'anneau du milieu comme dans la nymphale *Sorana*.

L'individu figuré par Cramer a deux points blancs près de l'angle anal des ailes inférieures en deſſus. Ce caractère eſt peut-être propre à la femelle, que nous ne connoiſſons pas, car il n'exiſte dans aucun des mâles qui nous ont paſſé ſous les yeux.

De Surinam & du Bréſil.

232. Nymphale Pygas.

Nymphalis Pygas.

Nym. alis ſubdentatis, nigris : anticis utrinquè areâ lunari chermeſinâ : poſticis ſubtùs annulis tribus ſtrigâque baſilari flavis.

Elle a environ deux pouces d'envergure. Le deſſus des ailes eſt d'un noir un peu chatoyant, avec un eſpace cramoiſi, grand & ſemi-lunaire, ſur le milieu des ſupérieures, leſquelles ont, outre cela, deux points blancs vis-à-vis du ſommet. Les ailes inférieures ont près de l'angle de l'anus une rangée de trois à quatre points d'un bleu-pâle.

Le deſſous des premières ailes ne diffère du deſſus que parce que l'origine de la côte eſt jaune, & qu'il y a à l'extrémité une ligne tranſverſe de cette couleur, puis une ligne bleue qui longe tout le bord.

Le deſſous des ſecondes ailes eſt noir, avec trois cercles jaunes, dont les deux intermédiaires fermés & adhérant l'un à l'autre; l'extérieur très-ouvert près du bord interne de l'aile, & doublé près de la baſe. Le cercle intermédiaire ſupérieur

renferme trois points bleus, & l'inférieur deux. Il y a en outre une ligne bleue, courbe & maculaire, avant le bord terminal. Ce bord eſt liſeré de blanc aux échancrures, ainſi que le bord analogue des premières ailes. Les antennes ſont noires, annelées de blanc en deſſous, avec la ſommité de la maſſue jaunâtre.

Du Bréſil.

Nota. Tous les ſujets que nous avons vus paroiſſoient être des mâles.

233. Nymphale Pyracmon.

Nymphalis Pyracmon.

Nym. alis ſubdentatis, nigris (in mare cyaneo nitidis) : anticis utrinquè faſciâ chermeſinâ, bifidâ : poſticis ſubtùs annulis tribus ſtrigâque baſilari flavis.

Elle eſt un peu plus petite que la précédente. Ses ailes ſont noires en deſſus, avec le milieu des ſupérieures traverſé par une bande cramoiſie & biſide antérieurement; le milieu des inférieures glacé de bleu changeant. Les premières ont un point blanc vis-à-vis du ſommet, & les ſecondes deux points d'un bleu-argentin à l'angle de l'anus.

Dans la femelle, la bande rouge des ailes ſupérieures eſt plus étroite, & le milieu des inférieures eſt tout-à-fait noir; mais en revanche ces dernières offrent vers l'angle anal une ſérie de huit à neuf points d'un bleu-argentin.

Le deſſous des ailes ſupérieures, dans les deux ſexes, reſſemble au deſſus, excepté que l'origine de la côte eſt jaune, & qu'il y a à l'extrémité une ligne tranſverſe de cette couleur, puis une ligne bleue plus longue.

Le deſſous des ſecondes ailes eſt noir, avec trois cercles jaunes, dont les deux intermédiaires adhérant l'un à l'autre; l'extérieur ouvert près du bord interne de l'aile & doublé du côté de la baſe. Le cercle intermédiaire ſupérieur eſt auſſi ouvert près du bord interne, & il ne renferme qu'un point bleu; l'inférieur en contient deux comme dans les eſpèces précédentes : il y a en outre une ligne bleue, courbe & maculaire, avant le bord poſtérieur. Ce bord eſt liſeré de blanc aux échancrures, ainſi que le bord analogue des ailes ſupérieures. Les antennes ne diffèrent point de celles du *Pygas*.

Du Bréſil.

234. Nymphale Hydaſpe.

Nymphalis Hydaſpes.

Nym. alis ſubdentatis, nigris, baſi ſuprà nitidè cyaneâ : anticis utrinquè faſciâ chermeſinâ, abbreviatâ : poſticis ſubtùs annulis duobus flavis punctiſque quatuor ocellaribus.

Papilio E. Hydaſpes, *alis integerrimis, fuſcis, cæruleo micantibus : poſticis ſubtùs flavis, lineis annularibus nigris punctiſque cæruleis* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 54. *n°.* 167.

Papilio Hydaſpes. Drury, *Inſ. tom.* 3. *pl.* 15. *fig.* 2. 3.

Elle eſt auſſi plus petite que le *Pygas*. Ses ailes ſont noires, avec la baſe des quatre glacée de bleu en deſſus, & le milieu des ſupérieures traverſé par une bande cramoiſie qui n'atteint ni la côte, ni le bord interne.

Le deſſous de ces dernières ailes offre un point, & une bande correſpondant à celle du deſſus, rouges; plus deux lignes jaunes, dont l'une couvrant environ la moitié antérieure de la côte, l'autre placée tranſverſalement vis-à-vis du ſommet, & ſuivie parfois d'un point bleuâtre.

Le deſſous des ſecondes ailes a deux cercles jaunes, ouverts, dont l'intérieur offrant trois points blancs & un point jaune entourés de bleu extérieurement. Il y a en outre à l'angle de l'anus trois ou quatre petites taches d'un bleu-métallique. Les échancrures de toutes les ailes ſont blanches, & les antennes entièrement noires.

Nous ignorons en quoi la femelle diffère du mâle.

Du Bréſil.

235. Nymphale Hydarnis.

Nymphalis Hydarnis.

Nym. alis integris, ſuprà nigris, baſi cyaneo nitidis : anticis faſciâ chermeſinâ, abbreviatâ : poſticis ſubtùs annulis quinque maculiſque duabus bipunctatis nigris.

Elle a près de deux pouces d'envergure. Le deſſus des ailes eſt noir, avec la baſe des ſupérieures, & le milieu des inférieures à partir de leur origine, d'un bleu-luiſant, qui devient violet ou verdâtre ſelon les aſpects. Les ailes ſupérieures ont une bande cramoiſie, un peu ſinuée, & ſe dirigeant obliquement du milieu de la côte à l'angle interne. Il y a en outre un point blanc à leur angle externe. Les ſecondes ailes ont ſur le limbe poſtérieur une ligne maculaire d'un bleu-métallique.

Le deſſous des premières ailes eſt d'un rouge-carmin depuis la baſe juſqu'au-delà du milieu; enſuite noir juſqu'au bout, avec deux lignes courbes & tranſverſes, dont l'antérieure plus courte & d'un blanc-jaunâtre, la poſtérieure moins large & d'un blanc-bleuâtre. La baſe offre outre cela deux traits jaunâtres, longitudinaux, dont l'antérieur placé ſur la côte.

Le deſſous des ſecondes ailes eſt gris, avec cinq anneaux noirs, dont deux excentriques, plus petits, & renfermant chacun une tache noire ſur laquelle ſont deux points tantôt gris, tantôt d'un blanc-bleuâtre. Le bord antérieur des mêmes ailes a du rouge vers ſon origine, & la tranche du

du bord postérieur des quatre offre une frange blanche, finement entrecoupée de noir. Les antennes sont de cette dernière couleur, avec le bout de la massue jaunâtre.

Nous n'avons pas vu la femelle.

Du Brésil.

236. Nymphale Clyménus.

Nymphalis Clymenus.

Nym. alis integris, suprà nigris (in mare violaceo mutabili micantibus) : fasciâ, anticarum mediâ, posticarum marginali, inaurato-viridi : posticis subtùs griseis, annulis quinque punctisque quatuor nigris.

Papilio F. Clymenus, *alis integris, fasciâ cyaneâ : subtùs anticis sanguineis; posticis albis, annulis punctisque atris.* Fab. *Spec. Inf. tom.* 2. *p.* 53. *n°.* 232. — *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 26. *n°.* 268. — *Entom. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 43. *n°.* 131.

Papilio Clymena. Cram. *pl.* 24. *fig.* E. F.

Elle est à peu près de la taille de la précédente. Le dessus des ailes est noir, avec un reflet d'un bleu-violet changeant dans le mâle, sans reflet dans la femelle. Les premières ailes des deux sexes ont à la base une ligne longitudinale, au milieu une bande transverse, au sommet une liture oblique, d'un vert qui paroît plus ou moins doré selon le point d'où vient la lumière. Les secondes ailes ont le long du bord terminal une bande d'un vert-doré ou bleuâtre.

Le dessous des ailes supérieures est d'un rouge-carmin depuis son origine jusqu'au-delà du milieu; puis noir jusqu'à l'extrémité, avec quatre lignes grises, dont deux longitudinales à la base, & deux transverses, dont l'antérieure plus courte, au bord postérieur.

Le dessous des ailes inférieures est d'un gris-satiné, avec cinq anneaux noirs, dont trois concentriques & ouverts près de la côte qui est en majeure partie du même rouge que le fond des ailes de devant. Ces cercles renferment deux ovales noirs, séparés ou tangens, & dans chacun desquels il y a deux points également noirs. La tranche du bord terminal de toutes les ailes est blanche & entrecoupée de noir. Le corps est noir en dessus, gris en dessous. Les antennes sont noires, annelées de blanc, avec la sommité de la massue rougeâtre.

De la Guyane & du Brésil.

237. Nymphale Euclide.

Nymphalis Euclides.

Nym. alis integris, suprà nigris (in mare violaceo mutabili micantibus) : fasciâ singularum submediâ inaurato-viridi : posticis subtùs griseis, annulis quinque punctisque tribus nigris.

Erycina Euclides, *alis integerrimis, suprà atris, fasciâ cœruleâ, radios aurato-virides reflectente; alis anticis infrà basin versùs roseo miniatis, in medio nigris, ad apicem superum lucido-griseis lineâque nigrâ notatis; posticis infrà lucido-griseis, ad costam superam miniatis; alâ singulâ lineis fuscis, circulos duos magnos, subconcentricos figurasque totidem subovatas in medio, delineantibus : figurâ superâ punctum unicum, inferâ duo, includentibus.* Recueil d'observat. de zool. & d'anat. comp. par Alex. de Humboldt & A. Bonpland, *vol.* 1. *p.* 240. *pl.* 24. *fig.* 3. 4.

Erycina Euclides. Recueil d'observ. de zool., &c. *vol.* 2. *p.* 131. *pl.* 42. *fig.* 5. 6.

Elle diffère du *Clyménus*, en ce que la bande verte du dessus des secondes ailes est beaucoup plus rapprochée du milieu, en ce que l'ovale supérieur de leur dessous ne renferme qu'un seul point noir au lieu de deux.

Du Pérou.

238. Nymphale Candréna.

Nymphalis Candrena.

Nym. alis integris, suprà nigris (in mare basi violaceo micantibus) : apice anticarum arcu, posticarum fasciâ, inaurato-viridibus : posticis subtùs griseis, annulis sex nigris.

Elle est approchant de la taille des trois précédentes. Le dessus des ailes est noir, avec la base glacée de bleu-violet dans le mâle. Les ailes supérieures ont à leur origine un trait longitudinal, à leur extrémité un chevron transverse & maculaire, d'un vert-doré. Les secondes ailes ont sur le bord postérieur une bande du même vert, mais elle ne monte pas jusqu'à l'angle externe.

Le dessous des ailes de devant est comme dans le *Clyménus*, avec cette différence que les deux lignes grises du bout sont séparées par une liture bleuâtre.

Le dessous des ailes de derrière est d'un gris-satiné, avec six anneaux noirs, dont trois concentriques, & ouverts près de la côte qui est presqu'entièrement rouge; le quatrième ovale; les deux autres ronds, très-petits, adhérens, & placés au-dessous du précédent qu'ils touchent parfois. La tranche du bord postérieur de toutes les ailes, le corps & les antennes ressemblent à peu près aux parties analogues du *Clyménus*.

Du Brésil.

239. Nymphale Oppel.

Nymphalis Oppelii.

Nym. alis integris, suprà nigris : anticarum fasciâ mediâ, posticarum lineâ marginali, inaurato-viridibus : posticis subtùs pallidè ochreaceis, strigis duabus nigris, parallelis.

Erycina Oppelii, *alis suprà atris; anticarum*

medio fasciâ aurato-viridi, transversâ; posticis, margini postico proximè, lineâ cœrulescenti: prioribus infrà nigris; illarum basi & apice, posteriorum paginâ inferâ totâ, pallido-ochreaceis; harum singulâ strigis duabus nigris, parallelis. Recueil d'observat. de zool. & d'anat. comp. par Alex. de Humboldt & A. Bonpland, *vol.* 1. *p.* 237. *pl.* 24. *fig.* 1. 2.

Le dessus des ailes est comme dans le *Clyménus*, mais la bande marginale des inférieures est plus étroite.

Le dessous est d'un jaune d'ocre pâle, avec une bande noire, transverse & très-large, sur le milieu des ailes de devant; avec deux lignes transverses & parallèles de cette couleur sur le milieu des ailes de derrière. Les premières ailes ont en outre tout le bord postérieur noir.

Dédiée à M. Oppel, peintre-naturaliste de S. M. le roi de Bavière.

Bords de la rivière des Amazones.

240. Nymphale Tytius.

Nymphalis Tytius.

Nym. alis integerrimis, fuscis, fasciâ communi albâ: anticarum interruptâ: singulis subtùs punctis baseos ocellaribus nigris.

Papilio F. Tytius, *alis integerrimis, fuscis, albo maculatis: anticis punctis quatuor ocellaribus atris.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 48. *n°.* 147.

Papilio Tytea. Cram. *pl.* 121. *fig.* C. D.

Elle a deux pouces de largeur, & elle est d'un brun-obscur en dessus. Ses premières ailes ont à la base quatre taches noires, cerclées de blanc, & au-delà du milieu une bande blanche, transverse, courbe, interrompue. Ses secondes ailes offrent près de leur origine une tache noirâtre, & à l'extrémité une bande transverse, puis une série de points blancs.

Le dessous ressemble beaucoup au dessus, mais il est plus pâle, & les ailes inférieures ont vers la base plusieurs points noirs, épars, & un peu oculaires.

De Surinam.

241. Nymphale Soronus.

Nymphalis Soronus.

Nym. alis integerrimis, fuscis, maculis plurimis ocellaribus nigris: anticis utrinquè fasciâ lutescente, mediâ.

Papilio Soronus. Cram. *pl.* 353. *fig.* A. B. (Le mâle?)

Papilio Orestes. Cram. *pl.* 282. *fig.* A. B. (La femelle?)

Les papillons *Soronus* & *Orestes* de Cramer forment, ce nous semble, une seule espèce, dont le premier pourroit bien être le mâle, & le second la femelle.

Son envergure est d'environ deux pouces. Le mâle est d'un brun-obscur, avec un grand nombre de points noirs oculaires sur les deux surfaces des ailes inférieures, & vers la base des supérieures. Ces dernières offrent en outre de part & d'autre une bande jaunâtre, transverse, discoïdale, courbe en arrière.

La femelle, ou l'individu que nous prenons pour la femelle, ressemble au mâle, mais elle a le fond des ailes d'un brun-jaunâtre.

De Surinam.

242. Nymphale? Phylacis.

Nymphalis Phylacis.

Nym. alis integerrimis: anticis fuscis, testaceo maculatis: posticis suprà testaceis, subtùs basi albis, utrinquè apice nigro punctatis.

Papilio Phylleus. Cram. *pl.* 63. *fig.* D. E.

Nous ne connoissons cette espèce que par la figure de Cramer.

Elle a environ deux pouces d'envergure. Le dessus des premières ailes est d'un brun-obscur, avec plusieurs lignes transverses, briquetées, dont six à la base, & une plus longue & plus large à l'extrémité. Il y a en outre deux grandes taches de cette couleur sur le milieu. Le dessus des secondes ailes est briqueté, avec la base obscure, & une rangée marginale de points noirs.

Le dessous des ailes supérieures ressemble au dessus, mais il est plus pâle.

Le dessous des ailes inférieures est blanc vers la base, avec trois points noirs; d'un brun-tanné-clair vers l'extrémité, avec une double rangée de gros points noirâtres.

De Surinam.

243. Nymphale Epigia.

Nymphalis Epigia.

Nym. alis integerrimis, concoloribus, nigris: anticis fasciâ abbreviatâ albâ, posticis disco communi rufo.

Papilio Epitus. Cram. *pl.* 270. *fig.* C.

Nous n'avons vu ce lépidoptère qu'en figure.

Il a deux pouces de largeur. Ses quatre ailes sont d'un noir-brun, avec une bande blanche, courte & transverse, sur le milieu des supérieures, & un grand espace roux sur le milieu des inférieures. La couleur rousse dont il vient d'être question s'étend en forme de demi-lune sur le bord interne des premières ailes.

Le dessous ne diffère du dessus que parce qu'il est un peu plus pâle.

De Surinam.

244. Nymphale Laphria.

Nymphalis Laphria.

Nym. alis integerrimis, suprà fuscis, immaculatis : subtùs pallidè fulvis, punctis strigâque communi nigricantibus.

Papilio Lamis. Cram. *pl.* 238. *fig.* E. (La femelle.)

Elle a de un pouce & demi à deux pouces d'envergure. Le deſſus des quatre ailes eſt d'un brun-obſcur, ſans aucune tache.

Le deſſous eſt d'un fauve-pâle, avec une ligne noirâtre, droite & tranſverſe, ſur le milieu, & une ligne ondulée, légèrement ferrugineuſe, en avant du bord poſtérieur. Ces deux lignes ſont ſéparées dans le ſens de leur longueur par une ſérie de points noirâtres, & il y a trois points ſemblables à la baſe de chaque aile.

Le mâle a les ailes ſupérieures un peu moins arrondies que la femelle. C'eſt la ſeule différence qu'il y ait entre l'un & l'autre.

De la Guyane & du Bréſil.

245. Nymphale Aréthuſus.

Nymphalis Arethuſus.

Nym. alis integris, suprà nitidè atris, virescenti-cœruleo multimaculatis : posticis subtùs punctis baseos angulique ani rubris. (Feminæ alis prioribus fusciâ albâ haud repandâ.)

Papilio F. Arethuſus, *alis integerrimis, atris, cœruleo maculatis : posticis subtùs punctis sanguineis.* Fab. *Spec. Inſ. tom.* 2. *p.* 53. *n°.* 231. — *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 25. *n°.* 266. — *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 42. *n°.* 130. (Le mâle.)

Papilio Arethuſa. Cram. *pl.* 77. *fig.* E. F. (Le mâle.)

Papilio Laodamia. Cram. *pl.* 130. *fig.* A. (La femelle.)

Papilio Arethuſa. Drury, *Inſ. tom.* 3. *pl.* 8. *fig.* 1. 2.

Papilio Arethuſus. Herbst, *Pap. tab.* 140. *fig.* 5. 6. (Le mâle.)

Papilio Laodamia. Herbst, *Pap. tab.* 141. *fig.* 3. (La femelle.)

Fabricius n'a décrit que le mâle de ce lépidoptère. Cramer & Herbſt ont connu les deux ſexes, mais ils ont fait de la femelle une eſpèce ſéparée ſous le nom de *Laodamia.*

Il a environ trois pouces d'envergure. Le deſſus des quatre ailes eſt d'un noir-foncé, chatoyant, avec une multitude de taches d'un bleu-verdâtre. La femelle, ou le *Laodamia* des auteurs mentionnés ci-deſſus, a en outre ſur les deux ſurfaces des ailes de devant une bande blanche, non ſinuée, & ſe dirigeant du milieu de la côte à l'angle interne, près duquel elle finit en pointe.

Le deſſous de toutes les ailes eſt d'un brun-verdâtre-luiſant. Celui des inférieures offre dix taches rouges, dont trois à la baſe, deux ſur le bord interne, & cinq ſur le bord poſtérieur vers l'angle de l'anus. Dans le mâle, les ailes ſupérieures ſont ſans bande blanche, mais, en place de cette bande, on voit une ligne bleue, oblique & interrompue, qu'environne un reflet d'un bleu beaucoup plus intenſe. Le corps a le deſſus noir & entièrement tacheté comme les ailes ; le deſſous brun, avec des marques rouges ſur la poitrine.

Nota. Il eſt des mâles dont le deſſous des ſecondes ailes eſt ſans taches rouges au bord interne.

De l'Amérique méridionale.

246. Nymphale Amphinome.

Nymphalis Amphinome.

Nym. alis subdentatis, suprà nigris, caracteribus cœruleo-virescentibus : anticis utrinquè fusciâ albâ repandâ : posticis subtùs rubro radiatis.

Papilio N. Amphinome, *alis dentatis, nigris, cœruleo nebulosis : primoribus fusciâ utrinquè albâ ; posticis rubro radiatis.* Linn. *Syſt. Nat.* 2. *p.* 779. *n°.* 176.

Papilio N. *Amphinome.* Fab. *Syſt. ent. p.* 508. *n°.* 276. — *Spec. Inſ. tom.* 2. *p.* 97. *n°.* 427. — *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 53. *n°.* 520. — *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 131. *n°.* 404.

Roes. *Inſ. tom.* 1. *tab.* 10. *fig.* 1. 2.

Merian, *Surin. Inſ. tab.* 8.

Klem. *Inſ. tom.* 1. *tab.* 10. *fig.* 1. 2.

Papilio Amphinome. Cram. *pl.* 54. *fig.* E. F.

Papilio Amphinomus. Herbst, *Pap. tab.* 141. *fig.* 1. 2.

Le Papier marbré de la Chine. Daubenton, *pl. enlum.* 92. *fig.* 7. 8.

Elle a de trois pouces à trois pouces & demi d'envergure. Le deſſus des quatre ailes eſt d'un noir-chatoyant, avec une multitude de taches d'un vert-bleuâtre ou légèrement doré, en forme d'hiéroglyphes, mais dont les pénultièmes des ſecondes ailes repréſentant une ſuite d'yeux ovalaires. Les premières ailes des deux ſexes ont une bande blanche, ſinuée, large, coupée par les nervures, atteignant le milieu de la côte & l'angle interne. Il y a en outre un point blanc entre cette bande & le ſommet.

Le deſſous de ces ailes eſt brun à la baſe, avec une tache rouge, triangulaire & longitudinale ; enſuite d'un noir-verdâtre juſqu'au bout, avec

une bande blanche, femblable à celle du deſſus, & ſuivie de deux rangées de points blanchâtres, dont les extérieurs marginaux.

Le deſſous des ſecondes ailes eſt d'un noir-verdâtre, avec des rayons rouges ſur la majeure partie de la ſurface, & des points d'un vert-blanchâtre à l'extrémité. Les échancrures des quatre ailes ſont liſerées de blanc de part & d'autre. Le corps eſt noir en deſſus & entièrement tacheté de vert-bleuâtre; il eſt gris en deſſous, avec la poitrine rougeâtre. Les antennes ſont noires.

La chenille, d'après Merian, reſſemble par la forme à celle de pluſieurs Morphos. Son corps eſt d'un vert-tendre, avec des raies longitudinales, alternativement jaunes & bleues, & les ſix pattes antérieures noirâtres. Sa tête eſt d'un jaune-obſcur, armée de huit épines inégales qui ſemblent former une couronne. Son anus ſe termine par une longue fourche. Elle vit ſur le *jaſminum indicum*.

La chryſalide eſt jaunâtre, alongée, bifide antérieurement, avec le dos épineux.

De l'Amérique méridionale.

Nota. Il eſt des individus mâles qui, au lieu d'avoir des rayons rouges ſur le deſſous des ſecondes ailes, n'ont que des taches de cette couleur à la baſe & vers l'angle anal deſdites ailes. Les rayons ſe ſont oblitérés en paſſant au brun-pâle.

247. Nymphale Féronia.

Nymphalis Feronia.

Nym. alis ſubdentatis, ſuprà fuſcis, caracteribus cœruleſcentibus ſtrigâque ocellorum iride ſimplici.

Papilio N. Feronia, *alis dentatis, ſuprà cœruleo fuſcoque undulatis : omnibus ocellis fex.* Linn. *Syſt. Nat.* 2. *p.* 770. *n°.* 140. — *Muſ. Lud. Ulr. p.* 283. *n°.* 101.

Papilio N. Feronia, *alis dentatis, ſuprà cœruleo, fuſco alboque marmoratis : omnibus ocellis fex.* Fab. *Syſt. Ent. p.* 491. *n°.* 210. — *Spec. Inſ. tom.* 2. *p.* 71. *n°.* 318. — *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 36. *n°.* 372.

Papilio S. *Feronia.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 226. *n°.* 710.

Papilio Feronia. Clerck, *Icon. tab.* 31. *fig.* 1. 2.

Papilio Feronia. Cram. *pl.* 192. *fig.* E. F.

Papilio Feronia. Drury, *Inſ. tom.* 1. *pl.* 10. *fig.* 1. 2.

Papilio Feronia. Herbst, *Pap. tab.* 225. *fig.* 1. 2.

Seba, *Muſ.* 4. *tab.* 38. *fig.* 10. 11.

Elle a le port & à peu près la taille de l'*Amphinome*. Le deſſus de ſes quatre ailes eſt d'un brun-noirâtre, avec une multitude d'hiéroglyphes bleuâtres, parmi leſquels il y a parallèlement au bord poſtérieur une rangée d'yeux ronds, entièrement bruns, avec la prunelle blanche, l'iris ſimple & d'un bleu pâle. Les ailes ſupérieures ont vers le milieu de la côte un *ſigma* rougeâtre, & entre ce ſigma & la rangée d'yeux, une douzaine de taches griſâtres, éparſes & aſſez grandes.

Le deſſous de ces ailes eſt d'un gris-luiſant à ſon origine, avec un *ſigma* pareil à celui du deſſus; enſuite noir juſqu'au bout & parſemé de taches blanches, inégales.

Le deſſous des ſecondes ailes eſt d'un gris-verdâtre-luiſant, avec quelques traits noirs ſur le milieu, & une rangée de gros points blancs cerclés de noir, en avant du bord terminal. Ce bord eſt noir, & marqué à chaque échancrure d'une lunule blanche. Le corps a le deſſus coloré & tacheté comme les ailes, & le deſſous gris. Les antennes ſont noires.

La femelle reſſemble au mâle.

Nous avons vu, dans la collection de M. le chevalier de Langſdorff, deux individus mâles chez leſquels toute la couleur griſe du deſſous des ſecondes ailes eſt remplacée par du jaune d'ocre foncé. Cette variété n'eſt pas commune.

De l'Amérique méridionale, & non des Indes orientales, comme le dit Fabricius.

Nota. Dans l'Entomologie ſyſtématique de Fabricius, l'*Arethuſus* eſt placé parmi les Danaïdes bigarrées, l'*Amphinome* parmi les Nymphales, & le *Feronia* parmi les Satyres; en ſorte qu'il faut aller du n°. 130 au n°. 710 de cet ouvrage pour trouver trois eſpèces qui appartiennent certainement au même genre, & qui doivent ſe ſuivre en raiſon de l'analogie des couleurs.

248. Nymphale Férentina.

Nymphalis Ferentina.

Nym. alis ſubdentatis, ſuprà fuſcis, caracteribus obſoletè cœruleſcentibus ſtrigâque ocellorum iride duplici. (*Poſticarum ocellis* 4°. *&* 5°. *in mare lunulâ rufâ notatis.*)

Papilio Feronia, var. Cram. *pl.* 362. *fig.* A. B.

Ce qui diſtingue ſurtout ce lépidoptère du précédent, c'eſt qu'il a le deſſus d'un brun plus obſcur, avec les hiéroglyphes moins prononcés & d'un bleu plus pâle; c'eſt que les yeux des ſecondes ailes ont tous un iris double, & que le quatrième & le cinquième d'entr'eux ſont marqués dans les mâles d'une lunule rouſſe qui eſt viſible de part & d'autre.

Dans la femelle, le deſſous des mêmes ailes offre ſur le limbe poſtérieur un cordon de taches ferrugineuſes.

Cramer le dit des Indes orientales, mais ſa patrie eſt la même que celle du *Feronia*.

249. Nymphale Chloé.

Nymphalis Chloe.

Nym. alis repando-dentatis, suprà virescenti-cœruleis nigroque multimaculatis : omnibus utrinque maculis baseos ferrugineis.

Papilio Chloe. Stoll, *Suppl. à* Cram. *pl.* 5. *fig.* 1. *&* 1. A.

Elle a environ deux pouces & demi d'envergure. Le dessus des ailes est d'un bleu-ardoisé, avec une multitude de taches noires, parmi lesquelles il y en a trois à la base des supérieures, & deux à celle des inférieures, dont le milieu est ferrugineux. On voit en outre, vers le bout de chaque aile, une rangée de quatre à cinq yeux ayant pour la plupart une petite prunelle blanche. Les yeux des ailes de devant sont accompagnés de taches grisâtres plus ou moins prononcées.

Le dessous de toutes les ailes est d'un brun-cendré-luisant, avec des taches ferrugineuses à la base, des yeux & des taches blanches à l'extrémité. Le corps a le dessus noirâtre & tacheté de bleu, le dessous tout gris. Les antennes sont noires, avec des anneaux blancs.

De l'Amérique méridionale.

O. Ailes oblongues ou alongées dans le sens du diamètre du corps.

250. Nymphale Eulimène.

Nymphalis Eulimene.

Nym. alis dentatis, nigro-fuscis, suprà fasciis tribus fulvis : posticis subtùs fasciis sex margineque carneo-albidis.

L'individu que nous décrivons est une femelle qui a près de quatre pouces d'envergure.

Le dessus de ses ailes est d'un brun-noirâtre, avec trois bandes fauves, communes, dont la postérieure moins large & moins vive. La base des premières ailes offre en outre une bande fauve, longitudinale, & marquée vers son milieu d'un O noir derrière lequel il y a une échancrure presqu'en forme d'Y.

Le dessous de ces mêmes ailes ressemble au dessus, mais les bandes y sont d'une teinte incarnate.

Le dessous des secondes ailes a sept bandes d'un blanc-incarnat, & dont la troisième plus la quatrième très-étroites, la postérieure marginale. Le corps est brun, avec des anneaux blanchâtres. Les antennes sont noirâtres en dessus, ferrugineuses en dessous.

Sa patrie nous est inconnue, mais nous soupçonnons qu'elle vient d'une des îles Moluques.

251. Nymphale Nesté.

Nymphalis Neste.

Nym. alis dentatis, suprà nigro-fuscis, subtùs virescentibus : utrinquè fasciis tribus maris luteis, fœminæ albidis.

Papilio Neste. Cram. *pl.* 256. *fig.* E. F. (Le mâle.)

Elle a un peu plus de deux pouces d'envergure. Le dessus des ailes est d'un brun-noirâtre, avec trois bandes d'un jaune-fauve dans le mâle, d'un blanc-obscur dans la femelle. Deux de ces bandes sont communes aux quatre ailes, mais l'antérieure des premières ailes est longitudinale, lancéolée, & elle atteint d'une part la base de l'aile, de l'autre la bande suivante qui a le milieu interrompu.

Le dessous de toutes les ailes est d'un brun-verdâtre, avec des bandes comme en dessus, mais moins foncées. Les ailes inférieures ont de plus deux lignes transversales, dont l'antérieure blanche & voisine de la base ; l'autre d'un ferrugineux-obscur & placée entre les deux bandes du milieu. Le corps est tout-à-fait gris en dessous ; noirâtre en dessus, avec un duvet verdâtre sur le corselet, & un anneau jaune ou blanc à la base de l'abdomen. Les antennes sont noirâtres, avec tout le dessous ferrugineux.

De l'île de Java.

252. Nymphale Héliodore.

Nymphalis Heliodore.

Nym. alis subintegris, concoloribus, nigro-fuscis, fasciis tribus luteis.

Papilio N. Heliodore, *alis dentatis, fulvis, fasciis tribus nigris.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 130. *n°.* 401.

Elle est un peu plus petite que le *Nesté*, au mâle duquel elle ressemble en dessus.

Le dessous de ses ailes offre le même dessin que le dessus., mais les inférieures ont de l'origine de la côte jaunâtre.

De l'île de Java & du royaume de Siam.

253. Nymphale Hordonia.

Nymphalis Hordonia.

Nym. alis subintegris, suprà nigro-fuscis, fasciis tribus luteis : subtùs flavescentibus ferrugineoque irroratis.

Papilio Hordonia. Stoll, *Suppl. à* Cram. *pl.* 33. *fig.* 4. *&* 4. D.

Elle est de la taille de la précédente, à laquelle elle ressemble en dessus, ainsi qu'au mâle du *Nesté*. Le dessous de ses ailes est jaunâtre, & plus ou moins parsemé d'atomes d'un ferrugineux-obscur.

Stoll dit, mais d'après des renseignemens inexacts, qu'elle se trouve en Guinée. Sa véritable patrie est le Bengale, où elle a été prise par Macé.

254. Nymphale Frobénia.

Nymphalis Frobenia.

Nym. alis subdentatis, concoloribus, nigro-fuscis, fasciâ fulvâ posticâ : anticarum è maculis tribus.

Papilio N. Frobenia, *alis repandis, fuscis, fasciâ communi fulvâ : anticarum interruptâ.* Fab. *Suppl. Ent. Syst. em. tom.* 5. *p.* 425. *n°.* 400-1.

Elle a près de deux pouces d'envergure. Le dessus des ailes est d'un brun-noirâtre, avec une bande fauve, postérieure, transverse, & suivie d'une ligne cendrée pareillement transverse. La bande des ailes de devant se compose de trois taches. Celle des ailes de derrière est continue.

Le dessous ne diffère du dessus que parce qu'il est généralement plus pâle, & parce que la ligne cendrée qui avoisine le bord postérieur est renfermée entre deux lignes flexueuses de sa couleur. Le corps est obscur & sans tache. Les antennes sont noirâtres en dessus, ferrugineuses en dessous.

Dans le mâle, le dessous des premières ailes offre vers l'origine du bord interne un espace d'un blanc d'étain-luisant.

De l'Ile-de-France.

255. Nymphale de l'Erable.

Nymphalis Aceris.

Nym. alis dentatis, supra fusco-nigris, subtùs fulvis, fasciis tribus maculariibus albis : anticarum fasciâ baseos longitudinali, lanceolatâ.

Papilio N. Aceris, *alis dentatis, albo fasciatis, supra nigris, subtùs fulvis.* Fab. *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 52. *n°.* 52. *n°.* 514.

Papilio S. *Aceris.* Fab. *Ent Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 245. *n°.* 763.

Papilio Aceris. Esp. *Pap. part.* 1. *tab.* 81. *cont.* 31. *fig.* 3. 4.

Papilio Aceris. Herbst, *Pap. tab.* 235. *fig.* 5. 6.

Papilio Leucothoe. Herbst, *Pap. tab.* 239. *fig.* 5. 6.

Papilio Columella. Herbst, *Pap. tab.* 240. *fig.* 1. 2.

Papilio Aceris. Borkh. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 27. *n°.* 23. — *p.* 211. *n°.* 22.

Papilio Aceris. Schneid. *Syst. Beschr. p.* 148. *n°.* 78.

Papilio Aceris. Lang. *Verz.* 2. *p.* 31. *n°.* 224. 225.

Papilio Aceris. Ochsenh. *Pap. Eur. tom.* 1. *p.* 156. *n°.* 1.

Papilio Aceris tartarici. Lepchin, *Tageb.* 1. *p.* 203. *tab.* 17. *fig.* 5. 6.

Papilio Leucothoe. Cram. *pl.* 296. *fig.* E. F.

Papilio Columella. Cram. *pl.* 296. *fig.* A. B.

Papilio H. *Sapho.* Pallas, *V. part.* 1. *n°.* 62.

Papilio Leucothoe. Pill. & Mitterb. *Iter, &c. p.* 41. *tab.* 5. *fig.* 3. 4.

Papilio Plautilla. Hubn. *Pap. tab.* 21. *fig.* 99. 100. (Mas.)

Illig. *Magaz. tom.* 3. *p.* 201.

Le Silvain à deux bandes blanches. Engram. *Pap. d'Europe, tom.* 1. *p.* 315. *pl.* 2. 3^e. *Suppl. fig.* 12. a-d. *tert.*

Son envergure est de deux pouces à deux pouces & demi. Le dessus des ailes est d'un noir-brun, avec trois bandes blanches, maculaires, dont la postérieure très-étroite. La bande de l'origine des premières ailes est longitudinale, & elle consiste en deux taches triangulaires, opposées par leur base.

En dessous, où le fond est d'un fauve-ferrugineux, on retrouve à chaque aile les caractères que nous venons d'indiquer. Indépendamment de cela, les inférieures ont trois lignes blanches, transverses, savoir : deux très-courtes à la base même; la troisième derrière la bande antérieure. Les échancrures du bord terminal de toutes les ailes sont blanches de part & d'autre. Le corps est brun en dessus, gris en dessous. Les antennes sont noires, avec le bout de la massue jaunâtre.

La femelle ressemble au mâle, seulement elle est plus grande.

Elle se trouve depuis les îles de la Sonde jusqu'en Autriche inclusivement.

Les individus des Indes orientales sont, comme le dit fort bien Fabricius, plus grands que ceux d'Europe.

256. Nymphale Leucothoé.

Nymphalis Leucothoe.

Nym. alis dentatis, supra fusco-nigris, subtùs fulvis, utrinquè fasciis tribus maculariibus albis : posticarum fasciâ intermediâ punctis nigris antrorsum fœtâ.

Papilio N. Leucothoe, *alis dentatis, supra fuscis, subtùs luteis, fasciis tribus maculariibus albis nigro notatis.* Linn. *Syst. Nat.* 2. *edit.* 12. *p.* 780. *n°.* 179. — *Mus. Lud. Ulr. p.* 292.

β. *Papilio* N. Hylas, *alis dentatis, supra fuscis, subtùs lutescentibus : fasciis utrinquè tribus albis, interruptis.* Linn. *Syst. Nat.* 2. *edit.* 10. *p.* 486. *n°.* 173.

Papilio N. Leucothoe, *alis dentatis, supra fuscis, fasciis tribus albis : subtùs luteis, fasciis*

tribus albo notatis. Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 129. *n°* 595.

Papilio Leucothoe. Sulz. *Inf. edit.* Roem. *tab.* 18. *fig.* 2. 3.

Papilio Erosine. Cram. *pl.* 203. *fig.* E. F.

Papilio Erosine. Herbst, *Pap. tab.* 240. *fig.* 5. 6.

Daubenton, *pl. enlum.* 91. *fig.* 3. 4.

Elle a un peu plus de deux pouces & demi d'envergure. Le deſſus des ailes eſt d'un noir-brun, avec trois bandes blanches, maculaires, dont l'antérieure plus large; l'intermédiaire chargée ſur le côté interne d'une ſérie de points très-noirs; la poſtérieure marginale & compoſée de petits croiſſans. Il y a en outre, à la baſe des premières ailes, une bande longitudinale, conſiſtant en une tache triangulaire & en trois gros points blancs.

Le deſſous de toutes les ailes eſt fauve, ou d'un jaune-rouſſâtre, avec des bandes ſemblables à celles du deſſus; mais la bande antérieure & celle de l'extrémité ſont bordées de noir, la première ſur chaque côté, l'autre en dehors ſeulement: les taches qui compoſent la bande longitudinale de la baſe des premières ailes ſont auſſi bordées de noir. Le corps eſt d'un brun-noirâtre, avec des taches blanches ſur le corſelet, & une à la baſe de l'addomen. Les antennes ſont noires en deſſus, ferrugineuſes en deſſous.

De la Chine, du Bengale & de l'île de Java.

Nota. Linnæus, dans la dixième édition de ſon *Syſtema naturæ*, rapporte cette eſpèce à notre *Hylé* ou *Hylas* de Clerck. Une telle erreur eſt vraiment inconcevable.

257. Nymphale Strophia.

Nymphalis Strophia.

Nym. alis dentatis, utrinquè fuſco-nigris, faſciis tribus maculariibus albis: poſticis ſubtùs baſi diſcoque punctis atris.

Papilio Sulpitia. Cram. *pl.* 214. *fig.* E. F.

Papilio Sulpitia. Herbst, *Pap. tab.* 240. *fig.* 3. 4.

Elle eſt un peu plus grande que la précédente. Le deſſus des ailes eſt d'un noir-brun, avec trois bandes blanches, communes & maculaires, dont la poſtérieure très-étroite & moins diſtincte. Il y a en outre à l'origine des premières ailes une bande blanche, longitudinale, formée de deux taches dont l'antérieure plus grande & lancéolée.

Le deſſous de ces ailes eſt à peu près comme le deſſus.

Le deſſous des ſecondes ailes eſt blanc à la baſe, avec des points d'un noir-foncé; enſuite d'un brun-noirâtre, avec trois bandes blanches, communes & tranſverſales. Les deux bandes antérieures ſont ſéparées par un rang de points très-noirs dont l'empreinte s'aperçoit ſur la ſurface oppoſée.

De la Chine.

258. Nymphale Hélicopis.

Nymphalis Helicopis.

Nym. alis dentatis, utrinquè fuſco-nigris, ſuprà faſciis duabus macularibus albis, ſubtùs quatuor: anticarum baſi punctis duobus albis.

Papilio Heliodore. Cram. *pl.* 212. *fig.* E. F.

Papilio Heliodorus. Herbst, *Pap. tab.* 241. *fig.* 1. 2.

Seba, *Muſ. tom.* 4. *tab.* 16. *fig.* 3. 4. 8. 9.

Elle eſt de la taille de la précédente. Le deſſus de ſes ailes eſt d'un noir-brun, avec deux bandes blanches, maculaires, dont l'antérieure large & diſcoïdale, la poſtérieure très-étroite & parfois moins-prononcée. Il y a en outre deux points blancs, alignés longitudinalement, entre la bande antérieure & la baſe des premières ailes.

Le deſſous diffère du deſſus, en ce que le bord terminal offre trois raies ou bandes blanches maculaires, au lieu d'une ſeule.

De l'île d'Amboine.

259. Nymphale Lucille.

Nymphalis Lucilla.

Nym. alis ſubdentatis, ſuprà fuſco-nigris, ſubtùs ferrugineis, utrinquè faſciâ alba, mediâ, maculari: anticarum baſi lineâ longitudinali punctorum alborum.

Papilio N. Lucilla, *alis dentatis, ſuprà fuſcis, ſubtùs brunneis: utrinquè faſciâ maculari albâ.* Fab. *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 55. *n°.* 549.

Papilio S. *Lucilla.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 246. *n°.* 768.

Papilio Lucilla. Wien. *Verz. p.* 173. *fam.* H. *n°.* 4.

Papilio Lucilla. Hubn. *Pap. tab.* 21. *fig.* 101. 102. (Mas.)

Hubn. *Beitr. tom.* 2. *part.* 1. *tab.* 2. *fig.* F. 1. 2.

Papilio Lucilla. Illig. N. *Aufg. Deſſ. tom.* 2. *p.* 213. *n°.* 4.

Illig. *Magaz. tom.* 3. *p.* 197.

Papilio Lucilla. Herbst, *Pap. tab.* 235. *fig.* 3. 4.

Papilio Cœnobitus. Herbst, *Pap. tab.* 239. *fig.* 3. 4.

Papilio Lucilla. Schrank, *Faun. Boïc. tom.* 3. *p.* 191. *n°.* 1529.

Papilio Lucilla. Pill. & Mitterb. *Iter, &c. p.* 40. *tab.* 5. *fig.* 5. 6.

Papilio Lucilla. Ochsenh. *Pap. Eur. tom.* 1.

Papilio Camilla. Esp. *Pap. part.* 1. *tab.* 59. *cont.* 9. *fig.* 1.

Papilio Camilla. Borkh. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 26. *n°.* 22. — *p.* 211. *n°.* 21.

Papilio Camilla. Schneid. *Syst. Beschr. p.* 147. *n°.* 77.

Papilio Cœnobita. Cram. *pl.* 296. *fig.* C. D.

Le Silvain cœnobite. Engram. *Pap. d'Europe, tom.* 1. *p.* 29. *pl.* 10. *fig.* 12. a. b.

Elle a environ deux pouces d'envergure. Ses ailes sont foiblement dentées. Leur dessus est d'un brun-noirâtre; leur dessous est d'un ferrugineux foncé, avec une bande blanche, commune & maculaire sur le milieu de chaque surface. La base des premières ailes offre en outre une ligne longitudinale de points blancs. Cette couleur est aussi celle des petites échancrures du bord terminal. Le corps est brun en dessus, gris en dessous. Les antennes sont noires, avec le bout de la massue roux.

Sud de la Russie, Autriche, Hongrie, Styrie, Dalmatie.

N. B. Le dessous des ailes varie quelquefois, en ce que la ligne ponctuée de la base des supérieures est double; en ce que les inférieures ont un peu de blanc vers leur origine; enfin, en ce qu'il y a parallèlement au bord postérieur des quatre deux lignes blanchâtres, maculaires, plus ou moins prononcées.

260. Nymphale Mélicerta.

Nymphalis Melicerta.

Nym. alis denticulatis, utrinquè fusco-nigris, fasciâ latâ strigisque albis: anticarum basi punctis albis, sparsis.

Papilio N. Melicerta, *alis dentatis, concoloribus, atris, albo punctatis fasciâque communi albâ: anticarum interruptâ.* Fab. *Syst. Ent. p.* 508. *n°.* 274. — *Spec. Inst. tom.* 2. *p.* 96. *n°.* 423. — *Mant. Inst. tom.* 2. *p.* 52. *n°.* 513.

Papilio S. *Melicerta.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 244. *n°.* 762.

Papilio Agatha. Cram. *pl.* 327. *fig.* A. B.

Papilio Agatha. Herbst, *Pap. tab.* 238. *fig.* 7. 8.

Elle a environ deux pouces d'envergure. Le dessus des ailes est d'un noir-brun, avec une large bande blanche sur le milieu, & quatre lignes blanchâtres sur le limbe postérieur. La bande est crénelée en dehors, & interrompue seulement vers le bord interne des premières ailes. Celles-ci ont à la base plusieurs points blancs, épars.

Le dessous ressemble au dessus, mais la naissance des ailes inférieures est rayonnée de blanc. Les petites échancrures des quatre ailes sont très-blanches de part & d'autre.

De Sierra-Leone en Afrique.

261. Nymphale Mélinoé.

Nymphalis Melinoe.

Nym. alis denticulatis, utrinquè fusco-nigris, fasciâ latâ strigisque albis: anticarum basi maculâ cuneiformi punctoque albis.

Papilio Melicerta. Drury, *Inst. tom.* 2. *pl.* 19. *fig.* 3. 4.

Papilio Melicertus. Herbst, *Pap. tab.* 238. *fig.* 5. 6.

Papilio Blandina. Cram. *pl.* 237. *fig.* E. F.

Elle diffère du *Melicerta* en ce que les premières ailes ont la bande beaucoup plus divisée, & les points blancs de la base remplacés par une tache cunéiforme & par un point de leur couleur.

De Sierra-Leone.

Nota. Ne seroit-ce pas plutôt une variété du *Melicerta* qu'une espèce distincte? On ne peut rien décider quand l'on n'a vu qu'un seul individu, à plus forte raison lorsqu'il est en mauvais état.

262. Nymphale Ophione.

Nymphalis Ophione.

Nym. alis denticulatis, utrinquè fuscis, fasciâ latâ strigisque albis: subtùs maculis ocellaribus atris.

Papilio N. Ophione, *alis dentatis, fuscis, albo maculatis: subtùs maculis ocellaribus atris, numerosis.* Fab. *Spec. Inst. tom.* 2. *p.* 97. *n°.* 425. — *Mant. Inst. tom.* 2. *p.* 53. *n°.* 518. — *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 131. *n°.* 402.

Papilio Ophione. Cram. *pl.* 114. *fig.* E. F.

Papilio Valentina? Cram. *pl.* 237. *fig.* C. D.

Papilio Ophione. Herbst, *Pap. tab.* 238. *fig.* 1. 2.

Papilio Valentinus? Herbst, *Pap. tab.* 238. *fig.* 3-4.

Elle a aussi de grands rapports avec le *Melicerta.* Néanmoins elle s'en distingue en ce que la bande des premières ailes est plus divisée; en ce que leur base n'a pas de points blancs, ou n'en a qu'un seul en dessus; en ce que le dessus des quatre ailes offre avant les lignes du limbe postérieur une rangée & demie de taches très-noires, cerclées de blanc.

Les auteurs s'accordent à dire qu'elle habite la Guinée. S'il n'y a point d'erreur à cet égard, le papillon *Valentina* de Cramer ne doit pas être d'Amboine,

d'Amboine, car il paroît trop voisin de l'Ophione pour en être séparé.

263. Nymphale Vénilia.

Nymphalis Venilia.

Nym. alis subdentatis, nigris, utrinquè fasciâ mediâ punctisque cærulescenti-albis : subtùs basi glauco radiatis.

Papilio N. Venilia, *alis dentatis, fuscis, fasciâ communi arcuatâ albâ, marginibus cærulescente.* Linn. *Syst. Nat.* 2. *p.* 780. *n°.* 177. — *Mus. Lud. Ulr. p.* 290. *n°.* 108.

Papilio N. *Venilia.* Fab. *Syst. Ent. p.* 509. *n°.* 278. — *Spec. Inf. tom.* 2. *p.* 98. *n°.* 431. — *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 55. *n°.* 525. — *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 134. *n°.* 411.

Papilio Venilia. Clerck, *Icon. tab.* 32. *fig.* 4.

Papilio Venilia. Cram. *pl.* 219. *fig.* B. C.

Seba, *Mus.* 4. *tab.* 16. *fig.* 3. 4.

Elle a approchant deux pouces & demi d'envergure. Ses ailes sont à peine dentées. Leur dessus est noir, avec une bande blanche, commune, discoïdale, bordée de bleu; plus une rangée postérieure de points d'un blanc-bleuâtre. Les premières ailes, dont la bande est maculaire & rétrécie antérieurement, ont entre cette bande & la base quatre ou cinq petits points blancs.

Le dessous ne diffère du dessus que parce qu'il est un peu plus pâle, & parce que la base des quatre ailes est rayonnée de blanc-verdâtre.

De Java, selon Cramer; des Indes, selon Fabricius.

264. Nymphale Nauplia.

Nymphalis Nauplia.

Nym. alis integris, fusco-nigris : anticis utrinquè maculis, posticis fasciâ, albis : posticarum fasciâ subtùs flavo rufoque circumdatâ.

Papilio N. Nauplia, *alis subdentatis, fuscis, subconcoloribus : primoribus suprà maculis quatuor, posticis fasciâ, albidis.* Linn. *Syst. Nat.* 2. *p.* 785. *n°.* 197. — *Mus. Lud. Ulr. p.* 309.

Papilio N. *Nauplia.* Fab. *Syst. Ent. p.* 512. *n°.* 293. — *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 52. *n°.* 515. — *Ent. S. st. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 130. *n°.* 400.

Papilio Nauplius. Clerck, *Icon. tab.* 46. *fig.* 1. 2.

Papilio Nauplia. Cram. *pl.* 316. *fig.* D. E. (La femelle.) *fig.* F. G. (Le mâle.)

Elle a environ deux pouces d'envergure. Les ailes sont d'un noir-brun en dessus, avec quatre ou cinq taches éparses sur le milieu des premières, & une bande transverse sur le milieu des secondes. Les taches & la bande sont très-blanches dans la femelle, d'un blanc-jaunâtre dans le mâle.

Ces caractères se retrouvent en dessous, où le fond est aussi d'un brun-noirâtre. Indépendamment de cela, les premières ailes ont à la base deux raies longitudinales, dont l'antérieure rousse, l'autre d'un jaune d'ocre-pâle. La bande des secondes ailes est enveloppée du côté de la base par une ligne jaune, & du côté du bord postérieur par une ligne rousse, derrière laquelle il y a une ligne jaunâtre, moins large.

De la Guyane.

Nota. Linnæus n'a connu que le mâle de cette espèce; à en juger du moins par la description qu'il en donne.

265. Nymphale Emilie.

Nymphalis Emilia.

Nym. alis integris, nigris : anticis utrinquè maculis, posticis fasciis duabus, nitidè albis : posticarum fasciâ baseos communi, alterâ subtùs rufo circumdatâ.

Papilio Emilia. Cram. *pl.* 223. *fig.* E. F.

Elle est un peu plus grande que la précédente. Le dessus des ailes est noir, avec des taches orbiculaires d'un blanc-luisant sur les supérieures, & deux bandelettes obliques du même blanc sur les inférieures. Les taches des ailes supérieures sont au nombre de trois, savoir : deux vis-à-vis du sommet; l'autre discoïdale, plus grande & coupée par une nervure fourchue. La bande postérieure des secondes ailes est maculaire; leur bande antérieure avoisine la base & monte jusqu'à la tache discoïdale des premières. Il y a en outre parallèlement au bord terminal des quatre ailes une ligne bleuâtre, très-fine.

Le dessous ressemble au dessus; mais la côte des premières ailes est longée, depuis son origine jusqu'aux taches du sommet, par une ligne rousse; les secondes ailes ont la bande postérieure plus large, continue, & renfermée dans un cercle roux & oblong. Le corps & les antennes sont de la couleur des ailes.

De la Guyane & du Brésil.

Nota. Le dessous des ailes supérieures offre près de son origine une convexité assez semblable à une petite vessie.

266. Nymphale Cœnobite.

Nymphalis Cœnobita.

Nym. alis dentatis, nigris : anticis strià maculisque : posticis suprà fasciâ albâ; subtùs albis, fasciis quatuor maculisque marginalibus fuscis. Fab.

Papilio S. *Cœnobita.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 247. *n°.* 769.

Papilio Cœnobita. Jon. *Fig. pict.* 5. *tab.* 27. *fig.* 2.

Papilio Cœnobita. Donow. *Of an Epit. of the Nat. Hiſt. Inſ. of India, cah.* 3. *pl.* 4. *fig.* 3.

Elle eſt de la taille de la nymphale *Sybille*. Le corps eſt noir, avec la baſe de l'abdomen blanche. Le deſſus des ailes ſupérieures eſt d'un noir-foncé, avec une raie longitudinale, courte, des taches & pluſieurs petites lignes, blanches. Leur deſſous reſſemble à leur deſſus, mais le fond en eſt brun. Les ſecondes ailes ont une raie tranſverſe, droite, une bande diſcoïdale, & deux lignes courbes vers le bord, blanches. Leur deſſous eſt blanc, avec quatre bandes, & des taches marginales, d'un brun-obſcur.

Des Indes.

(*Traduction de Fabricius.*)

267. Nymphale Herſilie.

Nymphalis Herſilia.

Nym. alis dentatis, ſuprà cinerascenti-albis, limbo fuſco : poſticis ſubtùs pallidè fulvis, faſciis duabus lunuliſque marginalibus albis.

Papilio S. Herſilia, *alis dentatis, albis, limbo fulvo : poſticis ſubtùs fulvis, faſciis duabus punctaque medio albis.* Fab. *Ent. Syſt em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 247. *n°.* 770.

Papilio Mardania. Cram. *pl.* 213. *fig.* F. G. (Variété.)

Elle a d'un pouce & demi à deux pouces d'envergure. Le deſſus des quatre ailes eſt d'un blanc plus ou moins cendré, avec le limbe poſtérieur d'un brun-obſcur & diviſé par un cordon de lunules blanches. La baſe des ailes ſupérieures eſt en outre obſcure, avec un trait noirâtre, tranſverſal.

Le deſſous de ces ailes eſt blanc, avec la baſe & l'extrémité ſouettées de fauve-pâle.

Le deſſous des ſecondes ailes eſt d'un fauve-pâle, avec une tache à la baſe, deux bandes tranſverſes ſur le milieu, une rangée de lunules ſur le bord terminal, blanches. La bande poſtérieure eſt maculaire & ſurmontée d'une ligne blanchâtre peu prononcée. Les lunules ſont bordées de noirâtre, particulièrement en arrière. Le corps eſt blanchâtre, avec le corſelet cendré. Les anteunes ſont noires, annelées de blanc, avec le bout de la maſſue ferrugineux ou jaunâtre.

La femelle reſſemble au mâle.

Quelquefois le deſſus des ailes prend une teinte rouſſâtre vers le bout, mais moins prononcée que dans l'individu figuré par Cramer ſous le nom de *Mardania*.

De la Guyane & du Bréſil.

Nota. La baſe des premières ailes offre en deſſous une petite veſſie ſemblable à celle que l'on voit dans la nymphale *Emilie*.

GENRE MORPHO (1).

CARACTÈRES DU GENRE.

Palpes inférieurs très-comprimés, ayant la tranche antérieure étroite ou aiguë; antennes presque filiformes, légèrement et insensiblement plus grosses vers leur extrémité.

I. Cellule discoïdale ou centrale des secondes ailes ouverte en arrière.

II. Cellule discoïdale des secondes ailes fermée en arrière. (Chenilles, du moins pour la plupart, terminées postérieurement par une pointe fourchue.)

A. *Angle anal des secondes ailes prolongé en une petite queue.*

Le genre Amathusia de Fabricius. (Pap. *Aurelius*, *Phidippus*, etc.)

B. *Angle anal des secondes ailes sans prolongement remarquable.*

Le genre Morpho de Fabricius. (Pap. *Hecuba*, *Menelaus*, *Achilles*, etc.)

ESPÈCES.

I. Cellule discoïdale des secondes ailes ouverte en arrière, ou fermée quelquefois en dessous par un léger pli.

A. Ailes supérieures non concaves. Inférieures ayant l'angle de l'anus prolongé en une petite queue obtuse ou tronquée.

1. Morpho Aurélius.

Dessus des ailes couleur de terre d'ombre, avec environ la moitié postérieure noire et tachetée de blanc : dessous des inférieures avec deux yeux écartés, et pareil nombre de lunules à l'angle de l'anus.

2. Morpho Phidippe.

Dessus des ailes couleur de terre d'ombre, avec une ligne jaunâtre, transverse et presque terminale : inférieures ayant de part et d'autre deux moitiés d'yeux sur l'angle de l'anus.

3. Morpho Adonis.

Dessus des ailes du bleu-azuré le plus brillant, avec le limbe postérieur noir (et tacheté de blanc dans la femelle) : dessous d'un gris lavé de brun, avec des bandes plus claires, et des yeux séparés.

B. Ailes supérieures plus ou moins concaves. Inférieures sans prolongement remarquable à l'angle de l'anus.

4. Morpho Andromachus.

Ailes un peu dentées, d'un brun-noirâtre en dessus, avec un large espace commun, et des taches terminales, fauves : dessous avec des yeux sans prunelle.

5. Morpho Hécube.

Ailes dentées, noires en dessus, avec le milieu des supérieures, et des taches

(1) Le genre Morpho de M. Latreille renferme deux divisions. Dans la première, la cellule discoïdale des ailes inférieures est ouverte; dans la seconde, elle est fermée postérieurement.

MORPHO. (Insecte.)

sur leur bord terminal, fauves : dessous des inférieures ayant à la base des bandes argentées et des bandes rousses.

6. Morpho Métellus.

Ailes dentées, d'un noir-brun en dessus, avec le milieu des supérieures, et des taches sur leur bord terminal, fauves : dessous des inférieures avec des bandes pâles à la base.

7. Morpho Persée.

Ailes dentées, d'un noir-brun en dessus, avec la base verdâtre, et l'extrémité tachetée de fauve : dessous des inférieures avec des bandes d'un blanc-luisant, et dont une dentée sur le bord d'en haut.

8. Morpho Anaxibia.

Ailes dentées, d'un bleu-azuré-brillant en dessus, avec le limbe terminal noir (et tacheté de fauve dans la femelle) : dessous d'un brun-clair, avec une rangée transverse d'yeux roux à prunelle blanche et linéaire.

9. Morpho Ménélas.

Ailes dentées, d'un bleu-azuré-brillant en dessus, avec le limbe noir (et tacheté de blanc dans la femelle) : dessous couleur de terre d'ombre, avec des yeux noirs à iris rouge et à prunelle formée par des atomes bleus.

10. Morpho Hélénor.

Ailes dentées, noires en dessus, avec un espace à la base, ou une bande sur le milieu, d'un bleu-azuré-luisant : dessous offrant à la base une ligne verdâtre, transverse et ondulée.

11. Morpho Achille.

Ailes dentées, noires en dessus, avec un espace à la base, ou une bande sur le milieu, d'un bleu-azuré-luisant : dessous offrant à la base beaucoup de lignes verdâtres, transverses et ondulées.

12. Morpho Rhéténor.

Dessus des ailes d'un bleu-azuré très-brillant : dessous varié de brun et de gris, avec des yeux sans prunelle. (Le mâle.)

13. Morpho Cythéris.

Dessus des ailes d'un bleu-argenté-luisant : inférieures dentées, ayant en dessous beaucoup de bandes nacrées, et trois yeux séparés. (Le mâle.)

14. Morpho Laerte.

Ailes un peu dentées, d'un blanc-nacré de part et d'autre, avec une bande noire sur la côte des supérieures : dessous des inférieures avec une rangée transverse d'yeux.

15. Morpho Jaïrus.

Ailes entières, d'un brun-obscur : inférieures avec le milieu blanc à partir de la base, un œil très-grand en dessus, deux yeux séparés en dessous.

16. Morpho Odana.

Ailes un peu dentées, d'un brun-noirâtre : supérieures avec une bande d'un bleu-violet-luisant : dessous des inférieures avec un œil sans prunelle à l'angle de l'anus.

17. Morpho Ogina.

Ailes un peu dentées, d'un brun-violet en dessus, avec une bande postérieure d'un bleu-pâle : dessous des inférieures avec deux à quatre yeux.

MORPHO. (Insecte.)

18. Morpho Célinde.

Ailes un peu dentées, d'un brun-violet en dessus, avec une bande d'un bleu-pâle sur le milieu : supérieures ponctuées de fauve à l'extrémité : dessous des inférieures avec deux yeux écartés.

19. Morpho Tullia.

Ailes un peu dentées, d'un brun-violet en dessus, avec des taches jaunes à l'extrémité : dessous ponctué de brun à la base.

20. Morpho Ménéthon.

Ailes dentées, d'un brun-obscur, avec le bord tacheté de jaune : dessous des inférieures avec deux yeux. Fab.

II. Cellule discoïdale des secondes ailes fermée en arrière par une nervure en angle aigu et d'où part un rameau longitudinal qui s'étend jusqu'au bord postérieur.

A. Ailes supérieures non concaves. Inférieures ayant l'angle de l'anus plus ou moins prolongé.

21. Morpho Actorion.

Ailes entières, couleur de terre d'ombre en dessus : supérieures avec une bande rousse à l'extrémité, et un espace d'un violet-luisant vers l'angle interne.

B. Ailes supérieures concaves. Inférieures plus ou moins prolongées en dehors.

22. Morpho Aorsa.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre, avec une ligne fauve, transverse et presque terminale : dessous des inférieures avec des réseaux et deux yeux.

23. Morpho Automédon.

Dessus des ailes d'un brun-noir, avec un espace violet, commun et discoïdal : sommet des supérieures (femelle) *avec une ligne fauve, transversale : dessous des inférieures avec deux yeux, dont le postérieur réuni à un autre de moitié plus petit.*

C. Ailes supérieures peu ou point concaves. Inférieures sans prolongement.

24. Morpho Euryloque.

Ailes un peu dentées, d'un bleu-obscur en dessus : dessous des supérieures avec deux yeux, dessous des inférieures avec trois, et une ligne noire, anguleuse et discoïdale, sur celles-ci et sur celles-là.

25. Morpho Ilionée.

Ailes un peu dentées, d'un bleu-violet en dessus, avec le limbe terminal noir : limbe des supérieures avec deux lignes transverses, limbe des inférieures avec les sinus, jaunâtres.

26. Morpho Teucer.

Ailes un peu dentées : dessus des supérieures d'une teinte livide ; dessus des inférieures d'un bleu-ardoisé à la base, leur dessous avec trois yeux séparés, dont le postérieur très-grand.

27. Morpho Idoménée.

Ailes un peu dentées, d'un brun-noir en dessus, avec la base des quatre, et le limbe terminal des inférieures, d'un bleu-ardoisé : dessous des inférieures avec deux yeux, et une tache blanche, centrale.

28. Morpho Inachis.

Ailes un peu dentées, d'un bleu-violet en dessus, avec le limbe terminal des quatre noir, et le sommet des supérieures d'un jaune-fauve : dessous des inférieures avec deux yeux oblongs.

29. Morpho Martia.

Ailes un peu dentées : les deux surfaces des supérieures avec un espace blanc, central ; dessus des inférieures violet, leur dessous avec deux yeux.

30. Morpho Taraméla.

Ailes presqu'entières : dessus des supérieures d'un fauve-jaunâtre-obscur, avec le limbe terminal noir : dessous des

MORPHO. (Insecte.)

inférieures avec deux yeux, et une ligne bleuâtre, transverse, ondulée.

31. Morpho Saronia.

Ailes presqu'entières, d'un jaune-roussâtre en dessus, avec le limbe terminal noir : dessous des supérieures ayant sur le milieu une bande jaunâtre, bifide ; dessous des inférieures avec deux yeux écartés.

32. Morpho Acadina.

Ailes un peu dentées, d'un brun-tanné-pâle en dessus, avec une ligne fauve, transverse, presque terminale, laquelle est double aux supérieures : dessous des inférieures avec deux bandes blanches, dont une plus courte, et deux yeux écartés.

33. Morpho Rusina.

Ailes un peu dentées, noires en dessus, avec un espace d'un bleu-brillant, puis une bande commune, qui est d'un jaune d'ocre aux supérieures, blanche aux inférieures : dessous de ces dernières avec deux yeux écartés.

34. Morpho Anaxandra.

Ailes un peu dentées, d'un noir-brun en dessus, avec une bande d'un jaune d'ocre-pâle sur les quatre : dessous des inférieures avec une rangée courbe de trois yeux.

35. Morpho Anaxarète.

Ailes entières, d'un noir-brun : extrémité des supérieures tachetée de blanc de part et d'autre : dessous des inférieures d'un roux-obscur, avec des points noirâtres à la base.

36. Morpho Anosia.

Ailes dentées, d'un brun-noirâtre : les deux surfaces des supérieures avec une bande blanche, maculaire : dessous des inférieures avec des lignes transversales et flexueuses, plus six yeux, dont le postérieur à double prunelle.

37. Morpho Darius.

Ailes entières, d'un brun-noirâtre : supérieures tachetées de blanc : dessous des inférieures avec un arc noir. Fab.

38. Morpho Œthon.

Ailes entières, d'un brun-obscur, avec une ligne fauve, transverse et marginale : dessous des inférieures avec de légères ondes et sept yeux. Fab.

39. Morpho Bérécynthus (1).

Ailes entières, d'un noir-brun en dessus, avec une bande fauve, terminale : bande des supérieures anguleuse : dessous des inférieures avec une rangée transverse de six yeux.

40. Morpho Xanthus.

Ailes presqu'entières, d'un noir-brun en dessus : supérieures avec une bande fauve, anguleuse : dessous des inférieures avec deux yeux écartés, dont l'antérieur réniforme.

41. Morpho Caryatis.

Ailes dentées, d'un noir-brun : dessus des supérieures avec une bande fauve, postérieure ; leur dessous avec une bande blanche, centrale : dessous des inférieures avec deux yeux semi-lunaires.

42. Morpho de la Casse.

Ailes dentées, d'un brun-noirâtre en dessus : les deux surfaces des supérieures avec une bande fauve : dessous des inférieures avec deux yeux séparés, dont l'antérieur plus grand et presque rond.

---

(1) Cette espèce et les suivantes font le passage des Morphos aux Brassolides, en raison de leurs antennes un peu plus renflées vers l'extrémité, et d'une fente longitudinale, couverte de poils, fente que l'on remarque, ainsi que dans les Brassolides, près du bord interne des ailes inférieures du mâle. Ce dernier caractère peut servir à distinguer ces espèces des Nymphales, avec lesquelles on seroit d'abord tenté de les confondre, si l'on n'avoit égard qu'aux palpes et aux antennes.

I. Cellule discoïdale des secondes ailes ouverte postérieurement, ou fermée quelquefois en dessous par un léger pli.

A. Ailes supérieures non concaves. Inférieures ayant l'angle de l'anus prolongé en une petite queue obtuse ou tronquée.

1. Morpho Aurélius.

Morpho Aurelius.

Mor. alis suprà umbrinis, dimidio circiter apicali nigro, albo maculato : posticis subtùs ocellis duobus diffitis lunulisque totidem anguli ani.

Papilio N. Aurelius, *alis subcaudatis, fuscis, apice atris albo maculatis : posticis subtùs ocellis duobus.* Fab. *Spec. Inf. tom.* 2. *p.* 11. *n°.* 99. — *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 71. *n°.* 222.

Papilio Aurelius. Cram. *pl.* 168. *fig.* A. B.

Papilio Aurelius. Herbst, *Pap. tab.* 38. *fig.* 1. 2.

Nous ne connoissons cette espèce que par la figure de Cramer.

Elle a près de six pouces d'envergure. Ses premières ailes sont entières, couleur de terre d'ombre en dessus, avec environ la moitié postérieure noire & chargée d'une douzaine de taches blanches, longitudinales, dont les quatre antérieures beaucoup plus grandes & réunies en une bande oblique qui a les côtés anguleux. Les secondes ailes ont l'angle anal un peu prolongé en pointe obtuse. Leur dessus, qui est aussi couleur de terre d'ombre, offre, à l'angle externe ou sommet, un grand espace noir sur lequel il y a une dixaine de taches blanches, dont trois longitudinales & en forme de coin, les autres orbiculaires & plus petites.

Le dessous des quatre ailes est d'un blanc-satiné, avec des bandes brunes, transverses & inégales, dont deux, savoir, celle du milieu & celle de la base, plus foncées. La bande du milieu des premières ailes est précédée en dehors, près du bord interne, par une tache noirâtre, transversale & presqu'en forme de clochette. La bande correspondante des secondes ailes l'est par deux yeux violâtres ayant une prunelle blanche, & un iris jaune qu'entoure un cercle noir. L'un de ces yeux avoisine la côte, l'autre est situé vers la pointe anale ou petite queue. Celle-ci est brune comme en dessus, mais elle a ici les bords blancs, & son milieu offre deux arcs noirâtres se regardant par leur concavité.

De l'île de Sumatra.

2. Morpho Phidippe.

Morpho Phidippus.

Mor. alis suprà umbrinis, strigâ subterminali flavidâ : posticis utrinquè ocellis duobus dimidiatis anguli ani.

Papilio E. A. Phidippus, *alis subcaudatis, fuscis : subtùs fusciis albidis biocellatis caudaque ocellis geminis.* Linn. *Syst. Nat.* 2. *p.* 752. *n°.* 37. — *Amæn. Acad.* 6. *p.* 402. *n°.* 52.

Papilio N. *Phidippus.* Fab. *Syst. Ent. p.* 455. *n°.* 52. — *Spec. Inf. tom.* 2. *p.* 21. *n°.* 85. — *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 11. *n°.* 97. — *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 71. *n°.* 220.

Papilio Phidippus. Cram. *pl.* 69. *fig.* A. B.

Papilio Phidippus. Herbst, *Pap. tab.* 35. *fig.* 3. 4.

Seba, *Mus.* 4. *tab.* 5. *fig.* 5.

Papilio Phidippus. Esp. *Pap. exot. tab.* 56. *fig.* 1.

Elle a environ quatre pouces d'envergure. Ses ailes supérieures sont entières. Les inférieures sont dentées, & terminées à l'angle anal par une queue courte, large & arrondie, sur laquelle il y a de part & d'autre deux demi-yeux sans prunelle, ou, si l'on veut, deux croissans blancs se regardant par leur concavité & embrassant chacun une tache noire, semi-lunaire & légèrement saupoudrée de bleuâtre.

Le dessus des quatre ailes est couleur de terre d'ombre, avec une ligne jaunâtre, transverse & presque terminale. Leur dessous est un peu plus clair que le dessus, avec six à sept bandes ou flammes blanchâtres, luisantes, transversales, de longueur inégale. Indépendamment de ces bandes, les secondes ailes ont deux yeux ronds, dont l'antérieur moins grand & voisin du bout de la côte, l'autre placé beaucoup plus bas vers l'origine de la queue. Ces yeux, qu'entoure un cercle noir étroit, sont d'un jaune-fale & piqués de brun-obscur, avec la prunelle d'un blanc-vif & ombrée de noirâtre en dehors. Le corps & les antennes sont de la couleur des ailes.

De l'île de Java.

Nota. Le dessus des ailes supérieures offre près du milieu de la côte, particulièrement dans la femelle, une éclaircie jaunâtre qui s'étend presque jusqu'à la raie marginale de cette couleur.

Le mâle a sous le milieu du ventre un faisceau de poils divergens.

3. Morpho Adonis.

Morpho Adonis.

Mor. alis suprà nitidissimè cyaneis, limbo nigro (feminæ albo maculato) : subtùs infuscato-griseis, fusciis dilutioribus ocellisque diffusis.

Papilio Adonis. Cram. *pl.* 61. *fig.* A. B. (Le mâle.)

Papilio Adonis. Herbst, *Pap. tab.* 26. *fig.* 3. 4.

Papilio Adonis. Esp. *Pap. exot. tab.* 55. *fig.* 2.

Elle a de trois pouces & demi à quatre pouces d'envergure.

Le mâle, furtout lorfqu'on le voit de face, a le deffus des ailes du bleu-azuré le plus brillant, avec tout le contour extérieur des premières, & le prolongement anal des fecondes, noirs. Ses premières ailes offrent, vers le bout de la côte, deux petites taches blanches, dont l'antérieure longitudinale, la poftérieure orbiculaire & placée un peu plus bas.

La femelle a le deffus d'un bleu moins vif que le mâle, avec le limbe poftérieur largement noir & chargé de deux rangs de taches blanches aux ailes fupérieures, d'un feul aux inférieures.

Le deffous des deux fexes eft d'un gris lavé de brun, avec fix bandes tranfverfes plus claires, dont les deux extérieures finuées, & féparées des précédentes par des yeux jaunâtres à prunelle blanche & à iris noir. Ces yeux font un peu oblongs, écartés l'un de l'autre, au nombre de deux aux ailes de devant, & de trois ou de quatre à celles de derrière. Ces dernières ont à l'angle de l'anus deux petites lignes noires, tortueufes & tranfverfales.

Nous avons vu, dans la collection de M. le chevalier de Langsdorff, un individu tout-à-fait femblable à la femelle quant aux caractères, mais dans lequel le bleu du deffus des ailes eft remplacé par du fauve, & le blanc des taches de l'extrémité par du jaune d'ocre.

De l'Amérique méridionale, & particulièrement du Bréfil & de la Guyane.

B. Ailes fupérieures plus ou moins concaves. Inférieures fans prolongement remarquable à l'angle de l'anus.

4. Morpho Andromachus.

Morpho Andromachus.

Mor. alis fubdentatis, fuprà nigro-fufcis, areâ communi latâ maculifque terminalibus fulvis : fubtùs ocellis cæcis.

Papilio Andromachus. Cram. *pl.* 56. *fig.* A. B.

Papilio Andromachus. Herbst, *Pap. tab.* 34. *fig.* 2. 3.

Nous ne connoiffons cette efpèce que par la figure de Cramer, & par un individu paffé dont nous n'avons pu vérifier le fexe.

Elle a environ fix pouces d'envergure. Ses premières ailes ont le fommet prolongé & arrondi. Leur deffus eft d'un brun-noirâtre, avec deux bandes fauves, dont l'antérieure plus claire, finuée & s'élargiffant à mefure qu'elle approche du bord interne; la poftérieure étroite, maculaire & tout-à-fait terminale. Les fecondes ailes ont le bord poftérieur foiblement denté. Leur deffus eft fauve depuis fa naiffance jufqu'au-delà du milieu; puis d'un brun-noirâtre, avec une rangée marginale de petites taches, & les échancrures, fauves.

Le deffous des premières ailes diffère du deffus, en ce que la bande fauve du milieu eft diviſée dans le fens de fa longueur par une ligne de points obfcurs, & en ce qu'il y a vers la partie antérieure de la côte cinq taches d'un gris-luifant, favoir: deux linéaires & convergentes à la bafe, les trois autres obliques, furtout l'extérieure qui eft plus grande & concave en dehors.

Le deffous des fecondes ailes eft couleur de terre d'ombre à la bafe, avec la côte d'un gris-luifant; jaunâtre au milieu, avec trois points obfcurs, dont l'antérieur ifolé & plus petit; d'une teinte violâtre-chatoyante à l'extrémité. Le corps eft brun, avec le deffus de l'abdomen fauve.

De Surinam. — Très-rare jufqu'à préfent.

N. B. L'*Andromacha* de Fabricius n'eft point une Morpho: c'eft une Acrée que nous avons donnée fous le nom d'*Entoria*, *p.* 231, *n°.* 3 de la première partie.

5. Morpho Hécube.

Morpho Hecuba.

Mor. alis dentatis, fuprà nigris, anticarum difco maculifque terminalibus fulvis : poſticis fubtùs baſi argenteo rufoque fufciatis.

Papilio E. A. Hecuba, *alis dentatis : anticis rubris, poſticis nigris : fubtùs omnibus ocellatis.* Linn. *Mant. Alt. p.* 534.

Papilio N. *Hecuba.* Fab *Syſt. Ent. p.* 459. *n°.* 67. — *Spec. Inſ. tom.* 2. *p.* 26. *n°.* 104. — *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 13. *n°.* 121. — *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 87. *n°.* 273.

Papilio Hecuba. Cram. *pl.* 217. *fig.* A. B.

Papilio Hecuba. Herbst, *Pap. tab.* 21. *fig.* 1. 2.

Daudenton, *pl. enlum.* 19.

Les deux individus d'après leſquels nous décrivons cette Morpho avoient le corps ſi défectueux que nous n'avons pu en déterminer le fexe. Cependant l'analogie feroit croire que ce ſont des femelles.

Elle a de ſept à huit pouces d'envergure. Le deſſus des premières ailes eſt noir, avec la baſe verdâtre, & le milieu traverſé par une bande fauve très-large. Le bord poſtérieur, qui a les échancrures blanchâtres, eſt en outre diviſé dans toute ſa longueur par trois rangs de lunules fauves, dont les poſtérieures adhérant l'une à l'autre. Le deſſus des ſecondes ailes eſt noir, avec la baſe d'un gris-verdâtre terminé de jaune, & le bord poſtérieur longé par un double cordon de lunules fauves.

Le

Le deſſous des premières ailes eſt brun, avec des lignes divergentes à la baſe, des taches triangulaires au milieu & avant le bord poſtérieur, d'un blanc-argenté. Derrière les taches du milieu, ſont trois grands yeux noirs, ayant l'iris roux, la prunelle blanche & en croiſſant. Le bord poſtérieur offre en outre une double ligne ferrugineuſe qui s'étend du ſommet à l'angle interne.

Le deſſous des ſecondes ailes eſt brun vers la baſe, grisâtre vers l'extrémité, avec quatre yeux diſcoïdaux, ſemblables à ceux des premières ailes, mais dont l'antérieur iſolé & plus grand que les trois autres. Ces yeux ſont précédés par trois bandes argentées, dont l'inférieure plus large, la ſupérieure linéaire & couvrant le bord d'en haut. Le bord terminal de ces ailes eſt entièrement diviſé par trois lignes, dont l'intérieure argentée, les deux extérieures ferrugineuſes, mais devenant argentées vers l'angle de l'anus.

De Cayenne. — Très-rare.

6. Morpho Métellus.

Morpho Metellus.

Mor. alis dentatis, ſuprà nigro-fuſcis, anticarum diſco maculiſque terminalibus fulvis : poſticis ſubtùs baſi pallidè ſuſciatis.

Papilio N. Metellus, *alis dentatis, fulvis, poſticè atris : ſubtùs anticis ocellis tribus, poſticis quinque.* Fab. *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 13. *n°.* 122. — *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 88. *n°.* 274.

Papilio Metellus. Cram. *pl.* 218. *fig.* A. B.

Papilio Metellus. Herbst, *Pap. tab.* 22. *fig.* 1. 2.

Nous n'avons vu que la femelle de ce lépidoptère.

Elle a un peu plus de ſix pouces d'envergure. Son deſſus reſſemble à celui de l'*Hécube*, mais les taches intérieures de l'extrémité des premières ailes ſont moins groſſes & deſcendent moins bas, & les extérieures ne ſont pas adhérentes entr'elles.

Le deſſous des premières ailes eſt brun. A ſa baſe ſont des lignes jaunâtres, divergentes, & ſuivies de deux taches blanchâtres, obliques. Vient enſuite, entre deux rangées de taches jaunâtres & triangulaires, une ſérie de quatre yeux dont les deux ſupérieurs plus petits & moins prononcés. Ces yeux ſont noirs, avec l'iris fauve & la prunelle formée par des atomes blancs. Le bord poſtérieur eſt en outre longé par une double ligne de petits croiſſans ferrugineux.

Le deſſous des ſecondes ailes eſt d'un brun-violâtre, avec des bandes pâles & peu prononcées à la baſe, une rangée courbe de cinq yeux noirs à iris fauve & à prunelle blanche ſur le milieu, une double ligne ferrugineuſe ſur le bord terminal. Le ſecond œil, à partir d'en haut, eſt plus petit que les autres, & les trois ſuivans ſont preſque ſemi-lunaires.

De Surinam. — Rare.

7. Morpho Perſée.

Morpho Perſeus.

Mor. alis dentatis, ſuprà nigro-fuſcis, baſi virescente, apice fulvo maculato : poſticis ſubtus faſciis nitidè-albidis, coſtali dentata.

Papilio N. Perſeus, *alis dentatis, pallidè cæruleis, apice atris ferrugineo maculatis : ſubtùs undatis, ocellis tribus quatuorve.* Fab. *Spec. Inſ. tom.* 2. *p.* 24. *n°.* 98. — *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 15. *n°.* 116. — *Entom. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 86. *n°.* 267.

Papilio Perſeus. Cram. *pl.* 71. *fig.* A. B. (La femelle.)

Papilio Perſeus. Herbst, *tab.* 22. *fig.* 3.

Papilio Perſeus. Herbst, *tab.* 23. *fig.* 1.

Seba, *Muſ.* 4. *tab.* 18. *fig.* 15. 16.

Elle a environ ſix pouces d'envergure. Le deſſus de ſes ailes eſt d'un brun-noirâtre, avec la baſe d'un vert-griſâtre, plus deux rangées terminales de petites taches & les échancrures fauves. Les premières ailes ont encore, au-delà du milieu de la côte, une bande jaunâtre, courte, oblique & ſinueuſe.

Le deſſous des premières ailes eſt comme dans le *Métellus*, mais les deux yeux ſupérieurs manquent quelquefois, & les deux autres ſont plus grands.

Le deſſous des ſecondes ailes eſt d'un brun plus ou moins violâtre, avec trois bandes blanchâtres, luiſantes, dont l'antérieure dentée & couvrant la côte vers ſon origine; la ſuivante plus courte; la troiſième flexueuſe & précédant preſqu'immédiatement quatre yeux dont le ſupérieur iſolé & plus gros. Ces yeux ſont noirs, avec l'iris roux & cerclé de noirâtre, la prunelle blanche & formée par des atomes. En avant du bord poſtérieur, il y a une bande griſâtre, & ce bord eſt longé par une double ligne ferrugineuſe.

La femelle a ſur le deſſus des premières ailes trois rangs de taches fauves. Elle ſe diſtingue en outre du mâle, en ce que les yeux du deſſous de ſes quatres ailes ſont moins grands & moins ronds, ce qui la rapproche à cet égard de la femelle du *Métellus*.

De Surinam & du Bréſil.

8. Morpho Anaxibia.

Morpho Anaxibia.

Mor. alis dentatis, ſuprà nitidè cyaneis, limbo nigro (feminæ fulvo maculato) : ſubtùs dilutè umbrinis, ſtrigâ ocellarum ruforum pupillâ albâ lineari.

Papilio Anaxibia. Esp. *Pap. exot. tab.* 55. *fig.* 1. (Le mâle.)

Papilio E. A. Telemachus, *alis dentatis, ſuprà*

fuſcis, immaculatis, areâ communi cœruleâ, radiatâ. Linn. *Syſt. Nat.* 2. *p.* 752. *n°.* 41. (La femelle.)

Merian, *Surin. Inſ. p.* 68. *tab.* 68. (La femelle.)

Papilio N. Telemachus, *alis dentatis, fuſcis, areâ communi cœruleâ, radiatâ : ſingulis ſubtùs ocellis.* Fab. *Syſt. Ent. p.* 458. *n°.* 64. — *Spec. Inſ. tom.* 2. *p.* 25. *n°.* 100. — *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 13. *n°.* 117. — *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 86. *n°.* 269. (La femelle.)

Papilio Telemachus. Cram. *pl.* 373. *fig.* A. B. (La femelle.)

Papilio Telemachus. Herbst, *Pap. tab.* 23. *fig.* 2. 3. (La femelle.)

Le papillon *Telemachus* des auteurs eſt la femelle de celui qu'Eſper a décrit & figuré ſous le nom d'*Anaxibia*.

Le mâle a de cinq pouces & demi à ſix pouces d'envergure. Le deſſus de ſes ailes eſt d'un brun-azuré-brillant, avec tout le contour extérieur des premières, & ſeulement les dents du bord poſtérieur des ſecondes, noirs. Les premières ailes ont au-delà du milieu de la côte une petite tache blanche, plus ou moins prononcée.

Le deſſus de la femelle eſt approchant du même bleu que celui du mâle, avec le limbe poſtérieur largement noir & chargé de deux rangs de taches fauves, dont les antérieures orbiculaires, les poſtérieures doubles & lunulées. On voit en outre aux premières ailes un cordon tranſverſal de cinq gros points blancs contigus à la couleur bleue, plus une tache blanchâtre placée ſur le noir de la côte derrière la cellule ſous-marginale.

Le deſſous des deux ſexes eſt d'un brun-pâle & luiſant, avec cinq bandes grifâtres, flexueuſes & peu apparentes, dont trois vers la baſe, & deux vers l'extrémité. Les bandes de l'extrémité ſont précédées d'une ſérie d'yeux roux ayant la prunelle blanche & linéaire, l'iris noirâtre & cerclé de gris. Ces yeux ſont au nombre de quatre aux ailes ſupérieures, de cinq à ſept aux inférieures. Indépendamment de cela, les ailes de devant ont l'origine de la côte rouge, & leur baſe eſt vergetée de gris à ſa partie ſupérieure. Le corps eſt bleu en deſſus, d'un brun-jaunâtre en deſſous.

La chenille, d'après Merian, eſt grande, épineuſe, d'un rouge-cramoiſi, avec des taches irrégulières d'un jaune-doré aux incifions. Sa nourriture eſt inconnue.

La chryſalide eſt courte, épaiſſe, carénée, d'un vert-pâle. L'inſecte y ſéjourne environ un mois, & éclôt dans le courant d'octobre.

De la Guyane & du Bréſil.

Nota. Dans la figure du *Telemachus* de mademoiſelle Merian, le bleu du deſſus des ailes ſe termine preſqu'en rayons. C'eſt ce qui a fait dire à Linnæus que cet inſecte reſſembloit beaucoup à ſon père (l'*Ulyſſe*), mais qu'il étoit plus petit & ſans queue. La même figure indique avec raiſon, des taches fauves ſur le limbe terminal des ailes; cependant Linnæus, qui y renvoie, dit dans ſa phraſe ſpécifique que les ailes ſont ſans taches en deſſus, *ſuprà immaculatis.*

9. Morpho Ménélas.

Morpho Menelaus.

Mor. alis dentatis, ſuprà nitidè cyaneis, limbo nigro (feminæ albo maculato) : ſubtùs umbrinis, ocellis nigris iride rubrâ atomiſque cœruleſcentibus in pupillam congeſtis.

Papilio E. A. Menelaus, *alis dentatis, ſuprà cœruleis, nitidiſſimis : ſubtùs nebuloſis, punctis fuſcis.* Linn. *Syſt. Nat.* 2. *p.* 748. *n°.* 20. — *Muſ. Lud. Ulr. p.* 200. (Le mâle.)

Papilio N. *Menelaus.* Fab. *Syſt. Ent. p.* 458. *n°.* 65. — *Spec. Inſ. tom.* 2. *p.* 25. *n°.* 101. — *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 13. *n°.* 118. — *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 86. *n°.* 270. (Le mâle.)

Papilio Menelaus. Clerck, *Icon. tab.* 21. *fig.* 1.

Gronow. *Zooph.* 722.

Knorr. *Del. tab.* c. 4. *fig.* 2.

Merian, *Surin. Inſ. p.* 53. *tab.* 53.

Seba, *Muſ.* 4. *tab.* 31. *fig.* 1. 2.

Papilio Menelaus. Cram. *pl.* 21. *fig.* A. B. (Le mâle.)

Papilio Menelaus. Herbst, *Pap. tab.* 24. *fig.* 3.

Papilio Menelaus. Herbst, *Pap. tab.* 25. *fig.* 1.

Papilio Menelaus. Esp. *Pap. exot. tab.* 41. *fig.* 1.

Papilio E. A. Neſtor, *alis dentatis, ſuprà fuſcis, maculis diſcoque cœruleis : ſubtùs ocellis tribus biniſque.* Linn. *Syſt. Nat.* 2. *p.* 752. *n°.* 40. (La femelle.)

Gronow. *Zooph.* 718.

Merian, *Surin. Inſ. p.* 9. *tab.* 9.

Seba, *Muſ.* 4. *tab.* 43. *fig.* 23. 24.

Papilio N. Neſtor, *alis dentatis, ſuprà fuſcis, albo maculatis diſcoque cœruleo : ſubtùs ocellis tribus quatuorve.* Fab. *Syſt. Ent. p.* 458. *n°.* 63. — *Spec. Inſ. tom.* 2. *p.* 24. *n°.* 98. — *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 13. *n°.* 115. — *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 85. *n°.* 266. (La femelle.)

Papilio Neſtor. Cram. *pl.* 19. *fig.* A. B. (La femelle.)

Papilio Neſtor. Herbst, *Pap. tab.* 24 *fig.* 1. 2.

Papilio Neſtor. Esp. *Pap. exot. tab.* 41. *fig.* 2.

Les auteurs ont donné le mâle de cette espèce sous le nom de *Menelaus*, & la femelle sous celui de *Nestor*.

Le mâle, dont l'envergure est d'environ six pouces, a le dessus des ailes d'un bleu-azuré-brillant, avec tout le contour extérieur noir, & les échancrures du bord terminal d'un blanc-jaunâtre. Il y a en outre sur la côte des premières ailes trois petites taches blanches, savoir : une au-delà de son milieu, les deux autres près de son extrémité.

La femelle est d'un bleu un peu moins vif que le mâle, avec le limbe postérieur largement noir & chargé d'un rang de taches blanches aux ailes inférieures, de deux aux supérieures. Ces dernières ailes ont à l'extrémité de la cellule sous-marginale une tache blanche, assez grande & placée transversalement sur la côte.

Le dessous des deux sexes est couleur de terre d'ombre, & présente sur chaque aile quatre yeux noirs ayant l'iris d'un rouge-brique & la prunelle composée d'atomes bleuâtres. L'œil antérieur des secondes ailes est toujours isolé, & quelquefois appuyé sur un autre plus petit. Ces yeux, qu'entoure un cercle gris, sont précédés intérieurement & presqu'immédiatement d'une série de lunules d'un vert-argentin, devant lesquelles l'on voit sur les ailes supérieures un chevron transversal, & sur les inférieures une ligne interrompue, du même vert. Indépendamment de cela, toutes les ailes ont l'extrémité saupoudrée de gris, & leur bord postérieur est longé par une double ligne rougeâtre en feston. Le corps est noir.

La chenille, selon Merian, est jaunâtre, avec des ligne longitudinales, & les pattes, roses. Sa tête est d'un brun-obscur, & chaque anneau de son corps offre quatre épines noires, aiguës. Elle vit sur un arbre très-élevé, auquel cet auteur donne le nom de *Mespilus*.

La chrysalide est cylindrique, pâle, avec des pointes sur le dos. Le papillon en sort au bout de quinze jours & paroît en janvier.

De la Guyane & du Brésil.

Nota. La phrase spécifique de Linnæus feroit soupçonner que son papillon *Menelaus* n'est pas le même que celui de Cramer. Mais la description détaillée qu'il en donne dans le *Museum Ludovicæ Ulricæ Reginæ*, & la figure de Clerck, à laquelle il renvoie, ne laissent aucun doute sur l'identité.

10. Morpho Hélénor.

Morpho Helenor.

Mor. alis dentatis, suprà nigris, areâ baseos seu fasciâ mediâ nitidè cyaneâ : subtùs basi strigâ undatâ virescente.

Papilio Helenor. Cleerck, *Icon. tab.* 24. *fig.* 3. 4.

Papilio Helenor. Cram. *pl.* 86. *fig.* A. B.

Papilio Helenor. Cram. *pl.* 373. *fig.* C. (Variété.)

Papilio Helenor. Herbst, *Pap. tab.* 26. *fig.* 1. 2.

Papilio Helenor. Esp. *Pap. exot. tab.* 42. *fig.* 2.

Elle a de quatre pouces & demi à cinq pouces d'envergure. Le dessus de ses ailes est noir, avec une bande commune & discoïdale d'un bleu-argenté, ou d'un bleu-violet-luisant, n'importe le sexe. Cette bande n'a pas une largeur constante ; car, dans les individus comme celui que Cramer a représenté, elle n'est guère que d'un demi-pouce, tandis que dans beaucoup d'autres elle s'étend presque jusqu'à la naissance des ailes, en perdant toutefois de son éclat. Les premières ailes ont vers le milieu de la côte une tache blanche oblique, & vers l'extrémité des points de cette couleur, disposés sur un rang dans le mâle, sur deux dans la femelle ; sans compter les petites lunules blanches qui bordent les échancrures. Les secondes ailes, dont les échancrures sont également blanches, ont le long du bord postérieur une série de points rouges, plus ou moins distincts.

Le dessous des quatre ailes est d'un brun-noirâtre, avec des yeux très-noirs, ayant la prunelle blanche & environnée d'atomes ferrugineux & d'atomes violets, l'iris jaune & renfermé dans un cercle verdâtre que borde intérieurement une lunule de sa couleur. Il y a en outre vers la base de chaque aile une ligne verdâtre, transverse, flexueuse & interrompue ; & le long du bord terminal trois lignes plus ou moins grisâtres, dont l'intermédiaire entrecoupée de rouge aux ailes inférieures. Les yeux sont au nombre de trois aux premières ailes, de quatre aux secondes, & l'antérieur d'entr'eux est toujours isolé. Le corps est noir en dessus, brun en dessous.

Cramer donne une variété qui a les trois yeux postérieurs du dessous des secondes ailes alongés & terminés inférieurement en pointe.

De plusieurs contrées de l'Amérique méridionale.

Nota. Dans les individu du Pérou, la bande du dessus des ailes est le plus ordinairement d'un bleu-violet ; dans ceux du Brésil & de Surinam, elle est d'un ton argenté.

11. Morpho Achille.

Morpho Achilles.

Mor. alis dentatis, suprà nigris, areâ baseos seu fasciâ mediâ nitidè cyaneâ : subtùs basi strigis plurimis virescentibus.

Papilio E. A. Achilles, *alis dentatis, suprà nigris, fasciâ cœruleâ : subtùs fuscis, ocellis tribus quinisque.* Linn. *Syst. Nat.* 2. *p.* 752. *n°.* 42. — *Mus. Lud. Ulr. p.* 211.

Papilio Achilles. Clerck, *Icon. tab.* 24. *fig.* 2.

Gronow, *Zooph.* 719.

Merian, *Surin. Inf. p.* 7. *tab.* 7.

Knorr. *Del. tab.* c. 2. *fig.* 1. 2.

Seba, *Muf.* 4. *tab.* 24. *fig.* 1. 2.

Papilio N. *Achilles.* Fab. *Syſt. Ent. p.* 456. *n°.* 54. — *Spec. Inſ. tom.* 2. *p.* 21. *n°.* 88. — *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 11. *n°.* 101. — *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 81. *n°.* 253.

Papilio Achilles. Cram. *pl.* 27. *fig.* A. B.

Papilio Achilles. Cram. *pl.* 28. *fig.* A.

Papilio Achilles. Herbst, *Pap. tab.* 25. *fig.* 2. 3.

Nous n'avons pas vu ce lépidoptère ; mais, d'après les figures des auteurs, il ne nous a paru différer de l'*Hélénor* que par les caractères ſuivans : 1°. le deſſus des ſecondes ailes eſt ſans points rouges ſur le limbe, & l'extrémité des premières n'a qu'un ou deux points blancs ; 2°. le deſſous des quatre ailes offre à la baſe pluſieurs lignes verdâtres, & la prunelle des yeux n'eſt point environnée d'atomes ferrugineux. Ces différences, en admettant qu'elles ſoient bien exactes, ſuffiſent-elles pour conſtituer une eſpèce à part ?

La chenille, ſelon Merian, eſt jaunâtre, avec des épines brunes, aiguës, médiocrement longues. Elle a en outre, ſur le devant du corps, des bouquets de poils bruns en forme de broſſes. On la trouve ſur le *cerifier d'Amérique.*

La chryſalide eſt courte, épaiſſe, verte, & munie de pointes aiguës à ſa partie antérieure. Le papillon éclôt au bout de cinq ſemaines, & donne dans le courant de mai.

12. Morpho Rhéténor.

Morpho Rhetenor.

Mor. alis ſuprà nitidiſſimè cyaneis : ſubtùs umbrino griſeoque variis, ocellis cœcis. (Mas.)

Papilio Rhetenor. Cram. *pl.* 15. *fig.* A. B.

Papilio Rhetenor. Herbst, *Pap. tab.* 27. *fig.* 1. 2.

Papilio Rhetenor. Esp. *Pap. exot. tab.* 42. *fig.* 1.

Papilio Rhetenor. Sulz. *Inſ. tab.* 13. *fig.* 1.

Nous ne connoiſſons que le mâle de ce lépidoptère.

Il a environ cinq pouces & demi d'envergure. Le deſſus des ailes eſt d'un bleu-azuré très-brillant, avec la côte des ſupérieures noire & leur ſommet violet.

Le deſſous eſt couleur de terre d'ombre vers la baſe ; d'un brun-griſâtre vers l'extrémité ; & traverſé au milieu par une bande blanchâtre, ſinuée, derrière laquelle on voit à chaque aile deux à trois petits yeux noirâtres, ſans prunelle, mais ayant aux inférieures un iris légèrement ferrugineux. Ces dernières ailes ont la côte bordée par une ligne blanchâtre, & les premières ont ſur le milieu pluſieurs taches inégales de cette couleur.

De Surinam.

13. Morpho Cythéris.

Morpho Cytheris.

Mor. alis ſuprà argenteo-cyaneis, nitidis : poſticis dentatis, ſubtùs faſciis plurimis argenteis ocelliſque tribus diſſitis. (Mas.)

Nous n'avons vu que des mâles de cette eſpèce.

Leur envergure eſt d'environ quatre pouces. Leur deſſus eſt d'un bleu-argenté-luiſant, avec une ligne ſur tout le contour extérieur des premières ailes, & une ſérie de points ſur la tranche du bord terminal des ſecondes, noirs. Les premières ailes offrent une tache blanchâtre vers le milieu de la côte, & les ſecondes ont la région de l'angle anal diviſée par une double ligne fauve, interrompue.

Le deſſous des quatre ailes eſt d'un brun-pâle, avec une multitude de bandes argentées, tranſverſes & flexueuſes, dont les deux poſtérieures ſéparées des autres par des yeux noirs ayant la prunelle argentée, l'iris roux & cerclé de gris. Ces yeux ſont écartés l'un de l'autre, & il y en a deux aux ailes de devant, trois à celles de derrière. Ces dernières ont l'angle de l'anus rayé de noir & de verdâtre. Le corps eſt bleuâtre en deſſus, griſâtre en deſſous.

Du Bréſil. — Très-rare.

14. Morpho Laerte.

Morpho Laertes.

Mor. alis ſubdentatis, utrinquè margaritaceo-albis, anticarum faſciâ coſtali nigrâ : poſticis ſubtùs ſtrigâ ocellorum.

Papilio N. Laertes, *alis dentatis, cinereo-albis : anticis apice nigris : poſticis ſubtùs ſtrigâ ocellorum fulvorum.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 84. *n°.* 262.

Papilio Laertes. Drury, *Inſ.* 3. *tab.* 15.

Papilio Laertes. Jon. *Fig. pict.* 5. *tab.* 46. *fig.* 1.

Papilio Laerte. Esp. *Pap. exot. tab.* 43. *fig.* 2. (La femelle.)

Elle a environ cinq pouces d'envergure. Ses quatre ailes ſont légèrement dentées, d'un blanc-nacré de part & d'autre. Leur deſſus offre, le long du bord poſtérieur, un double cordon de taches noires, mais plus grandes dans la femelle où elles ſont d'ailleurs ſéparées par une ligne noire en feſ-

ton. Les premières ailes des deux sexes ont en outre la moitié antérieure de la côte couverte par une raie noire qui se dilate en forme de crochet derrière la cellule sous-marginale.

En dessous, on retrouve les caractères du dessus, mais ils sont moins prononcés, & il y a au milieu de la surface une rangée transverse d'yeux noirs ayant l'iris fauve, & la prunelle formée par une ligne blanche. Ces yeux sont oblongs, au nombre de trois à quatre aux premières ailes; au nombre de sept, dont le postérieur semi-lunaire, aux secondes. Les premières ailes ont, vers le milieu de la cellule sous-marginale, deux petites taches brunes, plus ou moins alongées.

Nous avons vu, dans la collection de M. de Langsdorff, un individu femelle dont le dessous des ailes inférieures est varié de brun-pâle depuis la base jusqu'à l'extrémité.

Du Brésil.

15. Morpho Jaïrus.

Morpho Jaïrus.

Mor. alis integris, fuscis : posticis disco baseos albo, suprà oculo maximo, subtùs duobus diffitis.

Papilio F. Jairus, *alis integerrimis, fuscis : posticis disco albo, suprà ocello, subtùs duobus.* Fab. *Gen. Inf. Mant.* 258. — *Spec. Inf. tom.* 2. *p.* 30. *n°.* 325. — *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 54. *n°.* 168.

Papilio Caffiæ. Clerck, *Icon. tab.* 29. *fig.* 3.

Papilio Jairus. Cram. *pl.* 6. *fig.* A. B.

Papilio Jairus. Cram. *pl.* 185. *fig.* A. B. C.

Papilio Jairus. Herbst, *Pap. tab.* 218. *fig.* 1. 2. 3.

Elle a de quatre pouces à quatre pouces & demi d'envergure. Ses ailes sont entières, d'un brun-obscur de part & d'autre. Les supérieures sont ordinairement sans taches dans le mâle; mais, dans la femelle, elles offrent, entre le milieu et le sommet, un espace blanchâtre, plus prononcé en dessous qu'en dessus.

Les ailes inférieures ont le milieu blanc, à partir de la base. Leur dessus n'a qu'un seul œil, placé entre la couleur blanche & l'angle de l'anus. Leur dessous en a deux, dont un correspondant à celui de la surface opposée, l'autre appuyé sur la côte ou bord d'en haut. Ces yeux sont très-grands, noirs, avec la prunelle blanche & entourée d'atomes bleuâtres, l'iris d'un jaune-roussâtre. Le corselet est d'un brun-obscur, l'abdomen & les palpes sont fauves, & les antennes sont noires.

Dans certaines femelles, l'œil postérieur du dessous des secondes ailes est accolé à un autre œil beaucoup moins grand.

De l'île d'Amboine.

N. B. M. le capitaine Freycinet a rapporté des îles Rawack un individu mâle, remarquable par la petitesse de sa taille, ainsi que par la largeur de l'iris des ailes inférieures, & l'espace blanc qui longe de part & d'autre tout le bord interne des supérieures.

16. Morpho Odana.

Morpho Odana.

Mor. alis subdentatis, nigricanti-fuscis : anticis fasciâ violaceo-cæruleâ, nitidâ : posticis subtùs ocello anali cæco.

Nous ne connoissons cette espèce que par un individu unique qui nous a paru être un mâle.

Il a environ trois pouces & demi d'envergure. Le dessus de ses ailes est d'un brun-noirâtre, avec une bande courbe & oblique d'un bleu-violet vers le milieu des supérieures, lesquelles ont en face du sommet une tache blanchâtre peu prononcée. Les ailes inférieures n'ont pas de taches, seulement la cellule de leur base est plus noirâtre que le reste de la surface.

Le dessous des quatre ailes est d'un brun-enfumé & un peu chatoyant, avec des bandes violâtres, bordées de brun-marron. Les ailes supérieures en ont quatre, dont les trois antérieures plus courtes & appuyées transversalement près de l'origine de la côte, la quatrième se dirigeant obliquement vers le bord postérieur, qui est plus pâle que le reste de la surface. Les ailes inférieures n'en ont que trois, savoir : deux très-courtes à la base, & une plus longue sur le milieu. Cette dernière aboutit presqu'à un œil noirâtre, assez grand, sans prunelle, mais ayant un iris jaune qu'entoure un cercle noir. Indépendamment de cet œil, il y a vis-à-vis du sommet un point jaunâtre, & à l'angle anal une tache noire, semi-lunaire. Le bord postérieur des mêmes ailes est aussi plus pâle, & il est divisé dans le sens de sa longueur par une ligne blanchâtre, ondulée.

De Java.

17. Morpho Ogina.

Morpho Ogina.

Mor. alis subdentatis, suprà violaceo-fuscis, fasciâ posticâ cæruleſcente : posticis subtùs ocellis 2-5.

Elle est à peu près de la taille de la précédente. Le dessus des ailes est d'un brun glacé de violet, avec une bande postérieure & transverse d'un bleu-pâle & chargée d'un rang de points bruns. Cette bande n'existe quelquefois qu'aux ailes supérieures. Les ailes inférieures ont vers le milieu une tache noire, veloutée, ronde & coupée par une nervure fourchue.

Le dessous des quatre ailes est d'un brun-verdâtre un peu glacé de violet, avec deux bandes très-brunes, dont l'antérieure sinuée & plus courte; l'autre discoïdale, & suivie aux secondes ailes

d'une rangée de deux à cinq yeux qui ont la prunelle blanche & en croissant, l'iris jaune & entouré d'un cercle noir. Le corps est de la couleur des ailes, c'est-à-dire, d'un brun-violet en dessus, d'un brun-jaunâtre en dessous. Les antennes sont fauves.

De Java.

Nota. Nous n'avons vu que des mâles.

18. Morpho Célinde.

Morpho Celinde.

Mor. alis subdentatis, supra violaceo-fuscis, fasciâ mediâ cœrulescente : anticis apice fulvo-punctatis : posticis subtùs ocellis duobus remotis.

Papilio Celinde. Stoll, *Pap. Suppl. à* Cram. *pl.* 37. *fig.* 1 & 1. A.

Il seroit bien possible que ce lépidoptère fût la femelle du précédent; car, d'après la figure de Stoll, il paroît n'en différer que parce que la bande bleue du dessus des ailes est discoïdale & plus large, & parce que l'extrémité des supérieures offre une rangée transverse de sept points fauves. Le dessous des secondes ailes n'a que deux yeux; mais, comme nous l'avons dit en parlant de l'*Ogina*, le nombre des taches oculaires varie de deux à cinq.

De Java.

19. Morpho Tullia.

Morpho Tullia.

Mor. alis subdentatis, supra violaceo-fuscis, apice flavo maculato : subtùs punctis baseos fuscis.

Papilio N. Tullia, *alis dentatis, fuscis, maculis ocellaribus : subtùs fasciâ violaceâ, posticarum ocellis duobus.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 98. *n°.* 305.

Papilio Tullia. Cram. *pl.* 81. *fig.* A. B.

Nous ne connoissons ce lépidoptère que par un échantillon sans abdomen, & par la figure de Cramer.

Il est de la taille de l'*Odana*. Le dessus des ailes est d'un brun légèrement glacé de violet, avec des taches jaunâtres, orbiculaires, disposées, parallèlement au bord terminal, sur trois rangs, dont les deux intérieurs plus courts. Les premières ailes ont en outre une bande jaunâtre, sinuée, se dirigeant obliquement du milieu de la côte vers le sommet.

Le dessous des quatre ailes est d'un jaune-sale, avec deux bandes brunâtres, transversales, dont la troisième, à partir de la base, plus large, & offrant, mais seulement aux secondes ailes, deux yeux à prunelle blanche, à iris jaune & cerclé de noir. Indépendamment de cela, il y a près de la base de toutes les ailes plusieurs points bruns, rapprochés deux à deux.

De la Chine.

20. Morpho Ménéthon.

Morpho Menetho.

Mor. alis dentatis, fuscis, margine flavo maculato : posticis subtùs ocellis duobus. Fab.

Papilio N. *Menetho.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 83. *n°.* 260.

Papilio Menetho. Jon. *Fig. pict.* 5. *tab.* 61.

Papilio Menetho. Donow. *Of an Epitome of the Nat. Hist. of the Insects of India, cah.* 2. *pl.* 1. *fig.* 1.

Ce lépidoptère paroît ressembler beaucoup au précédent; peut-être même n'en est-il qu'une variété.

Voici ce qu'en dit Fabricius : les quatre ailes sont dentées, d'un brun-obscur en dessus, avec deux rangées transverses & presque terminales de taches jaunes.

En dessous le fond des ailes est jaunâtre, avec deux bandes obscures & communes, entre lesquelles les secondes ailes ont deux yeux sans prunelle.

De l'Inde.

N. B. D'après la figure de Donowan, il y a sur le milieu de la côte des quatre ailes une tache jaune, transversale, dont ne parle pas Fabricius. Cette tache appartient probablement à la femelle.

II. Cellule discoïdale des secondes ailes fermée en arrière par une nervure en angle aigu & d'où part un rameau longitudinal qui s'étend jusqu'au bord postérieur.

A. Ailes supérieures non concaves. Inférieures ayant l'angle de l'anus plus ou moins prolongé.

21. Morpho Actorion.

Morpho Actorion.

Mor. alis integris, supra umbrinis : anticis fasciâ apicis rufâ areâque interiori nitidè violaceâ.

Papilio P. U. Actorion, *alis subcaudatis, fuscis : primoribus fasciâ lutescente exteriore maculâque cœruleâ posticâ, subtùsque ocello.* Linn. *Syst. Nat.* 2. *p.* 794. *n°.* 262. — *Amœn Acad. tom.* 6. *p.* 409. *n°.* 78.

Papilio Actorion. Clerck, *Icon. tab.* 36. *fig.* 2.

Seba, *Mus.* 4. *tab.* 41. *fig.* 17. 18.

Papilio D. F. *Actorion.* Fab. *Syst. Ent. p.* 533. *n°.* 586. — *Spec. Ins. tom.* 2. *p.* 61. *n°.* 271. — *Mant. Ins. tom.* 2. *p.* 29. *n°.* 312.

Papilio Actorion. Cram. *pl.* 49. *fig.* C. D. (Le mâle.)

Papilio Actorion. Herbst, *Pap. tab.* 152. *fig.* 3. 4.

Linnæus a placé cette eſpèce dans ſa diviſion des *Plébéiens urbicoles*, diviſion qui correſpond en partie à notre genre Polyommate.

Elle n'a guère plus de deux pouces d'envergure. Le deſſus des premières ailes eſt couleur de terre d'ombre, avec une bande rouſſe, courbe en arrière, allant du milieu de la côte au milieu du bord terminal, & précédée en dehors de deux petits points blancs. Dans le mâle, ces mêmes ailes ont une tache poſtérieure, & dans la femelle une bande diſcoïdale, d'un violet-luiſant. Les ſecondes ailes ont le bord interne largement échancré à ſa partie inférieure. Leur deſſus eſt auſſi couleur de terre d'ombre, mais ſans taches.

Le deſſous des quatre ailes eſt ferrugineux & finement ondé ou réticulé de gris, avec deux points blancs & un œil noir à prunelle violette & à iris jaune au ſommet des ſupérieures; avec deux yeux jaunâtres à prunelle brune vers le milieu du bord antérieur des inférieures. Celles-ci offrent en outre, ſur le prolongement de l'angle de l'anus, un trait noir, longitudinal, & bordé intérieurement de blanc-violâtre. Le corps eſt brun en deſſus, jaunâtre en deſſous. Les antennes ſont rouſſes.

De Surinam & du Bréſil.

N. B. Le mâle a deux touffes de poils : l'une jaunâtre dans la gouttière du bord interne, l'autre brune à la baſe des ſecondes ailes.

B. Ailes ſupérieures concaves. Inférieures plus ou moins prolongées en dehors.

22. Morpho Aorſa.

Morpho Aorſa.

Mor. alis ſuprà nigricanti-fuſcis, ſtrigâ ſubterminali fulvâ : poſticis ſubtùs reticulatis biocellatiſque.

Par le port & par la couleur des ailes, cette eſpèce ſe rapproche du ſatyre *Europa* de Fabricius, ou *Beroe* de Cramer; mais, par les palpes & par les antennes, elle appartient aux *Morphos* qui ont la cellule diſcoïdale des ſecondes ailes fermée poſtérieurement.

Elle a de trois à quatre pouces d'envergure. Le deſſus des ailes eſt d'un brun-noirâtre, un peu chatoyant, avec une ligne fauve, partant du tiers poſtérieur de la côte des premières, & ſe continuant ſur la tranche du bord terminal des ſecondes. Celles-ci ont une queue extérieure, obtuſe & aſſez longue; celles-là ont au ſommet, derrière la ligne fauve dont il vient d'être queſtion, une rangée de trois points blancs.

Le deſſous des ailes ſupérieures eſt à peu près de la couleur du deſſus, & préſente les caractères ſuivans : vers la baſe eſt une bande rouſſe, tranſverſe, courte, droite, & compriſe entre deux lignes blanchâtres également droites & tranſverſes. Viennent enſuite deux bandes d'un blanc-jaunâtre-luiſant, en forme de chevron, & oppoſées par leur convexité. Près du ſommet, qui eſt d'une teinte violâtre, ſont deux yeux noirs, dont l'antérieur ſans prunelle, l'autre en ayant une blanche avec un iris jaunâtre.

Le deſſous des ſecondes ailes eſt d'un brun-noirâtre, ondé de jaunâtre, ſurtout vers le bord poſtérieur, ainſi qu'à la baſe où l'on voit deux taches obſcures & orbiculaires. Indépendamment de ces taches, il y a, ſur le milieu, deux yeux très-écartés, dont l'antérieur ferrugineux, marqué d'un croiſſant très-blanc, & pourvu d'un iris noir que borde un cercle jaunâtre; le poſtérieur noir, ſaupoudré de gris-verdâtre, ayant une prunelle très-blanche en croiſſant, & un iris ferrugineux. On remarque de plus entre ces yeux deux points rouſſâtres, peu prononcés.

Du Bréſil. — Très-rare juſqu'à préſent.

Nota. Le deſſous des ſecondes ailes offre, au bas de la cellule diſcoïdale, un renflement elliptique très-prononcé.

23. Morpho Automédon.

Morpho Automedon.

Mor. alis ſuprà nigro-fuſcis, diſco communi violaceo : anticarum apice (fem.) *ſtrigâ fulvâ : poſticis ſubtùs ocellis duobus, poſtremo ſeſquialtero.*

Papilio N. Automedon, *alis angulato-repandis, fuſcis : ſubtùs lividiuſculis, ocello anguli ani.* Fab. *Gen. Inſ. Mant.* 253. — *Spec. Inſ. tom.* 2. *p.* 25. *n°.* 103. — *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 13. *n°.* 120. — *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 87. *n°.* 272.

Papilio Automedon. Cram. *pl.* 41. *fig.* A. B. (Le mâle.)

Papilio Automedon. Cram. *pl.* 389. *fig.* A. B. (La femelle.)

Papilio Automedon. Herbst, *Pap. tab.* 31. *fig.* 3. (Le mâle.)

Papilio Automedon. Herbst, *Pap. tab.* 32. *fig.* 1. (Le mâle.) *fig.* 2. 3. (La femelle.)

Elle a de quatre pouces & demi à cinq pouces d'envergure. Le deſſus des ailes eſt d'un brun-noir, avec le milieu violet, mais d'un ton plus vif dans le mâle que dans la femelle. Celle-ci a en outre la tranche du bord poſtérieur des ſecondes ailes jaunâtre, & l'extrémité de ſes premières ailes eſt coupée par une raie fauve, tranſverſe, flexueuſe, tantôt interrompue, tantôt dilatée & marquée de

deux taches noires près du ſommet, lequel offre dans chaque ſexe un double point blanc.

Le deſſous des quatre ailes eſt d'un brun-griſâtre ou jaunâtre, ondé de noirâtre en deux endroits, ſavoir : à la baſe où il y a une bande blanche, commune & oblique; enſuite vers l'extrémité où ſont trois lignes noirâtres, tranſverſes & ſinuées, mais plus apparentes aux ailes ſupérieures qu'aux inférieures. Sur le milieu, où l'on remarque quelques hiéroglyphes noirs, les ſecondes ailes ont deux yeux, dont l'antérieur preſqu'ovale & appuyé obliquement ſur la côte, le poſtérieur placé beaucoup plus bas & réuni extérieurement à un autre qui eſt beaucoup plus petit. Ces yeux ſont jaunâtres, cerclés de noir, & marqués d'un croiſſant blanc. L'œil poſtérieur eſt en outre pointillé de gris-olivâtre. Aux deux points blancs du ſommet des premières ailes correſpondent deux points ſemblables, mais s'alignant ici avec deux taches noirâtres, réniformes, bordées de jaunâtre & aſpergées de blanc.

De Surinam & du Bréſil.

C. Ailes ſupérieures peu ou point concaves. Inférieures ſans prolongement.

24. Morpho Euryloque.

Morpho Eurylochus.

Mor. alis ſubdentatis, ſuprà fuſco-cæruleſcentibus : ſubtùs anticis ocellis duobus, poſticis tribus, omnibuſque ſtrigâ nigrâ, angulatâ, mediâ.

Papilio Eurilochus. Cram. *pl.* 33. *fig.* A.

Papilio Eurilochus. Cram. *pl.* 34. *fig.* A.

Papilio Eurilochus. Esp. *Pap. exot. tab.* 44. *fig.* 2.

Papilio Eurylochus. Herbst, *Pap. tab.* 29. *fig.* 1. 2.

Elle a de ſix pouces & demi à ſept pouces d'envergure. Le deſſus des ailes eſt d'un ton ardoiſé-obſcur, avec le limbe terminal largement noir, & diviſé en outre aux ſupérieures par deux lignes brunâtres, tranſverſes, ſinuées, dont l'intérieure plus courte, & ſéparée de l'extérieure par une ſuite de trois petites lunules blanches qui ſont face au ſommet.

Le deſſous des quatre ailes eſt brun, finement ondé de blanchâtre & de noirâtre, avec trois lunules blanches & un petit œil noir au ſommet des ſupérieures dont le bord de derrière eſt entièrement longé par une double ligne noirâtre en zig-zag; avec un arc de trois yeux écartés, & dont le poſtérieur très-grand, ſur le milieu des inférieures. Ce dernier œil eſt ſurmonté d'une ligne noire flexueuſe, ligne que Cramer n'a pas indiquée, non plus qu'une autre, à peu près ſemblable, & non moins caractériſtique, que l'on voit ſur le milieu des ailes de devant. Le corps eſt d'un bleu-obſcur en deſſus, brun en deſſous. Les antennes ſont noirâtres.

La femelle reſſemble au mâle, mais elle eſt plus grande.

De la Guyane & du Bréſil.

25. Morpho Ilionée.

Morpho Ilioneus.

Mor. alis ſubdentatis, ſuprà violaceo-cæruleſcentibus, limbo nigro, anticarum ſtrigis duabus, poſticarum ſinubus, flavidis.

Papilio Ilioneus. Cram. *pl.* 52. *fig.* A.

Papilio Ilioneus. Herbst, *Pap. tab.* 30. *fig.* 1.

Seba, *Muſ.* 4. *tab.* 31. *fig.* 3. 4.

Elle a environ cinq pouces d'envergure. Le deſſus des ailes eſt d'un bleu-violet-pâle, avec le limbe terminal largement noir, bordé de jaunâtre aux inférieures, & diviſé tranſverſalement aux ſupérieures par deux lignes également jaunâtres, entre leſquelles il y a vis-à-vis du ſommet un groupe de deux ou trois petites lunules blanches.

Le deſſous des ailes ſupérieures eſt brun & ondé de noirâtre, avec cinq bandes blanchâtres, ſinuées, tranſverſales, dont les trois antérieures plus courtes; les deux poſtérieures renfermant trois petites lunules blanches correſpondant à celles du deſſus, plus deux yeux, dont l'un faiſant ſuite à ces lunules, l'autre placé à égale diſtance du précédent & de l'angle interne. On voit en outre une tache blanchâtre, ſemi-lunaire, devant la première des deux bandes poſtérieures.

Le deſſous des ailes inférieures eſt coloré & ondé comme celui des ſupérieures, avec trois bandes blanchâtres, peu prononcées, & un arc diſcoïdal de trois yeux, dont l'intermédiaire beaucoup plus petit, le poſtérieur médiocrement grand & ſurmonté d'un petit arc noir, au-deſſus duquel il y a une tache blanchâtre, centrale. Le corps eſt bleuâtre en deſſus, brun en deſſous. Les antennes ſont noirâtres.

La femelle reſſemble au mâle, mais elle eſt un peu plus grande, & le ſommet de ſes ailes inférieures offre en deſſus trois lunules blanches, tandis qu'il n'y en a que deux dans le mâle.

De la Guyane & du Bréſil.

26. Morpho Teucer.

Morpho Teucer.

Mor. alis ſubdentatis : anticis ſuprà lividiuſculis ; poſticis ſuprà baſi cæruleſcente, ſubtùs ocellis tribus diſſitis, poſtremo maximo.

Papilio E. A. Teucer, *alis ſubrepandis, lividiuſculis : ſubtùs nebuloſis, poſticis ocellis tribus, poſtremo maximo.* Linn. *Syſt. Nat.* 2. *p.* 753. *n°.* 44. — *Muſ. Lud. Ulr. p.* 212.

Merian,

Merian, *Surin. Inf. p.* 23. *tab.* 23.

Sloan. *Jamaic.* 2. *p.* 219. *n°.* 24.

Papilio N. *Teucer.* Fab. *Syſt. Ent. p.* 458. *n°.* 66. — *Spec. Inſ. tom.* 2. *p.* 25. *n°.* 102. — *Mant. inſ. tom.* 2. *p.* 13. *n°.* 119. — *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 87. *n°.* 271.

Papilio Teucer. Cram. *pl.* 51. *fig.* A. B.

Papilio Teucer. Herbst, *Pap. tab.* 31. *fig.* 1. 2.

Papilio Teucer. Esp. *Pap. exot. tab.* 44. *fig.* 1.

Elle a de cinq à ſix pouces d'envergure. Le deſſus des premières ailes eſt d'une teinte livide vers la baſe, d'un brun-noirâtre vers l'extrémité, & traverſé obliquement au milieu par une ligne jaunâtre un peu flexueuſe.

Le deſſus des ſecondes ailes a la moitié antérieure d'un bleu-ardoiſé; l'autre moitié noire, avec la tranche du bord terminal légèrement blanchâtre.

Le deſſous des quatre ailes reſſemble au deſſous de l'*Ilionée*, mais l'œil poſtérieur des inférieures eſt ſenſiblement plus grand.

Elle habite une grande partie de l'Amérique méridionale.

Nota. Nous n'avons pas vu la femelle.

27. Morpho Idoménée.

Morpho Idomeneus.

Mor. alis ſubdentatis, ſuprà nigro-ſuſcis, omnium baſi poſticarumque limbo cæruleſcenti-violaceis: poſticis ſubtùs ocellis duobus maculaque centrali albâ.

Papilio E. A. Idomeneus, *alis ſubcrenatis, ſuſcis, cæruleſcenti-ſuſceſcentibus: ſubtùs nebuloſis, ocellis duobus, poſtico magno, flaveſcente.* Linn. *Syſt. Nat.* 2. *p.* 753. *n°.* 45. — *Muſ. Lud. Ulr. p.* 213.

Papilio Idomeneus. Clerck, *Icon. tab.* 20. *fig.* 1.

Gronow. *Zooph.* 721.

Merian, *Surin. Inſ. p.* 60. *tab.* 60.

Papilio N. Idomeneus, *alis ſubcrenatis, ſuſcis, baſi cyaneis: ſubtùs nebuloſis, poſticis ocello magno flaveſcente.* Fab. *Syſt. Ent. p.* 459. *n°.* 68. — *Spec. Inſ. tom.* 2. *p.* 26. *n°.* 105. — *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 13. *n°.* 123. — *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 88. *n°.* 275.

Papilio Surinamenſis, maximus: ſubtùs perbellè oculatus & marmoratus. Petiv. *Gazoph.* 43. *tab.* 28. *fig.* 1.

Papilio Idomeneus. Cram. *pl.* 52. *fig.* B.

Papilio Idomeneus. Cram. *pl.* 390. *fig.* A. B.

Papilio Idomeneus. Herbst, *tab.* 30. *fig.* 2.

Daubenton, *pl. enlum.* 96. *fig.* 1. 2.

Elle a environ ſix pouces d'envergure. Le deſſus de ſes ailes eſt d'un brun-noir, avec la baſe des quatre, & le bord terminal des inférieures, d'un bleu-ardoiſé. Les premières ailes ont une raie jaunâtre, ſe dirigeant obliquement de la partie poſtérieure de la côte vers le milieu du bord interne où elle ſe perd dans la couleur bleue. Cette raie eſt moins apparente dans certaines femelles que dans le commun des mâles.

Le deſſous des ailes eſt d'un brun-rouſſâtre, ondé de noir, avec deux bandes blanches, communes & ondées comme le fond. Entre ces bandes, les ſecondes ailes ont, indépendamment d'une tache blanche centrale, deux yeux écartés, dont l'antérieur roux, ayant un large iris noir & une prunelle blanche en croiſſant; le poſtérieur beaucoup plus grand, noir, fablé de verdâtre, ayant une prunelle ſemblable à celle que nous venons d'indiquer, & un très-large iris jaunâtre qu'entoure un cercle noir, mais plus étroit en arrière qu'en avant. Les premières ailes ont entre les deux bandes ſuſdites, deux raies blanches, ſinuées, dont la poſtérieure très-oblique, interrompue inférieurement; &, vis-à-vis du ſommet, deux yeux noirs, ſéparés l'un de l'autre par deux petites lunules blanches. Après ces yeux viennent deux lignes noirâtres, en zig-zag, & deſcendant de la côte à l'angle interne.

La chenille, ſelon Merian, eſt rougeâtre, avec trois tubercules bleus à tous les anneaux, tubercules de chacun deſquels part une aigrette noirâtre, longue. Sa nourriture n'eſt pas indiquée.

La chryſalide eſt verdâtre, dentée, & pourvue de deux éminences, dont l'antérieure placée ſur la tête & courbée en arrière; l'autre ſituée ſur le dos & courbée en avant. L'inſecte parfait n'y reſte guère que quinze jours, & paroît dans le courant de janvier.

De Surinam & du Bréſil.

28. Morpho Inachis.

Morpho Inachis.

Mor. alis ſubdentatis, ſuprà violaceo-cæruleis, omnium limbo nigro anticarumque apice luteo: poſticis ſubtùs ocellis duobus oblongis.

Elle a de ſix pouces à ſix pouces & demi d'envergure. Le deſſus des ailes eſt d'un bleu-violet, avec le limbe terminal largement noir. Outre cela, les premières ailes ont le ſommet d'un jaune-fauve, avec deux litures & trois petites lunules blanches, derrière leſquelles il y a une tache noire, tranſverſale.

Le deſſous des quatre ailes reſſemble beaucoup au deſſous de l'*Idoménée*, mais le fond eſt d'un brun moins rouſſâtre; le limbe terminal des ſupérieures eſt preſqu'entièrement ondé; les deux yeux des inférieures ſont oblongs, & la tache centrale qui les ſépare eſt jaunâtre & beaucoup plus petite.

La femelle ne diffère du mâle que parce qu'elle eſt un peu plus grande & qu'elle a l'abdomen plus gros.

Du Bréſil & du Pérou.

29. Morpho Martia.

Morpho Martia.

Mor. alis ſubdentatis : anticis utrinquè areâ centrali albâ ; poſticis ſuprà violaceis, ſubtùs bi-ocellatis.

Elle a environ cinq pouces d'envergure. Le deſſus des premières ailes eſt d'un brun-noirâtre, avec la partie inférieure de la baſe légèrement glacée de violet, & le milieu traverſé par une bande blanche, large, mais n'atteignant pas l'angle interne. Le ſommet offre en outre un groupe de deux petites taches blanches. En deſſous, le fond de ces ailes eſt brun, avec des hiéroglyphes noirâtres à la baſe; une bande blanche, jaſpée, ſur le milieu; quatre yeux, puis deux lignes flexueuſes, noirs, à l'extrémité. Les yeux ſont alignés vis-à-vis du ſommet, & l'inférieur d'entre eux a un iris roux.

Les ſecondes ailes ont le deſſus d'un violet aſſez vif, avec le limbe poſtérieur noir & liſeré de blanchâtre aux ſinus. Leur deſſous eſt brun, avec des ondes griſâtres à la baſe & à l'extrémité, des hiéroglyphes noirs & deux yeux écartés ſur le milieu. L'œil antérieur eſt rouſſâtre, avec l'iris noir & la prunelle blanche. L'œil poſtérieur eſt beaucoup plus grand, noir, avec la prunelle très-blanche & lunulée, l'iris jaune, cerclé de noir & ſurmonté d'un arc de cette couleur.

Décrite d'après deux individus mâles pris au Bréſil par M. le chevalier de Langſdorff.

30. Morpho Taramela.

Morpho Taramela.

Mor. alis ſubintegris : anticis ſuprà fuſcescenti-luteis, limbo nigro : poſticis ſubtùs ocellis duobus ſtrigâque undatâ cœruleſcente.

Elle a de cinq pouces à cinq pouces & demi d'envergure. Le deſſus des premières ailes eſt d'un fauve-jaunâtre un peu obſcur depuis la baſe juſqu'au-delà du milieu; enſuite noir juſqu'au bout, avec une ligne brunâtre, tranſverſe & flexueuſe.

Le deſſus des ſecondes ailes eſt d'un jaune très-obſcur à la baſe; d'une teinte ardoiſée au milieu; noir à l'extrémité, avec la tranche du bord poſtérieur griſâtre dans le mâle, jaunâtre dans la femelle.

Le deſſous des premières ailes eſt brun, avec des taches blanchâtres, irrégulières, à la baſe; une bande tranſverſe également blanchâtre ſur le milieu; deux lignes noires, flexueuſes, à l'extrémité. Entre ces lignes & la bande fuſdite, ſont des ondes blanches, derrière leſquelles on voit, en face du ſommet, une ſuite de quatre petits yeux noirs, dont le poſtérieur cerclé de roux.

Le deſſous des ſecondes ailes eſt brun, avec des ondes blanches à la baſe & derrière le milieu; des ondes noirâtres à l'extrémité. Sur le milieu ſont deux yeux écartés, dont l'antérieur rouſſâtre, entouré de noir & marqué d'un croiſſant blanc; le poſtérieur beaucoup plus grand, noir, avec la prunelle blanche & en croiſſant, l'iris jaunâtre, environné de noir, & ſurmonté d'une liture flexueuſe de cette couleur, puis d'un point jaunâtre. Entre ces yeux & le bord poſtérieur, il y a une ligne bleuâtre, finuée, courbe, & allant de la côte au bord interne. Le corps eſt jaunâtre en deſſus, brun en deſſous.

Dans la femelle, le deſſus des ailes ſupérieures offre, entre la partie jaune & la ligne brunâtre du limbe, une ſérie tranſverſe de ſept petites taches blanches.

Du Bréſil.

31. Morpho Saronia.

Morpho Saronia.

Mor. alis ſubintegris, ſuprà luteis, limbo nigro : ſubtùs anticarum diſco faſciâ bifidâ flaveſcente, poſticarum ocellis duobus remotis.

Elle a près de quatre pouces d'envergure. Ses premières ailes ſont entières, les ſecondes ſont un peu finuées. Le deſſus des quatre eſt d'un jaune plus ou moins rouſſâtre depuis la baſe juſqu'au-delà du milieu, enſuite d'un noir-brun juſqu'au bout. Il y a en outre, au ſommet des ailes ſupérieures, un arc tranſverſal de trois points d'un jaune d'ocre.

Le deſſous des premières ailes a environ la moitié antérieure d'un brun-tanné-clair, avec deux bandes jaunâtres, dont l'intérieure étroite, bordée de noir, ſe prolongeant, mais en devenant plus pâle, juſqu'au centre des ſecondes ailes; l'extérieure très-large, & ayant la partie ſupérieure profondément bifide. Après cette dernière bande, le fond devient d'un brun preſque marron, & préſente près de la côte un eſpace griſâtre, ondé de blanc, en forme de triangle renverſé, & ſuivi de trois points blancs, dont les deux poſtérieurs ſéparés par un œil noir à iris d'un jaune-paille & à prunelle ſemi-lunaire d'un beau blanc. Le long du bord terminal, qui eſt d'un gris-verdâtre, ſont deux lignes noires, flexueuſes, dont l'extérieure moins prononcée.

Le deſſous des ſecondes ailes eſt d'un brun-noirâtre, avec des ondes très-fines, leſquelles ſont rouſſâtres près de la baſe & avant le bord poſtérieur; d'un gris-ſale ſur ce même bord; blanchâtres ſur le milieu où il y a deux yeux écartés, dont l'antérieur ferrugineux & à iris noir; le poſtérieur noir, avec l'iris jaune & bordé de ferrugineux ou de noir. Ces yeux ont l'un & l'autre une prunelle comme l'œil des ailes de devant, mais elle eſt moins étroite. Le corps eſt fauve en deſſus, d'un gris-brun en deſſous. Les antennes ſont ferrugineuſes.

La femelle reſſemble au mâle.

Du Bréſil.

32. Morpho Acadina.

Morpho Acadina.

Mor. alis ſubdentatis, ſuprà fuſceſcenti-corticinis, ſtrigâ apicis fulvâ, anticarum geminâ: poſticis ſubtùs fuſciâ ſeſquialterâ albâ ocelliſque duobus remotis.

Elle eſt à peu près de la taille de la précédente. Le deſſus des premières ailes eſt d'un brun-tanné-pâle, avec l'extrémité noirâtre & chargée de deux lignes fauves, tranſverſes, dont l'extérieure courbe & maculaire, l'intérieure anguleuſe & plus courte. Ces deux lignes ſont ſéparées près de la côte par un arc tranſverſal de trois points d'un jaune d'ocre. Le deſſus des ſecondes ailes eſt d'un brun plus ou moins obſcur, avec le limbe terminal noirâtre & chargé d'un rang de lunules fauves, rapprochées deux à deux.

Le deſſous des premières ailes eſt fauve, avec quatre bandes jaunes, bordées de noir, étroites & tranſverſales, dont les deux intermédiaires renfermant deux petites taches de leur couleur; la poſtérieure n'atteignant pas le bord d'en haut, ayant ſur ſon côté interne un petit œil noir à prunelle blanche, & ſur ſon côté externe une double ligne noire, marginale, ſinuée. On voit de plus, entre cette dernière bande & la précédente, quelques ondes noirâtres, ainſi que trois points correſpondant à ceux de la ſurface oppoſée, mais blancs, au lieu d'être d'un jaune d'ocre.

Le deſſous des ſecondes ailes eſt brun, finement ondé de blanchâtre au bord interne, & enſuite de rouſſâtre juſqu'au limbe poſtérieur, avec deux bandes blanches, tranſverſes, diſcoïdales, ondées de même, dont l'intérieure moitié moins longue & ſéparée de la ſuivante par deux yeux à peu près ſemblables à ceux qu'on voit dans le *Saronia*. Le limbe poſtérieur eſt roux & diviſé dans toute ſa longueur par deux lignes jaunes, ſinuées & bordées de noir à leur côté interne. Le corps eſt brun en deſſus, jaunâtre en deſſous. Les antennes ſont d'un rouge-ferrugineux.

La femelle reſſemble au mâle, mais elle a le deſſus des ailes inférieures légèrement glacé de violet dans ſon milieu.

Du Bréſil.

33. Morpho Ruſina.

Morpho Ruſina.

Mor. alis ſubdentatis, ſuprà nigris, areâ nitidè cœruleâ tuncque ſuſciâ communi, anticarum ochreaceâ, poſticarum albâ: poſticis ſubtùs ocellis duobus remotis.

Elle eſt à peu près de la taille du *Saronia*. Le deſſus des ailes eſt d'un noir-brun, avec un eſpace d'un bleu-violet-luiſant, ſuivi aux ſupérieures d'une bande oblique d'un jaune d'ocre, & aux inférieures d'une bande blanche également oblique. Dans la femelle, les ailes ſupérieures ont, près de la côte, une double liture jaunâtre.

Le deſſous des ailes eſt brun & ondé de gris-jaunâtre, avec une bande correſpondante à celle du deſſus, mais forſement bifide aux ſupérieures, & renfermant dans ſa fiſſure un petit œil noir à prunelle blanche. Cette bande eſt précédée immédiatement aux ailes inférieures de deux yeux roux à iris noir & à prunelle blanche. Le corps eſt de la couleur des ailes. Les antennes ſont brunâtres & annelées de noir.

Du Bréſil, collection de M. le chevalier de Langſdorff.

34. Morpho Anaxandra.

Morpho Anaxandra.

Mor. alis ſubdentatis, ſuprà fuſco-nigris, faſciâ ſingularum pallidè ochreaceâ: poſticis ſubtùs ocellis tribus in arcum digeſtis.

Elle a de quatre pouces à quatre pouces & demi d'envergure. Le deſſus des ailes eſt d'un noir-brun-chatoyant, avec une bande d'un jaune d'ocre pâle ſur chacune des quatre. La bande des ſecondes ailes eſt plus ou moins longue: dans certains individus des deux ſexes, elle va de l'angle externe à la partie inférieure du bord abdominal; dans d'autres, au contraire, elle ne deſcend pas juſqu'au milieu de la ſurface. Sa largeur eſt également variable. La bande des premières ailes ſe dirige obliquement du ſommet vers l'origine du bord interne, & elle a fort ſouvent le milieu dilaté. Ces mêmes ailes ſont en outre vergetées de jaune-pâle ſur la majeure partie de leur bord d'en haut.

En deſſous, le fond de chaque aile eſt brun & finement ondé de gris ou de verdâtre, excepté aux endroits où reparoît la bande jaune du deſſus. Indépendamment de cela, il y a, au ſommet des ailes ſupérieures, un groupe de deux yeux noirs à prunelle blanche & à iris d'un jaune-obſcur; &, ſur le milieu des inférieures, un arc tranſverſal de trois yeux ſéparés, d'un roux-foncé, ayant l'iris

noir, la prunelle très-blanche & en croiſſant. Ces trois yeux ſont aſſez grands, & le poſtérieur d'entr'eux, qui eſt encore un peu plus grand, a le milieu noir. Le corps eſt brun en deſſus, plus pâle en deſſous. Les antennes ſont noirâtres.

Aſſez commune dans quelques parties du Bréſil.

Nota. Le mâle a près de la baſe des ailes inférieures un petit bouquet de poils jaunâtres.

35. Morpho Anaxarète.

Morpho Anaxarete.

Mor. alis integris, fuſco-nigris : anticis utrinquè ad apicem albo maculatis : poſticis ſubtùs griſeo-rufeſcentibus, punctis baſeos nigricantibus.

Papilio Anaxarete. Cram. *pl.* 95. *fig.* A. B. (Le mâle.)

Papilio Anaxarete. Cram. *pl.* 374. *fig.* A. B. (La femelle.)

Papilio Anaxaretus. Herbst, *Pap. tab.* 131. *fig.* 1. 2. (Le mâle.) *fig.* 3. 4. (La femelle.)

Elle eſt à peu près de la taille de l'*Anaxandra*. Le deſſus de ſes ailes eſt d'un noir-brun-chatoyant. Les premières ont neuf taches blanches, dont quatre réunies en une bande oblique au-delà du milieu de la côte, trois groupées vers l'angle interne, & deux plus petites faiſant face au ſommet. Les ſecondes ailes ont, entre le diſque & le bord terminal, une petite bande tranſverſe & flexueuſe, qui eſt blanche dans la femelle, d'un cendré-bleuâtre dans le mâle. Outre cela, la tranche du bord poſtérieur de toutes les ailes eſt blanchâtre ou plus claire que le fond.

Le deſſous des premières ailes diffère du deſſus en ce que la moitié antérieure de la côte eſt largement rouſſâtre, & le ſommet griſâtre.

Le deſſous des ſecondes ailes eſt d'un roux plus ou moins obſcur, avec des mouchetures brunâtres, & un arc diſcoïdal de trois taches blanchâtres, dont les deux antérieures preſqu'orbiculaires; la poſtérieure bilobée, & marquée par en haut d'un croiſſant blanc que ſurmonte un petit arc noir. Il y a en outre, vers la baſe, un groupe de points noirâtres. Le corps eſt de la couleur des ailes. Les antennes ſont blanchâtres.

De Surinam & du Bréſil.

36. Morpho Anoſia.

Morpho Anoſia.

Mor. alis dentatis, nigricanti-fuſcis : anticis utrinquè fuſciâ maculari albâ : poſticis ſubtùs ſtrigis flexuoſis, ocelliſque ſex, poſtremo bipupillato.

Elle a le port & la taille de l'*Anaxandra*. Ses ailes ſont dentées & d'un brun-noirâtre en deſſus. Les premières ont une bande blanche, maculaire, un peu courbe, & allant du milieu de la côte à l'angle interne. Leur ſommet offre en outre un point blanc, au-deſſus duquel il y a deux litures jaunâtres. Les ſecondes ailes ont une lunule blanche ſur chacune des deux échancrures antérieures.

Le deſſous des ailes de devant reſſemble au deſſus, mais il eſt un peu plus pâle, & il y a au ſommet, qui eſt nuancé de griſâtre, un œil noir à prunelle blanche & à iris jaunâtre, placé au bas du point blanc dont nous avons parlé en décrivant le deſſus de ces ailes.

Le deſſous des ailes de derrière eſt d'un brun-pâle, avec cinq lignes noires, tranſverſes & flexueuſes, dont trois vers la baſe, & deux vers le bord terminal. Entre ces deux dernières lignes & les trois précédentes, l'on voit une rangée courbe de ſix yeux à prunelle blanche, à iris jaunâtre & cerclé de noir. Les deux yeux antérieurs, & le poſtérieur, qui eſt bipupillé, ſont noirs; les trois autres ſont de la couleur du fond de l'aile, mais foiblement teintés de violet. Le corps eſt du même ton que les ailes. Les antennes ſont noirâtres.

Dans les deux ſexes, l'extrémité des ailes ſupérieures, à partir de la bande blanche, eſt d'un brun plus noir que le reſte de la ſurface.

Du Pérou & du Bréſil. — Très-rare.

37. Morpho Darius.

Morpho Darius.

Mor. alis integerrimis, fuſcis : anticis albo maculatis : poſticis ſubtùs arcu nigro. Fab.

Papilio F. *Darius.* Fab. *Syſt. Ent. p.* 482. *n°.* 173. — *Spec. Inſ. tom.* 2. *p.* 57. *n°.* 249. — *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 27. *n°.* 288. — *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 52. *n°.* 161.

Ce lépidoptère pourroit bien être une variété mâle de l'*Anaxarète ;* mais, dans le doute, nous traduiſons la deſcription que Fabricius en a donnée.

Il eſt grand, d'un brun-noirâtre en deſſus. Les premières ailes ont cinq taches blanches, dont une oblongue vers le milieu de la côte, trois plus petites près de l'angle interne, & une en forme de liture vis-à-vis du ſommet.

Les ſecondes ailes ſont ſans taches. Leur deſſous eſt gris, avec un arc noir & une petite lunule blanchâtre ſur le milieu.

Le deſſous des ailes ſupérieures reſſemble au deſſus, mais il eſt plus pâle. Les antennes ſont noirâtres.

Du Bréſil.

38. Morpho Œthon.

Morpho Œthon.

Mor. alis integerrimis, fuſcis, ſtrigâ marginali

fulvâ : posticis subtùs subundatis, ocellis septem. Fab.

Papilio N. *Œthon.* Fab. *Spec. Inf. tom.* 2. *p.* 59. *n°.* 259. — *Mant. Inf. tom.* 2. *pag.* 28. *n°.* 299. — *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 152. *n°.* 465.

Fabricius la décrit ainsi : elle a tout-à-fait le port de la M. de la *Cassé*. Ses quatre ailes sont entières, d'un brun-obscur en dessus, avec une raie fauve, transverse, placée aux inférieures le long du bord terminal, & aux supérieures vers l'extrémité. Le sommet de ces dernières offre en dessus quelques points blancs, & en dessous un petit œil noir.

Le dessous des secondes ailes a des ondes blanches & brunes, peu prononcées, avec sept yeux.

De Surinam.

39. Morpho Bérécynthus (1).

Morpho Berecynthus.

Mor. alis integris, suprà fusco-nigris, fasciâ fulvâ, terminali : anticarum angulatâ : posticis subtùs strigâ sex ocellorum.

Papilio N. Berecynthus, *alis integerrimis, suprà atris, fasciâ marginali flavâ : subtùs posticis maculis sex ocellaribus.* Fab. *Spec. Inf. tom.* 2. *p.* 59. *n°.* 259. — *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 28. *n°.* 298. — *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 151. *n°.* 462.

Papilio Berecynthia. Cram. *pl.* 184. *fig.* B. C.

Stoll, *Pap. Suppl. à* Cram. *pl.* 3. *fig.* 4. A. (La chenille jeune.) *fig.* 4. B. (La chenille adulte.) *fig.* 4. C. (La chrysalide.)

Papilio Berecynthius. Herbst, *Pap. tab.* 130. *fig.* 2. 3.

Seba, *Mus.* 4. *tab.* 13. *fig.* 2. 3.

Elle a environ quatre pouces d'envergure. Ses ailes sont entières, & les supérieures ont le bord terminal un peu concave. Le dessus des quatre est d'un noir-brun, avec une bande fauve. La bande des premières ailes descend de la côte à l'angle interne, en faisant un coude en arrière vers le milieu de sa longueur. Elle est en outre précédée en dehors de trois points blancs, disposés en un arc transversal vis-à-vis du sommet. La bande des secondes ailes est tout-à-fait terminale, & un peu sinuée à son côté interne.

En dessous, le fond est d'un brun plus clair qu'en dessus, & finement ondé de grisâtre, avec deux taches ferrugineuses, bordées de noir, près de la base de chaque aile. Indépendamment de ces taches, les premières ailes ont, non loin du sommet, un œil noir à prunelle blanche & à iris jaunâtre. Les secondes ailes offrent, un peu au-delà du milieu, une rangée courbe & transverse de six yeux semblables, mais inégaux, saupoudrés de gris-cendré, & pourvus d'un iris ferrugineux.

Nous avons vu un mâle sans bande fauve, & la femelle nous est inconnue.

La chenille, selon Stoll, est d'un brun-clair, avec des lignes obscures & longitudinales. Entre la cinquième & la neuvième incisions, sont alignées cinq épines noirâtres, dorsales & aiguës. Il y en a six autres sur la tête ; mais elles sont obtuses, velues & brunes. L'anus se termine par une fourche assez longue. Avant la quatrième mue, cette chenille a le dos vert, avec une seule épine, placée sur une tache noire. Elle vit sur le *cacaoyer* (*theobrana*).

La chrysalide est un peu anguleuse, brune & mouchetée de noir, avec des points argentés à l'enveloppe des ailes. Elle est suspendue par la queue, & la dépouille de la chenille y reste attachée.

De Surinam.

40. Morpho Xanthus.

Morpho Xanthus.

Mor. alis subintegris, suprà fusco-nigris : anticis fasciâ fulvâ, angulatâ : posticis subtùs ocellis duobus remotis, antico reniformi.

Papilio D. F. Xanthus, *alis integerrimis, suprà fuscis, fasciâ ferrugineâ : posticis subtùs ocellis duobus, altero lunari.* Linn. *Syst. Nat.* 2. *p.* 767. *n°.* 122. — *Mus. Lud. Ulr. p.* 267.

Clerck, *Icon. tab.* 34. *fig.* 1. 2.

Papilio N. Xanthus, *alis integerrimis, fuscis, fasciâ ferrugineâ : posticis subtùs griseo marmoratis, ocellis duobus.* Fab. *Syst. Ent. p.* 483. *n°.* 177. — *Spec. Inf. tom.* 2. *p.* 58. *n°.* 257. — *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 28. *n°.* 296. — *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 150. *n°.* 460.

Papilio Xanthus. Cram. *pl.* 183. *fig.* A. B.

Papilio Xanthus. Herbst, *Pap. tab.* 127. *fig.* 1. 2.

Elle a le port & à peu près la taille du *Bérécynthus*, & elle n'en diffère en dessus que parce que la bande fauve de ses ailes supérieures est tantôt interrompue par le milieu, tantôt unidentée en dehors ; parce que celle des inférieures est nulle ou

(1) Cette espèce & les suivantes font le passage des Morphos aux Brassolides, en raison de leurs antennes un peu plus renflées vers l'extrémité, & d'une fente longitudinale, couverte de poils, fente que l'on remarque, ainsi que dans les Brassolides, près du bord interne des ailes inférieures du mâle. Ce dernier caractère peut servir à distinguer ces espèces des Nymphales, avec lesquelles on seroit d'abord tenté de les confondre, si l'on n'avoit égard qu'aux palpes & aux antennes.

à peine indiquée au bord du sommet, du moins dans le commun des individus.

Le dessous des quatre ailes est à peu près de la couleur du dessus, avec des taches blanchâtres & des taches brunes en échiquier sur presque toute la surface des supérieures, & à la base des inférieures. Celles-ci sont ondées de blanc à la naissance de la côte, & de gris-roussâtre depuis le milieu jusqu'au bord terminal. Sur leur milieu sont deux yeux écartés, dont l'antérieur presque réniforme, brun & chargé d'un croissant blanc; le postérieur rond, noir, pablé de verdâtre, ayant la prunelle blanche & arquée, l'iris brun & très-large. Non loin du sommet des ailes de devant, il y a un moyen œil noir à prunelle blanche & à iris jaunâtre, œil que séparent de la côte quelques ondes, & trois points, blancs. Le corps est de la couleur des ailes. Les antennes sont ferrugineuses.

La femelle ressemble au mâle, excepté qu'elle n'a pas de fente près du bord interne des ailes inférieures, & que son abdomen est plus gros.

De Surinam & du Brésil.

Nota. Cramer a mal rendu les marbrures du dessous des ailes. Il n'a pas fait non plus sentir les sinuosités du bord terminal.

41. Morpho Caryatis.

Morpho Caryatis.

Mor. alis dentatis, fusco-nigris : anticis suprà fasciâ fulvâ posticâ, subtùs albâ mediâ : posticarum paginâ inferâ ocellis duobus dimidiatis.

Papilio Cassiope. Cram. *pl.* 57. *fig.* A. B.

Papilio Cassiopus. Herbst, *Pap. tab.* 128. *fig.* 3. 4.

Nous donnons cette Morpho d'après la figure de Cramer.

Elle a le port & la taille des trois précédentes. Ses ailes sont dentées, d'un noir-brun en dessus. Les inférieures n'ont pas de taches. Les supérieures offrent, indépendamment de trois points blancs placés au sommet, une bande fauve, un peu oblique, assez large, bidentée en dehors, unidentée en dedans, atteignant la côte & l'angle interne.

Le dessous des quatre ailes est d'un ton ferrugineux, avec des ondes grisâtres vers la base, & des ondes cendrées vers le bout. Sur le milieu des inférieures, sont deux yeux très-écartés, semi-lunaires, roux, avec l'iris blanc & bordé de noir. Le milieu des ailes supérieures est traversé par une bande blanche, un peu courbe en arrière, & leur sommet offre un œil noir à iris jaunâtre & à prunelle blanche.

De Surinam.

42. Morpho de la Casse.

Morpho Cassiæ.

Mor. alis dentatis, suprà nigricanti-fuscis : anticis utrinquè fasciâ fulvâ : posticis subtùs ocellis duobus diffitis, antico majore, subrotundato.

Papilio D. F. Cassiæ, *alis integerrimis, fuscis : primoribus posticarumque margine fasciâ ferrugineâ : omnibus subtùs ocellatis.* Linn. *Syst. Nat.* 2. *p.* 767. *n°.* 120. — *Mus. Lud. Ulr. p.* 265.

Clerck, *Icon. tab.* 34. *fig.* 3. 4.

Merian, *Surin. Inf. pag.* 3. *tab.* 32.

Papilio N. Cassiæ, *alis repandis, fuscis, fasciâ ferrugineâ, apice bifidâ : posticis subtùs cinereis, ocellis duobus.* Fab. *Syst. Ent. p.* 483. *n°.* 178. — *Spec. Inf. tom.* 2. *p.* 58. *n°.* 258. — *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 28. *n°* 297. — *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 150. *n°.* 461.

Papilio N. Glycerie, *alis dentatis, fuscis : anticis fasciâ fulvâ : subtùs anticis ocello, posticis duobus cœcis.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 94. *n°.* 291.

Papilio Cassiæ. Cram. *pl.* 105. *fig.* A. B.

Papilio Cassiæ. Cram. *pl.* 106. *fig.* A.

Papilio Quiteria. Cram. *pl.* 313. *fig.* 3. 4.

Stoll, *Suppl. à* Cram. *pl.* 3. *fig.* 3. A. (La chenille.) *fig.* 3. B. (La chrysalide.)

Papilio Cassiæ. Herbst, *Pap. tab.* 129. *fig.* 1. 2. *fig.* 3. (Mas.)

Papilio Quiterius. Herbst, *Pap. tab.* 127. *fig.* 3. 4.

Papilio Quiterius. Herbst, *Pap. tab.* 128. *fig.* 1. 2. (Mas.)

Fabricius fait de ce lépidoptère deux espèces, savoir : l'une sous le nom de *Cassiæ*, appartenant à l'Amérique; l'autre sous celui de *Glycerie*, appartenant aux Indes orientales.

Les ailes sont plus ou moins dentées, & varient pour l'envergure depuis trois pouces jusqu'à quatre & demi. Leur dessus est d'un brun-noirâtre. Celui des supérieures offre une bande fauve, sinuée, quelquefois bifide antérieurement, descendant du milieu de la côte à l'angle interne où elle se termine par un petit crochet aigu & dont la pointe est tournée du côté de la base de l'aile : derrière cette bande sont deux points blancs, placés vis-à-vis du sommet. Le dessus des secondes ailes est tantôt nud, tantôt coupé parallèlement au bord postérieur par une bande continue ou seulement par quelques taches d'un fauve-ferrugineux.

Le dessous des quatre ailes a beaucoup de rapport avec le dessous du *Xanthus*; mais ce qui

l'en diſtingue, c'eſt que les ſupérieures ſont moins tachetées de brun & de blanchâtre, & que leur bande fauve ſe reproduit ici preſqu'en totalité; c'eſt qu'indépendamment de cela, l'œil poſtérieur des ſecondes ailes eſt moins grand que l'antérieur. Le corps & les antennes ſont comme dans le *Xanthus*.

La chenille, ſelon Stoll & Merian, eſt verte, avec des lignes roſées, longitudinales, & les ſtigmates ferrugineux. Elle a en outre, au deſſus des pattes, une raie jaunâtre ou blanchâtre. Sa tête eſt d'un brun-obſcur, & couronnée de quatre épines rougeâtres, velues. Le corps ſe termine par une fourche aſſez longue, dont les extrémités ſont jaunâtres. Elle vit ſur la *caſſe* (*caſſia*), & ſe tranſforme vers la fin de mai. Le papillon commence à paroître dans la première quinzaine de juin.

La chryſalide eſt preſqu'ovoïde, un peu arquée, bifide antérieurement, brune & mouchetée de noir, avec des taches argentées.

De Surinam & du Bréſil.

N. B. Linnæus rapporte cette eſpèce à la figure 29 de Clerck. C'eſt ſans doute par inadvertance, car ladite figure repréſente le *Jairus*.

Il y a auſſi une erreur dans l'*Entomologie ſyſtématique* de Fabricius, à l'occaſion de ſon papillon *Caſſiæ*. On y lit: *tab.* 43, &c., au lieu de *tab.* 34. *fig.* 3. 4.

GENRE BRASSOLIDE.

CARACTÈRES DU GENRE.

Palpes inférieurs courts, ne s'élevant pas au-delà du chaperon, point barbus; antennes terminées par une massue épaisse et en forme de cône renversé. Cellule discoïdale des secondes ailes fermée en arrière, comme dans les Morphos de la seconde division.

ESPÈCES.

Bord postérieur des quatre ailes arrondi et entier.

1. Brassolide du Sophora.

Dessus des ailes d'un brun-obscur : les deux surfaces des supérieures avec une bande fauve, sinuée : dessous des inférieures avec trois yeux séparés.

2. Brassolide Astyra.

Dessus des ailes d'un noir-brun : les deux surfaces des supérieures avec une bande jaunâtre large : dessous des inférieures avec trois yeux séparés : bout de l'abdomen, et des points sur la poitrine, ferrugineux.

Bord postérieur des quatre ailes arrondi & entier.

1. Brassolide du Sophora.

Brassolis Sophoræ.

Briss. alis suprà fuscis : anticis utrinquè fasciâ fulvâ, repandâ : posticis subtùs ocellis tribus diffitis.

Papilio D. F. Sophoræ, *alis integerrimis, fuscis, fasciâ ferrugineâ : subtùs primoribus ocello unico, posticis tribus.* Linn. *Syst. Nat.* 2. *p.* 767. *n°.* 121. — *Mus. Lud. Ulr. p.* 266.

Papilio Sophoræ. Clerck, *Icon. tab.* 35. *fig.* 3.

Merian, *Surin. Inf. tab.* 35. *fig.* 1. 2.

Roes. *Inf.* 4. *tab.* 4. *fig.* 1. 2.

Papilio. N. Sophoræ, *alis integerrimis, fuscis, fasciâ ferrugineâ : posticis subtùs brunneis, ocellis tribus.* Fab. *Syst. Ent. p.* 483. *n°.* 176. — *Spec. Inf. tom.* 2. *p.* 58. *n°.* 256. — *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 28. *n°.* 295. — *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 150. *n°.* 459.

Papilio Sophoræ. Cran. *Pap. pl.* 253. *fig.* A. B. C.

Stoll, *Pap. Suppl. à* Cram. *pl.* 3. *fig.* 2. A. (La chenille.) *fig.* 2. B. (La chrysalide.)

Papilio Sophoræ. Herbst, *Pap. tab.* 129. *fig.* 4. 5.

Papilio Sophoræ. Herbst, *Pap. tab.* 130. *fig.* 1.

Elle a de trois pouces & demi à quatre pouces d'envergure. Ses ailes sont très-entières & d'un brun-obscur en dessus. Les premières, dont le bord antérieur est très-arqué, sont traversées, à partir du milieu de ce même bord, par une bande fauve, courbe, un peu sinuée, aboutissant à l'angle interne, & se prolongeant quelquefois, mais en perdant de sa largeur, jusqu'à l'angle correspondant des secondes ailes. Cette bande est plus ou moins bifide à son origine.

Le dessous des quatre ailes est plus pâle que le dessus & finement pointillé de gris. Celui des supérieures offre, indépendamment de la bande fauve dont nous venons de parler, un petit œil noir à prunelle blanche & à iris jaunâtre, œil peu distant du sommet & que précède en dehors une double ligne obscure, ondulée, presque marginale. Le dessous des ailes inférieures a une rangée courbe & disco'idale de trois yeux séparés, bruns, ayant l'iris noir, la prunelle blanche & en croissant. On voit de plus à la base de toutes les ailes une tache fauve, orbiculaire. Le corps est brun. Les antennes sont noires.

La chenille, selon Stoll & Merian, est pubescente, d'un brun-clair, avec des lignes noirâtres, longitudinales. Ses pattes antérieures sont noires, ainsi que sa tête, sur laquelle il y a une petite ligne jaunâtre, transversale. Elle vit en société très-nombreuse dans un tissu serré qu'elle fabrique, & d'où elle ne sort que pendant la nuit pour manger. La plupart des auteurs disent qu'elle se nourrit du *sophora;* d'après Stoll & Merian, elle vivroit aussi sur le *cocotier* & sur le *cacaoyer.* Sa métamorphose a lieu au commencement d'avril, & l'insecte parfait paroît quinze jours après.

La chrysalide est ovoïde, ramassée, un peu courbe, d'une couleur pâle, mouchetée de brun-ferrugineux & marquée de quatre points argentés. Elle est suspendue par la queue, & la dépouille de la chenille y reste attachée.

De Surinam & du Brésil.

2. Brassolide Astyra.

Brassolis Astyra.

Briss. alis suprà fusco-nigris : anticis utrinquè fusciâ lutescente, latâ : posticis subtùs ocellis tribus diffitis : abdominis apice pectorisque punctis ferrugineis.

Elle diffère de la précédente, en ce qu'elle a le fond des ailes d'un brun plus noir, & la bande fauve au contraire plus pâle & plus large; en ce que la partie postérieure de l'abdomen est ferrugineuse, & en ce qu'il y a des points de cette couleur sur la poitrine & sur le devant du corselet.

La femelle ressemble au mâle, mais elle a le corps beaucoup plus gros.

Du Brésil.

GENRE EURYBIE (1).

CARACTÈRES DU GENRE.

Palpes inférieurs courts, dépassant à peine le chaperon ; antennes en fuseau alongé et un peu courbe. Cellule discoïdale des secondes ailes fermée en arrière par une nervure en angle aigu, et d'où part un rameau longitudinal, qui se prolonge jusqu'au bord postérieur.

ESPÈCES.

A. Sommet des premières ailes aigu et un peu prolongé. Bord postérieur des secondes ayant le milieu dilaté en angle.

1. Eurybie Caroline.

Ailes d'un brun-noirâtre, ayant en dessus des taches ferrugineuses, et en dessous une rangée terminale de points oculaires.

B. Bord postérieur des quatre ailes arrondi et entier.

2. Eurybie Nicæus.

Dessus des ailes supérieures d'un brun-noirâtre, et offrant vers le milieu un œil sans prunelle; dessus des inférieures glacé de violet, avec deux rangs de taches rousses, ocellées, à l'extrémité.

3. Eurybie Dardus.

Dessus de toutes les ailes d'un brun-obscur, et offrant à l'extrémité deux cordons de taches ocellées : supérieures avec un œil presque central et sans prunelle.

(1) Nous donnons par addition ce genre d'Illiger. Il ne se compose jusqu'à présent que de quelques espèces, propres à l'Amérique méridionale.

A. Sommet des premières ailes aigu & un peu prolongé. Bord postérieur des secondes ayant le milieu dilaté en angle.

1. Eurybie Caroline.

Eurybia Carolina.

Eur. alis fuscis, suprà ferrugineo maculatis, subtùs strigâ terminali punctorum ocellarium.

Nous ne connoissons ce lépidoptère que par un individu mâle & unique, appartenant à M. le chevalier de Langsdorff.

Il a le port & la taille du *Citron* ou *Coliade du Nerprun.* (*Voyez p.* 89. *n°.* 2.) Le dessus de ses ailes est d'un brun-noirâtre-chatoyant, avec huit petites taches ferrugineuses sur le milieu des supérieures, & neuf semblables sur le milieu des inférieures. L'extrémité des ailes supérieures offre en outre deux points & un croissant blancs.

Le dessous diffère du dessus, en ce que le fond est plus pâle; en ce que les ailes supérieures sont sans taches ferrugineuses; enfin, en ce que l'on voit le long du bord terminal des quatre une rangée de points noirâtres, oculaires. Le corps est de la couleur des ailes, avec les palpes, & le tour des yeux, fauves. Les antennes sont annelées de noir & de gris, avec la sommité de la massue jaunâtre.

Du Brésil.

B. Bord postérieur des quatre ailes arrondi & entier.

2. Eurybie Nicæus.

Eurybia Nicæus.

Eur. alis anticis suprà nigricanti-fuscis, ocello centrali cæco; posticis violaceo nitentibus, apice strigis duabus ocellaribus rufis.

Papilio F. Nicæus, *alis integerrimis, fuscis: anticis ocello, posticis suprà fasciâ rubrâ marginali punctisque ocellaribus.* Fab. *Syst. Ent. p.* 482. *n°.* 175. — *Spec. Inst. tom.* 2. *p.* 57. *n°.* 251. — *Mant. Inst. tom.* 2. *p.* 28. *n°.* 290. — *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 53. *n°.* 163.

Papilio Salome. Cram. *pl.* 12. *fig.* G. H.

Papilio Salome Herbst, *tab.* 223. *fig.* 1. 2.

Elle a environ deux pouces d'envergure. Le dessus des ailes supérieures est d'un brun-noirâtre, avec une tache violette, presque centrale, cerclée de fauve, & suivie d'un groupe de deux points blancs. Il y a en outre, le long du limbe postérieur, un cordon de taches noires, entourées d'un iris plus pâle que le fond de l'aile.

Le dessus des secondes ailes est d'un brun plus ou moins glacé de violet, selon le sexe, avec une double rangée de taches oculaires à iris roux. Les taches de la rangée intérieure sont ordinairement moins apparentes que celles de la rangée extérieure.

Le dessous des quatre ailes est d'un gris-cendré, avec deux rangées transverses & presque terminales de petites taches blanchâtres, dont les extérieures orbiculaires & ayant le milieu noir. A la tache violette du milieu des premières ailes correspond ici une tache semblable, mais cerclée de jaune, & suivie de deux points de plus que du côté opposé. Il y a en outre, vers le milieu de la côte des secondes ailes, deux points blanchâtres, plus ou moins ombrés de noirâtre. Le corps est noirâtre en dessus, cendré en dessous, avec les palpes d'un jaune-orangé. Les antennes sont noirâtres, annelées de gris, avec la sommité jaunâtre.

De la Guyane & du Brésil.

Nota. Fabricius a fait sa description d'après la figure de Cramer. Nous en jugeons du moins par ces mots : *ailes inférieures avec une bande rousse, marginale, sur laquelle sont des points entourés d'un anneau jaune.*

3. Eurybie Dardus.

Eurybia Dardus.

Eur. alis omnibus suprà fuscis, apice strigis duabus ocellaribus : anticis ocello subcentrali cæco.

Papilio N. Dardus, *alis integerrimis, fuscis : anticis utrinquè ocello medio cyaneo : omnibus subtùs strigis duabus ocellaribus.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 156. *n°.* 482.

Papilio Lamia? Cram. *pl.* 150. *fig.* C.

Papilio Lamia? Herbst, *tab.* 223. *fig.* 3.

Ce lépidoptère n'est peut-être qu'une variété du *Nicæus.* En effet, il n'en diffère que parce qu'il est un peu plus petit, & parce que le dessus des premières ailes offre, avant le cordon de taches oculaires de l'extrémité, une rangée transverse de points, tantôt blancs, tantôt roussâtres.

Le dessus des secondes ailes est sans reflet violet, du moins dans les femelles, car nous n'avons pas vu de mâles.

De Surinam.

GENRE SATYRE.

CARACTÈRES DU GENRE.

Palpes inférieurs s'élevant notablement au-delà du chaperon, plus ou moins hérissés de poils en avant; antennes finissant tantôt par un bouton court et un peu en cuilleron, tantôt par une massue grêle et presqu'en fuseau. Cellule discoïdale ou centrale des secondes ailes fermée en arrière par une nervure en angle plus ou moins aigu et d'où part une seule branche longitudinale. Chenilles nues ou presque rases, et ayant l'anus terminé par une pointe fourchue. Chrysalides, du moins pour la plupart, suspendues par la queue.

I. *Cellule discoïdale des secondes ailes fermée par un angle peu aigu.*

Partie du genre Hætera de Fabricius. (Pap. *Lena*, *Nereis*, *Piera*, etc.)

II. *Cellule discoïdale des secondes ailes fermée par une nervure en angle très-aigu.*

Le genre Hipparchia de Fabricius, Maniola de Schrank. (Pap. *Circe*, *Hermione*, *Briseis*, *Galathea*, *Mœra*, *Janira*, *Tithonius*, etc.)

N. B. La massue des antennes ne peut pas être prise ici pour caractère; puisque, par exemple, elle est renflée et en cuilleron dans l'*Hermione*, tandis qu'elle est grêle et presqu'en fuseau dans le *Circé*, espèces d'ailleurs si voisines l'une de l'autre. Mais un caractère constant, et auquel on n'a peut-être pas fait assez d'attention, c'est que tous les Satyres, tant exotiques qu'indigènes, ont les deux premières nervures des ailes supérieures très-renflées à leur origine.

ESPÈCES.

A. Sommet des premières ailes plus ou moins tronqué. Bord postérieur des secondes finissant extérieurement par une petite queue.

1. Satyre Constantia.

Dessus des ailes d'un brun-obscur : sommet des supérieures avec une bande jaunâtre et deux points oculaires.

2. Satyre ? Bernard.

Ailes en queue, fauves : extrémité des supérieures noire, avec une bande jaune; inférieures avec une rangée transverse de points oculaires. Fab.

3. Satyre Banksia.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre : sommet des supérieures avec deux yeux, dont un moitié plus petit : dessous des quatre avec des bandes plus foncées, et une rangée transverse de points blanchâtres.

4. Satyre Léda.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre ou d'un brun-tanné : sommet des supérieures avec deux yeux, dont un moitié plus petit : dessous des quatre réticulé de gris, et offrant une rangée transverse d'yeux.

SATYRE. (Insecte.)

5. Satyre Gerdrudtus.

Ailes en queue, d'un brun-obscur : sommet des supérieures avec une tache oculaire : dessous (des quatre) *ferrugineux, avec un point blanc aux supérieures, et deux aux inférieures.* Fab.

6. Satyre Europa.

Ailes d'un brun-obscur : les deux surfaces des supérieures avec une bande blanche, oblique : dessous des inférieures avec une série d'yeux, plus une ligne blanchâtre, basilaire, et commune aux ailes de devant.

7. Satyre Caumas.

Dessous des ailes d'un gris-roussâtre, avec trois lignes ferrugineuses, transverses : limbe terminal des inférieures avec six yeux à prunelle formée par des atomes dorés.

8. Satyre ? Rohria.

Ailes dentées et en queue, d'un brun-obscur : supérieures avec une bande blanche : dessous des inférieures avec sept yeux, dont plusieurs ponctués de blanc. Fab.

9. Satyre ? Panthéra.

Ailes dentées et en queue, d'un brun-noirâtre : leur dessous ondé ; celui des inférieures avec deux yeux bleuâtres sur le milieu, et cinq vers l'extrémité.

B. Bord postérieur des premières ailes en faulx. Bord correspondant des secondes un peu prolongé à l'angle de l'anus, et terminé en dehors par une queue obtuse et très-oblique.

10. Satyre Chorinée.

Dessus des ailes d'un brun-obscur : supérieures avec une bande fauve, transversale : dessous des inférieures avec une ligne allant obliquement de l'angle externe à l'angle de l'anus.

C. Ailes supérieures triangulaires. Inférieures terminées en dehors par une petite queue aiguë, et ayant entre cette queue et l'angle de l'anus une dent obtuse.

11. Satyre Philoctète (1).

Dessus des ailes d'un brun-violet : inférieures offrant, vers l'angle de l'anus, trois taches bleues, dont les deux extérieures chargées chacune d'un point noir.

12. Satyre Morna.

Ailes dentées, d'un brun-obscur : les deux surfaces des inférieures avec deux yeux et trois points blancs. Fab.

D. Ailes ovales. Inférieures terminées en dehors par un prolongement plus ou moins remarquable.

13. Satyre Léna.

Ailes un peu transparentes, d'un brun-obscur : dessus des secondes ayant la moitié postérieure d'un noir-foncé, avec des taches bleues, éparses, et chargées pour la plupart d'un point blanc.

14. Satyre Dindymène.

Ailes d'un brun-obscur et un peu transparentes : dessus des inférieures avec une série de points oculaires : dessous des quatre avec trois lignes transverses, et des points à la base, plus obscurs.

15. Satyre Luna.

Ailes dentées, d'un brun-obscur, avec des lignes transverses plus foncées : inférieures avec deux yeux : dessous des quatre avec quatre points. Fab.

---

(1) Dans cette espèce et dans les sept suivantes, la cellule discoïdale des secondes ailes est fermée par un angle moins aigu que chez les autres Satyres, et les antennes sont presque filiformes. Ces espèces se rapportent au genre *Hæra* de Fabricius.

SATYRE. (Insecte.)

16. Satyre Néréis.

Ailes d'un brun-obscur et un peu transparentes, avec une bande blanche, linéaire, commune : inférieures fauves vers l'extrémité, avec deux yeux très-noirs.

17. Satyre Piéra.

Ailes transparentes : supérieures sans taches; inférieures ayant sur le milieu une ligne obscure, transversale, et à l'extrémité deux yeux separés par deux points blancs.

18. Satyre Andromède.

Ailes transparentes : supérieures avec deux lignes brunâtres, transversales; inférieures d'un rouge-cramoisi vers l'angle de l'anus, et offrant au sommet un seul œil.

E. Ailes supérieures triangulaires. Inférieures un peu tronquées vers l'angle de l'anus.

19. Satyre Girondius.

Dessus des ailes d'un brun-obscur, et offrant à l'extrémité quatre yeux rapprochés deux à deux; dessous des inférieures avec un point noir à la base.

20. Satyre Bétro.

Ailes d'un brun-noirâtre : dessus des supérieures avec une bande roussâtre à l'extrémité : dessous des inférieures avec une rangée transverse de points jaunâtres.

F. Sommet des premières ailes plus ou moins aigu. Bord terminal des secondes offrant vers l'angle de l'anus trois dents, dont l'extérieure souvent plus prononcée.

21. Satyre Chélys..

Dessus des ailes d'un brun-obscur, et sans taches : dessous des inférieures d'un ferrugineux-sombre, ou d'un gris-verdâtre, avec une rangée transverse de points jaunâtres.

22. Satyre Rébecca.

Dessus des ailes d'un brun-obscur, et sans taches : dessous légèrement glacé de violet, avec deux lignes transverses, et un point central, d'un ferrugineux-obscur.

23. Satyre Merméria.

Dessus des ailes d'un brun-obscur, et sans taches : dessous d'un ferrugineux-sombre, avec une ligne cendrée, transverse, discoïdale, et six points blanchâtres, oculaires.

G. Sommet des premières ailes un peu tronqué. Bord postérieur des secondes inégalement denté.

24. Satyre Lachès.

Ailes d'un brun-obscur, sans taches en dessus : dessous avec une bande postérieure d'un gris-violet et offrant aux supérieures cinq yeux peu prononcés, aux inférieures six.

25. Satyre Célia.

Ailes d'un brun-obscur, sans taches en dessus : dessous avec une bande postérieure d'un gris-violet et offrant aux supérieures quatre yeux peu prononcés, aux inférieures cinq.

H. Bord postérieur des quatre ailes arrondi.

26. Satyre Valentine.

Dessus des ailes d'un brun-obscur, et sans taches : dessous avec une bande d'un blanc-violatre, chargée de cinq yeux à chaque aile; milieu des inférieures d'un jaune-chamois.

27. Satyre Orchame.

Dessus des ailes d'un noir-enfumé, et sans taches : dessous avec une rangée transverse de points oculaires; troisième point des ailes supérieures adhérant par son côté interne à une lunule d'un rouge-fauve.

SATYRE. (Insecte.)

28. Satyre Pénéléa.

Dessus des ailes d'un brun-obscur, et sans taches : dessous des inférieures cendré à la base, avec un espace longitudinal jaunâtre; d'un brun-marron vers le sommet; violâtre vers l'angle anal, avec deux à quatre yeux.

29. Satyre Péribas.

Ailes dentées, d'un brun-obscur en dessus, avec un seul œil : leur dessous gris, avec une ligne jaunâtre, transversale, et deux points blancs aux supérieures, cinq à six noirs aux inférieures.

30. Satyre Dénina.

Ailes sinuées, d'un brun-obscur en dessus : leur dessous cendré, avec une bande blanche, commune, discoïdale; inférieures ayant six yeux rapprochés trois à trois, et dont le quatrième plus grand.

31. Satyre Quantius.

Ailes d'un brun-obscur, sans taches en dessus : dessous des inférieures avec une bande discoïdale et le limbe postérieur d'un cendré-violâtre, plus une rangée intermédiaire de points jaunâtres.

32. Satyre Halyma.

Ailes dentées, d'un brun-obscur et sans taches en dessus : leur dessous pâle, avec des bandes fauves, plus cinq yeux aux supérieures, sept aux inférieures. Fab.

33. Satyre Hermès.

Ailes entières, d'un brun-obscur, sans taches en dessus : leur dessous avec deux raies ferrugineuses, communes, et l'extrémité grisâtre; inférieures offrant cinq yeux, dont le 3e., le 4e. et le 5e. à double prunelle.

34. Satyre Ocypète.

Dessus des ailes d'un brun-obscur, et sans taches : leur dessous d'un gris-violet, avec cinq lignes ferrugineuses, communes; bord terminal des inférieures denté, et offrant six yeux bipupillés, dont le postérieur très-écarté des autres.

35. Satyre Argulus.

Ailes presqu'entières, d'un brun-obscur et sans taches en dessus : leur dessous plus pâle, avec trois lignes ferrugineuses, communes; inférieures offrant cinq yeux bipupillés.

36. Satyre Myncéa.

Ailes entières, d'un brun-obscur en dessus : leur dessous gris, avec quatre lignes ferrugineuses, communes; inférieures offrant cinq yeux bipupillés, dont l'anal visible en dessus.

37. Satyre Crantor.

Ailes entières, d'un brun-obscur : dessus des inférieures avec un seul œil bipupillé; leur dessous avec cinq yeux, dont le premier (à partir d'en bas) *et le quatrième bipupillés.* Fab.

38. Satyre Celmis.

Ailes presqu'entières, d'un brun-noirâtre : leur dessous avec trois lignes transverses plus obscures; inférieures ayant cinq yeux, dont le second et le troisième peu prononcés, le quatrième bipupillé et plus grand.

39. Satyre Pénélope.

Ailes entières, d'un brun-obscur en dessus, avec un seul œil : leur dessous grisâtre, avec deux lignes ferrugineuses, communes; angle anal des supérieures jaunâtre, inférieures avec deux yeux bipupillés.

SATYRE. (Insecte.)

40. Satyre Lydius.

Ailes entières, blanches : leur dessous avec quatre bandes ferrugineuses ; inférieures offrant trois yeux, dont l'anal plus grand et bipupillé.

41. Satyre Ocirrhoé.

Ailes presqu'entières, d'un beau blanc en dessus, avec l'extrémité d'un brun-noirâtre : leur dessous d'un brun-obscur, avec trois bandes blanches ; inférieures offrant cinq yeux, dont le troisième, le quatrième et le cinquième bipupillés.

42. Satyre Brixius.

Ailes entières, minces, d'un bleu-cendré, offrant de part et d'autre six raies brunes, transversales : quatrième rude des ailes inférieures offrant en dessous cinq yeux bipupillés.

43. Satyre Pæon.

Toutes les ailes dentées, d'un brun-obscur en dessus : dessous des inférieures jaunâtre à la base et au sommet ; puis d'un brun-obscur, avec quatre yeux bipupillés et formant deux groupes écartés.

44. Satyre Crimon.

Ailes presqu'entières, d'un brun-obscur : leur dessous avec trois raies plus obscures, transverses et ondulées ; inférieures ayant deux yeux bipupillés, et un troisième séparé des autres par deux taches jaunâtres.

45. Satyre Mæpius.

Ailes entières, d'un brun-obscur : leur dessous avec trois raies ferrugineuses, et la moitié postérieure grisâtre ; inférieures ayant cinq yeux bipupillés, dont le troisième, le quatrième et le cinquième visibles en dessus.

46. Satyre Pagyris.

Dessus des ailes d'un brun-obscur : leur dessous avec deux raies ferrugineuses, transverses et ondulées ; inférieures grisâtres à la base, puis jaunâtres, avec des taches argentées, et une noire chargée de deux points.

47. Satyre Pharès.

Ailes entières, d'un brun-noirâtre en dessus : dessous des supérieures jaunâtre, dessous des inférieures grisâtre, avec trois raies ferrugineuses, communes : les deux surfaces des ailes inférieures, avec six yeux, dont le troisième double.

48. Satyre Tolumnia.

Ailes presqu'entières, minces, d'un brun glacé de bleu : leur dessous avec quatre raies ferrugineuses, transversales ; inférieures ayant cinq yeux, dont le quatrième alongé, les autres bipupillés.

49. Satyre Aranéa.

Dessus des ailes supérieures d'un brun-noirâtre, dessus des inférieures d'un bleu-luisant : dessous des quatre avec trois raies ferrugineuses, transversales ; inférieures ayant cinq yeux, dont le second et le cinquième plus grands.

50. Satyre Léa.

Ailes presqu'entières, bleues en dessus : leur dessous d'un brun-violâtre, avec trois raies ferrugineuses, transversales ; inférieures ayant six yeux, dont le cinquième plus grand.

51. Satyre Cluéria.

Ailes minces, d'un violet-cendré : inférieures dentées, ayant de part et d'autres cinq yeux, et en dessous trois lignes et une bande brunes partant de la côte des ailes supérieures.

SATYRE. (Insecte.)

52. Satyre Cornélius.

Ailes très-entières, d'un cendré-obscur : inférieures avec quatre yeux rapprochés. Fab.

53. Satyre Doritis.

Ailes presqu'entières, d'un brun-obscur en dessus : leur dessous d'un bleu-pâle, avec cinq raies brunes et transversales ; troisième raie des ailes inférieures chargée de quatre yeux formant deux groupes écartés.

54. Satyre Doxès.

Ailes d'un brun-bleuâtre : leur dessous avec deux raies ferrugineuses, transversales ; inférieures ayant cinq yeux ovales, et couverts intérieurement d'une poussière argentée.

55. Satyre Canthus.

Ailes très-entières, d'un brun-noirâtre : dessous des premières avec quatre yeux, dessous des secondes avec six. Linn.

56. Satyre Cauthéus.

Ailes entières, d'un brun-noirâtre et sans taches en dessus : dessous des inférieures avec six yeux. Fab.

57. Satyre Eurythris.

Ailes entières, d'un brun-obscur, ayant en dessus deux yeux bipupillés et écartés : dessous des quatre avec deux lignes ferrugineuses, transversales ; inférieures offrant quatre yeux rapprochés deux à deux et séparés par autant de points.

58. Satyre Aréolé.

Ailes entières, d'un brun-noirâtre, sans taches en dessus : leur dessous avec deux lignes transverses, et un cercle, ferrugineux ; inférieures ayant six yeux, dont le troisième, le quatrième et le cinquième très-alongés.

59. Satyre Phocion.

Ailes très-entières, d'un brun-obscur et sans taches en dessus : dessous des inférieures avec des lignes jaunes, transversales, et trois yeux oblongs.

60. Satyre Herséis.

Ailes entières, minces, d'un brun glacé de bleuâtre : dessous des inférieures avec trois lignes ferrugineuses, transverses et anguleuses, plus cinq yeux, dont le troisième et le quatrième alongés.

61. Satyre Pacarus.

Ailes entières, d'un brun-noirâtre, sans taches en dessus : dessous des supérieures avec deux lignes ondulées plus obscures, dessous des inférieures avec trois et cinq yeux ayant la prunelle formée par des atomes argentés.

62. Satyre Périphas.

Ailes très-entières, d'un brun-obscur, avec un seul œil en dessus : leur dessous avec une ligne ferrugineuse, transversale ; inférieures ayant trois yeux, dont l'un séparé des autres par quatre points.

63. Satyre Sosybius.

Ailes très-entières, d'un brun-obscur, sans taches en dessus : leur dessous avec trois lignes transverses, et une liture centrale, plus obscures ; inférieures ayant six yeux, dont le troisième et le quatrième peu prononcés.

64. Satyre Galésus.

Ailes entières, d'un brun-obscur, sans taches en dessus : leur dessous avec trois lignes transverses plus obscures ; supérieures sans aucun point, inférieures avec cinq points noirâtres.

SATYRE. (Insecte.)

65. Satyre Phronius.

Ailes entières, d'un brun-noirâtre en dessus, avec le limbe terminal plus foncé : leur dessous avec des ondes et des lignes transverses d'un brun-obscur ; supérieures avec un point, inférieures avec quatre, blancs.

66. Satyre Mélusine.

Dessus des ailes d'un brun-obscur, avec le milieu plus pâle : leur dessous blanchâtre ; celui des supérieures avec deux yeux écartés, celui des inférieures avec sept rapprochés, dont le quatrième et le cinquième plus grands.

67. Satyre Bysès.

Ailes entières, minces, d'un brun-violâtre en dessus : leur dessous lilas et ondé de brun, celui des inférieures avec deux yeux séparés par quatre points blancs.

68. Satyre ? Polixenès.

Ailes entières, d'un brun-obscur : dessous des inférieures piqué de gris et de brun. Fab.

69. Satyre Écho.

Ailes dentées, d'un brun-obscur : les deux surfaces des supérieures ayant à l'extrémité un espace ferrugineux : dessous des quatre avec une rangée postérieure de points blancs.

70. Satyre Gripus.

Ailes entières, d'un brun-tanné : extrémité des supérieures jaunâtre de part et d'autre : dessous des quatre avec une rangée centrale de points blancs.

71. Satyre ? Arcésilaus.

Ailes très-entières, ferrugineuses et sans taches en dessus : leur dessous obscur, avec deux lignes transverses plus obscures et renfermant une série de points jaunâtres.

72. Satyre Abéona.

Ailes dentées, d'un noir-brun : supérieures ayant de part et d'autre deux bandes orangées, dont une plus courte, avec deux yeux : dessous des inférieures avec deux lignes jaunes renfermant deux yeux écartés.

73. Satyre Gélanor.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre et tacheté de fauve : supérieures avec un point blanc : dessous des inférieures d'un gris-violâtre, avec deux lignes brunes renfermant deux yeux écartés. (Femelle.)

74. Satyre Mardanie.

Ailes dentées, fauves : supérieures ayant le sommet noir, avec une bande blanche ; inférieures avec quatre points jaunes, oculaires.

75. Satyre ? Blomfildia.

Ailes dentées, jaunes, avec l'extrémité noire : dessous des inférieures obscur et ondé de blanc, avec quatre yeux, dont les intermédiaires sans prunelle. Fab.

76. Satyre Lycaon.

Ailes dentées : supérieures d'un brun-obscur, tachetées de jaune et de blanc ; inférieures ferrugineuses, avec six yeux ; leur dessous varié, avec huit yeux. Fab.

77. Satyre Hersé.

Ailes dentées, d'un ferrugineux-obscur : supérieures ponctuées de blanc ; inférieures ayant de part et d'autre sept yeux sans prunelle. Fab.

78. Satyre Minerve.

Ailes dentées, fauves, avec l'extrémité noire et tachetée de blanc : inférieures ayant en dessus cinq yeux sans prunelle, et en dessous sept avec une prunelle. Fab.

SATYRE. (Insecte.)

79. Satyre Proserpine.

Ailes dentées, fauves : extrémité des supérieures noire, avec des points jaunes : dessous des inférieures marbré, avec quatre yeux, dont les intermédiaires sans prunelle. Fab.

80. Satyre Mérope.

Ailes dentées, fauves en dessus, avec un seul œil : les deux surfaces des premières avec la moitié postérieure noire et tachetée de jaune : dessous des inférieures cendré et lavé de brun, avec deux yeux, et un troisième très-petit. (Femelle.)

81. Satyre Archémor.

Dessus des quatre ailes et dessous des supérieures fauves, variés de noir, avec un seul œil : dessous des inférieures d'un jaune-cendré, avec trois lignes brunes, ondulées, deux yeux, et un troisième, petits. (Mâle.)

82. Satyre Achauta.

Dessus des quatre ailes et dessous des supérieures fauves, rayés de noir, avec un seul œil : dessous des inférieures varié de brun et de jaunâtre, avec deux yeux écartés.

83. Satyre Sirius.

Ailes très-entières, d'un roux-obscur : dessus des supérieures avec deux yeux, dessus des inférieures avec quatre. Fab.

84. Satyre Terminus.

Ailes entières, d'un brun-obscur, avec un espace fauve : dessus des supérieures avec un seul œil, dessus des inférieures avec quatre. Fab.

85. Satyre Rémulia.

Ailes entières, d'un brun-obscur en dessus, avec le milieu fauve : leur dessous roussâtre à la base, gris à l'extrémité ; celui des inférieures avec six yeux, dont le deuxième, le troisième, le sixième, petits.

86. Satyre Macra.

Ailes dentelées, d'un brun-obscur en dessus, avec une bande fauve : les deux surfaces des supérieures ayant un œil bipupillé, et un autre très-petit : dessous des inférieures gris, avec deux lignes brunes, ondulées, et six yeux à iris double.

87. Satyre Mégère.

Ailes dentelées, fauves en dessus, et rayées de noirâtre : les deux surfaces des supérieures ayant deux yeux, dont un moitié plus petit : dessous des inférieures cendré, avec deux lignes brunes, ondulées, éclairées de jaunâtre, et six yeux à iris double.

88. Satyre Roxelane.

Ailes dentées, d'un brun foiblement obscur en dessus : les deux surfaces des supérieures avec le milieu fauve et coupé par les nervures ; dessous des inférieures gris, avec cinq lignes brunes, et cinq yeux à iris simple.

89. Satyre Egérie.

Ailes dentelées, d'un brun-obscur : les deux surfaces des supérieures avec beaucoup de taches jaunes ou fauves, et un seul œil : dessous des inférieures d'un gris-verdâtre, avec deux lignes brunes, ondulées, et une série de points oculaires.

90. Satyre Xiphia.

Ailes dentelées, d'un brun-obscur : les deux surfaces des supérieures avec beaucoup de taches fauves, et un seul œil : dessous des inférieures d'un gris-roussâtre avec une bande blanche appuyée transversalement sur la côte, et une série de points oculaires.

SATYRE. (Insecte.)

91. Satyre Galathée.

Ailes dentelées, d'un blanc-jaunâtre, avec la base et l'extrémité noires en dessus et tachetées de blanc : tache de la base presqu'ovale; inférieures avec deux et trois yeux noirs, nuls ou peu distincts en dessus.

92. Satyre Lachésis.

Ailes dentelées, blanches, sans taches en dessus à la base, noires et tachetées de blanc à l'extrémité; inférieures avec deux et trois yeux noirs, visibles de part et d'autre.

93. Satyre Argé.

Ailes dentelées, d'un blanc-jaunâtre, avec la base noire en dessus et marquée d'une tache blanche presqu'ovale : les deux surfaces des inférieures offrant de part et d'autre vers l'extrémité deux et trois yeux, puis une ligne noire, anguleuse.

94. Satyre Amphitrite.

Ailes dentelées, blanches, sans taches en dessus à la base, noires et tachetées de blanc à l'extrémité; inférieures avec deux et trois yeux, noirs en dessus, roux en dessous.

95. Satyre Psyché.

Ailes dentelées, blanches, sans taches en dessus à la base; noires, avec des taches blanches et des yeux noirs à l'extrémité : dessous des inférieures avec des veines, et deux plus trois yeux, bruns.

96. Satyre Déjanire.

Ailes presque dentées, d'un brun-obscur : les deux surfaces des supérieures avec cinq yeux : dessous des inférieures avec une bande blanche, sinuée et offrant six yeux, dont le troisième très-petit, l'anal bipupillé.

97. Satyre Minéus.

Ailes d'un brun-obscur : leur dessous avec une ligne sur le milieu, et quatre à l'extrémité, blanches : inférieures avec sept yeux, dont le premier, le troisième, le quatrième et le cinquième, plus gros.

98. Satyre Hésione.

Ailes d'un brun-obscur et sans taches en dessus : leur dessous avec une raie blanche, commune, et des yeux entourés chacun d'un cercle couleur de plomb; yeux des ailes supérieures au nombre de deux, yeux des inférieures au nombre de trois, dont un plus petit.

99. Satyre Constantius.

Ailes entières, d'un cendré-obscur, avec une rangée marginale de points noirâtres. Fab.

100. Satyre Nécys.

Ailes très-entières, d'un brun-noirâtre et sans taches en dessus : leur dessous d'un cendré-obscur, avec trois lignes brunes, transversales, et une rangée de six points blanchâtres.

101. Satyre Polydecta.

Ailes d'un brun-obscur : dessus des supérieures avec un seul œil, ou deux, dont un plus petit : dessous des quatre avec deux lignes noirâtres; celui des inférieures offrant sept yeux ou sept points oculaires.

102. Satyre Martius.

Ailes très-entières, noires : leur dessous avec quatre points oculaires aux supérieures, sept aux inférieures. Fab.

103. Satyre Zachéus.

Ailes entières, d'un brun-obscur, avec deux yeux en dessus : dessous des supérieures avec quatre, dessous des inférieures avec six. Fab.

SATYRE. (Insecte.)

104. Satyre Tabitha.

Ailes dentées, noires: supérieures avec un seul œil : dessous des quatre obscur, avec une rangée de points oculaires. Fab.

105. Satyre Clérimon.

Ailes un peu sinuées, d'un brun-obscur : dessus des supérieures avec un œil très-noir : dessous des quatre avec quatre yeux très-petits. Fab.

106. Satyre Florimel.

Ailes très-entières, d'un brun-obscur: dessus des supérieures avec deux yeux, dessous des inférieures avec quatre. Fab.

107. Satyre Mergus.

Ailes très-entières, semblables de part et d'autre, d'un brun-obscur : supérieures avec quatre yeux, dont l'antérieur bipupillé ; inférieures avec cinq. Fab.

108. Satyre Circé.

Ailes dentées, d'un noir-brun, ayant en dessus une bande blanche, commune: dessous des inférieures avec deux, dont une plus courte : bande des supérieures maculaire de part et d'autre, et n'offrant le plus souvent qu'un seul œil.

109. Satyre Briséis.

Ailes dentées, d'un brun-noirâtre à reflet verdâtre, avec une bande blanche, commune : bande des supérieures maculaire et offrant deux yeux écartés.

110. Satyre Hermione.

Ailes dentées, d'un brun-noirâtre à reflet verdâtre, ayant de part et d'autre une bande blanche, commune : bande des supérieures avec deux yeux écartés, bande des inférieures avec un seul.

111. Satyre Sémélé.

Ailes dentées, d'un brun-obscur en dessus, avec une bande jaunâtre, sinuée, interrompue : bande des supérieures offrant deux yeux de part et d'autre : dessous des inférieures marbré de brun et de cendré, avec une bande blanchâtre, anguleuse.

112. Satyre Alcyone.

Ailes dentées, d'un brun-obscur en dessus, avec une bande jaune, bordée de noir : bande des supérieures non sinuée et offrant de part et d'autre deux yeux : dessous des inférieures marbré de brun et de cendré, sans bande.

113. Satyre Aréthuse.

Ailes dentées, d'un brun-obscur en dessus, avec une bande fauve, maculaire, et offrant un œil sans prunelle : dessous des inférieures marbré de brun et de cendré, avec une bande blanchâtre, courbe en arrière.

114. Satyre Autonoé.

Ailes dentées, d'un brun-obscur en dessus, avec une bande jaunâtre: bande des supérieures offrant deux yeux de part et d'autre : dessous des inférieures nébuleux, avec des veines et quelques lignes trasverses, blanchâtres.

115. Satyre Ælio.

Ailes dentées, d'un jaune-obscur en dessus, avec une bande plus claire : les deux surfaces des supérieures (femelle) *avec deux points ocellés, leur dessous* (mâle) *avec un seul : dessous des inférieures marbré de brun et de cendré, avec des veines blanchâtres.*

SATYRE. (Insecte.)

116. Satyre Norna.

Ailes dentées, d'un jaune-obscur en dessus, avec une bande plus claire : les deux surfaces des supérieures (mâle) *avec deux points ocellés,* (fem.) *avec trois : dessous des inférieures marbré de blanchâtre et de cendré, avec une bande obscure, flexueuse, discoïdale.*

117. Satyre Fortunatus.

Ailes minces, dentelées, d'un gris-jaunâtre, avec la tranche du bord postérieur ponctuée de noir : dessous des inférieures avec des atomes, et deux lignes transverses, ondulées, d'un brun-obscur.

118. Satyre Tarpéius.

Ailes entières, d'un fauve-obscur en dessus : leurs deux surfaces avec une rangée de quatre à cinq points noirs : dessous des inférieures nébuleux, avec une bande plus obscure, sinuée, et des veines blanchâtres.

119. Satyre Phrynéus.

Ailes minces, entières, d'un blanc de lait et sans taches en dessus : leur dessous d'un brun-obscur, avec des veines d'un blanc-argenté, et une bande pâle chargée de cinq à six yeux.

120. Satyre Fidia.

Ailes dentées, d'un brun-obscur, glacé de verdâtre; supérieures avec deux yeux, pupillés de part et d'autre, et séparés par autant de points blancs : dessous des inférieures varié de brun et de blanc, avec deux lignes noires, flexueuses, dont une plus courte.

121. Satyre Fauna.

Ailes dentées, d'un brun-obscur, glacé de verdâtre : supérieures avec deux yeux, sans prunelle au-dessus, et séparés par autant de points blancs : dessous des inférieures cendré, avec deux lignes noirâtres, flexueuses, dont une plus courte, et une bande blanchâtre, discoïdale.

122. Satyre Cordula.

Ailes presque dentées, ayant le dessus d'un brun-noirâtre, avec une bande rousse, peu prononcée : supérieures offrant de part et d'autre deux yeux pupillés, et séparés par autant de points blancs : dessous des inférieures cendré, avec une bande et le bord postérieur blanchâtres, et deux points très-noirs intercalés vers l'angle de l'anus.

123. Satyre Bryce.

Ailes entières, d'un brun-noirâtre : supérieures ayant de part et d'autre deux yeux très-noirs, séparés par autant de points blancs : dessous des inférieures avec deux bandes grises, étroites.

124. Satyre Actæa.

Ailes entières, d'un brun-noirâtre : supérieures ayant de part et d'autre un seul œil dans le mâle, *deux dans la* femelle, *et deux points blancs intercalaires, mais visibles seulement en dessous dans le* mâle : *dessous des inférieures avec deux bandes blanches, crénelées, dont l'antérieure plus large et plus vive.*

125. Satyre Podarcé.

Ailes entières, d'un brun-noirâtre : supérieure ayant de part et d'autre un seul œil dans le mâle, *deux dans la* femelle, *et deux points blancs intercalaires, mais visibles seulement en dessous dans le* mâle : *dessous des inférieures avec deux bandes transverses, et des veines, blanches.*

126. Satyre Phædra (1).

Ailes dentées, d'un brun-noirâtre : supérieures ayant de part et d'autre deux yeux très-noirs à prunelle d'un bleu-violet.

---

(1) Cette espèce, et les suivantes jusqu'à l'*hyperanthus* inclusivement, sont connues sous le nom de *nègres.*

SATYRE. (Insecte.)

127. Satyre Alopé.

Ailes entières, d'un noir-brun : supérieures ayant de part et d'autre une bande d'un jaune d'ocre, avec deux yeux écartés : dessous des quatre ondé ; celui des inférieures avec six yeux, dont quatre peu distincts.

128. Satyre Pégala.

Ailes dentées, d'un brun-obscur : supérieures avec une bande rousse et un seul œil ; dessus des inférieures avec un œil, leur dessous avec six. Fab.

129. Satyre Zangis.

Ailes très-entières, d'un noir-brun en dessus : leur dessous ferrugineux, avec quatre lignes noires ; celui des supérieures avec un œil bipupillé, celui des inférieures avec deux, dont l'anal sans prunelle.

130. Satyre Servatius.

Ailes entières, d'un noir-bleu et sans taches en dessus : leur dessous ferrugineux, avec quatre lignes violâtres ; celui des supérieures avec deux yeux, celui des inférieures avec sept, dont le cinquième plus grand.

131. Satyre Hysius.

Ailes très-entières, d'un brun-obscur : dessus des inférieures et les deux surfaces des supérieures avec un espace ferrugineux, presque terminal : dessous des quatre avec une ligne grise, transverse, et un seul œil, lequel est bipupillé aux supérieures.

132. Satyre Clytus.

Ailes très-entières, d'un noir-brun : supérieures ayant de part et d'autre une bande jaune, bifide et renfermant deux yeux : dessous des inférieures avec deux et cinq yeux.

133. Satyre Cassus.

Ailes très-entières, d'un noir-brun : supérieures ayant de part et d'autre le milieu ferrugineux, et le sommet marqué d'un œil à double prunelle ; dessus des inférieures avec quatre à cinq yeux, leur dessous avec sept peu prononcés.

134. Satyre Cassius.

Ailes très-entières, d'un brun-noirâtre : supérieures ayant de part et d'autre le milieu ferrugineux, et le sommet marqué d'un œil à double prunelle ; dessus des inférieures avec deux yeux rapprochés, leur dessous avec trois très-petits.

135. Satyre Hyperbius.

Ailes très-entières, d'un brun-obscur, avec un espace roux : supérieures avec un œil à double prunelle : dessous des inférieures avec sept points. Linn.

136. Satyre Gorgé.

Ailes entières, d'un noir-brun en dessus, avec une bande ferrugineuse : les deux surfaces des supérieures avec un œil double, celles des inférieures avec un œil simple : dessous des inférieures cendré, avec trois lignes noirâtres, ondulées.

137. Satyre Manto.

Dessus des ailes d'un noir-brun : les deux surfaces des supérieures avec une bande ferrugineuse, chargée de quatre points très-noirs : dessous des inférieures gris, avec trois lignes noirâtres, transversales, dont les deux antérieures ondulées, la postérieure formée par des points.

138. Satyre Dromus.

Ailes entières, d'un noir-brun : supérieures ayant de part et d'autre deux yeux rapprochés : dessous des inférieures d'un gris-luisant avec deux lignes brunes, transverses et ondulées.

SATYRE. (Insecte.)

139. Satyre Aretée.

Ailes entières, d'un noir-brun en dessus, avec une bande ferrugineuse : bande des supérieures avec un œil double, ou un autre écarté : dessous des inférieures d'un vert-grisâtre, avec une rangée transverse de points blancs.

140. Satyre Arachné.

Ailes entières, d'un noir-brun à reflet violet : supérieures ayant de part et d'autre une bande ferrugineuse, avec deux yeux rapprochés, ou un autre écarté : dessous des inférieures cendré, avec une bande discoïdale, sinuée, et le bord postérieur, noirâtres.

141. Satyre Goante.

Ailes entières, d'un noir-brun en dessus, avec une bande ferrugineuse : supérieures ayant de part et d'autre un œil double, et un autre écarté et très-petit : dessous des inférieures d'un gris-nébuleux, avec une bande discoïdale plus obscure et bordée de blanc,

142. Satyre Stirius.

Ailes entières, d'un noir-brun en dessus, avec une bande ferrugineuse : les deux surfaces des supérieures avec un œil double, et un autre écarté ; celles des inférieures avec quatre yeux : dessous des inférieures cendré, avec une bande postérieure plus claire. (Fem.)

143. Satyre Dalmata.

Ailes entières, d'un noir-brun, ayant une rangée d'yeux de part et d'autre : sommet des premières avec un petit œil extérieur : dessous des secondes veiné de gris vers l'extrémité. (Fem.)

144. Satyre Afra.

Ailes entières, d'un noir-brun : les deux surfaces des supérieures et dessus des inférieures avec une bande ferrugineuse, maculaire, chargée de cinq à six yeux : dessous des inférieures avec des veines blanchâtres et une série de six à sept yeux.

145. Satyre Griéla.

Ailes un peu dentées, d'un noir-brun : supérieures ayant de part et d'autre quatre à cinq yeux foiblement pupillés : dessous des inférieures cendré, avec une bande noirâtre, discoïdale, sinuée : sinus du bord terminal des quatre ailes gris.

146. Satyre Æthiops.

Ailes entières, d'un noir-brun, ayant en dessus une bande ferrugineuse chargée de trois à quatre yeux : supérieures semblables de part et d'autre : dessous des inférieures avec une bande sinuée d'un cendré-luisant et offrant des points oculaires.

147. Satyre Ligéa.

Ailes un peu dentées, d'un noir-brun, offrant de part et d'autre une bande ferrugineuse chargée de trois à quatre yeux : dessous des inférieures avec une ligne blanche près du côté interne de la bande ferrugineuse : sinus du bord terminal des quatre ailes blancs.

148. Satyre Euryale.

Ailes un peu dentées, d'un noir-brun, offrant en dessus une bande ferrugineuse chargée de trois à quatre yeux : dessous des inférieures avec une bande dentée, blanchâtre ou jaunâtre, et marquée de points oculaires : sinus du bord terminal des quatre ailes blancs.

SATYRE. (Insecte.)

149. Satyre Mnestra.

Ailes entières, d'un noir-brun, ayant en dessus une bande ferrugineuse : bande des supérieures large, chargée de deux points ou de deux yeux : dessous des inférieures cendré et sans taches à l'extrémité.

150. Satyre Stygné.

Ailes entières, d'un noir-brun, ayant en dessus une bande ferrugineuse : les deux surfaces des supérieures avec un œil double, et un autre très-petit écarté, celles des inférieures avec trois.

151. Satyre Mélas.

Ailes entières, d'un noir-brun : supérieures ayant de part et d'autre une bande ferrugineuse (oblitérée dans le mâle), *avec un œil double, ou un autre très-petit écarté ; inférieures avec trois yeux, mais sans bande en dessous.*

152. Satyre Alecton.

Ailes entières, d'un noir-brun : supérieures ayant de part et d'autre une bande ferrugineuse, oblitérée, sans yeux ou avec deux dans le mâle, *avec quatre dans la* femelle : *dessous des inférieures d'un noir-foncé et sans yeux.*

153. Satyre Machabée.

Ailes entières, d'un noir-brun : supérieures ayant de part et d'autre une bande ferrugineuse, avec deux points très-noirs et rapprochés : dessous des inférieures avec deux taches à la base et une bande vers l'extrémité, jaunâtres.

154. Satyre Cassiope.

Ailes entières, d'un noir-brun : supérieures ayant de part et d'autre une bande ferrugineuse, avec trois points d'un noir-foncé : dessus des inférieures avec deux à quatre taches ferrugineuses, pupillées de noir ; leur dessous brun ou cendré, avec des points seulement.

155. Satyre Mélampus.

Ailes entières, semblables de part et d'autre, d'un noir-brun, avec une bande ferrugineuse, maculaire : bande des supérieures avec deux points très-noirs et rapprochés ; bande des inférieures avec trois, écartés.

156. Satyre Pharté.

Ailes entières, semblables de part et d'autre, d'un noir-brun, avec une bande ferrugineuse, maculaire et sans points.

157. Satyre Épiphron.

Ailes entières, d'un noir-brun à reflet verdâtre, avec une bande ferrugineuse, maculaire : bande des supérieures ayant de part et d'autre deux à quatre yeux ; bande des inférieures avec trois à cinq en dessous.

158. Satyre Œmé.

Ailes entières, d'un noir-brun : sommet des supérieures offrant de part et d'autre une tache ferrugineuse avec deux yeux très-petits : inférieures avec trois taches ferrugineuses en dessus, quatre à cinq en dessous.

159. Satyre Psodéa.

Ailes entières, semblables de part et d'autre, d'un noir-brun, avec une bande ferrugineuse, maculaire : bande des supérieures avec un double œil et d'autres plus petits : bande des inférieures avec quatre yeux dans le mâle, *six dans la* femelle.

160. Satyre Céto.

Ailes entières, semblables de part et d'autre, d'un noir-brun, avec une rangée de six taches ferrugineuses, chargées chacune d'un point oculaire.

SATYRE. (Insecte.)

161. Satyre Méduse.

Ailes entières, ou un peu dentées, d'un noir-brun, avec une bande maculaire, ferrugineuse ou jaunâtre : bande des supérieures ayant trois à cinq yeux de part et d'autre; bande des inférieures en ayant quatre à sept en dessous.

162. Satyre Hypéranthus.

Ailes entières, d'un noir-brun en dessus : leur dessous plus pâle; celui des inférieures avec deux ou trois yeux.

163. Satyre Jauira.

Ailes dentées, d'un brun-obscur en dessus : sommet des supérieures offrant de part et d'autre un seul œil : dessous des inférieures d'un cendré-jaunâtre, avec une bande plus claire, marquée de un à trois points noirs.

164. Satyre Eudora.

Ailes dentées, d'un brun foiblement obscur en dessus : supérieures avec un point noir dans le mâle, *deux dans la* femelle, *et autant d'yeux en dessous : dessous des inférieures d'un cendré-grisâtre, avec une bande plus claire et sans taches.*

165. Satyre Clymène.

Ailes dentées, d'un brun-obscur : supérieures ayant de part et d'autre le milieu roux, et le sommet marqué d'un œil; inférieures avec une rangée de trois à quatre taches oculaires en dessus, de sept en dessous.

166. Satyre Tithonius.

Ailes dentelées, fauves en dessus, avec la base et les bords obscurs : supérieures ayant de part et d'autre un œil bipupillé : dessous des inférieures d'un jaune-nébuleux, avec deux bandes plus claires, dont une plus courte, et cinq points ocellés.

167. Satyre Ida.

Ailes dentelées, fauves en dessus, avec la base et les bords obscurs : supérieures ayant de part et d'autre un œil bipupillé : dessous des inférieures d'un gris-nébuleux, avec deux bandes plus claires, et pas de points ocellés.

168. Satyre Bathséba.

Ailes dentelées, fauves en dessus, avec la base et les bords obscurs : supérieures ayant de part et d'autre un œil bipupillé : dessous des inférieures noirâtre, avec une bande jaunâtre, discoïdale, unidentée en dehors, et bordée par cinq yeux.

169. Satyre OEdipe.

Ailes entières, d'un noir-brun en dessus : leur dessous d'un jaune-obscur; celui des inférieures avec une série de six yeux bordés par une ligne argentée, et dont l'antérieur solitaire.

170. Satyre Héro.

Ailes entières, d'un brun-noirâtre en dessus : leur dessous plus pâle; celui des inférieures avec une série de six yeux bordés en dedans par une bandelette blanche, anguleuse, et en dehors par une ligne argentée.

171. Satyre Iphis.

Ailes entières : supérieures roussâtres de part et d'autre : dessus des inférieures d'un brun-obscur; leur dessous d'un cendré-verdâtre, avec une série de six yeux bordés en dedans par une bande blanche, interrompue, et en dehors par une ligne mine de plomb.

172. Satyre Arcanius.

Ailes entières : supérieures fauves de part et d'autre, avec le bout obscur : dessus des inférieures d'un brun-noirâtre; leur dessous d'un roux-cendré, avec une

bande blanche anguleuse, chargée de cinq à six yeux, dont l'antérieur solitaire, les autres bordés en dehors par une ligne argentée.

173. Satyre Corinus.

Ailes entières, fauves : supérieures avec un œil sans prunelle en dessus : dessous des inférieures d'un roux-cendré, avec une bande blanche, interrompue, chargée de cinq yeux, dont l'antérieur isolé, les autres bordés en dehors par une ligne argentée.

174. Satyre Philéus.

Ailes entières, d'un brun-obscur en dessus : milieu des supérieures fauve de part et d'autre : dessous des inférieures d'un brun-verdâtre, avec une bande blanche, courbe en arrière, et chargée de six yeux bordés extérieurement par une ligne argentée.

175. Satyre Dorus.

Ailes entières : dessus des supérieures brunâtre dans le mâle, *d'un jaune-fauve dans la* femelle, *avec un œil sans prunelle : inférieures d'un jaune-fauve, offrant en dessous une bande blanchâtre, bordée en dehors par une ligne argentée, et chargée de six yeux, dont l'antérieur isolé.*

176. Satyre Léandre.

Ailes entières : supérieures fauves, avec le bout obscur ; inférieures d'un brun-noirâtre, avec une bande fauve, chargée en dessus d'une série de points noirs, en dessous d'une rangée d'yeux bordés extérieurement par une ligne argentée.

177. Satyre Irius.

Ailes entières, fauves en dessus, avec le contour extérieur d'un brun-obscur : dessous des inférieures cendré, avec une bande jaunâtre, terminale, chargée de deux yeux et d'un point intermédiaire bordés intérieurement par une ligne ferrugineuse, et extérieurement par une ligne argentée.

178. Satyre Lyllus.

Ailes entières, d'un fauve-pâle en dessus, avec le limbe postérieur obscur : dessous des supérieures avec un seul œil et une ligne argentée, courte, presque terminale ; dessous des inférieures d'un gris-jaunâtre, avec une bande blanchâtre, oblitérée, et trois à quatre points très-blancs à iris noir.

179. Satyre Pamphile.

Ailes entières, d'un fauve-pâle en dessus, avec le limbe postérieur foiblement obscur : dessous des supérieures avec un seul œil ; dessous des inférieures d'un gris-verdâtre, avec une bande blanchâtre, sinuée, et trois à quatre points très-blancs à iris ferrugineux.

180. Satyre Davus.

Ailes entières, d'un brun foiblement obscur : dessus des supérieures avec un ou deux points noirs, leur dessous avec autant d'yeux ; dessous des inférieures d'un roux-verdâtre, avec une bande blanche, interrompue, et six yeux noirs.

181. Satyre Narcisse.

Ailes entières, d'un brun-obscur en dessus, avec un espace fauve ; roussâtres en dessous, avec des ondes brunes : supérieures avec un seul œil de part et d'autre, inférieures avec deux très-petits.

182. Satyre Magus.

Ailes très-entières, d'un fauve-obscur : supérieures ayant de part et d'autre un œil à double prunelle ; dessus des inférieures avec deux yeux, leur dessous avec trois. Fab.

SATYRE. (Insecte.)

183. Satyre Aphnius.

Ailes entières : supérieures d'un brun-obscur, avec un œil très-grand et bipupillé : dessus des inférieures d'un brun-obscur, avec une bande fauve ; leur dessous ondé de blanc et de cendré, et offrant quatre petits yeux, visibles sur la surface opposée.

184. Satyre Baldus.

Ailes entières, d'un brun-obscur en dessus : supérieures ayant de part et d'autre un œil bipupillé : dessous des inférieures avec six yeux, rapprochés deux à deux.

185. Satyre Arctoüs.

Ailes entières, d'un brun-obscur en dessus, plus claires et ondées de gris-cendré en dessous : les quatre n'ayant de part et d'autre qu'un seul œil, mais bipupillé et plus grand aux supérieures.

A. Sommet des premières ailes plus ou moins tronqué. Bord postérieur des secondes finissant extérieurement par une petite queue.

1. Satyre Constantia.

Satyrus Constantia.

Sat. alis suprà fuscis : anticarum apice fasciâ lutescente punctisque duobus ocellatis.

Papilio Constantia. Cram. *pl.* 133. *fig.* A. B.

Papilio Constantia. Herbst, *Pap. tab.* 173. *fig.* 6. 7.

Il a environ trois pouces & demi d'envergure. Le dessus de ses ailes est d'un brun-obscur, avec trois points blancs oculaires entre l'angle anal & la petite queue des inférieures, & deux points semblables, mais dont l'un plus gros, vis-à-vis du sommet des supérieures. Ces dernières ailes ont une bande jaune, courbe, sinuée, partant de la côte, & finissant presqu'en pointe à l'angle interne.

Le dessous des quatre ailes est grisâtre, avec une multitude d'atomes bruns, & une ou deux lignes transverses de cette couleur. Indépendamment de cela, les secondes ailes ont sur le limbe postérieur une rangée courbe & transversale de six yeux noirs, dont l'antérieur, le quatrième & le cinquième plus grands, le postérieur bipupillé, & tous pourvus d'une prunelle blanche & d'un iris jaune-paille. Le limbe analogue des secondes ailes offre, sur un fond plus pâle que le reste de la surface, une rangée de trois à quatre points blancs, oculaires.

La bande du dessus des ailes supérieures est plus étroite & plus foncée dans le mâle que dans la femelle.

Des Molucques.

2. Satyre? Bernard.

Satyrus Bernardus.

Sat. alis caudatis, fulvis : anticis apice atris, fasciâ flavâ ; posticis strigâ punctorum ocellatorum. Fab.

Papilio N. *Bernardus.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 71. *n°.* 223.

Papilio Bernarda. Jon. *Fig. pict.* 4. *tab.* 65. *fig.* 2.

Quoique nous n'ayons pas vu ce lépidoptère, nous soupçonnons qu'il doit plutôt appartenir aux Satyres qu'aux Nymphales. Il paroît, il est vrai, se rapprocher beaucoup de notre nymphale *Polixo* ou *Polixena* de Cramer (*voyez* n°. 169); mais la *Polyxo* n'a point de queue, & elle présente d'ailleurs d'autres petites différences qui viennent encore à l'appui de notre opinion.

Le corps est grand, fauve, avec les antennes noires. Les quatre ailes sont fauves en dessus, & les supérieures ont l'extrémité noire, avec une large bande jaune derrière laquelle il y a un petit point pareillement jaune. Les ailes inférieures se terminent par une queue, & elles offrent une rangée transverse de sept points noirs à prunelle blanche, dont l'extérieur double & plus grand que les autres.

Le dessous des quatre ailes est panaché, & il y a aux inférieures une ligne peu prononcée de points blancs & de points noirs.

De la Chine.

(*Traduction de Fabricius.*)

3. Satyre Bankfia (1).

Satyrus Bankfia.

Sat. alis suprà fuscis : anticis ocello apicis fere quialtero : omnibus subtùs obscuriùs fasciatis, strigâ punctorum albidorum.

Papilio N. Bankfia, *alis angulatis, suprà fuscis : anticis disco flavescente ocello atro pupillâ geminâ.* Fab. *Syst. Ent. p.* 499. *n°.* 245. — *Spec. Inf. tom.* 2. *p.* 84. *n°.* 371. — *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 45. *n°.* 448. — *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 106. *n°.* 327.

Papilio Bankfia. Donow. *Gen. Illust. of Entom. part.* 1. *an Epitome of the Inf. of New. Holl. pl.* 25. *fig.* 1.

Papilio Bankfia. Herbst, *Pap. tab.* 173. *fig.* 1. 2.

Papilio Phedima. Herbst, *Pap. tab.* 173. *fig.* 4. (Variété.)

Papilio Arcensia. Herbst, *Pap. tab.* 173. *fig.* 5. (Variété.)

Papilio Isinene. Cram. *pl.* 26. *fig.* A. B.

Papilio Mycena. Cram. *pl.* 291. *fig.* F. (Variété.)

Papilio Phedima. Cram. *pl.* 292. *fig.* B. (Variété.)

Il a le port du *Constantia*, mais il est un peu moins grand. Le dessus de ses ailes est d'un brun plus ou moins noirâtre. Non loin du sommet des supérieures sont deux yeux noirs à prunelle blanche, & dont l'antérieur plus petit, oblong, disposé longitudinalement. Ces yeux sont bordés du côté de la base par un croissant fauve, plus vif dans les mâles que dans les femelles. Les secondes ailes ont, vers l'angle anal, de un à trois petits points blancs.

Le dessous des quatre ailes varie beaucoup.

(1) Si cette espèce fût restée parmi les Nymphales, il eût suffi d'en traduire le nom pour apprendre au lecteur qu'elle a été dédiée par Fabricius au Mécène des savans & des naturalistes européens, à M. Banks, président de la Société royale de Londres.

Tantôt il eſt d'un brun-jaunâtre, tantôt d'un brun preſque marron, avec des bandes tranſverſes plus foncées, leſquelles ſont au nombre de deux ou de trois ſur les ailes ſupérieures, d'une ou de deux ſur les inférieures. Quelquefois ces bandes ſont mouchetées de noir, & le fond eſt cendré & parſemé d'atomes bruns. Outre cela, il y a vers l'extrémité des ailes inférieures une rangée courbe de trois à ſix points d'un blanc-verdâtre, & vers l'extrémité des ſupérieures une rangée de deux à quatre points ſemblables. Ces différences ne conſtituent pas des eſpèces, comme l'a penſé Cramer. Auſſi ſes papillons *Phedima*, *Mycena*, *Arcenſia* ne ſont-ils pour nous que des variétés. La dernière n'a pas d'yeux aux ailes ſupérieures en deſſus, mais ſimplement deux points blancs, dont l'antérieur plus gros. Le corps & les antennes ſont d'un brun-obſcur.

Du Bengale & de l'île de Java.

Nota. Linnæus a connu ce ſatyre, mais il l'a pris pour la femelle du *Léda*.

4. Satyre Léda.

Satyrus Leda.

Sat. alis ſuprà fuſcis, ſeu corticino-fuſcis : anticis ocello apicis ſeſquialtero : omnibus ſubtùs griſeo reticulatis, ſtrigâ ocellorum.

Papilio N. Leda, *alis angulatis, luridis : primoribus ocello geminato : poſticis ſubtùs ocellatis.* Linn. *Syſt. Nat. 2. p. 773. n°. 150.*

Edw. *Av.* 297.

Papilio N. Leda, *alis angulatis, fuſcis : anticis ſuprà ocello geminato : ſubtùs griſeo reticulatis ; poſticis ocellis ſex.* Fab. *Syſt. Ent. p. 500. n°. 246. — Spec. Inſ. tom. 2. p. 85. n°. 370. — Mant. Inſ. tom. 2. p. 46. n°. 454. — Ent. Syſt. em. tom. 3. pars 1. p. 108. n°. 333.*

Papilio Leda. Cram. *pl.* 196. *fig.* C. D.

Papilio Leda. Cram. *pl.* 292. *fig.* A.

Papilio Leda. Drury, *Inſ. 1. tab. 15. fig. 5. 6.*

Papilio Leda. Herbst, *Pap. tab. 173. fig. 3:*

Seba, *Muſ. 4. tab. 42. fig. 5. 6.*

Papilio N. Solandra, *alis angulatis, fuſcis : anticis ocello ſeſquialtero ; poſticis duobus, ſubtus quatuor.* Fab. *Syſt. Ent. p. 500. n°. 244. — Spec. Inſ. tom. 2. p. 84. n°. 372. — Mant. Inſ. tom. 2. p. 45. n°. 449. — Ent. Syſt. em. tom. 3. pars 1. p. 106. n°. 328.*

Papilio Solandra. Donow. *Gen. Illuſt. of Entom. part. 1. an Epitome of the Inſ. of New. Holl. pl. 23. fig. 1.*

Nous avons réuni ſous le même nom le *Leda* & le *Solandra* de Fabricius, parce qu'il nous eſt ſuffiſamment démontré que le ſecond n'eſt qu'une variété du premier.

Il a le port & la taille du *Bankſia*. Le deſſus des ailes eſt tantôt d'un brun-noirâtre, tantôt d'un brun-tanné-obſcur. Les premières ont, vis-à-vis du ſommet, deux yeux noirs à prunelle blanche, & dont l'antérieur plus petit, oblong, diſpoſé longitudinalement. Les ſecondes ailes ont, près de l'angle de l'anus, un œil noir à prunelle blanche & à iris rouſſâtre, lequel eſt parfois précédé en dehors d'un ou de deux autres plus petits.

En deſſous les quatre ailes ſont finement réticulées ou maillées de gris, depuis leur origine juſqu'à leur extrémité, & l'on voit ſur les ſupérieures de deux à quatre yeux noirs, inégaux, ayant tous un iris jaunâtre & une prunelle blanche. Les ailes inférieures ont une rangée d'yeux ſemblables, dont l'antérieur beaucoup plus grand, l'anal pourvu d'une double prunelle. Ces yeux ſont ordinairement au nombre de ſix : nous diſons ordinairement, parce que parfois il n'y en a que cinq de bien apparens, & même quatre comme dans le *Solandra* de Fabricius. Le corps & les antennes ſont d'un brun-obſcur.

Cramer & Drury le diſent de la Chine & du Bengale. Fabricius, qui en fait deux eſpèces, le *Leda* & le *Solandra*, indique le premier comme ſe trouvant à Sierra-Leone en Afrique, & le ſecond à la Nouvelle-Hollande. Ce que nous pouvons dire de certain à cet égard, c'eſt qu'il eſt commun à l'île de France, & que c'eſt de cette colonie qu'il a été rapporté par M. Catoire, payeur militaire.

5. Satyre Gerdrudtus.

Satyrus Gerdrudtus.

Sat. alis caudatis, fuſcis : anticis maculâ apicis ocellari : ſubtùs (omnibus) *ferrugineis, puncto anticarum albo, poſticarum duobus.* Fab.

Papilio N. *Gerdrudtus.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom. 3. pars 1. p. 72. n°. 224.*

Papilio Gerdrudta. Jon. *Fig. pict. 4. tab. 5. fig. 2.*

Fabricius le décrit ainſi : il a preſque le port du *Bankſia*. Le deſſus des ailes eſt d'un brun-obſcur. Les ſupérieures ont vers l'extrémité une tache fauve, & au ſommet une tache très-noire, ayant une prunelle blanche & un iris formé par un croiſſant fauve. Les ailes inférieures ſont ſans taches, & leur extrémité eſt tronquée & terminée en queue.

Le deſſous de toutes les ailes eſt d'un ferrugineux-pâle, avec une ou deux lignes tranſverſes plus obſcures, un ſeul point blanc ſur les ſupérieures, & deux ſur les inférieures.

Il habite.....

6. Satyre Europa.

Satyrus Europa.

Sat. alis fuscis : anticis utrinquè fasciâ albâ obliquâ : posticis subtùs fere ocellorum, strigâque baseos albida, aliis primoribus communi.

Papilio N. Europa, *alis subcaudatis, fuscis : posticis subtùs fasciâ ocellari albidâ.* Fab. *Syst. Ent. p.* 500. *n°.* 247. — *Spec. Inf. tom.* 2. *p.* 66. *n°.* 380. — *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 46. *n°.* 380. — *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 76. *n°.* 238.

Papilio Beroe. Cram. *pl.* 79. *fig.* C. D.

Papilio Arete. Cram. *pl.* 315. *fig.* E. F. (Variété.)

Il a entre deux & trois pouces de largeur. Ses ailes sont d'un brun-obscur de part & d'autre. Les premières ont le bord postérieur droit & entier dans les mâles, dentelé & un peu concave dans les femelles. Du milieu du bord antérieur de ces ailes part une bande blanche qui va obliquement aboutir à leur angle interne. Il y a en outre, vis-à-vis de leur sommet, deux ou trois points blancs, disposés à peu près dans le même sens que cette bande.

Les secondes ailes sont légèrement dentées dans les deux sexes & un peu prolongées en queue en dehors. Leur dessus offre, le long du bord terminal, une double ligne ondulée, blanchâtre ou cendrée, & précédée intérieurement d'un cordon de quatre à cinq points noirâtres, plus apparens dans certains individus que dans d'autres.

Le dessous des ailes supérieures présente les caractères que voici : vers la base est une ligne transverse plus ou moins blanche. Vient ensuite une bande semblable à celle du dessus & colorée de même; puis une autre bande atteignant inférieurement la précédente & composée de quatre à six yeux grisâtres à prunelle noire.

Le dessous des secondes ailes a, vers la base, une ligne blanche, faisant suite à celle de la base des premières ailes; &, vers le bout, entre deux lignes ondulées grisâtres, une rangée courbe de six yeux adhérans entr'eux, & dont l'antérieur plus gros. Ces yeux sont ronds dans les mâles, noirs, avec la prunelle blanche, l'iris jaunâtre & de plus entouré d'un cercle violâtre. Dans les femelles, au contraire, ils sont oblongs, plus grands, d'un brun-jaunâtre, avec le milieu fablé de blanc & de noir, & l'iris d'un gris de perle.

Des îles de Java & d'Amboine.

Nota. Le dessus des premières ailes est quelquefois sans bande blanche; &, dans la variété que Cramer donne sous le nom d'*Arete*, cette bande n'existe ni en dessus, ni en dessous.

7. Satyre Caumas.

Satyrus Caumas.

Sat. alis subtùs rufo-grisescentibus, strigis tribus ferrugineis : posticarum limbo ocellis sex pulvere inaurato pupillatis.

Papilio Arcadia. Cram. *pl.* 116. *fig.* D. E. (La femelle.)

Il a le port de l'*Europa*, mais il est un peu plus petit.

Le dessous des deux sexes est d'un gris-roussâtre, avec trois lignes ferrugineuses & transverses, dont la deuxième & la troisième plus ondulées que l'antérieure, & embrassant aux secondes ailes six yeux jaunâtres, contigus, ayant l'iris d'un gris de perle, la prunelle noire & parsemée d'atomes qui paroissent comme dorés. Ces mêmes lignes n'embrassent aux premières ailes que quelques points ocellés, peu distincts.

Le dessus du mâle, si toutefois celui que nous avons vu n'est pas une variété, le dessus du mâle, disons-nous, est d'un brun-obscur, avec une petite touffe de poils noirs sur le disque des ailes inférieures; & une tache cendrée, elliptique, longitudinale, entourée de noir, vers le milieu du bord interne des ailes supérieures.

Le dessus de la femelle est d'un fauve-obscur, terminé aux premières ailes par un espace noirâtre triangulaire & très-grand, sur lequel il y a une bande blanche, maculaire, transverse, coudée en arrière, & suivie d'un point blanc qui fait face au sommet. Les secondes ailes ont, parallèlement au bord d'en bas, une rangée de quatre gros points noirs, oculaires. On les aperçoit aussi dans le mâle, quoiqu'il soit d'une couleur plus obscure. Le corps est brun. Les antennes sont roussâtres.

De l'île de Java.

Nota. Fabricius y rapporte, avec doute il est vrai, son papillon *Minerva* qui est différent.

8. Satyre? Rohria.

Satyrus Rohria.

Sat. alis dentato-caudatis, fuscis : anticis fasciâ albâ : posticis subtùs ocellis septem, plurimis albo punctatis. Fab.

Papilio N. *Rohria.* Fab. *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 45. *n°.* 446. — *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 75. *n°* 255.

Il est de moyenne taille, d'un brun-obscur en dessus. Ses premières ailes ont une bande blanche qui n'atteint pas le bord postérieur. Ce bord offre des taches blanches, indépendamment desquelles il y en a deux autres vis-à-vis du sommet.

Les secondes ailes ont une queue, & elles sont liserées de blanc en dehors.

En dessous, toutes les ailes sont brunes & ondées de violâtre. Les supérieures ont une bande blanche, & trois yeux noirs sans prunelle. Les inférieures ont sept yeux, dont l'antérieur plus gros, noir & à prunelle blanche; les trois suivans oblongs, offrant des points noirs chargés chacun d'un point blanc; le cinquième plus grand & dépourvu de prunelle; les deux postérieurs réunis &

ſablés de blanc. Les antennes ont la maſſue noirâtre, avec la ſommité ferrugineuſe.

De l'Inde.

(*Traduction de Fabricius.*)

9. SATYRE? Panthéra.

SATYRUS Panthera.

Sat. alis dentato-caudatis, fuſcis : ſubtùs undatis, poſticis ocellis duobus diſci, quinque marginalibus, cæruleſcentibus. FAB.

Papilio N. *Panthera.* FAB. *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 39. *n°.* 407. — *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 75. *n°.* 234.

Il eſt de moyenne taille. Le deſſus de ſes ailes eſt noir, avec le bord obſcur. Les inférieures ont des dents & une queue.

Le deſſous de toutes les ailes eſt ondé. Celui des inférieures offre, ſur le milieu, deux petits yeux à prunelle bleuâtre, & à l'extrémité, qui eſt d'un cendré-obſcur, cinq yeux noirs, dont la prunelle eſt également bleuâtre. Le corps eſt d'un brun-noirâtre.

De Trinquebar.

(*Traduction de Fabricius.*)

B. Bord poſtérieur des premières ailes en faulx. Bord correſpondant des ſecondes un peu prolongé à l'angle de l'anus, & terminé en dehors par une queue obtuſe & très-oblique.

10. SATYRE Chorinée.

SATYRUS Chorinæus.

Sat. alis ſuprà fuſcis : anticis faſciâ fulvâ, tranſverſâ : poſticis ſubtùs ſtrigâ ab angulo externo ad analem obliquè ductâ.

Papilio N. Chorineus, *alis integerrimis, fuſcis : anticis falcatis, faſciâ fulvâ : poſticis caudatis.* FAB. *Syſt. Ent. p.* 484. *n°.* 182. — *Spec. Inſ. tom.* 2. *p.* 60. *n°.* 266. — *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 29. *n°.* 306. — *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 72. *n°.* 225.

Papilio Arceſilaus. SULZ. *Inſ. edit.* ROEM. *p.* 142. *tab.* 14. *fig.* 4.

Papilio Arceſilaus. CRAM. *pl.* 294. *fig.* A. B. (Le mâle.) *fig.* B. C. (La femelle.)

STOLL, *Pap. Suppl. à* CRAM. *pl.* 6. *fig.* 1. (La chenille.) *fig.* 1. A. (La chryſalide.)

Papilio Arceſilaus. ESP. *Pap. exot. tab.* 54. *fig.* 5-7.

SEBA, *Muſ.* 4. *tab.* 41. *fig.* 15. 16.

SEBA, *Muſ.* 4. *tab.* 42. *fig.* 15. 16.

Il a de quatre pouces à quatre pouces & demi d'envergure. Le deſſus des premières ailes eſt d'un brun-noirâtre, avec une bande fauve, large, ſinuée, deſcendant du milieu de la côte à l'angle interne où elle finit en pointe arrondie. Il y a en outre un gros point blanc vis-à-vis du ſommet.

Le deſſus des ſecondes ailes eſt couleur de terre d'ombre, avec le limbe poſtérieur plus clair, & diviſé par une ligne de trois à quatre points blanchâtres, points qui ne ſont que l'empreinte plus ou moins viſible de ceux de la ſurface oppoſée.

Le deſſous des quatre ailes eſt cendré, finement ondé de noirâtre, avec quelques lignes brunâtres diſpoſées tranſverſalement, à l'exception toutefois de la poſtérieure des ſecondes ailes, laquelle va obliquement de l'angle externe à l'angle interne. Le corps eſt brun, avec un collier fauve.

La chenille, ſelon Stoll, eſt d'un rouge-ponceau, avec les côtés du ventre & les pattes fauves. Elle a tout le long du dos une bande jaune, formée par une ſuite de taches à peu près elliptiques, & coupées de noirâtre dans le ſens de leur longueur. La tête eſt ferrugineuſe, bordée & rayée de jaunâtre. L'anus ſe termine par une longue fourche griſâtre, ciliée de noir. Cette chenille vit ſur la *canne à ſucre.*

La chryſalide eſt courte, d'un brun-pâle, avec des mouchetures noires. Elle eſt ſuſpendue par la queue.

De Surinam.

C. Ailes ſupérieures triangulaires. Inférieures terminées en dehors par une petite queue aiguë, & ayant entre cette queue & l'angle de l'anus une dent obtuſe.

α. Bord interne des ailes ſupérieures fortement arqué dans les mâles.

11. SATYRE Philoctète (1).

SATYRUS Philoctetes.

Sat. alis ſuprà violaceo-fuſcis : poſticis ad angulum ani maculis tribus cæruleis, externis duabus puncto nigro fœtis.

Papilio E. A. Philoctetes, *alis ſubcaudatis, fuſcis : poſticis ocellis duobus cæruleis pupillâ nigrâ punctiſque tribus albis* LINN. *Syſt. Nat.* 2. *p.* 750. *n°.* 29. — *Muſ. Lud. Ulr. p.* 219.

Papilio Philoctetes. CLERCK, *Icon. tab.* 30. *fig.* 3.

Papilio E. A. *Philoctetes.* FAB. *Syſt. Ent.*

(1) Dans cette eſpèce & dans les ſept ſuivantes, la cellule diſcoïdale des ſecondes ailes eſt fermée par un angle moins aigu que chez les autres SATYRES, & les antennes ſont preſque filiformes. Ces eſpèces répondent au genre HETERA de Fabricius.

p. 456. *n°.* 56. — *Spec. Inſ. tom.* 2. *p.* 22. *n°.* 90. — *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 12. *n°.* 106.

Papilio N. *Philoctetes.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 83. *n°.* 259.

Papilio Philoctetes. Esp. *Pap. exot. tab.* 46. *fig.* 4.

Papilio Philoctetes. Cram. *pl.* 20. *fig.* A. (Le mâle.) *fig.* B. C. (La femelle.)

Papilio Philoctetes. Drury, *Inſ.* 2. *pl.* 1. *fig.* 1-3.

Papilio Philoctetes. Herbst, *Pap. tab.* 55. *fig.* 2. 3.

Sulz. *Inſ. edit.* Roem. *tab.* 13. *fig.* 5.

Seba, *Muſ.* 4. *tab.* 4. *fig.* 9. 10.

Seba, *Muſ.* 4. *tab.* 21. *fig.* 7. 8.

Il a environ trois pouces & demi d'envergure. Ses ailes ſupérieures ſont entières, d'un brun enfumé en deſſus, avec un léger reflet violet vers la baſe, & deux petits points blancs vis-à-vis du ſommet.

Les ailes inférieures ont le deſſus d'un noir-brun, glacé de violet, avec trois taches bleues, dont la plus intérieure diſpoſée tranſverſalement au deſſus de l'angle anal, les deux autres chargées chacune d'un très-gros point noir & placées longitudinalement entre la précédente & l'origine de la petite queue. A la ſuite de ces taches, en remontant vers l'angle extérieur, il y a une rangée de trois points blancs.

Le deſſous des premières ailes eſt couleur de café au lait pâle, avec deux lignes d'un noir-brun, tranſverſes & parallèles, dont la poſtérieure diſcoïdale, plus longue & doublée de blanc intérieurement; ſans compter une bande violâtre, étroite, environnée de brun-marron, & deſcendant directement de la côte à l'angle interne. Les mâles ont en outre, vers le milieu du bord intérieur, un faiſceau de poils brunâtres & divergens, dont l'empreinte forme ſur la ſurface oppoſée une tache ovale d'un ton noirâtre.

Le deſſous des ſecondes ailes eſt couleur de café au lait pâle vers ſa naiſſance, avec trois points, puis une ligne, d'un noir-brun. Sur le milieu de la ſurface eſt une bande tranſverſe d'un brun-marron, immédiatement ſuivie d'une bande violâtre ſur laquelle reparoiſſent les trois points blancs du deſſus, ainſi que les deux gros points noirs qui occupent chacun le centre des deux taches bleues longitudinales dont nous avons parlé en décrivant le deſſus.

Commun à Surinam.

Nota. Dans la figure de Drury, les ailes inférieures ſont ſans queue.

12. Satyre Morna.

Satyrus Morna.

Sat. alis dentatis, fuſcis : poſticis ocellis utrinquè duobus punctiſque tribus albis. Fab.

Papilio N. *Morna.* Fab. *Syſt. Ent. p.* 500. *n°.* 245. — *Spec. Inſ. tom.* 2. *p.* 46. *n°.* 432. — *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 107. *n°.* 331.

Fabricius le décrit ainſi : les ailes ſupérieures ſont d'un brun-obſcur, avec un point blanc au ſommet.

Les inférieures ſont dentées, d'un brun encore plus obſcur, avec trois points blancs près de l'extrémité, & deux yeux noirs, ſans prunelle, mais ayant un large iris bleu. Il y a en outre une tache bleue près de l'angle de l'anus.

Le deſſous des quatre ailes eſt bleuâtre vers la baſe, avec des taches noires; d'un brun-obſcur vers le bout, avec une ligne cendrée, tranſverſale, laquelle offre aux ſecondes ailes deux yeux comme en deſſus, mais précédés ici de trois points blancs diſcoïdaux.

Des Indes occidentales.

Nota. Ne ſeroit-ce pas une variété ſans queue du ſatyre *Philoctète?*

D. Ailes ovales. Inférieures terminées en dehors par un prolongement plus ou moins remarquable.

13. Satyre Léna.

Satyrus Lena.

Sat. alis ſubhyalinis, fuſcis : poſticis ſuprà dimidio apicali atro maculis cœruleis, ſparſis, pleriſque puncto albo fœtis.

Papilio N. Lena, *alis ſubdentatis, fuſcis : poſticis poſticè atris, albo cœruleoque punctatis; ſubtùs biocellatis.* Linn. *Syſt. Nat.* 2. *p.* 784. *n°.* 206.

Papilio N. *Lena.* Fab. *Syſt. Entom. p.* 514. *n°.* 301. — *Spec. Inſ. tom.* 2. *p.* 85. *n°.* 377. — *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 46. *n°.* 455. — *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars. p.* 108. *n°.* 334.

Papilio Lena. Cram. *pl.* 198. *fig.* D. E.

Papilio Lena. Cram. *pl.* 291. *fig.* A. B.

Papilio Lena. Herbst, *Pap. pl.* 224. *fig.* 3-6.

Klem. *Inſ. tab.* 10. *fig.* 3. 4.

Seba, *Muſ.* 4. *tab.* 36. *fig.* 13. 14.

Il a preſqu'un pouce de moins que le *Philoctète.* Ses premières ailes ſont entières & un peu tranſparentes. Leur deſſus eſt d'un brun-obſcur, tantôt ſans taches, tantôt coupé parallèlement au bord poſtérieur par une ſuite de quatre ou cinq points, dont le ſecond, à partir de la côte, noir &

touré d'un cercle gris; les autres tout-à-fait bleuâtres.

Les secondes ailes sont un peu dentées, & terminées en dehors par une petite queue obtuse. Leur dessus a environ la moitié antérieure d'un brun glacé de violet; la moitié postérieure d'un noir-foncé, avec une vingtaine de taches bleues, chargées pour la plupart d'un point très-blanc. Le bout de la queue est pareillement blanc.

Le dessous des premières ailes est d'un brun légèrement glacé de violet, avec une bande blanche, linéaire, droite, descendant du bord antérieur au bord interne, près de l'angle de ce nom, & se prolongeant ensuite jusqu'au disque des ailes inférieures. Indépendamment de cette bande, on voit, vers la base, trois ou quatre points noirs, épars; &, vers l'extrémité, une suite de points blanchâtres, correspondant à ceux de la surface opposée.

Le dessous des secondes ailes est à peu près du même ton de couleur que le dessous des premières, avec sept à huit points d'un blanc-jaunâtre, disséminés entre le disque & le bord terminal; & deux yeux noirs à prunelle blanche & à iris jaune, placés vis-à-vis du sommet. Il y a en outre, près de la base, quatre ou cinq points noirs, foiblement ocellés, qu'enveloppe extérieurement une ligne brune, transverse, courbe & un peu ondulée. Le corps est gris en dessous; d'un brun-violâtre en dessus, avec un collier blanchâtre. Les antennes sont rousses & finement annelées de noir.

De la Guyane & du Brésil.

Nota. Le manque de queue est purement accidentel, & non particulier à l'un des sexes, comme l'ont cru Fabricius & Cramer.

14. Satyre Dindymène.

Satyrus Dindymene.

Sat. alis fuscis, subhyalinis : posticis supra serie punctorum ocellatorum : subtùs omnibus strigis tribus punctisque baseos obscurioribus.

Papilio N. Dindymene, *alis dentatis, fuscis : posticis supra violaceis, punctis quatuor albis.* Fab. *Spec. Inf. tom.* 2. *p.* 86. *n°.* 378. — *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 46. *n°.* 456. — *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 108. *n°.* 535.

Papilio Dindymene. Cram. *pl.* 198. *fig.* F. G.

Papilio Dindymene. Herbst, *Pap. tab.* 224. *fig.* 1. 2.

Papilio Lamia. Sulz. *Inf. edit.* Roem. *tab.* 18. *fig.* 1.

Papilio Rhea, *alis rotundatis, fusco-hyalinis : posticis punctis quinque ocellaribus albis.* Fab. *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 18. *n°.* 179. — *β. Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 108. *n°.* 534.

Il a le port, la taille & la légère transparence du *Léna*, mais ses ailes inférieures n'ont pas de prolongement sensible. Le dessus de ces ailes est d'un brun un peu violâtre, avec une rangée courbe & postérieure de quatre ou cinq points noirs, plus ou moins gros, & ayant le milieu blanc. Dans les mâles, il y a en outre, près du bout de l'abdomen, une tache jaunâtre, oculaire.

Les ailes supérieures font d'un brun-obscur dans la femelle, avec deux points blanchâtres, alignés transversalement vis-à-vis du sommet. Dans le mâle, le milieu de ces ailes est plus clair, & jette à certains aspects un reflet d'un vert d'émeraude.

Le dessous des deux sexes est d'un brun un peu teinté de violet, avec une multitude d'atomes cendrés, & trois lignes transverses d'un brun plus obscur que le fond. Aux points ocellés des ailes inférieures correspondent ici cinq points blanchâtres. Les ailes supérieures en ont trois semblables près de l'angle externe, & un noir près de la base. La base des secondes ailes en offre trois ou quatre de cette dernière couleur. Le corps est grisâtre en dessous; brun en dessus, avec un collier jaunâtre. Les antennes sont noires & finement annelées de blanc.

De la Guyane & du Brésil.

N. B. Le *Rhea*, mentionné dans la synonymie, se rapporte au *Dindymène* par l'ensemble des caractères. C'est donc à tort que Fabricius en a fait en dernier lieu une variété du *Léna*.

15. Satyre Luna.

Satyrus Luna.

Sat. alis dentatis, fuscis, obscuriùs strigosis : posticis ocellis duobus : subtùs omnibus punctis quatuor. Fab.

Papilio N. *Luna.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 109. *n°.* 536.

Papilio Luna. Jon. *Fig. pict.* 4. *tab.* 9. *fig.* 1.

Suivant Fabricius, ce lépidoptère a le port du *Dindymène*, auquel il ressemble beaucoup. Les premières ailes sont d'un brun-obscur, avec trois lignes transverses plus foncées, & trois points blancs en dessus, quatre en dessous. Les secondes ailes sont aussi d'un brun-obscur, avec des lignes plus foncées. Leur extrémité, qui est plus obscure que le reste de la surface, offre deux yeux très-noirs, dont le postérieur sans prunelle. Ces yeux se reproduisent en dessous & ils y sont accompagnés de trois ou quatre points blancs. Le corps est brun en dessus avec les incisions de l'abdomen jaunes.

De Surinam.

N. B. Ne seroit-ce pas une variété du précédent?

16. Satyre Néréis.

Satyrus Nereis.

Sat. alis fuſcis, ſubhyalinis, vittâ communi albâ : poſticis ad apicem fulvis, ocellis duobus atris.

Papilio P. Nereis, *alis repandis, fuſcis : poſticis fuſcâ nivea diſcoque fulvo ocellis duobus atris.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 184. *n°.* 568.

Papilio Nereis. Drury, *Inſ.* 3. *pl.* 35. *fig.* 4.

Papilio Nereis. Herbst, *Pap. tab.* 84. *fig.* 1. 2.

Papilio Nereis. Stoll, *Suppl. à* Cram. *pl.* 26. *fig.* 3.

Papilio Nereis. Jon. *Fig. pict.* 2. *tab.* 35. *fig.* 2.

Il a près de trois pouces d'envergure. Les ailes ſupérieures ſont un peu tranſparentes, d'un brun-obſcur de part & d'autre, avec une bande blanchâtre, linéaire, deſcendant obliquement du bout de la côte au bout du bord interne.

Le deſſus des ſecondes ailes a environ la moitié antérieure & le bord terminal d'un brun-obſcur; & tout le reſte fauve ou couleur de tabac d'Eſpagne, avec une bande très-blanche, bordée de noirâtre, fortement dilatée en dehors à ſa partie inférieure, n'atteignant pas le bord interne, mais s'alignant avec la bande des ailes ſupérieures. Entre cette bande des ſecondes ailes & leur bord poſtérieur, il y a deux yeux très-noirs à prunelle bleuâtre, leſquels ſont ſéparés l'un de l'autre par deux points blancs; ſans compter un point ſemblable placé près de la côte au-deſſus de l'œil antérieur.

Le deſſous de ces ailes eſt généralement plus pâle que le deſſus, & il n'a point le bord poſtérieur obſcur; les deux yeux noirs y ſont beaucoup plus petits & entourés d'un cercle griſâtre; la bande blanche s'y prolonge davantage, & l'on voit près de la baſe une ligne noirâtre, fine, oblique, un peu ondulée. Le corps eſt griſâtre en deſſous; brun en deſſus, avec un collier blanchâtre.

La femelle a de part & d'autre, vis-à-vis du ſommet des premières ailes, une rangée tranſverſe de trois points blancs.

De la Guyane & du Bréſil.

17. Satyre Piéra.

Satyrus Piera.

Sat. alis hyalinis : anticis immaculatis ; poſticis diſco rufeſcentibus ſtrigâ fuſcâ, apice ocellis duobus punctiſque totidem albis interjectis.

Papilio H. Piera, *alis oblongis, integerrimis, hyalino-diaphanis : poſticis ocellis binis.* Linn. *Syſt. Nat.* 2. *p.* 754. *n°.* 52. — *Muſ. Lud. Ulr. p.* 220.

Papilio P. *Piera.* Fab. *Syſt. Ent. p.* 467. *n°.* 103. — *Spec. Inſ. tom.* 2. *p.* 37. *n°.* 153. — *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 17. *n°.* 175. — *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 183. *n°.* 566.

Clerck, *Icon. tab.* 36. *fig.* 7. 8.

Merian, *Surin. Inſ. tab.* 16. *fig. ſuper. à gauche.*

Klem. *Inſ.* 1. *tab.* 6. *fig.* 1. 2.

Sulz. *Inſ. edit.* Roem. *tab.* 15. *fig.* 5.

Seba, *Muſ.* 4. *tab.* 8. *fig.* 9. 10.

Papilio Piera. Cram. *pl.* 291. *fig.* C. D. E.

Papilio Piera. Herbst, *Pap. tab.* 84. *fig.* 3. 5.

Il a de deux pouces & demi à trois pouces d'envergure. Ses quatre ailes ſont entières, tranſparentes, avec les nervures & les bords brunâtres. Les ailes ſupérieures ſont ſans taches. Les inférieures ont le milieu d'une teinte rouſſâtre, avec une ligne obſcure, tranſverſe & tortueuſe, derrière laquelle il y a deux yeux noirs à prunelle blanche & à iris jaunâtre, & ſéparés l'un de l'autre par deux points blancs. Le corps eſt cendré. Les antennes ſont fauves.

La femelle reſſemble au mâle.

La chenille, ſelon Merian, eſt garnie de poils blancs, très-touffus, longs & rabattus ſur les côtés du corps. Elle ſe trouve à Surinam ſur l'*acajou* (anacardium). Linnæus l'a priſe pour celle de ſon *pap. Anacardii*, papillon qui eſt le même que notre vaneſſe Aglatonice. (*Voy.* le Supplément.)

18. Satyre Andromède.

Satyrus Andromeda.

Sat. alis hyalinis : anticis ſtrigis duabus fuſceſcentibus ; poſticis ad angulum ani chermeſinis, apice ocello unico.

Papilio P. Andromeda, *alis rotundatis hyalino-albis : poſticis apice rubris ocello utrinquè unico.* Fab. *Syſt. Ent. p.* 467. *n°.* 107. — *Spec. Inſ. tom.* 2. *p.* 37. *n°.* 158. — *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 18. *n°.* 180. — *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 184. *n°.* 569.

Papilio Pireta. Cram. *pl.* 315. *fig.* A.

Papilio Philis. Cram. *pl.* 387. *fig.* E. (Var.)

Papilio Menander. Drury, *Inſ.* 3. *pl.* 38. *fig.* 3.

Papilio Menander. Herbst, *Pap. tab.* 84. *fig.* 6.

Papilio Philis. Herbst, *Pap. tab.* 84. *fig.* 7. (Var.)

Il a le port du précédent, mais il eſt d'environ un tiers plus petit. Ses ailes ſont auſſi tranſparentes & entières. Les ſupérieures ont le milieu ta-

verſé, d'un bord à l'autre, par deux lignes brunâtres, obliques & parallèles, dont la poſtérieure ſe prolongeant ſur les ſecondes ailes. Celles-ci ſont d'un rouge-cramoiſi vers l'angle de l'anus, & leur ſommet ou angle poſtérieur offre de part & d'autre un œil noir à prunelle blanche & à iris jaunâtre, au bas duquel on diſtingue un petit point blanc. Le corps eſt cendré en deſſus; plus pâle en deſſous. Les antennes ſont noirâtres.

Il ſe trouve à Surinam & à la Jamaïque.

Cramer a figuré, ſous le nom de *Philis*, une variété dont les premières ailes n'ont qu'une ligne brunâtre, & dont l'angle anal des ſecondes ailes eſt d'un cramoiſi plus foncé.

E. Ailes ſupérieures triangulaires. Inférieures un peu tronquées vers l'angle de l'anus.

19. Satyre Girondius.

Satyrus Girondius.

Sat. alis ſuprà fuſcis, apice ocellis quatuor geminatis : poſticis ſubtùs puncto baſeos nigro.

Il a environ trois pouces d'envergure. Le deſſus de toutes les ailes eſt d'un brun-obſcur, avec quatre yeux noirs, rapprochés deux à deux, mais moins gros & moins prononcés aux ailes inférieures qu'aux ſupérieures. Ces yeux ont une prunelle d'un blanc-bleuâtre & un iris d'un roux-fale.

En deſſous, où le fond eſt plus pâle, & quelquefois légèrement teinté de violet, les ailes de devant ont une rangée poſtérieure de quatre points blanchâtres, & celles de derrière une rangée de ſix points ſemblables. La baſe de ces dernières offre en outre un point noir.

La femelle reſſemble au mâle.

Du Bréſil.

20. Satyre Bétro.

Satyrus Betro.

Sat. alis nigricanti-fuſcis : anticis ſuprà faſciâ apicis rufeſcente : poſticis ſubtùs ſtrigâ punctorum flaveſcentium.

Il eſt de la taille du *Girondius*. Le deſſus de ſes ailes eſt d'un brun-noirâtre, ſans taches aux inférieures, avec une bande rouſſâtre, tranſverſale, vers l'extrémité des ſupérieures.

Le deſſous des quatre ailes eſt d'un brun-noirâtre, avec une légère teinte violâtre à l'angle externe des ſupérieures, & une rangée de ſix points jaunâtres près de l'extrémité des inférieures. On aperçoit en outre, mais d'une manière peu diſtincte, deux lignes d'un ferrugineux-obſcur ſur le milieu de chaque aile.

Décrit d'après un individu unique, envoyé du Bréſil par M. le chevalier de Langſdorff.

Nota. Les premières ailes ont le bord antérieur très-arqué, & le bord poſterieur entier.

F. Sommet des premières ailes plus ou moins aigu. Bord terminal des ſecondes offrant vers l'angle de l'anus trois dents, dont l'extérieure ſouvent plus prononcée.

21. Satyre Chélys.

Satyrus Chelys.

Sat. alis ſuprà fuſcis, immaculatis : poſticis ſubtùs nebuloſè ferrugineis aut vireſcenti-griſeis, ſtrigâ punctorum flaveſcentium.

Papilio N. Chelys, *alis dentato-caudatis, fuſcis : ſubtùs variegatis, ſtrigâ punctorum flaveſcentium.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 80. *n°.* 249.

Papilio Chelys. Jon. *Fig. pict.* 3. *tab.* 78. *fig.* 2.

Notre *Chélys* paroît bien être le même que celui de Fabricius.

Il a approchant deux pouces & demi d'envergure. Le deſſus des ailes eſt d'un brun-obſcur & ſans taches.

Le deſſous des ſupérieures eſt à peu près de la couleur du deſſus, avec l'extrémité un peu glacée de violâtre, & diviſée vis-à-vis du ſommet, qui eſt ferrugineux ou griſâtre, par un rang de quatre petits points jaunâtres.

Le deſſous des ailes inférieures eſt d'un ferrugineux-obſcur dans le mâle, d'un gris plus ou moins verdâtre dans la femelle, avec une bande diſcoïdale plus foncée, & une rangée poſtérieure de cinq points jaunâtres, dont l'anal plus gros & oculaire. Le milieu de la bande diſcoïdale offre dans chaque ſexe un point noir.

Du Bréſil.

22. Satyre Rébecca.

Satyrus Rebecca.

Sat. alis ſuprà fuſcis, immaculatis : ſubtùs nitenti-ſubviolaceis, ſtrigis duabus punctoque centrali obſcurè-ferrugineis.

Papilio N. Rebecca, *alis dentato-caudatis, fuſcis, immaculatis : ſubtùs pallidioribus, ſtrigis duabus brunneis punctiſque ſubocellaribus albis.* Fab. *Entom. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 75. *n°.* 236.

Papilio Virgilia. Cram. *pl.* 96. *fig.* C.

Papilio Virgilius. Herbst, *Pap. tab.* 193. *fig.* 6.

Fabricius ne rapporte ſon papillon *Rebecca* à aucune figure; mais la deſcription qu'il en donne & la patrie qu'il lui aſſigne ne permettent pas de douter que ce ne ſoit le même que le *Virgilia* de Cramer.

Il a de trois pouces à trois pouces & demi d'en-

vergure. Le deſſus des quatre ailes eſt d'un brun-obſcur & ſans taches.

Leur deſſous eſt d'un brun légèrement glacé de violet, avec deux lignes obliques d'un ferrugineux-obſcur, & renfermant entr'elles un point central de leur couleur. La ſeconde ligne, qui a le côté externe doublé de grisâtre, eſt ſuivie d'un cordon de points blancs oculaires, au nombre de cinq ſur les ailes ſupérieures, au nombre de ſix ſur les inférieures, & ſéparés du bord terminal des unes & des autres par une ligne brune, ondulée & très-fine. Le corps & les antennes ſont à peu près du même brun que les ailes.

De la Guyane & du Bréſil.

23. Satyre Merméria.

Satyrus Mermeria.

Sat. alis ſuprà ſuſcis, immaculatis : ſubtùs obſcurè ferrugineis, ſtrigâ cinereâ, mediâ, punctiſque ſex ocellaribus albidis.

Papilio Mermeria. Cram. *pl.* 96. *fig.* C.

Papilio Mermeria. Cram. *pl.* 289. *fig.* E. F.

Papilio Mermerius. Herbst, *Pap. tab.* 192. *fig.* 1. 2. 3.

Sa taille eſt à peu près la même que celle du précédent. Le deſſus de toutes les ailes eſt d'un brun-obſcur & ſans taches.

Leur deſſous eſt d'un brun-ferrugineux, piqué de noirâtre, avec une ligne cendrée, oblique & diſcoïdale, près du côté extérieur de laquelle il y a une rangée de ſix points blanchâtres, oculaires, ſéparés du bord terminal par une ligne cendrée, flexueuſe & plus ou moins apparente. On voit parfois vers la baſe une ligne arquée de cette dernière couleur.

Dans certaines femelles, le deſſous des ailes eſt d'un gris-verdâtre ou violâtre, depuis le milieu juſqu'au bord poſtérieur; mais cela n'empêche pas d'y retrouver les caractères que nous venons d'indiquer.

Dans d'autres, les points oculaires ont un léger iris jaunâtre.

De la Guyane & du Bréſil.

G. Sommet des premières ailes un peu tronqué. Bord poſtérieur des ſecondes inégalement denté.

24. Satyre Lachès.

Satyrus Laches.

Sat. alis ſuſcis, ſuprà immaculatis : ſubtùs faſciâ poſticâ violaceo-griſeâ ocellis anticarum quinque, poſticarum ſex obſoletis.

Papilio S. Laches, *alis dentatis, ſuſcis :* (ſubtùs) *faſciâ cæruleâ ocellis anticarum quinque, poſticarum ſex.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 229. *n°.* 719.

Papilio Laches. Jon. *Fig. pict.* 3. *tab.* 81. *fig.* 2.

Papilio Adromeda. Cram. *pl.* 96. *fig.* A.

Papilio Thamyra. Cram. *pl.* 242. *fig.* B.

Papilio Andromedus. Herbst, *Pap. tab.* 192. *fig.* 7.

Papilio Thamyrus. Herbst, *Pap. tab.* 194. *fig.* 1.

Quoique Fabricius diſe que ſon ſatyre *Laches* a toutes les ailes très-dentées (*alæ omnes valdè dentatæ*), nous y rapportons ſans le moindre ſcrupule les papillons *Andromeda* & *Thamyra* de Cramer qui ne ſont qu'une ſeule & même eſpèce.

Il a environ trois pouces d'envergure. Le deſſus des ailes eſt d'un brun-obſcur & ſans taches.

Le deſſous eſt auſſi d'un brun-obſcur, & l'on voit à l'extrémité une large bande d'un gris-violet. Sur cette bande, les ailes ſupérieures ont une ſérie de cinq yeux peu prononcés, dont le deuxième un peu en arrière des autres; & les ſecondes ailes une rangée courbe de ſix yeux, dont les deux extrêmes plus petits, l'avant-dernier plus ou moins noirâtre. Ces yeux ont tous une prunelle blanche ou jaunâtre. La baſe des quatre ailes eſt en outre d'un gris-violet, ſurtout dans les femelles, avec une ligne brune, tranſverſe & arquée. Le corps eſt brun en deſſus, un peu plus pâle en deſſous. Les antennes ſont rouſſâtres.

De la Guyane & du Bréſil.

25. Satyre Célia.

Satyrus Celia.

Sat. alis ſuſcis, ſuprà immaculatis : ſubtùs faſciâ poſticâ violaceo-griſeâ ocellis anticarum quatuor, poſticarum quinque obſoletis.

Papilio Celia. Cram. *pl.* 242. *fig.* C.

Papilio Celius. Herbst, *Pap. tab.* 194. *fig.* 2.

Si la figure de Cramer eſt exacte, ce ſatyre ne diffère en deſſous du précédent que parce que la ligne brune de la baſe des ailes eſt flexueuſe, au lieu d'être arquée; & parce que les ſupérieures n'ont que quatre yeux placés ſur la même ligne, & les ſecondes cinq qui ſont tous égaux.

De la Guyane.

H. Bord poſtérieur des quatre ailes arrondi.

26. Satyre Valentine.

Satyrus Valentina.

Sat. alis ſuſcis, ſuprà immaculatis, ſubtùs faſciâ violaceo-albidâ ocellis ſingularum quinque : poſticis diſco lutescente.

Papilio Valentina. Cram. *pl.* 242. *fig.* A.

Papilio Valentinus. Herbst, *Pap. tab.* 193. *fig.* 7.

Il eſt un peu moins grand que le *Lachès*. Le deſſus des ailes eſt d'un brun-obſcur & ſans taches.

Leur deſſous eſt un peu plus clair que le deſſus, avec une bande poſtérieure, violâtre en avant, blanche en arrière, & chargée ſur chaque aile d'une ſérie de cinq yeux à prunelle blanche & à iris jaunâtre. Entre cette bande & la baſe, il y a une ligne très-brune, flexueuſe & tranſverſe, derrière laquelle les premières ailes offrent une liture oblique, & les ſecondes une tache orbiculaire, d'un jaune-chamois.

De la Guyane.

Nota. Décrit d'après Cramer.

27. Satyre Orchame (1).

Satyrus Orchamus.

Sat. alis ſuprà fuſco-nigris, immaculatis, ſubtùs ſtrigâ punctorum ocellarium : puncto anticarum tertio lunulæ rubræ intùs adnato.

Satyre Orchus. *Recueil d'obſervations de zool. & d'anat. comp. par Alex. de* Humboldt *& A.* Bonpland, *tom.* 2. *p.* 72. *pl.* 35. *fig.* 1. 2.

Il a environ trois pouces d'envergure. Le deſſus des ailes eſt d'un noir-enfumé-mat, ſans aucune tache, mais avec le bord terminal des ſupérieures un peu plus clair.

Le deſſous de toutes les ailes eſt d'un brun-obſcur, avec une teinte plus foncée au milieu des premières & à la baſe des ſecondes. La teinte de ces dernières forme comme deux bandes tranſverſes, dont la poſtérieure beaucoup plus large & ſe dilatant en angle obtus au milieu de ſon côté externe. A la ſuite de ces bandes, les ailes de devant ont une rangée tranſverſe de quatre points noirs à prunelle bleuâtre, & dont le troiſième adhérant par ſon côté interne à une lunule d'un rouge-fauve. Les ailes de derrière offrent une ſuite de cinq à ſix points ſemblables, mais ils ſont plus petits, entourés d'un cercle un plus pâle que le fond de l'aile, & le dernier d'entr'eux ou l'anal eſt bipupillé. Le corps eſt d'un noir-brun, avec les côtés des palpes & une grande partie des pattes griſâtres. Les antennes ſont noires, finement annelées de gris, avec un peu de brun ſous l'extrémité de la maſſue.

Du Pérou.

Nota. Nous ignorons ſi les deux ſexes ſe reſſemblent. Celui que nous décrivons paroît être le mâle.

(1) Nous avons changé le nom de cette eſpèce, parce qu'il y en a une qui porte plus anciennement le nom d'*Orcus*.

28. Satyre Pénéléa.

Satyrus Penelea.

Sat. alis ſuprà fuſcis, immaculatis : poſticis ſubtùs baſi cinereis areâ longitudinali luteſcente, tunc ad angulum externum caſtaneis, ad internum ſubviolaceis ocellis 2-4.

Papilio N. Penelea, *alis dentatis, ſuprà fuſcis : ſubtùs omnibus ocellis duobus.* Fab. *Spec. Inſ. tom.* 2. *p.* 35. *n°.* 368. — *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 92. *n°.* 286.

Papilio Penelea. Cram. *pl.* 101. *fig.* 6.

Papilio Peneleus. Herbst, *Pap. tab.* 194. *fig.* 3.

On a placé ce lépidoptère dans la diviſion des Nymphales, mais il a bien tous les caractères des Satyres.

Son envergure eſt de deux pouces & un quart. Le deſſus des quatre ailes eſt d'un brun-obſcur & ſans taches.

Le deſſous des premières eſt à peu près de la couleur du deſſus, avec deux yeux noirs à prunelle blanche & à iris jaune, placés ſur un fond violâtre vis-à-vis du ſommet, entre deux lignes anguleuſes d'un brun-foncé & allant de la côte au bord oppoſé.

Le deſſous des ſecondes ailes eſt cendré vers ſon origine; d'un brun-marron vers le ſommet, avec un eſpace jaunâtre, longitudinal, ſe dirigeant de la baſe au tiers poſtérieur de la ſurface, où le fond devient violâtre, & préſente, en tirant du côté de l'angle anal, quatre yeux comme ceux des ailes ſupérieures, mais dont les deux extrêmes plus petits & manquant quelquefois. Ces yeux ſont ſéparés du bord terminal par deux lignes ondulées, dont l'extérieure jaunâtre, l'intérieure d'un brun-foncé. On en voit une, pareille à cette dernière, près de la baſe.

De la Guyane & du Bréſil.

29. Satyre Péribas (1).

Satyrus Peribas.

Sat. alis dentatis, ſuprà fuſcis, ocello unico : ſubtùs griſeis, ſtrigâ flaveſcente punctiſque, anticarum 2 *albis, poſticarum* 5-6 *atris.*

Papilio S. Peribæa, *alis dentatis, fuſcis : anticis ocello obſoleto, ſubtùs ſtrigâ flaveſcente, poſticis punctis ocellaribus atris.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 234. *n°.* 730.

Il eſt à peu près de la taille des deux précédens. Ses ailes ſont dentées, d'un brun-obſcur en deſſus, avec un grand œil noir à iris jaunâtre & à prunelle

(1) Nous avons changé le nom que Fabricius a donné à cette eſpèce, parce qu'il y a une péride appelée *Peribæa*.

blanche sur les supérieures, & un petit œil peu prononcé sur les inférieures. Celles-ci ont le bord terminal rayé.

Le dessous des quatre ailes est gris, avec une ligne jaunâtre, transversale, indépendamment de laquelle il y a sur les premières deux points blancs, très-petits, & sur les secondes cinq à six points oculaires d'un noir-foncé.

Il se trouve à Surinam.

30. Satyre Dénina (1).

Satyrus Denina.

Sat. alis repandis, suprà fuscis : subtùs cinereis, fasciâ communi albidâ, mediâ ; posticis ocellis sex ternatis, quarto majori.

Papilio S. Delila, *alis repandis, fuscis : anticis ocello minuto : subtùs anticis ocellis duobus, posticis sex, quarto majori.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 234. *n°.* 731.

Il est de moyenne taille ; d'un brun-obscur en dessus, avec un œil très-petit au sommet des ailes supérieures.

En dessous le fond des quatre ailes est cendré, avec une bande blanchâtre, transverse & discoïdale, indépendamment de laquelle les premières ont deux yeux noirs, dont le postérieur plus grand, & les secondes six, rapprochés trois à trois, petits, à l'exception du quatrième qui est très-grand. Tous ces yeux ont une prunelle blanche. Les antennes sont noirâtres, avec la base & le bout de la massue ferrugineux.

Fabricius le dit de la Guinée. Mais est-ce bien là qu'il se trouve ?

31. Satyre Quantius.

Satyrus Quantius.

Sat. alis fuscis, suprà immaculatis : posticis subtùs fasciâ mediâ limboque posteriori violaceo-cinereis, strigâ punctorum flavescentium interpositâ.

Il n'a guère que deux pouces d'envergure. Ses ailes sont entières & d'un brun-obscur. Leur dessus n'a aucune tache.

Le dessous des ailes inférieures offre deux bandes d'un cendré-violâtre, l'une discoïdale, transverse & bordée par deux lignes un peu plus obscures que le fond ; l'autre tout-à-fait terminale, dentée à son côté interne, & séparée de la précédente par une rangée transverse de six points jaunâtres.

Le dessous des ailes supérieures a le bord de derrière cendré & précédé de quatre points de la couleur de ceux des ailes inférieures, mais plus petits.

(1) Fabricius a employé deux fois le nom de *Delila*. D'abord pour la *Cælioste* que nous avons donnée sous le n°. 2, ensuite pour l'espèce dont il est ici question.

Décrit d'après un individu unique, envoyé du Brésil à M. le chevalier Latreille.

32. Satyre Halyma.

Satyrus Halyma.

Sat. alis dentatis, suprà fuscis, immaculatis : subtùs pallidis, fulvo fasciatis ; anticis ocellis quinque, posticis septem. Fab.

Papilio S. *Halyma.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 243. *n°.* 758.

N'ayant pas vu ce lépidoptère, nous le donnons d'après la description que Fabricius en a faite.

Il a le port de l'*Eudora*, c'est-à-dire, qu'il n'a guère que deux pouces d'envergure. Le dessus de ses ailes est d'un brun-obscur & sans taches.

Leur dessous est blanchâtre, avec une bande discoïdale, large, plus claire dans son milieu, & quelques lignes transverses, fauves. Les ailes supérieures ont en outre cinq yeux, dont le second plus gros ; & les inférieures sept, dont le troisième & le septième également plus gros.

Des Indes occidentales.

33. Satyre Hermès.

Satyrus Hermes.

Sat. alis integerrimis, fuscis, suprà immaculatis : subtùs strigis duabus ferrugineis apiceque grisescente ; posticis ocellis quinque, 3°., 4°., 5°. bipupillatis.

Papilio N. Hermes ? *alis integerrimis, suprà fuscis, immaculatis : posticis ocellis sex, tribus cœcis.* Fab. *Syst. Ent. p.* 487. *n°.* 195. — *Spec. Inst. tom.* 2. *p.* 65. *n°.* 292. — *Mant. Inst. tom.* 2. *p.* 32. *n°.* 339. — *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 158. *n°.* 486.

Papilio Hermes ? Herbst, *Pap. tab.* 192. *fig.* 4.

Papilio Antonoe. Cram. *pl.* 60. *fig.* E. F.

Il a environ deux pouces & demi d'envergure. Ses quatre ailes sont bien entières. Leur dessus est d'un brun-obscur & sans taches.

Leur dessous a environ la moitié antérieure du même brun, avec deux raies ferrugineuses, obliques & légèrement sinuées. L'autre moitié est d'un gris un peu violâtre, avec une rangée de trois yeux aux ailes supérieures ; avec une rangée de cinq, dont le second & l'anal très-noirs & plus grands, aux inférieures. Ces yeux ont tous un iris jaune & une prunelle blanche, mais la prunelle des trois postérieurs des secondes ailes est double. Il y a en outre le long du bord terminal de chaque aile une double ligne obscure.

De la Guyane & du Brésil.

Nota. Fabricius dit que les ailes inférieures ont six yeux, dont trois sans prunelle. Cependant

la figure de Cramer, à laquelle il renvoie, n'en indique que cinq, ce qui eſt conforme à ce que nous avons vu.

34. Satyre Ocypète.

Satyrus Ocypete.

Sat. alis ſuprà fuſcis, immaculatis : ſubtùs violaceo-griſeis, ſtrigis quinque ferrugineis ; poſticarum margine dentato ocellis ſex bipupillatis, poſteriori remotiſſimo.

Papilio N. Ocypete ? *alis dentatis, ſuprà fuſcis, immaculatis : ſubtùs glaucis, ſtrigis tribus obſcuris ; poſticis ocellis quinque.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 96. *n°.* 296.

Papilio Helle ? Cram. *pl.* 194. *fig.* F. G.

Il a environ deux pouces d'envergure. Ses premières ailes ſont très-entières, les ſecondes aſſez fortement dentées. Le deſſus des unes & des autres eſt d'un brun-cendré, un peu chatoyant & ſans taches.

Le deſſous eſt d'un gris-violet-luiſant, avec quatre raies communes d'un ferrugineux-obſcur, mais plus particulièrement l'avant-dernière, ſur laquelle les ailes ſupérieures ont deux à trois yeux peu apparens ; & les inférieures cinq contigus, dont le ſecond & le cinquième plus gros & ayant, ainſi que les trois autres, un iris jaune & une double prunelle argentée. Les ailes inférieures ont un ſixième œil, très-petit & placé à leur bord interne ſur la raie précédente. Elles offrent en outre, très-près de leur naiſſance, une petite raie ferrugineuſe qui ſe prolonge rarement ſur les ailes ſupérieures. A tous les caractères que nous venons d'indiquer, il faut ajouter encore pour le deſſous de toutes les ailes une double ligne noirâtre, terminale.

De la Guyane & du Bréſil.

N. B. L'*Ocypète* de Fabricius, ou *Helle* de Cramer, reſſemble bien au lépidoptère dont il s'agit ici, mais il n'a que cinq yeux ; celui du bord interne manque. Ce ſixième œil eſt, il eſt vrai, fort petit, & par cette raiſon peu diſtinct.

35. Satyre Argulus.

Satyrus Argulus.

Sat. alis ſubintegris, ſuprà fuſcis, immaculatis : ſubtùs pallidioribus, ſtrigis tribus ferrugineis ; poſticis ocellis quinque bipupillatis.

Papilio Argante. Cram. *pl.* 204. *fig.* c. d.

Fabricius le rapporte au ſatyre que nous donnons ſous le nom de *Canthéus* (*voyez* n°. 56) ; mais nous avons cru devoir l'en ſéparer, par la raiſon que les yeux des ſecondes ailes ſont bipupillés, & ſeulement au nombre de cinq.

Il a environ un pouce & demi de largeur. Le deſſus des ailes eſt d'un brun-obſcur & ſans taches.

Le deſſous eſt d'un brun plus clair que le deſſus, avec trois lignes d'un ferrugineux-ſombre, entre la ſeconde & la poſtérieure deſquelles les ailes ſupérieures ont une rangée de trois à quatre yeux plus ou moins diſtincts ; & les ailes inférieures une rangée de cinq yeux preſqu'égaux, noirs, avec un iris jaunâtre & une double prunelle argentée. Sur le bord terminal, qui eſt ſinué aux ſecondes ailes, on voit, en deſſus comme en deſſous, une ligne blanchâtre que précède en dehors une ligne noirâtre.

De Surinam.

36 Satyre Myncéa.

Satyrus Myncea.

Sat. alis integris, ſuprà fuſcis : ſubtùs griſeis, ſtrigis quatuor ferrugineis ; poſticis ocellis quinque bipupillatis, analî ſuprà conſpicuo.

Papilio Myncea. Cram. *pl.* 293. *fig.* C.

Papilio Mynceus. Herbst, *Pap. tab.* 195. *fig.* 3.

On ſeroit tenté de le prendre pour notre *Ocypète*, ſans les différences ci-après : il a environ un demi-pouce de moins ; ſes ailes inférieures ſont entières ou à peine ſinuées ; leur deſſus offre à l'angle anal, du moins dans les individus que nous avons pu voir, un œil noir à double prunelle argentée & à iris jaune ; on aperçoit auſſi, mais d'une manière moins diſtincte, un œil au ſommet des ailes ſupérieures.

En deſſous, où le fond eſt gris & ſans reflet violâtre, les ſecondes ailes n'ont pas, comme dans l'*Ocypète*, la petite raie ferrugineuſe qui avoiſine la baſe, & le ſixième œil placé près du bord interne.

De la Guyane & du Bréſil.

37. Satyre Crantor.

Satyrus Crantor.

Sat. alis integerrimis, fuſcis : poſticis ſuprà ocello unico bipupillato ; ſubtùs quinque, primo quartoque bipupillatis. Fab.

Papilio N. *Crantor.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 158. *n°.* 489.

Papilio Crantor. Jon. *Fig. pict.* 4. *tab.* 18. *fig.* 1.

Papilio Crantor. Donow. *Of an Epitome of the Nat. Hiſt. Inſ. of India, cah.* 3. *pl.* 5. *fig.* 4.

Fabricius le décrit ainſi : il a le port & la taille du *Minéus*. Ses quatre ailes ſont entières, d'un brun-obſcur en deſſus, ſans aucune tache aux ſupérieures, avec un œil noir à iris jaune & à double prunelle aux inférieures.

En

En dessous, le fond est plus pâle qu'en dessus, avec des raies transverses très-obscures, indépendamment desquelles les ailes de devant ont deux yeux, & celles de derrière cinq, dont le premier & le quatrième, à partir d'en bas, très-noirs & à double prunelle, le troisième & le cinquième sans prunelle.

Du Brésil.

38. Satyre Celmis.

Satyrus Celmis.

Sat. alis subintegris, fuscis : subtùs strigis tribus obscurioribus; posticis ocellis quinque, 2°. & 3°. obsoletis, 4°. bipupillato majoreque.

Nous n'avons vu que le mâle de ce satyre.

Il a près de deux pouces d'envergure. Le dessus des ailes est d'un brun-noirâtre, sans taches aux supérieures; avec un œil noir à iris jaune & à prunelle blanche vers l'angle anal des inférieures.

Le dessous est un peu plus clair que le dessus, avec trois lignes transverses très-obscures, entre l'extérieure & l'intermédiaire desquelles les ailes de devant ont un petit œil peu distinct, & les ailes de derrière une rangée de cinq yeux, dont le second & le troisième presqu'effacés, les trois autres noirs, ayant un iris jaune & une prunelle blanche, laquelle est double au quatrième œil qui est le plus grand de tous. Le bord terminal de chaque aile est en outre longé par une double ligne noirâtre, flexueuse, & un tant soit peu fenestrée en dessus.

Du Brésil.

39. Satyre Pénélope.

Satyrus Penelope.

Sat. alis integris, suprà fuscis, ocello unico : subtùs griseſcentibus, strigis duabus ferrugineis; anticis angulo ani luteſcente, posticis ocellis duobus bipupillatis.

Papilio N. Penelope, *alis subdentatis, fuscis, ocello unico : posticis subtùs duobus.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 96. *n°.* 298.

Papilio Clarissa. Cram. *pl.* 293. *fig.* D. E.

Papilio Clarissus. Herbst, *Pap. tab.* 195. *fig.* 6. 7.

Cette espèce paroît bien être la même que le *Clarissa* de Cramer.

Elle a environ un pouce & demi d'envergure. Le dessus des ailes est d'un brun-obscur, avec un œil noir à iris fauve & à prunelle argentée au sommet des supérieures; avec un œil semblable, mais un peu plus gros & bipupillé, près de l'angle anal des inférieures.

En dessous, où le fond est d'un gris légèrement violâtre, avec deux raies obliques d'un ferrugineux-obscur, les premières ailes ont vers l'angle postérieur un espace d'un jaune-fauve, & à l'angle du sommet trois taches argentées, entre la première & la seconde desquelles il y a un œil correspondant à celui du dessus, mais bipupillé. Les ailes inférieures ont également trois taches argentées, dont l'antérieure appuyée sur la côte, les deux autres groupées entre deux yeux noirs à iris jaune & à double prunelle argentée. Indépendamment de cela, on voit le long du bord terminal de chaque aile trois lignes noirâtres, dont la plus intérieure inégalement dentée & précédée d'atomes obscurs.

De la Guyane.

40. Satyre Lydius.

Satyrus Lydius.

Sat. alis integris, albis : subtùs fasciis quatuor ferrugineis; posticis ocellis tribus, anali majore bipupillatoque.

Papilio Lydia. Cram. *pl.* 148 *fig.* C. D.

Nous ne connoissons ce satyre que par l'individu que Cramer a figuré, & cet individu paroît être une femelle.

Son envergure est de deux pouces & un quart. Le dessus des premières ailes est d'un brun-obscur, avec à peu près la moitié antérieure du bord interne d'un blanc-sale.

Le dessus des secondes ailes est d'un beau blanc, avec le limbe terminal chargé de deux yeux écartés, derrière lesquels il y a deux lignes noirâtres, flexueuses.

Le dessous des quatre ailes est d'un blanc un peu violâtre, avec quatre bandes ferrugineuses, communes & obliques, dont la postérieure plus large, offrant aux premières ailes deux yeux contigus, & aux secondes trois dont l'antérieur plus petit, l'anal plus gros & bipupillé. Ces yeux sont noirs, avec l'iris jaune, & la prunelle argentée. Il y a en outre trois points argentés entre le second œil & celui de l'angle de l'anus, & le bord postérieur de toutes les ailes est longé par deux lignes noirâtres, dont l'intérieure en feston.

De Surinam.

Nota. Fabricius rapporte son papillon *Lydia* à celui de Cramer, mais il y a bien de la différence entre l'un & l'autre.

41. Satyre Ocyrhoé.

Satyrus Ocyrhoe.

Sat. alis integris, suprà niveis, apice fusco : subtùs fuscis, fasciis tribus albis; posticis ocellis quinque, 3°., 4°., 5°. bipupillatis.

Papilio N. Ocirrhoe, *alis dentatis, suprà albis, apice fuscis : subtùs fuscis, fascus duabus*

albis ; poſticis ocellis quinque. Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 96. *n°.* 297.

Papilio Ciſſia. Cram. *pl.* 148. *fig.* C. D.

Sulz. *Inſ. edit.* Roem. *tab.* 17. *fig.* 3. 4.

Seba, *Muſ.* 4. *tab.* 38. *fig.* 3. 4.

Il a environ un pouce & demi d'envergure. Le deſſus des ailes eſt d'un beau blanc-ſatiné, avec toute la côte, & à peu près le tiers poſtérieur des premières d'un brun-noirâtre ; avec une double ligne ondulée de cette couleur ſur le bord terminal des ſecondes.

Le deſſous des quatre ailes eſt d'un brun-obſcur, avec trois bandes blanches, communes & obliques, dont l'antérieure moins vive & moins large ; plus une rangée d'yeux à iris jaune & à prunelle argentée ſur le limbe poſtérieur, lequel eſt grisâtre & coupé dans toute ſa longueur par deux lignes noirâtres dont l'intérieure flexueuſe. Les yeux des ailes ſupérieures ſont au nombre de trois ou de quatre ; ceux des ailes inférieures au nombre de cinq, dont le deuxième & le cinquième très-noirs & plus gros ; le troiſième & le quatrième ayant, ainſi que l'anal, la prunelle double.

La femelle a la côte des premières ailes plus largement bordée de noirâtre, & les ſecondes ailes ont ſouvent en deſſus un petit œil qui correſpond à l'anal de la ſurface oppoſée.

De la Guyane & du Bréſil.

Nota. Cramer dit que les mâles ſont tout blancs en deſſus. Cela peut être vrai à l'égard de quelques individus ; mais en général ils ont du brun aux endroits que nous avons indiqués. Ils en ont même parfois, ainſi que certaines femelles, avant la double ligne marginale du deſſus des ſecondes ailes.

42. Satyre Brixius.

Satyrus Brixius.

Sat. alis integris, teneris, cœruleſcentibus, ſtrigis utrinquè ſex fuſcis : poſticarum quartâ ſubtùs ocellis quinque bipupillatis.

Il n'a guère qu'un pouce & demi d'envergure. Le deſſus de ſes ailes eſt d'un bleu-cendré, avec ſix raies tranſverſes, & une double ligne terminale, d'un brun-noirâtre.

En deſſous, on retrouve le deſſin du deſſus, mais le fond eſt plus clair, & la quatrième raie des ailes inférieures offre cinq yeux dont le premier, le ſecond & le dernier à iris blanchâtre, les deux autres ſans iris. Tous ces yeux ſont noirs avec une double prunelle argentée.

Décrit d'après un individu unique, envoyé du Bréſil par M. le chevalier de Langſdorff.

43. Satyre Pæon.

Satyrus Pæon.

Sat. alis omnibus dentatis, ſuprà fuſcis : poſticis ſubtùs baſi apiceque flaveſcentibus, tunc fuſcis, ocellis quatuor bipupillatis per paria diſſita approximatis.

Nous décrivons ce ſatyre d'après un individu unique.

Il a approchant un pouce & demi d'envergure. Ses quatre ailes ſont dentées, ſurtout les inférieures. Leur deſſus eſt d'un brun légèrement obſcur avec une double ligne noirâtre, ondulée & terminale.

Le deſſous des premières ailes eſt un peu plus pâle que le deſſus, avec quatre lignes noirâtres, tranſverſes, dont deux ſur le milieu, & deux le long du bord poſtérieur. Il y a en outre un point blanc, oculaire, vis-à-vis du ſommet.

Le deſſous des ſecondes ailes a environ la moitié antérieure & l'angle externe jaunâtres & piqués de noirâtre ; le reſte de la ſurface d'un brun très-obſcur, avec quatre yeux noirs à double prunelle blanche & à iris nébuleux. Ces yeux ſont rapprochés deux à deux, les uns du bord d'en haut, les autres du bord interne. A la double ligne marginale du deſſus répond une ligne ſemblable, & la moitié jaunâtre, qui a le côté poſtérieur très-ſinué, offre dans ſon milieu une raie noirâtre, tranſverſe & atteignant les deux bords.

Du Bréſil.

44. Satyre Grimon.

Satyrus Grimon.

Sat. alis ſubintegris, fuſcis : ſubtùs ſtrigis tribus obſcurioribus undatis ; poſticis ocelli duobus alteroque bipupillatis, maculis flavidis duabus interpoſitis.

Il a environ un pouce & demi d'envergure. Ses ailes, dont le bord terminal eſt entier ou à peine dentelé, ſont d'un brun foiblement obſcur de part & d'autre. Leur deſſus eſt ſans taches.

Leur deſſous offre trois lignes plus obſcures, tranſverſes & ondulées, entre l'intermédiaire & l'extérieure deſquelles les ſecondes ailes ont une rangée de cinq taches, dont l'antérieure, la ſuivante & la poſtérieure oculaires, noires, avec une double prunelle blanche & un iris d'un jaune-rouſſâtre ; la troiſième & la quatrième jaunâtres & un tant ſoit peu réniformes. Les premières ailes ont auſſi deux taches jaunâtres, ſemblables, & ſurmontées d'un œil bipupillé. Il y a en outre, le long du bord poſtérieur des quatre ailes, une double ligne noirâtre, dont l'empreinte ſe fait ſentir en deſſus.

Décrit d'après un ſeul individu, envoyé du Bréſil par M. le chevalier de Langſdorff.

45. Satyre Mæpius.

Satyrus Mæpius.

Sat. alis integris, fuſcis : ſubtùs ſtrigis tribus ferrugineis dimidioque apicali griſeſcente ; poſticis ocellis quinque bipupillatis, 2°., 4°., 5°. *ſuprà conſpicuis.*

Il a environ un pouce & demi de largeur. Le deſſus des ailes eſt d'un brun-obſcur.

Leur deſſous eſt, à une légère nuance près, du même brun depuis la baſe juſqu'au milieu, avec deux lignes ferrugineuſes & tranſverſales; enſuite griſâtre juſqu'au bout, avec une rangée de quatre yeux aux ailes ſupérieures, & une rangée de cinq, dont le ſecond, le quatrième & l'anal viſibles en deſſus, aux ailes inférieures. Ces yeux, que précèdent en dehors une ligne ferrugineuſe & une double ligne noirâtre, ondulées, ſont très-noirs, avec un iris jaunâtre & une double prunelle argentée. Parmi ceux des ailes ſupérieures, il en eſt deux, le premier & le dernier, dont l'empreinte ſe diſtingue en deſſus.

De la Guyane.

46. Satyre Pagyris.

Satyrus Pagyris.

Sat. alis ſuprà fuſcis : ſubtùs ſtrigis duabus ferrugineis undatis ; poſticis baſi griſeſcentibus, tunc flaveſcentibus, maculis argenteis nigrâque bipunctatâ.

Nous décrivons ce ſatyre d'après le ſeul individu qu'il nous a été poſſible d'obtenir.

Sa largeur eſt d'environ un pouce & demi. Le deſſus des ſes ailes eſt d'un brun foiblement obſcur. Les ſupérieures ſont entières & ſans taches. Les inférieures ſont dentées, blanchâtres vers l'angle de l'anus, avec une ſuite de trois points noirs, dont l'intermédiaire plus gros.

Le deſſous des premières ailes eſt de la couleur du deſſus, avec deux lignes ferrugineuſes, tranſverſes & ondulées, indépendamment deſquelles il y a, le long du bord poſtérieur, une ſérie de neuf à dix points argentés, peu brillans.

Le deſſous des ſecondes ailes eſt griſâtre vers la baſe, avec deux lignes ferrugineuſes faiſant ſuite à celles des ailes de devant; puis jaunâtre juſque vers le bout, avec ſept taches argentées, dont cinq, à peu près orbiculaires, rangées parallèlement au bord terminal; les deux autres, & ſurtout celle qui avoiſine le bord interne, alongées & atteignant la ſeconde ligne ferrugineuſe. Entre la quatrième & la cinquième taches orbiculaires, on en voit une noire, qui eſt grande, ovale, diſpoſée tranſverſalement, & chargée de deux gros points argentés. Sur le bord poſtérieur, dont le fond eſt du même gris que la baſe, il y a une double ligne noirâtre, flexueuſe.

Du Bréſil.

47. Satyre Pharès.

Satyrus Phares.

Sat. alis integris, ſuprà fuſcis : ſubtùs anticis flaveſcentibus, poſticis griſeſcentibus, ſtrigis tribus ferrugineis : poſticarum utràque paginâ ocellis ſex, 3°. *didymo.*

Il a environ un pouce & demi d'envergure. Le deſſus des ailes eſt d'un brun-noirâtre, ſans taches aux ſupérieures; avec ſix yeux, dont le ſecond & le quatrième plus gros, le troiſième double, aux inférieures. Ces yeux ſont noirs, avec une double prunelle argentée & un iris jaune.

Le deſſous des premières ailes eſt d'un jaune-rouſſâtre, avec le ſommet d'un gris-rougeâtre & marqué d'un ou de deux petits yeux.

Le deſſous des ſecondes ailes eſt gris, aſpergé de brun, avec les mêmes yeux que du côté oppoſé. Il y a en outre à chaque aile trois lignes d'un ferrugineux-obſcur & légèrement ondulées, ſavoir : deux vers la baſe, la troiſième vers le bord poſtérieur, lequel eſt longé par une ligne noirâtre en feſton.

Du Bréſil.

Nota. Dans le nombre des individus que nous avons obſervés, il s'eſt trouvé une variété dont le deſſus des ſecondes ailes n'offroit diſtinctement que les deux yeux qui avoiſinent l'angle de l'anus.

48. Satyre Tolumnia.

Satyrus Tolumnia.

Sat. alis ſubintegris, teneris, fuſco-cæruleſcentibus : ſubtùs ſtrigis quatuor ferrugineis ; poſticis ocellis quinque, 4°. *elongato, cæteris bipupillatis.*

Papilio N. Tolumnia, *alis dentatis, atris : poſticis ſubtùs ſtrigis ferrugineis cæruleiſque, ocellis quinque, poſtico majori* Fab. *Spec. Inſ. tom.* 2. *p.* 85. *n°.* 374. — *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 46. *n°.* 451. — *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 107. *n°.* 330. (Le mâle.)

Papilio Tolumnia. Cram. *pl.* 130. *fig.* F. G. (Le mâle.)

Papilio Chloris Cram. *pl.* 293. *fig.* A. B. (La femelle.)

Papilio Tolumnia. Herbst, *Pap. tab.* 185. *fig.* 5. 6.

Papilio Chloris. Herbst, *Pap. tab.* 195. *fig.* 1. 2.

Il a environ deux pouces d'envergure. Le deſſus du mâle eſt d'un brun-noirâtre, & glacé de bleu vers l'angle anal des ſecondes ailes.

Le deſſus de la femelle eſt d'un brun entièrement glacé de bleu.

Le deſſous des deux ſexes eſt d'un violet pâle & luiſant, avec quatre raies obliques d'un ferrugineux-obſcur, ſur la troiſième deſquelles les

ailes de devant ont un petit œil plus ou moins diſtinct, & celles de derrière une rangée de cinq yeux, dont le quatrième, à partir d'en haut, oblong, argenté, bordé de fauve; le troiſième brun, bordé comme celui que nous venons de citer, mais arrondi & bipupillé; les autres pareillement arrondis, noirs, avec un iris d'un jaune-paille & une double prunelle argentée. Le cinquième œil eſt très-grand, le ſecond moyen, l'antérieur petit. Derrière les yeux, chaque aile a une double ligne noirâtre, terminale. Tous ces caractères s'aperçoivent en deſſus, en raiſon de la ténuité des ailes.

Il habite la Guyane, le Bréſil, l'île Saint-Thomas, &c. C'eſt par erreur que Fabricius dit que ſon *Tolumnia* eſt des Indes orientales. D'ailleurs, la deſcription qu'il en donne prouve qu'il l'a décrit d'après la figure de Cramer.

49. Satyre Aranéa.

Satyrus Aranea.

Sat. alis anticis ſuprà fuſcis, poſticis nitidè cyaneis : omnibus ſubtùs ſtrigis tribus ferrugineis; poſticis ocellis quinque 2°. & 4°. *majoribus.*

Papilio N. Aranea, *alis ſubdentatis, fuſcis : poſticis cæruleſcentibus, ſubtùs ocellis quinque.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 97. *n°.* 299.

Papilio Ebuſa. Cram. *pl.* 292. *fig.* F. G.

La deſcription que Fabricius donne de ſon papillon *Aranea* convient parfaitement à l'*Ebuſa* de Cramer. Auſſi ne balançons-nous pas à regarder l'un comme étant l'identique de l'autre.

Son envergure eſt d'environ un pouce & demi. Le deſſus des premières ailes eſt d'un brun-noirâtre, un peu chatoyant.

Le deſſus des ſecondes eſt d'un bleu-luiſant, avec le bord antérieur largement brun.

Le deſſous des quatre ailes eſt d'un brun légèrement glacé de bleu, avec trois raies communes d'un ferrugineux-obſcur. La raie poſtérieure eſt précédée aux premières ailes de trois yeux, dont le ſupérieur bipupillé; & aux ſecondes de cinq, dont le deuxième & l'anal plus gros, noirs, ainſi que le premier, les deux intermédiaires bruns. Ces yeux ont un iris jaune & une prunelle blanche. Le bord poſtérieur de toutes les ailes eſt en outre longé par une ligne jaunâtre, bordée de noir.

Nous n'avons pas vu la femelle.

De la Guyane & du Bréſil.

50. Satyre Léa.

Satyrus Lea.

Sat. alis ſubintegris, ſuprà cyaneis : ſubtùs violaceo-fuſcis, ſtrigis tribus, ferrugineis; poſticis ocellis ſex, 5°. *majore.*

Papilio Lea. Cram. *pl.* 151. *fig.* C. D.

Papilio Junia. Cram. *pl.* 292. *fig.* D. E.

Fabricius y rapporte, avec doute il eſt vrai, ſon papillon *Aranea.*

Il a environ deux pouces d'envergure. Le deſſus des ailes eſt d'un bleu-luiſant, tantôt ſans taches, tantôt avec le ſommet des ſupérieures noirâtre.

Le deſſous eſt d'un brun glacé de violet, avec trois raies communes d'un ferrugineux-obſcur, ſavoir : deux diſpoſées obliquement entre la baſe & le milieu, l'autre parallèle au bord terminal, lequel eſt un peu ſinué aux ailes inférieures. Ces ailes ont, dans l'eſpace qui ſépare la raie poſtérieure de la précédente, ſix yeux dont le pénultième plus gros, noir, ainſi que les autres, & ayant comme eux une ſimple prunelle argentée & un iris jaunâtre. Les ailes ſupérieures offrent trois yeux, mais dont l'antérieur beaucoup plus diſtinct. Il y a en outre ſur chaque aile une double ligne noirâtre, terminale.

De Surinam.

Nota. Nous avons réuni ſous la même dénomination le *Lea* & le *Junia* de Cramer, parce que la ſeule différence qu'il y ait entr'eux, c'eſt que le ſecond eſt tout bleu en deſſus, tandis que le premier a le ſommet des ailes ſupérieures noirâtre. L'un eſt probablement le mâle, & l'autre la femelle.

51. Satyre Cluéria.

Satyrus Clueria.

Sat. alis teneris, cineraſcenti-violaceis : poſticis dentatis, utrinquè ocellis quinis, ſubtùs lineis tribus faſciaque brunneis, anticarum à coſtâ deductis.

Papilio S. Clueria, *alis dentatis, fuſcis : poſticis faſciâ cæruleâ ocellis quinque atris, ſubtùs faſciâ fuſcâ ocellis quinque.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 229. *n°.* 716.

Papilio Clueria. Jon. *Fig. pict.* 4. *tab.* 9. *fig.* 2.

Papilio N. PH. *Cluena.* Drury, *Inſ. tom.* 3. *pl.* 7. *fig.* 5. 6.

Il a environ deux pouces d'envergure. Ses ailes ſont minces, d'un violet cendré en deſſus, ſans aucune tache aux ſupérieures; avec cinq yeux adhérens, noirs, à prunelle & à iris lilas aux inférieures. Ces dernières ailes ont le bord terminal denté & coupé dans toute ſa longueur par une ligne violâtre en feſton.

Le deſſous des quatre ailes eſt lilas, avec trois lignes brunes, dont la poſtérieure flexueuſe, & ſéparée des autres par une bande brune, ſur laquelle les ailes de devant ont deux ou trois yeux, celles de derrière cinq comme en deſſus, mais plus petits, non adhérens, & ayant l'iris jaune, même le troiſième & le quatrième qui ſont bruns au lieu d'être noirs. Sur le bord poſtérieur, qui eſt brun, il

y a une ligne lilas, correſpondant à celle de deſſus. Les antennes ſont rouſſes, avec la maſſue noire.

Du Bréſil.

52. Satyre Cornélius.

Satyrus Cornelius.

Sat. alis integerrimis, obſcurè cinereis : poſticis ocellis quatuor approximatis. Fab.

Papilio S. *Cornelius.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 220. *n°.* 689.

Papilio Cornelius. Jon. *Fig. pict.* 6. *tab.* 49. *fig.* 2.

Il eſt de moyenne taille. Le deſſus des ailes eſt d'un cendré-obſcur, ſans taches aux ſupérieures; avec quatre yeux bruns, contigus & marginaux, aux inférieures.

Le deſſous eſt un peu plus pâle que le deſſus, avec des ondes brunes. Aux yeux des ailes inférieures correſpondent quatre yeux très-noirs à prunelle argentée.

Il habite.....

(*Traduction de Fabricius.*)

53. Satyre Doritis (1).

Satyrus Doritis.

Sat. alis ſubintegris, ſuprà fuſcis : ſubtùs cœruleſcentibus, ſtrigis quinque fuſcis; poſticarum tertiâ ocellis quatuor per paria diſſita geminatis.

Papilio N. Doris, *alis dentatis, fuſcis : ſubtùs cœruleis, nigro faſciatis, ocellis trium parium.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 101. *n°.* 314.

Papilio Doris. Cram. *pl.* 8. *fig.* B. C.

Il a environ un pouce & demi de largeur. Le deſſus des ailes eſt d'un brun-obſcur, ſans taches aux ſupérieures, avec une ligne blanche, ondulée & terminale, aux inférieures.

En deſſous, le fond des ailes eſt d'un brun-violet, pâle, avec cinq raies tranſverſes, & une double ligne marginale, d'un brun-noirâtre. Sur la troiſième raie, les ailes ſupérieures ont, près du bord d'en haut, deux yeux à prunelle blanche & à iris fauve; & les ailes inférieures quatre yeux ſemblables, dont deux groupés contre la côte, les deux autres contre le bord interne.

De la Guyane & du Bréſil.

54. Satyre Doxès.

Satyrus Doxes.

Sat. alis cœruleſcenti-fuſcis : ſubtùs ſtrigis duabus ferrugineis; poſticis ocellis quinque ovatis & intùs argenteo pulverulentis.

Il a un peu plus d'un pouce & demi d'envergure. Ses ailes ſont d'un brun-bleuâtre de part & d'autre. Le deſſus des ſupérieures eſt ſans taches. Le deſſus des inférieures a, vers l'angle de l'anus, un gros point noirâtre, & le long du bord terminal, qui eſt plus ou moins denté, une double ligne ſinuée, également noirâtre.

En deſſous, chaque aile offre une ligne marginale ſemblable, & l'on y voit trois lignes ferrugineuſes, ondulées & tranſverſes, dont la poſtérieure ſéparée des autres, mais ſeulement aux ſecondes ailes, par une rangée de cinq yeux ovales, dont le ſecond, le troiſième & le quatrième plus gros. Ces yeux, qu'entoure un iris d'un jaune-rouſſâtre, ſont noirs du côté du bord poſtérieur de l'aile, bruns & couverts d'une pouſſière argentée du côté de la baſe. Le corps eſt de la couleur des ailes. Les antennes ſont annelées de brun & de blanchâtre, & elles ont la maſſue rouſſe, avec la ſommité noire.

Il eſt des individus qui ont un œil de plus près de la côte des ſecondes ailes, mais il eſt plus petit & moins apparent que tous les autres.

Du Bréſil.

55. Satyre Canthus.

Satyrus Canthus.

Sat. alis integerrimis, fuſcis : ſubtùs primoribus ocellis quatuor, poſticis ſenis. Linn.

Papilio D. F. *Canthus.* Linn. *Syſt. Nat.* 2. *p.* 768. *n°.* 129.

Papilio Euridice. Linn. *Amœn. Acad. tom.* 6. *p.* 406. *n°.* 65.

Fabricius a réuni ce lépidoptère au ſuivant; mais il nous paroît former une eſpèce différente, à en juger du moins par la deſcription que voici.

Il reſſemble à l'*Hyperanthus*. Ses ailes ſont très-entières, d'un brun-obſcur en deſſus, avec de foibles veſtiges d'yeux aux inférieures.

Le deſſous des ailes ſupérieures a, vers le bord terminal, quatre yeux noirs à prunelle blanche.

Le deſſous des inférieures a cinq yeux contigus, & un ſixième ſéparé des autres.

Des environs de Philadelphie.

(*Traduction de Linnæus*, Amœn. Acad.)

Nota. Nous n'avons pas voulu éloigner ce ſatyre de celui auquel Fabricius l'a réuni. Mais, s'il n'a que les caractères que nous venons de citer, ſa place eſt à côté de l'*Hyperanthus* qui n'a que des yeux aux ailes.

56. Satyre Canthéus.

Satyrus Cantheus.

Sat. alis integris, ſuprà fuſcis, immaculatis : poſticis ſubtùs ocellis ſex. Fab.

(1) Nous avons changé le nom de Fabricius, parce qu'il y a une héliconie qui porte le nom de *Doris*.

Papilio N. *Canthus.* Fab. *Syſt. Ent. p.* 486. *n°.* 191.—*Spec. Inſ. tom.* 2. *p.* 31. *n°.* 333.—*Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 157. *n°.* 488.

Sa taille eſt à peu près la même que celle du précédent.

Le deſſus des ailes eſt d'un brun-noirâtre & ſans taches.

Le deſſous eſt un peu plus clair que le deſſus, avec deux lignes ferrugineuſes, obliques & communes. Les ailes ſupérieures ont trois petits yeux peu prononcés. Les inférieures ont le bord terminal rayé, avec ſix yeux, dont le cinquième très-grand, le ſixième très-petit & placé à l'angle de l'anus.

De l'Amérique ſeptentrionale.

(*Traduction de Fabricius.*)

57. Satyre Eurythris.

Satyrus Eurythris.

Sat. alis integerrimis, fuſcis, ſuprà ocellis duobus bipupillatis remotiſque : ſubtùs ſtrigis duabus ferrugineis; poſticis ocellis quatuor geminatis punctiſque totidem interjectis.

Papilio F. Eurytus, *alis integerrimis, fuſcis : anticis ocellis utrinquè duobus; poſticis ſuprà unico, ſubtùs quatuor : omnibus pupillâ geminâ.* Fab. *Syſt. Ent. p.* 487. *n°.* 194. — *Spec. Inſ. tom.* 2. *p.* 65. *n°.* 291. — *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 32. *n°.* 337.

Papilio N. *Eurytris.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 157. *n°.* 485.

Papilio Eurytris. Herbst, *Pap. tab.* 196. *fig.* 7. 8.

Papilio Cymela. Cram. *pl.* 132. *fig.* C. D.

Il a un peu plus d'un pouce & demi d'envergure. Ses quatre ailes ſont entières, d'un brun foiblement obſcur en deſſus, ſurtout à leur extrémité où l'on voit deux yeux très-noirs à iris jaunâtre & à double prunelle argentée. Ces yeux ſont très-éloignés l'un de l'autre, & ſéparés du bord terminal par une triple ligne noirâtre.

En deſſous, le fond eſt encore plus pâle qu'en deſſus, avec deux lignes brunes, tranſverſes, ondulées, & placées vers le milieu de la ſurface. Aux yeux des premières ailes correſpondent deux yeux ſemblables, mais entre leſquels il y a deux doubles points argentés. Les ſecondes ailes ont quatre yeux, ſavoir : deux, dont l'antérieur plus petit, près de la côte, & deux, dont le poſtérieur auſſi plus petit, près de l'angle de l'anus; ſans compter deux doubles points argentés, intermédiaires, & entourés quelquefois d'un iris jaunâtre. Après les yeux viennent trois lignes noirâtres, terminales. Le corps eſt de la couleur des ailes. Les antennes ſont annelées de blanc & de noir, & leur maſſue eſt ferrugineuſe.

Il ſe trouve dans l'Amérique ſeptentrionale & à la Jamaïque. C'eſt donc d'après des renſeignemens inexacts que Fabricius le dit du Cap de Bonne-Eſpérance.

Nota. Dans certains individus, le plus petit des deux yeux de l'angle anal des ailes inférieures paroît en deſſus; ce qui fait de ce côté trois yeux, au lieu de deux.

58. Satyre Aréolé (1).

Satyrus Areolatus.

Sat. alis integerrimis, nigro-fuſcis, ſuprà immaculatis : ſubtùs ſtrigis duabus circuloque ferrugineis, poſticis ocellis ſex, 3°., 4°., 5°. valdè elongatis.

Papilio S. Areolatus, *alis integerrimis, ſuprà fuſcis, immaculatis : ſubtùs ſtrigâ communi margineque circuliſque teſtaceis; primoribus ocellis quatuor, poſticis ſex, intermediis elongatis.* Smith-Abbot, *The Nat. Hiſt. of the rarer Lepid. Inſ. of Georgia, vol.* 1. *p.* 25. *tab.* 13.

Il a entre un pouce & demi & deux pouces d'envergure. Ses quatre ailes ſont bien entières & d'un brun-noirâtre. Leur deſſus eſt ſans taches.

Leur deſſous eſt un peu plus clair que le deſſus, avec deux lignes ferrugineuſes & tranſverſales, dont l'une vers la baſe, l'autre le long du bord poſtérieur. Entre ces lignes, il y a un cercle alongé, également ferrugineux, dans lequel les premières ailes ont trois à quatre yeux, ronds, noirs, avec la prunelle bleuâtre, l'iris jaune. Ce cercle renferme aux ſecondes ailes ſix yeux, dont le troiſième, le quatrième & le cinquième très-oblongs & ayant la prunelle ovale, les autres arrondis comme ceux des ailes de devant.

La chenille, ſelon Abbot, eſt d'un vert-foncé, avec des raies longitudinales plus claires. Elle vit ſur le *barbon penché* (*andropogon nutans*).

La chryſalide eſt verdâtre, & ſuſpendue par la queue. Le papillon éclôt en juin. On le trouve communément en Georgie, le long des ruiſſeaux.

59. Satyre Phocion.

Satyrus Phocion.

Sat. alis integerrimis, ſuprà fuſcis, immaculatis : poſticis ſubtùs ſtrigis flavis ocelliſque tribus oblongis. Fab.

Papilio S. *Phocion.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 218. *n°.* 683.

Fabricius le décrit ainſi : il eſt petit. Le deſſus

(1) Abbot a appelé ce ſatyre *Areolatus*, pour indiquer qu'il a ſous chaque aile une aire ou ſurface ovale, renfermant des yeux. Nous ne pouvions donc traduire ce nom que par le mot *aréolé*, mot que les botaniſtes emploient à peu près dans le même ſens.

de ſes quatre ailes & le deſſous des ſupérieures ſont d'un brun-obſcur, & ſans taches.

Le deſſous des inférieures eſt également d'un brun-obſcur, & l'on y voit quatre lignes jaunes, tranſverſales, dont la ſeconde & la troiſième ſe réuniſſant par leurs extrémités & embraſſant trois yeux très-alongés, noirs, avec un iris jaune & une prunelle formée de pluſieurs points argentés.

La patrie de ce ſatyre n'eſt pas indiquée; mais l'analogie nous fait ſoupçonner qu'il habite l'Amérique.

60. Satyre Herſéis.

Satyrus Herſeis.

Sat. alis integris, teneris, cæruleſcentibus: poſticis ſubtùs ſtrigis tribus ferrugineis, angulatis, ocelliſque quinque, 3°. & 4°. elongatis.

Papilio Herſe. Cram. *pl.* 10. *fig.* C. D.

Son envergure eſt approchant de deux pouces. Ses ailes ſont très-minces. Leur deſſus eſt d'un brun glacé de bleuâtre.

Leur deſſous eſt à peu près de la couleur du deſſus, avec trois raies d'un ferrugineux-obſcur, obliques aux ailes ſupérieures; anguleuſes, ſurtout l'intermédiaire & la ſuivante, aux ailes inférieures. Sur la raie poſtérieure, les ailes de devant ont un petit œil faiſant face au ſommet; & celles de derrière une rangée de cinq yeux, dont le troiſième & le quatrième, à partir d'en haut, oblongs, argentés & bordés de jaune. Les autres yeux ſont ronds, noirs, avec un iris jaune & une prunelle argentée, laquelle eſt double à l'œil le plus voiſin de l'angle anal. Il y a en outre, tout le long du bord poſtérieur de chaque aile, deux lignes noirâtres, parallèles, dont l'empreinte, ainſi que celle des raies ferrugineuſes & des yeux, s'aperçoit en deſſus.

De la Guyane & du Bréſil.

Décrit d'après Cramer.

61. Satyre Pacarus.

Satyrus Pacarus.

Sat. alis integris, nigricanti-fuſcis, ſuprà immaculatis: ſubtùs anticis ſtrigis duabus obſcurioribus undatis, poſticis tribus ocelliſque quinque atomis pupillaribus argenteis.

Il a environ deux pouces d'envergure. Ses ailes ſont entières, & d'un brun-noirâtre de part & d'autre. Leur deſſus eſt ſans taches.

Leur deſſous offre, vers l'extrémité, deux lignes plus obſcures que le fond. Les ſecondes ailes ont une troiſième ligne ſemblable, placée tranſverſalement vers le milieu, & ſéparée des autres par une rangée de cinq yeux ronds, très-noirs, ayant une prunelle formée par des atomes argentés, & un iris brunâtre qu'entoure un cercle plus foncé. Les premières ailes n'ont pas d'yeux.

Décrit ſur un individu unique, pris au Bréſil.

62. Satyre Périphas.

Satyrus Periphas.

Sat. alis integerrimis, fuſcis, ſuprà ocello unico: ſubtùs ſtrigâ ferrugineâ; poſticis ocellis tribus punctiſque quatuor interjectis.

Il diffère de l'*Eurythris*, en ce qu'il eſt plus petit; en ce que le deſſus des quatre ailes & le deſſous des ſupérieures n'offrent qu'un ſeul œil; en ce que le deſſous des inférieures n'a que trois yeux, ſavoir: un près de la côte, & deux, dont le poſtérieur plus petit, près de l'angle de l'anus; enfin, en ce qu'il n'y a qu'une ligne brune, au lieu de deux, ſur le milieu de la ſurface inférieure de chaque aile.

Décrit d'après un individu unique, pris au Bréſil.

63. Satyre Soſybius.

Satyrus Soſybius.

Sat. alis integerrimis, fuſcis, ſuprà immaculatis: ſubtùs ſtrigis tribus lituráque centrali obſcurioribus; poſticis ocellis ſex, 3°. & 4°. obſoletis.

Papilio S. Soſybius, *alis integerrimis, ſuprà fuſcis, immaculatis: ſubtùs anticis ocellis quinque; poſticis ſex, internediis cæcis.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 219. *n°.* 684.

Papilio Soſybius. Jon. *Fig. pict.* 6. *tab.* 52. *fig.* 2.

Papilio Camerta. Cram. *pl.* 293. *fig.* F.

Papilio Camertus. Herbst, *Pap. tab.* 195. *fig.* 8.

La deſcription que Fabricius donne de ce ſatyre ne permet pas de douter que ce ne ſoit le même que le *Camerta* de Cramer.

Il eſt petit. Ses ailes ſont entières & d'un brun-obſcur. Leur deſſus n'a pas de taches.

Leur deſſous, qui eſt un peu plus clair que le deſſus, offre trois lignes très-obſcures, tranſverſes & ondulées. Entre la ligne antérieure & la ſeconde, il y a une liture diſcoïdale, également très-obſcure; &, entre la ſeconde & la troiſième lignes, une rangée de quatre à cinq yeux aux ailes ſupérieures, & une rangée de ſix aux inférieures. Les yeux des ailes de devant ſont plus ou moins diſtincts. Ceux des ailes de derrière ſont noirs, avec une ſimple prunelle blanche & un iris jaunâtre; mais le premier, le ſecond & le troiſième ſont parfois moins prononcés, & même preſque nuls. Ce qui a fait dire à Fabricius qu'ils étoient ſans prunelle. Indépendamment des trois lignes dont nous venons de parler, il en

exiſte une noirâtre, qui eſt double & tout-à-fait terminale.

La femelle reſſemble au mâle.

De la Guyane & du Bréſil.

64. Satyre Galéſus.

Satyrus Galeſus.

Sat. alis integris, fuſcis, ſuprà immaculatis: ſubtùs ſtrigis tribus obſcurioribus; anticis punctis nullis, poſticis quinque nigricantibus.

Il a environ un pouce & demi de largeur. Ses quatre ailes ſont entières & d'un brun foiblement obſcur. Leur deſſus eſt ſans taches.

Leur deſſous offre trois lignes plus obſcures, dont l'intermédiaire éclairée de gris-violâtre en dehors, la poſtérieure très-fine & en feſton. Cette dernière ligne eſt ſéparée de la précédente, mais ſeulement aux ſecondes ailes, par une rangée de cinq points noirâtres. Les premières ailes n'ont aucun point, du moins dans l'individu d'après lequel nous donnons cette deſcription.

Du Bréſil.

65. Satyre Phronius.

Satyrus Phronius.

Sat. alis integris, ſuprà fuſcis, limbo ſaturatiore: ſubtùs flavidis, undis ſtrigiſque tribus fuſcis; anticis puncto, poſticis quatuor, albis.

Il a environ un pouce & demi de largeur. Le deſſus de ſes ailes eſt d'un brun-noirâtre, avec le limbe poſtérieur plus foncé.

Le deſſous eſt jaunâtre, avec une multitude d'ondes, & trois lignes tranſverſes, d'un brun-obſcur. La ligne poſtérieure eſt flexueuſe, précédée aux premières ailes d'un ſeul point blanc, & aux ſecondes de quatre, dont les deux extrêmes cerclés de noir.

Décrit d'après un individu ſans corps & ſans antennes, envoyé du Bréſil.

66. Satyre Méluſine.

Satyrus Meluſina.

Sat. alis ſuprà fuſcis, diſco pallidiore: ſubtùs, albidis; anticis ocellis duobus diſſitis, poſticis ſeptem approximatis, 4°. & 5°. majoribus.

Papilio N. Meluſina, *alis dentatis, fuſcis, diſco albo: ſubtùs albidis, anticis ocellis duobus, poſticis ſeptem.* Fab. *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 43. *n°.* 430.

Papilio S. *Meluſina.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3 *pars* 1. *p.* 240. *n°.* 750.

Papilio S. Miriam, *alis dentatis, fuſcis: ſubtùs cinereis, anticis ocellis duobus, poſticis ſeptem.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 242. *n°.* 754.

Papilio Miriam. Jon. *Fig. pict.* 6. *tab.* 32. *fig.* 2.

Papilio Miriam. Herbst, *Pap. tab.* 204 *fig.* 3. 4.

Papilio Dorothea. Cram. *pl.* 204. *fig.* E. F.

Il ſuffit de rapprocher la deſcription du papillon *Meluſina* de Fabricius, de celle de ſon papillon *Miriam*, pour être convaincu ſur-le-champ qu'ils ne forment qu'une ſeule & même eſpèce.

Elle a environ un pouce & demi d'envergure. Le deſſus des ailes eſt d'un brun-obſcur, avec le milieu des ſupérieures & la baſe des inférieures beaucoup plus pâles. Les ailes ſupérieures ſont entières, les inférieures ſont légèrement dentées.

Le deſſous des unes & des autres eſt d'un blanc-ſale, avec tout le pourtour extérieur largement couvert d'atomes obſcurs, & une ligne en zig-zag de cette couleur ſur le milieu de la ſurface. Entre cette ligne & le bord terminal, les ailes de devant ont deux yeux très-écartés, dont le poſtérieur plus grand. Les ailes de derrière en ont ſept contigus, dont le quatrième & le cinquième auſſi plus grands. Ces yeux ſont noirs, avec la prunelle blanche & l'iris jaune, & le bord qu'ils avoiſinent eſt diviſé dans toute ſa longueur par une double ligne noirâtre, flexueuſe. Le corps eſt brun en deſſus, griſâtre en deſſous. Les antennes ſont obſcures, avec la maſſue ferrugineuſe.

Ce ſatyre n'eſt ni des Indes, ni de Sierra-Leone, comme le diſent Fabricius & Cramer; mais de l'île King (mer du Sud), d'où il a été rapporté par MM. Péron & le Sueur.

Nota. Le deſſus des ſecondes ailes eſt garni près de la baſe d'un faiſceau de poils griſâtres, divergens.

67. Satyre Byſès.

Satyrus Byſes.

Sat. alis integris, teneris, ſuprà cæruleſcenti-fuſcis: ſubtùs cæruleſcentibus, fuſco undatis; poſticis ocellis duobus punctiſque totidem albis interjectis.

Il a environ un pouce & demi d'envergure. Ses ailes ſont entières, minces. Leur deſſus eſt d'un brun-violâtre, ſans aucune tache.

Leur deſſous eſt lilas, finement ondé de brun, avec une rangée tranſverſe de trois à quatre petits points blancs vis-à-vis du ſommet des ailes ſupérieures; avec deux yeux noirs à prunelle blanche & à iris d'un jaune-paille près du bord terminal des inférieures. Ces yeux ſont très-éloignés l'un de l'autre, & il y a entr'eux deux points blancs ou jaunâtres. Le corps eſt brun en deſſus, plus clair

clair en dessous. Les antennes sont annelées de brun & de blanc, & leur massue est roussâtre, avec l'extrémité noire. Les pattes sont jaunâtres.
Du Brésil.

68. Satyre Polixenès.

Satyrus Polixenes.

Sat. alis integris, fuscis : posticis subtùs fusco grisèoque nebulosis. Fab.

Papilio N. *Polixenes.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 152. *n°.* 466.

Le corps est velu, noir. Le dessus des quatre ailes & le dessous des supérieures sont d'un brun-obscur, sans taches.
Le dessous des inférieures est piqué de gris & de brun, avec une bande plus obscure sur le milieu.
De l'Amérique méridionale.
(*Décrit d'après Fabricius.*)

69. Satyre Echo.

Satyrus Echo.

Sat. alis dentatis, fuscis : anticis utrinquè areâ apicis ferrugineâ : singulis subtùs strigâ posticâ punctorum alborum.

Papilio N. Echo, *alis dentatis, fuscis : omnibus subtùs strigâ punctorum alborum.* Fab. *Spec. Inf. tom.* 2. *p.* 91. *n°.* 399. — *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 49. *n°.* 484. — *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 180. *n°.* 568.

Papilio Echo. Cram. *pl.* 57. *fig.* C. D.

Il a près de trois pouces d'envergure. Ses ailes sont d'un brun-obscur. Les premières, dont le bord postérieur est entier, ont de part & d'autre, près de leur extrémité, un espace ferrugineux en forme de bande transverse. Les secondes ailes sont dentées, & sans aucune tache en dessus.
Le dessous des quatre ailes est traversé par une rangée postérieure de points blancs.
De Surinam.

70. Satyre Gripus.

Satyrus Gripus.

Sat. alis integris, corticino-fuscis : anticis utrinquè apice flavido : singulis subtùs strigâ mediâ punctorum alborum.

Papilio N. Gripus, *alis integris, subfuscis : subtùs strigâ punctorum alborum.* Fab. *Syst. Ent. append.* 829. — *Spec. Inf. tom.* 2. *p.* 58. *n°.* 255. — *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 28. *n°.* 294. — *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 149. *n°.* 457.

Papilio Gripus. Herbst, *Pap. tab.* 135. *n°.* 3. 4.

Papilio Fumea. Cram. *pl.* 165. *fig.* C. D.

Papilio Fumeus. Drury, *Inf. tom.* 1. *pl.* 2. *fig.* 5.

Il a environ trois pouces d'envergure. Ses quatre ailes sont arrondies & entières. Le dessus des premières est d'un brun-tanné, avec une bande jaunâtre, large, courbe & presque terminale. Le dessus des secondes ailes est d'un brun-obscur, sans aucune tache.
Le dessous des quatre ailes est approchant de la couleur du dessus, avec une rangée transverse & presque centrale de gros points blancs, renfermée entre deux lignes noirâtres, dont l'antérieure plus distincte.
De l'Inde, selon Fabricius; de la Chine, selon Cramer & Drury.

71. Satyre? Arcésilaus.

Satyrus Arcesilaus.

Sat. alis integerrimis, suprà ferrugineis, immaculatis : subtùs fuscis, strigis duabus obscurioribus punctorum flavescentium seriem includentibus.

Papilio N. Arcesilaus? *alis integerrimis, suprà ferrugineis, immaculatis : subtùs fuscis, strigis duabus obscurioribus.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 153. *n°.* 470.

Papilio Arcesilaus. Donow. *Of an Epit. of the Nat. Hist. Inf. of India, cah.* 2. *pl.* 1. *fig.* 2.

Comme nous n'avons vu ce lépidoptère qu'en figure, nous ne sommes pas bien certains qu'il appartienne au genre Satyre.
Il a environ deux pouces d'envergure. Ses ailes sont entières, ferrugineuses, & tout-à-fait sans taches en dessus.
Leur dessous est obscur, avec deux lignes transverses, encore plus obscures, & renfermant une rangée de points jaunâtres, très-petits. La base offre en outre, mais d'une manière moins distincte, une autre ligne obscure.
Du royaume de Siam.
Nota. Fabricius ne parle pas de la rangée de points jaunâtres du dessous des secondes ailes. Il est vrai que ces points sont peu apparens.

72. Satyre Abéona.

Satyrus Abeona.

Sat. alis dentatis, fusco-nigris : anticis utrinquè fasciâ sesquialterâ aurantiacâ ocellisque duobus : posticis subtùs strigis duabus flavis ocellos totidem dissitos includentibus.

Papilio Abeona, *alis dentatis, fuscis : anticis fasciâ testaceâ, ocellis duobus; posticis suprà ocello, subtùs duobus.* Donow. *Gen. Illust. of Entom. part.* 1. *an Epitome of the Inf. of New Holl. pl.* 22. *fig.* 1.

Il a de deux pouces & demi à trois pouces d'envergure. Ses ailes ſont d'un noir-brun en deſſus. Les premières, dont le bord poſtérieur eſt entier, ont, ſur leur milieu, une bande orangée, tranverſe, anguleuſe, rétrécie antérieurement; &, vers leur extrémité, deux yeux, dont l'inférieur plus gros & adhérant au côté externe de la bande, le ſupérieur ſéparé de cette même bande par une ligne ou par une liture orangée qui s'appuie obliquement ſur la côte. Ces yeux ſont bleus, avec la prunelle blanche & l'iris d'un noir-foncé. Les ſecondes ailes ſont dentées, & elles ont deux yeux noirs à prunelle bleue; mais l'œil du bord d'en haut eſt ſans iris; l'œil de l'angle anal au contraire en a un d'un rouge-fauve.

Le deſſous des quatre ailes eſt moins foncé que le deſſus. Celui des ſupérieures a, indépendamment des caractères que nous avons indiqués, deux points bleuâtres, placés entre les taches oculaires. Celui des ailes inférieures a deux yeux ſemblables à l'œil anal du deſſus, & ils ſont renfermés entre deux lignes jaunes ondulées, dont l'extérieure double & ſe prolongeant ſur le bord terminal des premières ailes. Le corps & les antennes ſont d'un noir-brun.

Les femelles reſſemblent aux mâles; cependant, chez quelques-unes, les taches oculaires du deſſous des ſecondes ailes ſont entourées d'un cercle blanchâtre.

De la Nouvelle-Hollande.

73. Satyre Gélanor.

Satyrus Gelanor.

Sat. alis ſuprà fuſcis, fulvo maculatis : anticis puncto albo : poſticis ſubtùs violaceo-griſeis, ſtrigis duabus fuſcis ocellos totidem diſſitos includentibus. (La femelle.)

Nous ne connoiſſons que la femelle de ce ſatyre.

Elle a environ trois pouces d'envergure. Le deſſus de ſes ailes eſt d'un brun-noirâtre, avec des taches fauves. Les ailes ſupérieures en ont ſix, dont quatre, plus grandes, diſpoſées obliquement ſur le diſque; les deux autres placées près du ſommet & ſéparées par un point blanc. Les ailes inférieures en ont cinq, dont une, très-large, occupant le milieu du bord antérieur; les quatre autres groupées vers le bord terminal qui eſt dentelé. Il y a en outre près de l'angle de l'anus un œil noir à prunelle blanche & à iris fauve.

Le deſſous des premières ailes reſſemble beaucoup au deſſus; mais il eſt plus pâle, & le ſommet offre, ſur un fond cendré, un petit œil ſurmontant le point blanc de la ſurface oppoſée.

Le deſſous des ſecondes ailes eſt d'un gris-violâtre-luiſant, avec deux petits yeux, dont un correſpondant à celui du deſſus, l'autre touchant preſque le bord d'en haut. Ces yeux ſont noirs, avec la prunelle blanche & l'iris obſcur, & ils ſont renfermés entre deux lignes brunes, flexueuſes, dont l'antérieure diſcoidale, la poſtérieure longeant le bord qui eſt brun. Le corps eſt obſcur, avec un petit collier blanc & le haut du corſelet ferrugineux.

De la Nouvelle-Hollande.

74. Satyre Mardanie.

Satyrus Mardania.

Sat. alis dentatis, fulvis : anticis apice nigris faſciâ albâ, poſticis punctis quatuor ocellaribus flavis. Fab.

Papilio S. *Mardania.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom. 3. pars 1. p. 249. n°. 776.*

Papilio Mardania. Jon. *Fig. pict. 4. tab. 70. fig. 1.*

Le corps eſt obſcur. Les premières ailes, dont le deſſus eſt fauve & tacheté de brun-obſcur, ont le ſommet noir, avec une bande blanche. Les ſecondes ailes ſont fauves en deſſus, avec quatre points jaunes, oblongs, à prunelle noire, & ſuivis d'une ligne obſcure, peu prononcée.

Le deſſous des quatre ailes eſt verdâtre, nuancé de brun, avec une bande noirâtre ſur le milieu, & une ligne de points également noirâtres vers le bord terminal. Les points ſupérieurs des ailes de devant ont un iris jaune.

Des Indes.

(*Traduction de Fabricius.*)

75. Satyre? Blomfildia.

Satyrus Blomfildia.

Sat. alis dentatis, flavis, apice nigris : poſticis ſubtùs fuſcis, albo undatis, ocellis quatuor, intermediis cæcis. Fab.

Papilio N. *Blomfildia.* Fab. *Spec. Inſ. tom. 2. p. 84. n°. 370. — Mant. Inſ. tom. 2. p. 45. n°. 447. — Ent. Syſt. em. tom. 3. pars 1. p. 106. n°. 526.*

Ce lépidoptère a été dédié par Fabricius à M. Blomfield, amateur anglais.

Il eſt grand, fauve en deſſus. Ses ailes ſupérieures ont l'extrémité noire & glacée de bleu, avec trois taches blanches. Les ailes inférieures ont une ligne noire, marginale.

Le deſſous des premières ailes eſt à peu près ſemblable au deſſus.

Le deſſous des ſecondes ailes eſt obſcur, avec des traits ſinueux & des anneaux blancs. Outre cela, il y a vers le bord terminal quatre yeux, dont l'antérieur noir, avec la prunelle blanche & l'iris ferrugineux; les deux intermédiaires verdâ-

tres, fans prunelle, & ayant l'iris gris; le poſtérieur rougeâtre, avec la prunelle blanche & l'iris noir.

Du Bréſil.

(*Traduction de Fabricius.*)

76. Satyre Lycaon.

Satyrus Lycaon.

Sat. alis dentatis : anticis fuſcis, flavo alboque maculatis : poſticis ferrugineis, ocellis ſex cæcis; ſubtùs variegatis, ocellis octo. Fab.

Papilio S. *Lycaon.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 228. *n°.* 714.

Papilio Lycaon. Jon. *Fig. pict.* 4. *tab.* 17. *fig.* 1.

Le corps eſt de médiocre grandeur, brun, avec les côtés de l'abdomen fauves. Le deſſus des ailes ſupérieures eſt d'un brun-obſcur, tacheté de jaune & de blanc, avec un œil noir à iris roux & ſans prunelle. Le deſſus des ailes inférieures eſt obſcur à la baſe, avec une rangée de cinq taches jaunes; roux à l'extrémité, avec ſix taches noires, oculaires.

Le deſſous des ailes de devant eſt jaune à la baſe, avec des taches obſcures; brun à l'extrémité, avec une ligne jaune, terminale, précédée de trois taches blanches & de deux yeux noirs, ayant chacun un iris jaune, mais dont le poſtérieur ſans prunelle, tandis que l'antérieur en a une blanche.

Le deſſous des ailes de derrière eſt varié de jaune & de brun, avec une rangée de huit yeux noirs à iris jaune & à prunelle bleue.

Il habite. . . . .

(*Traduction de Fabricius.*)

77. Satyre Herſé.

Satyrus Herſe.

Sat. alis dentatis, fuſco-ferrugineis : anticis albo punctatis; poſticis utrinquè ocellis ſeptem cæcis. Fab.

Papilio S. *Herſe.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 229. *n°.* 718.

Papilio Herſe. Jon. *Fig. pict.* 4. *tab.* 7. *fig.* 2.

Le deſſus de ſes ailes ſupérieures eſt d'un ferrugineux-obſcur, avec une bande de ſix taches blanches au-delà du milieu & quatre points de cette couleur au ſommet. Leur deſſous eſt un peu plus pâle.

Le deſſus des ailes inférieures eſt auſſi d'un ferrugineux-obſcur, avec une rangée de ſept yeux noirs, ayant tous un iris fauve, mais dont le ſecond & le troiſième ſeulement pourvus d'une prunelle blanche, les cinq autres ſans prunelle. En deſſous ces mêmes ailes ſont plus pâles, & leurs ſept yeux ſont bleus, avec l'iris jaune & entouré d'un cercle noir.

Il habite. . . .

(*Traduction de Fabricius.*)

78. Satyre Minerve.

Satyrus Minerva.

Sat. alis dentatis, fulvis, apice nigris albo maculatis : poſticis ocellis ſuprà quinque cæcis, ſubtùs ſeptem pupillatis. Fab.

Papilio N. *Minerva.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 95. *n°.* 295.

Les premières ailes ſont entières, fauves en deſſus, avec l'extrémité noire, & marquée de quatre ou cinq taches blanches. Il y a en outre un trait jaunâtre avant la partie noire. Les ſecondes ailes ſont dentées, fauves en deſſus, avec une raie marginale, & cinq yeux ſans prunelle, d'un brun-obſcur.

Le deſſous des quatre ailes eſt cendré : celui des ſupérieures offre deux lignes ferrugineuſes, avec le trait jaunâtre & les taches blanches du deſſus; celui des inférieures a une rangée de ſept yeux à prunelle blanchâtre.

De l'Amérique.

(*Traduction de Fabricius.*)

N. B. Ce lépidoptère eſt celui que Fabricius a rapporté avec doute à notre *Caumas* ou *Arcadia* de Cramer. (*Voyez* Satyre n°. 7.)

79. Satyre Proſerpine.

Satyrus Proſerpina.

Sat. alis dentatis, fulvis : anticis apice atris, punctis flavis : poſticis ſubtùs marmoratis, ocellis quatuor, intermediis cæcis. Fab.

Papilio S. *Proſerpina.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 228. *n°.* 713.

Papilio Proſerpina. Jon. *Fig. pict.* 5. *tab.* 24. *fig.* 1.

Il eſt grand, fauve en deſſus. Ses premières ailes ont l'extrémité noire, avec trois taches jaunes. Les ſecondes ailes ont ſur le bord poſtérieur une ligne noire, interrompue.

Le deſſous des ailes ſupérieures eſt jaune à la baſe, avec des taches noires; d'un noir-brun vers le bout, avec des taches blanches.

Le deſſous des ailes inférieures eſt marbré, & l'on y voit quatre yeux, dont le premier fauve & ayant l'iris noir, le ſecond & le troiſième ſans prunelle, le quatrième à iris fauve & à prunelle blanche.

Il habite. . . . .

(*Traduction de Fabricius.*)

80. Satyre Mérope.

Satyrus Merope.

Sat. alis dentatis, suprà fulvis, ocello unico : anticis utrinquè dimidio apicali nigro maculis flavis : posticis subtùs fusco-cinereis, ocellis duobus alteroque minutissimis. (Fem.)

Papilio N. Merope, *alis dentatis, fulvis, apice nigris ocello unico : posticis subtùs cinereis, ocellis tribus minutissimis.* Fab. *Syst. Ent. p.* 495. *n°.* 228. — *Spec. Inf. tom.* 2. *p.* 40. *n°.* 408. — *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 99. *n°.* 306.

Papilio Merope. Donow. *Gen. Illust. of Entom. part* 1. *an Epitome of the Inf. of New Holl. pl.* 28. *fig.* 2.

Nous décrivons cette espèce d'après des individus femelles, n'ayant pu parvenir à voir un seul mâle. Fabricius & Donowan n'ont aussi connu que la femelle de ce satyre.

Elle a un peu plus de deux pouces & demi d'envergure. Les premières ailes, dont le bord terminal est entier, ont environ la moitié antérieure fauve, avec la côte & le bord interne obscurs; l'autre moitié noire, avec trois taches plus ou moins jaunes, dont l'inférieure adhérant à la partie fauve, la supérieure externe plus petite, & surmontée d'un œil très-noir à prunelle bleue & à iris roux. Les secondes ailes sont dentées, fauves en dessus, avec le bord postérieur noirâtre, & un œil presqu'anal, pareil à celui dont nous venons de parler, & compris entre deux lignes noires, ondulées, qui se croisent un peu au-delà de l'angle extérieur & s'écartent ensuite de plus en plus sans atteindre le bord abdominal de l'aile.

Le dessous des ailes supérieures ressemble au dessus, mais le sommet est cendré jusqu'à l'œil.

Le dessous des ailes inférieures est cendré, lavé de brun sur le disque & sur la moitié postérieure du bord de ce nom. On y distingue trois yeux noirs, très-petits, dont deux groupés près du bord d'en haut, le troisième correspondant à celui de la surface opposée. Outre cela, la nervure qui ferme intérieurement la cellule du milieu est d'une teinte jaune. Le corps est fauve en dessus, d'un gris-sale en dessous. Les antennes sont brunes, annelées de blanchâtre, avec la massue noire & terminée de roux.

De la Nouvelle-Hollande.

81. Satyre Archémor.

Satyrus Archemor.

Sat. alis omnibus supràque anticisque subtùs fulvis, nigro variis, ocello unico : posticis subtùs cinereo-luteis entibus, strigis tribus fuscis, undulatis, ocelliscque duobus & altero minutis. (Mas.)

Nous n'avons vu que des mâles de ce satyre.

Il est un peu moins grand que le *Mérope*, auquel il ressemble par le dessus des secondes ailes.

Les deux surfaces des premières ailes sont variées de fauve & de noir-obscur, & elles offrent, vis-à-vis du sommet qui est un peu plus pâle en dessous, un œil noir à prunelle bleue & à iris fauve.

Le dessous des secondes ailes est d'un jaune-cendré, avec trois lignes brunes, transverses, ondulées, interrompues, & trois petits yeux disposés comme dans le *Mérope*, mais plus distincts.

De la Nouvelle-Hollande.

Nota. Ne seroit-ce pas le mâle du *Mérope* ?

82. Satyre Achanta.

Satyrus Achanta.

Sat. alis omnibus supràque anticisque subtùs fulvis, nigro striatis, ocello unico : posticis subtùs fusco flavidoque variegatis, ocellis duobus disjunctis.

Papilio Achanta, *alis dentatis, fulvis, fusco fasciatis : anticis ocello, posticis duobus, anteriore supràque minore.* Donow. *Gen. Illust. of Entom. part.* 1. *an Epitome of the Inf. of New Holl. pl.* 22. *fig.* 2.

Il est de la taille du *Mœra*. Ses premières ailes sont entières. Leur dessus est fauve, ainsi que leur dessous, & rayé obliquement de noirâtre depuis le milieu jusqu'au bord terminal qui est lui-même noirâtre. Il y a en outre, vis-à-vis du sommet, un œil noir à prunelle blanche.

Les secondes ailes sont dentelées, fauves en dessus, avec une ligne discoidale, deux postérieures & le bord de ce nom noirâtres; sans compter un œil semblable à celui dont nous venons de parler, & placé près de l'angle de l'anus dans un cercle de la couleur des lignes.

Le dessous des mêmes ailes est d'un brun-obscur, avec un mélange alternatif de taches & de raies transverses d'un jaune plus ou moins foncé, indépendamment desquelles on voit deux yeux, dont un correspondant à celui de la surface opposée, l'autre appuyé sur le bord antérieur. Ces yeux sont noirs aussi, avec la prunelle blanche, l'iris jaune & bordé d'un cercle noirâtre.

De la Nouvelle-Hollande.

N. B. Il est des individus qui ont deux points blancs entre les taches oculaires du dessous des secondes ailes.

83. Satyre Sirius.

Satyrus Sirius.

Sat. alis integerrimis, obscurè rufis : supràque anticis ocellis duobus, posticis quatuor. Fab.

Papilio S. *Sirius.* Fab. *Syst. Entom. p.* 488. *n°.* 201. — *Spec. Inf. tom.* 2. *p.* 66. *n°.* 298. — *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 52. *n°.* 345. — *Entom. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 220. *n°.* 688.

Papilio Sirius. Donow. *Gen. Illust. of Entom. part.* 1. *an Epitome of the Inf. of New Holl. pl.* 28. *fig.* 3.

Il eſt approchant de la taille de l'*Hypéranthus*. Le deſſus des ailes ſupérieures eſt d'un roux-obſcur, avec l'extrémité brunâtre & marquée de deux yeux ferrugineux ayant la prunelle blanche, l'iris brun & entouré d'un anneau très-noir. Le deſſus des ailes inférieures eſt également d'un roux-obſcur, avec le bord terminal brun, coupé par des lignes plus foncées, & précédé de quatre yeux dont les intermédiaires plus grands.

Le deſſous des quatre ailes eſt d'un blanc-violâtre du côté de la baſe, avec deux arcs & une ligne tranſverſe ferrugineux; plus obſcur vers le bout, avec quatre yeux, dont les intermédiaires plus grands, aux ailes ſupérieures, & ſept, dont l'anal très-petit, aux ailes inférieures.

De la Nouvelle-Hollande.

(*Traduction de Fabricius.*)

84. Satyre Terminus.

Satyrus Terminus.

Sat. alis integris, fuſcis, areâ rufâ : ſuprà anticis ocello unico, poſticis quatuor. Fab.

Papilio S. *Terminus.* Fab. *Syſt. Entom. p.* 488. *n°.* 200. — *Spec. Inſ. tom.* 2. *p.* 66. *n°.* 297. — *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 52. *n°.* 344. — *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 220. *n°.* 687.

Papilio Terminus. Donow. *Gen. Illuſt. of Entom. part* 1. *an Epitome of. the Inſ. of New Holl. pl.* 28. *fig.* 4.

Il eſt à peu près de la taille de l'*Hypéranthus*. Ses quatre ailes ſont entières. Leur deſſus eſt d'un brun-obſcur, avec un eſpace fauve, plus large & plus vif ſur les ſupérieures. Celles-ci ont un œil noir à prunelle blanche. Les inférieures ont, dans un iris rouſſâtre, quatre yeux ſemblables, dont le quatrième peu prononcé.

Le deſſous de chaque aile eſt brun vers ſon origine; plus clair vers le bout, avec une ligne noirâtre, marginale & ondulée, que précèdent intérieurement ſur les ailes ſupérieures cinq yeux preſqu'effacés, & ſur les inférieures ſix yeux diſtincts, dont le deuxième, le troiſième & le ſixième plus grands. Les ſecondes ailes ont en outre, près de la baſe, une ligne tranſverſe très-obſcure.

De la Nouvelle-Hollande.

85. Satyre Rémulia.

Satyrus Remulia.

Sat. alis integris, ſuprà fuſcis, diſco fulvo : ſubtùs baſi rufeſcentibus, apice griſeis; poſticis ocellis ſex, 2°., 3°., 6°. minutis.

Papilio Remulia. Cram. *pl.* 237.

Il a près de deux pouces d'envergure. Ses ailes ſont entières, & d'un brun-obſcur en deſſus. Les ſupérieures ont ſur le milieu un eſpace fauve, grand, arrondi en dehors, couvrant tout le bord interne, excepté l'angle de ce nom, & offrant vers le milieu du bord terminal un œil noir à prunelle blanche. Les ailes inférieures ont, vis-à-vis du ſommet, une bande fauve, courbe en arrière, avec laquelle s'alignent trois yeux, dont l'anal beaucoup plus petit. Ces yeux ſont noirs, cerclés de fauve, & pourvus d'une prunelle blanche.

Le deſſous des quatre ailes a la moitié antérieure d'un brun-rouſſâtre & formant un triangle dont le côté externe eſt oblique; l'autre moitié blanchâtre, avec des yeux ſemblables à ceux que nous venons de citer. Les premières en ont de deux à quatre, dont le poſtérieur beaucoup plus grand. Les ſecondes ailes en ont ſix, dont le deuxième, le troiſième & le poſtérieur, très-petits. Il y a en outre, le long du bord poſtérieur de chaque aile, une double ligne ondulée d'un brun-noirâtre.

De l'île de Java.

Nota. Il eſt bien voiſin du *Terminus*.

86. Satyre Mæra.

Satyrus Mæra.

Sat. alis denticulatis, ſuprà fuſcis, faſciâ fulvâ : anticis utrinquè ocello bipupillato alteroque minuto : poſticis ſubtùs griſeis, ſtrigis duabus fuſcis, undutis, ocelliſque ſex iride duplici.

Papilio N. Mæva, *alis ſubdentatis, fuſcis : utrinquè primoribus ſeſquiocello; poſticis ocellis ſuprà tribus.* Linn. *Syſt. Nat.* 2. *p.* 771. *n°.* 141. — *Faun. Suec. edit.* 2. *p.* 275. *n°.* 1049.

Papilio Satyrus. Linn. *Faun. Suec. edit.* 1. *p.* 238. *n°.* 785.

Papilio S. Mæra, *alis dentatis, fuſcis : utrinquè anticis ſeſquiocello; poſticis ocellis ſuprà tribus, ſubtùs ſex.* Fab. *Syſt. Entom. p.* 491. *n°.* 211. — *Spec. Inſ. tom.* 2. *p.* 71. *n°.* 319. — *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 56. *n°.* 373. — *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 227. *n°.* 711.

Papilio Hiera. Fab. *Gen. Inſ. Mant. p.* 262. *n°.* 236-37.

Papilio Mæra. Esp. *Pap. part.* 1. *tab.* 6. *fig.* 2.

Papilio Mæræ. Var. Esp. *Pap. part.* 1. *tab.* 49. *Suppl.* 23. *fig.* 1.

Papilio Megæræ. Var. Esp. *Pap. part.* 1. *tab.* 68. *cont.* 18. *fig.* 1. 2.

Papilio Mæra. Fem. Esp. *Pap. part.* 1. *tab.* 68. *cont.* 18. *fig.* 3.

Papilio Megæra. Fem. Herbst, *Pap. tab.* 207. *fig.* 5. 6.

Papilio Mæra. Herbst, *Pap. tab.* 207. *fig.* 7. 8.

Papilio Mœra. Herbst, *Pap. tab.* 208. *fig.* 1. 2. (Var.)

Naturf. 8. *tab.* 3. *fig.* A. B.

Naturf. 10. *tab.* 2. *fig.* 8. 9.

Papilio Mœra. Wien. *Verz. p.* 166. *fam.* F. *n°.* 4.

Papilio Mœra. Illig. *N. Aufg. Deff. tom.* 2. *p.* 176. *n°.* 4.

Papilio Mœra. Illig. *Magaz. tom.* 3. *p.* 198.

Papilio Hiera. Illig. *Magaz. tom.* 3. *p.* 195.

Papilio Mœra. Schœff. *Icon. tab.* 58. *fig.* 2. 3.

Klemann, *Beytr. tab.* 45.

Papilio Mœra. Borkh. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 81, 82 & 239. *n°.* 20.

Borkh. *Rhein. Magaz. tom. p.* 237. 238.

Papilio Mœra. Scop. *Ent. Carn. p.* 154. *n°.* 431.

Rossi, *Mant. tom.* 2. *p.* 10. *n°.* 347.

Schneid. *Syſt. Beſchr. p.* 116. *n°.* 55.

Fuessl. *Suiſſ. Inſ. p.* 29. *n°.* 558.

Fuessl. *N. Magaz. tom.* 3. *p.* 149. *n°s.* 61 & 72. *p.* 163. *n°.* 182.

Muller, *Zool. Dan. p.* 114. *n°.* 1320.

Lang. *Verz.* 2. *p.* 18. *n°.* 101-103.

Schwarz, *Raup. Calend. p.* 616. 741.

Papilio Mœra. Hubn. *Pap. tab.* 39. *fig.* 174. 175.

Papilio Hiera. Hubn. *Pap. tab.* 39. *fig.* 176. (Var.)

Papilio Mœra. Ochsenh. *Pap. Eur. tom.* 1. *p.* 231. *n°.* 31.

Papilio Hiera. Ochsenh. *Pap. Eur. tom.* 4. *Suppl. p.* 135.

Papilio Adraſta. Ochsenh. *Pap. Eur. tom.* 4. *Suppl. p.* 137. *n°.* 32.

Man. Mœra. Schrank, *Faun. Boïc. tom.* 2. *p.* 172. *n°.* 1300.

Satyre. De Geer, *Hiſt. Inſ. tom.* 2. *part.* 2. *p.* 144. *tab.* 2. *fig.* 1. 2.

Le Satyre. Geoff. *Hiſt. Inſ. tom.* 2. *p.* 50. *n°.* 19.

Le Némuſien. Engram. *Pap. d'Europe, tom.* 1. *p.* 120. *pl.* 26. *fig.* 51. a. b.

L'Ariane. Engram. *Pap. d'Europe, tom.* 1. *p.* 305. *pl.* 82. 2e. *Suppl. pl.* 3. *fig.* 50. a. b. c. *bis.*

Il a approchant deux pouces d'envergure. Ses quatre ailes ſont foiblement denteés, d'un brun-obſcur en deſſus, avec les ſinus blanchâtres. Les premières ont, vers le bout, une bande fauve, tranſverſale, plus ou moins coupée par les nervures, ſinuée ſur le côté interne, rétrécie à ſa partie inférieure, & chargée à ſa partie ſupérieure de deux yeux noirs, dont l'extérieur très-petit, l'autre grand & pourvu le plus ſouvent d'une double prunelle blanche. Le milieu de la ſurface de ces ailes eſt en outre fauve, avec une raie noirâtre, large & oblique dans les mâles, étroite & en zig-zag dans les femelles. Les ſecondes ailes ont une bande fauve, courbe & maculaire, ſur laquelle il y a de trois à quatre yeux, dont deux, le ſecond & le troiſième, à partir d'en haut, plus grands.

Le deſſous des ailes ſupérieures ne diffère du deſſus que parce qu'il eſt généralement plus pâle.

Le deſſous des ailes inférieures eſt gris, avec deux lignes brunes, tranſverſes, ondulées, parallèles & preſque diſcoïdales; à la ſuite deſquelles vient une rangée courbe de ſix yeux noirs, dont l'antérieur, le quatrième & le cinquième plus gros, l'anal double. Ces yeux ont tous une prunelle blanche & deux iris jaunâtres, entourés chacun d'un cercle noirâtre. Il y a en outre une ligne ondulée de cette couleur le long du bord terminal de chaque aile. Le corps eſt brun en deſſus, gris en deſſous. Les antennes ſont annelées de blanc & de noir.

Ce ſatyre eſt très-commun en Europe. Les individus des parties chaudes de ce continent ont le fauve du diſque des premières ailes moins prononcé ou preſque nul, & le gris du deſſous des ſecondes ailes d'un ton plus rembruni; ce qui a porté quelques auteurs à en faire une eſpèce diſtincte ſous le nom d'*Hiera.*

Les individus des parties froides ont, au contraire, preſque tous le deſſus des ailes rouſſâtre, ſans néanmoins différer en deſſous. M. Ochſenheimer a fait de ces derniers une nouvelle eſpèce ſous le nom d'*Adraſta;* mais ce n'eſt pour nous qu'une variété auſſi bien que l'*Hiera.*

Eſper donne une autre variété dans laquelle le noir des taches oculaires eſt tellement oblitéré qu'on ne voit que des points blancs ſur la bande fauve.

La chenille eſt pubeſcente ou légèrement velue, d'un vert-tendre, avec l'anus terminé en pointe bifide. Elle mange pluſieurs ſortes de *graminées*, entr'autres le *paturin annuel* (*poa annua*), la *fétuque flottante* (*feſtuca fluitans*).

La chryſalide eſt verdâtre ou noirâtre, ſuivant l'âge, avec deux rangs parallèles de points blancs tuberculeux ſur la partie poſtérieure du dos, & une tache noire à la ſommité du corſelet. Elle eſt ſuſpendue par la queue. Le papillon paroît pour la première fois en mai, & pour la ſeconde en juillet & août. Il ſe repoſe ſur les murs, ſur les tas de pierres, &c.

87. Satyre Mégère.

Satyrus Megœra.

Sat. alis denticulatis, suprà fulvis, fusco striatis : anticis utrinquè sesquiocello : posticis subtùs cinereis, strigis duabus fuscis, undatis, flavescenti inductis, ocellisque sex iride duplici.

Papilio N. Megœra, *alis subdentatis, luteis, fusco fasciatis : utrinquè primoribus sesquiocello; posticis suprà quinis.* Linn. *Syst. Nat.* 2. *p.* 771. *n°.* 142.

Papilio N. Mægera, *alis dentatis, luteis, fusco fasciatis : anticis ocello ; posticis suprà quinis, subtùs sex.* Fab. *Syst. Entom. p.* 492. *n°.* 215. — *Spec. Inst. tom.* 2. *p.* 73. *n°.* 324. — *Mant. Inst. tom.* 2. *p.* 36. *n°.* 380. — *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 94. *n°.* 292.

Papilio Megœra. Esp. *Pap. part.* 1. *tab.* 6. *fig.* 3.

Papilio Megœra. Esp. *Pap. part.* 1. *tab.* 68. *cont.* 18. *fig.* 4. (Mas.)

Esp. *Pap. part.* 1. *tab.* 94. *cont.* 49. *fig.* 6-8. (La chenille & la chrysalide.)

Papilio Megœra. Herbst, *Pap. tab.* 207. *fig.* 3. 4.

Papilio Megœra. Wien. *Verz. p.* 166. *fam.* F. *n°.* 3.

Papilio Megœra. Illig. *N. Aufg. Dess. tom.* 2. *p.* 175. *n°.* 3.

Papilio Megœra. Illig. *Magaz. tom.* 3. *p.* 198.

Papilio Megœra. Schœff. *Icon. tab.* 148. *fig.* 3. 4.

Papilio Megœra. Borkh. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 79 & 237. *n°.* 18.

Borkh. *Rhein. Magaz. tom.* 1. *p.* 236. *n°.* 16.

Papilio Megœra. Rossi, *Faun. Etr. tom.* 2. *p.* 146. *n°.* 1002.

Schneid. *Syst. Beschr. p.* 114. *n°.* 54.

Fuessl. *Suiss. Inst. p.* 29. *n°.* 559.

Muller, *Zool. Dan. p.* 114. *n°.* 1321.

Lang. *Verz.* 2. *p.* 18. *n°.* 97-100.

Schwarz, *Raup. Calend. p.* 40. 342.

Bergstr. *Nomencl. tab.* 72. *fig.* 1-6.

Sepp. *Nieder. Inst. part.* 2. *tab.* 2. 3.

Lewin, *Inst. tab.* 21. *fig.* 1-5.

Papilio Megœra. Hubn. *Pap. tab.* 39. *fig.* 177. 178. (Mas.)

Papilio Megœra. Ochsenh. *Pap. Eur. tom.* 1. *p.* 235. *n°.* 32.

Man. Megœra. Schrank, *Faun. Boïc. tom.* 2. *p.* 171. *n°.* 1299.

Le Satyre. Geoffr. *Hist. Inst. tom.* 2. *p.* 50. *n°.* 19.

Le Satyre. Engram. *Pap. d'Europe, tom.* 1. *p.* 118. *pl.* 26. *fig.* 50. a. b. c. d. (e. f. Var.)

Le Satyre. Engram. *Pap. d'Europe, tom.* 1. *p.* 261. *pl.* 65. *Suppl.* 11. *fig.* 50. g. h.

Engram. *Pap. d'Europe, tom.* 1. *p.* 322. 3e. *Suppl. pl.* 4. *fig.* 50. l. (La chrysalide.)

Geoffroy l'a confondu avec le *Mœra*, dont il est en effet très-voisin.

Les quatre ailes sont foiblement dentées, fauves en dessus, avec les nervures, le bord terminal, & trois lignes ondulées, dont l'intérieure plus courte, noirâtres. Les premières ailes ont, vis-à-vis du sommet, un œil noir à prunelle blanche, lequel est précédé en dehors, notamment en dessous, d'un autre œil beaucoup plus petit & pupillé de même. Dans le mâle, les trois lignes transverses du milieu de ces ailes sont coupées obliquement par une bande noirâtre un peu finuée. Les secondes ailes ont la base plus ou moins obscure, suivant le sexe, & leur extrémité offre une rangée courbe de trois à cinq yeux noirs, dont la prunelle est d'un blanc-bleuâtre.

Le dessous des ailes supérieures ressemble au dessus, mais il est plus pâle.

Le dessous des ailes inférieures est d'un gris piqué de noirâtre, avec deux lignes brunes, transverses, ondulées, parallèles, & ayant sur un de leurs côtés une petite éclaircie jaunâtre, caractère constant qui n'existe ni dans le *Mœra*, ni dans ses variétés. Entre ces lignes & le bord postérieur est une rangée courbe de six yeux noirs, dont le troisième, le quatrième & le cinquième un peu plus gros, l'anal double. Ces yeux ont une prunelle blanche, & deux iris jaunâtres, entourés chacun d'un cercle obscur. Le corps & les antennes sont comme dans le *Mœra*.

La chenille est pubescente, d'un vert-tendre, avec une ligne blanche le long de chaque côté. Son corps est terminé par une pointe bifide. Elle vit sur plusieurs *graminées* & se métamorphose vers la mi-avril.

La chrysalide, quoi qu'en dise Hubner, est comme celle du *Mœra*. On la trouve suspendue par la queue au pied des arbres & contre les murs des jardins. Le papillon en sort au commencement de mai. Il donne ensuite une seconde fois dans le cours de l'été. Ses mœurs sont les mêmes que celles du *Mœra*. Il est très-commun aux environs de Paris & dans beaucoup de parties de la France; mais il paroit qu'il est assez rare dans certaines contrées de l'Allemagne. Fabricius, qui en connoissoit la chenille, l'a rangé parmi les Nymphales, tandis qu'il a mis dans les Satyres le *Mœra*

dont il connoiſſoit auſſi la chenille. Il arrive ſouvent à cet auteur d'éloigner plus ou moins l'une de l'autre deux eſpèces preſque ſemblables, pour avoir moins de peine à faire ſes phraſes ſpécifiques.

38. Satyre Roxelane.

Satyrus Roxelana.

Sat. alis dentatis, ſuprà dilutè fuſcis : anticis utrinquè diſco fulvo, nervis diviſo : poſticis ſubtùs griſeis, ſtrigis quinque fuſcis ocelliſque ſeptem iride ſimplici.

Papilio S. Roxelana, *alis dentatis, fuſcis, ſuprà cœcis : poſticis ſubtùs undatis, ocellis ſeptem, interiori pupillâ geminâ.* Fab. *Spec. Inſ. tom.* 2. *p.* 72. *n°.* 320. — *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 36. *n°.* 374. — *Ent. Syſt. entom. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 227. *n°.* 712.

Papilio Roxelana. Cram. *pl.* 161. *fig.* C. D. (Le mâle.) *fig.* E. F. (La femelle.)

Papilio Roxelanus. Herbst, *Pap. tab.* 222. *fig.* 3. 4. (Le mâle.) *fig.* 5. 6. (La femelle.)

Papilio Roxelana. Ochsen. *Pap. Eur. tom.* 1. *p.* 217.

Il a le port du *Mæra ;* mais il eſt d'environ un tiers plus grand. Le deſſus des quatre ailes eſt d'un brun foiblement obſcur, avec le milieu des ſupérieures fauve & diviſé par des nervures de la couleur du fond de l'aile. Dans les individus femelles, le ſommet offre en outre quatre taches jaunâtres, dont la plus intérieure en forme de bande tranſverſe, les trois autres orbiculaires, diſpoſées ſur une ligne courbe dont le milieu eſt marqué d'un gros point noirâtre. Les ailes inférieures ont, entre le milieu & le bout, une rangée de trois à cinq yeux noirs à iris rouſſâtre & à prunelle blanchâtre.

Le deſſous des premières ailes ne diffère du deſſus que parce que la côte eſt coupée tranſverſalement par trois ou quatre lignes obſcures en zig-zag, & parce que le gros point noirâtre placé ſur la ligne courbe de taches jaunâtres forme un œil bien caractériſé.

Le deſſous des ailes inférieures eſt d'un griſ-obſcur dans le mâle, d'un gris plus clair dans la femelle, avec trois lignes brunes, très-flexueuſes, à la ſuite deſquelles vient une rangée de ſept yeux, dont le troiſième & le quatrième plus petits, l'anal pourvu d'une double prunelle. Ces yeux reſſemblent à ceux de la ſurface oppoſée, mais ils ſont plus vifs, & ſéparés du bord par une double ligne brune en feſton. Le corps eſt de la couleur des ailes. Les antennes ſont brunes, annelées de blanc, avec la maſſue noire & terminée de fauve.

On le trouve aux environs de Conſtantinople, dans les îles de l'Archipel, &c. M. de Darville, lieutenant de la marine royale, l'a pris communément près d'Athènes.

89. Satyre Égérie.

Satyrus Ægeria.

Sat. alis denticulatis, fuſcis : anticis utrinquè maculis plurimis ochreaceis aut fulvis ocelloque unico : poſticis ſubtùs virescenti-griſeis, ſtrigis duabus fuſcis, undatis, ſerieque punctorum ocellatorum.

Papilio N Ægeria, *alis dentatis, fuſcis, luteo maculatis : utrinquè primoribus ocello ; poſticis ſuprà tribus.* Linn. *Syſt. Nat.* 2. *p.* 771. *n°.* 143.

Papilio N. Ægeria, *alis dentatis, fuſcis, luteo maculatis : anticis utrinquè ocello ; poſticis ſuprà ocellis, ſubtùs punctis quatuor.* Fab. *Syſt. Entom. p.* 492. *n°.* 214. — *Spec. Inſ. tom.* 2. *p.* 73. *n°.* 325. — *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 37. *n°.* 381. — *Entom. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 94. *n°.* 293.

Papilio Ægeria. Esp. *Pap. part.* 1. *tab.* 7. *fig.* 1.

Papilio Meone. Esp. *Pap. part.* 1. *tab.* 95. *cont.* 50. *fig.* 1.

Papilio Ægeria. Herbst, *Pap. tab.* 217. *fig.* 3. 4.

Papilio Meone. Herbst, *Pap. tab.* 191. *fig.* 7. 8.

Papilio Ægeria. Hubn. *Pap. tab.* 40. *fig.* 181. 182.

Papilio Meone. Hubn. *Pap. tab.* 40. *fig.* 179. 180.

Papilio Ægeria. Illig. *N. Auſg. Deſſ. tom.* 2. *p.* 175. *n°.* 2.

Illig. *Magaz. tom.* 3. *p.* 184.

Papilio Meone. Illig. *Magaz. tom.* 1. *p.* 450. — *tom.* 3. *p.* 198. — *tom.* 4. *p.* 28.

Papilio Ægeria. Ochsenh. *Pap. Eur. tom.* 1. *p.* 238. *n°.* 33.

Papilio Meone. Ochsenh. *Pap. Eur. tom.* 1. *p.* 240. *n°.* 34.

Papilio Meone. Cram. *Pap. pl.* 314. *fig.* E. F.

Papilio Ægeria. Wien. *Verz. p.* 166. *fam.* F. *n°.* 2.

Papilio Ægeria. Scop. *Ent. Carn. p.* 156. *n°.* 432.

Rossi, *Faun. Etr. tom.* 2. *p.* 146. *n°.* 1003.

Panz. *Faun. Germ.* 28-21.

Schœff. *Icon. tab.* 75. *fig.* 1. 2.

Sepp. *Niederl. Inſ. tom.* 1. *tab.* 6. *fig.* 1-7.

Roes. *nſ.* 4. *tab.* 33. *fig.* 3. 4.

Klemann, *Beytr. tab.* 19. *fig.* A. B. (La chenille & la chryſalide.)

Papilio Ægeria. Bergst. *Nomencl. tab.* 22. *fig.* 1-7.

Papilio Ægeria. Borkh. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 78 & 236. *n°.* 17.

Borkh. *Rhein. Magaz. tom.* 1. *p.* 236. *n°.* 15.

Schneid. *Syst. Beschr. p.* 118. *n°.* 57.

Fuessl. *Saiff. Inf. p.* 29. *n°.* 560.

Bradm. *Inf. Calend. p.* 215. *n°.* 111.

Lang. *Verz.* 2. *p.* 17. *n°.* 95-96.

Schwarz, *Raup. Calend. p.* 485. 616. 748.

Man. Ægeria. Schrank, *Faun. Boïc. tom.* 2. *p.* 171. *n°.* 1298.

Reaum. *Mem. Inf. tom.* 1. *tab.* 27. *fig.* 16. 17.

Tircis. Geoffr. *Hist. Inf. tom.* 2. *p.* 48. *n°.* 16.

Le Tircis. Engram. *Pap. d'Europe, tom.* 1. *p.* 117. *pl.* 25. *fig.* 49. a-d.

Le Tircis. Engram. *Pap. d'Europe, tom.* 1. *p.* 261. *pl.* 65. *Suppl.* 11. *fig.* 49. c.

Sous le nom d'*Égérie* nous réuniſſons l'*Ægeria* & le *Meone* des auteurs, parce qu'ils ne ſe diſtinguent l'un de l'autre que par plus ou moins d'intenſité dans la couleur jaune des taches de leurs ailes.

Il a entre un pouce & demi & deux pouces d'envergure. Les quatre ailes ſont dentées, notamment les inférieures, d'un brun-obſcur en deſſus, avec des taches d'un jaune d'ocre comme dans l'*Ægeria*, ou fauves comme dans le *Meone*. Les ailes ſupérieures en ont une douzaine, ſavoir: trois ſur la côte, cinq ſur le diſque, une ſur le milieu du bord terminal, &, vis-à-vis du ſommet, trois, dont l'intermédiaire marquée d'un œil noir à prunelle blanche. Les ailes inférieures en ont deux, un peu échancrées intérieurement; l'une occupe le milieu du bord d'en haut, l'autre l'extrémité poſtérieure de la cellule diſcoïdale. Entre ces taches & le bord de derrière, on en voit quatre autres, contiguës, dont les trois inférieures chargées chacune d'un œil noir à prunelle blanche, & la ſupérieure d'un point noir très-petit.

Le deſſous des premières ailes reſſemble au deſſus, ſeulement le fond & les taches ſont un peu plus pâles.

Le deſſous des ſecondes ailes eſt d'un gris-verdâtre, légèrement chatoyant, avec deux lignes brunes, tranſverſes, ondulées, à la ſuite deſquelles viennent deux taches jaunâtres, puis une rangée courbe de cinq à ſix points blanchâtres, entourés de brun, & correſpondant aux taches oculaires du deſſus. Le bord poſtérieur eſt d'une teinte violâtre luiſante, & ſes échancrures ſont blanches, ainſi que celles du bord analogue des ailes de devant. Les deux ſurfaces du corps ſont du même ton que celles des ailes. Les antennes ſont annelées de noir & de blanc, avec l'extrémité de la maſſue fauve.

La chenille eſt d'un vert-mat, avec des lignes longitudinales, les unes d'un vert-foncé, les autres blanches, & de petits poils de cette dernière couleur. Elle vit ſur le *triticum repens* (le *chiendent*) & ſur pluſieurs autres *graminées*.

La chryſalide eſt anguleuſe, tantôt d'un vert-pâle, tantôt d'un vert-noirâtre. Elle paſſe l'hiver, & le papillon en ſort vers la fin d'avril ou au commencement de mai. Il donne une ſeconde fois en juillet & en août. On le trouve communément dans les bois & dans les prairies. Les individus des contrées froides ou tempérées de l'Europe ont les taches d'un jaune d'ocre plus ou moins foncé; ceux des parties chaudes de ce continent & de la côte de Barbarie les ont fauves.

90. Satyre Xiphia.

Satyrus Xiphia.

Sat. alis denticulatis, fuſcis: anticis utrinquè maculis plurimis fulvis ocelloque unico: poſticis ſubtùs ruſeſcenti-griſeis, faſciâ coſtali albâ, tranſverſâ, ſerieque punctorum ocellatorum.

Papilio N. Xiphia, *alis dentatis, fuſcis, flavo maculatis: utrinquè anticis ocello, poſticis ſuprà tribus, ſubtùs quatuor.* Fab. *Syſt. Ent. p.* 492. *n°.* 215. — *Spec. Inf. tom.* 2. *p.* 74. *n°.* 326. — *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 37. *n°.* 382. — *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 95. *n°.* 294.

Il ne diffère du précédent que parce que ſes taches ſont conſtamment fauves; que le deſſous des ſecondes ailes eſt rouſſâtre, au lieu d'être verdâtre, & a ſur le milieu du bord d'en haut une bande blanche, tranſverſe, courte, étroite, un peu dilatée à ſon origine, & terminée par un petit crochet dont la pointe regarde le bord interne. Dans quelques individus, les deux taches fauves, qui correſpondent à cette bande ſur la ſurface oppoſée, ſont liées entr'elles par un trait de leur couleur.

On le trouve dans les îles de Madère & de Ténériffe. Peut-être n'eſt-il qu'une variété de l'*Égérie*, plus modifiée encore par le climat que le *Meone*.

91. Satyre Galathée.

Satyrus Galathea.

Sat. alis denticulatis, flaveſcenti-albis, baſi ſuprà apiceque nigris, albo maculatis: maculâ baſeos ſubovatâ; poſticis ocellis duobus tribuſque nigris, ſuprà nullis aut obſoletis.

Papilio N. Galathea, *alis dentatis, albo nigroque variis: ſubtùs anterioribus ocello unico,*

posterioribus quinque obsoletis. Linn. *Syst. Nat.* 2. *p.* 772. *n°.* 147.

Papilio S. Galathea, *alis dentatis, albo nigroque variis : subtùs anticis ocello unico, posticis quinque.* Fab. *Syst. Entom. p.* 496. *n°.* 250. — *Spec. Inst. tom.* 2. *p.* 79. *n°.* 349. — *Mant. Inst. tom.* 2. *p.* 45. *n°.* 420. — *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 259. *n°.* 745.

Papilio Galathea. Esp. *Pap. part.* 1. *tab.* 7. *fig.* 3.

Papilio Galathea mas, var. Esp. *Pap. part.* 1. *tab.* 111. *cont.* 66. *fig.* 4.

Papilio N. G. Galaxaera, *alis subdentatis, nigris, concoloribus, maculis pallidis ; inferioribus ocellis tribus binisque distantibus anguli externi.* Esp. *Pap. part.* 1. *p.* 97. *tab.* 111. *cont.* 66. *fig.* 5. (Var.)

Papilio N. G. Leucomelas, *alis subdentatis, albo nigroque variis : inferioribus subtùs pallidè maculatis, absque ocellis.* Esp. *Pap. part.* 1. *p.* 141. *tab.* 81. *cont.* 31. *fig.* 1. 2. (Var.)

Papilio Galathea. Herbst, *Pap. tab.* 183. *fig.* 3. 4.

Papilio Procida. Herbst, *Pap. tab.* 183. *fig.* 5. 6. (Var.)

Papilio Galathea. Wien. *Verz. p.* 166. *fam.* F. *n°.* 1.

Papilio Galathea. Illig. *N. Aufg. Deff. tom.* 2. *p.* 173. *n°.* 1.

Illig. *Magaz. tom.* 3. *p.* 194. — *tom.* 4. *p.* 26.

Papilio Procida. Illig. *Magaz. tom.* 1. *p.* 450. — *tom.* 4. *p.* 27. (Var.)

Papilio Leucomelas. Illig. *Magaz. tom.* 1. *p.* 450. — *tom.* 3. *p.* 197. — *tom.* 4. *p.* 26. 27. (Var.)

Schœff. *Icon. tab.* 98. *fig.* 7-9.

Roes. *Inst.* 3. *tab.* 37. *fig.* 1. 2.

Roes. *Inst.* 3. *tab.* 79. *fig.* 6. (La chenille.)

Papilio Galathea. Borkh. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 105 & 245. *n°.* 48. — *part.* 2. *p.* 210.

Papilio Galathea. Borkh. *Rhein. Magaz. tom.* 1. *p.* 235. *n°.* 14.

Papilio Galathea. Schneid. *Syst. Beschr. p.* 84. *n°.* 27.

Papilio Leucomelas. Schneid. *Syst. Beschr. p.* 80. *n°.* 26. (Var.)

Papilio Galathea. Hufnag. *Magaz. tom.* 2. *p.* 70. *n°.* 25.

Bergstr. *Nomencl. tab.* 16. *fig.* 1. 2. — *tab.* 92. *fig.* 1-6.

Panz. *Faun. Germ.* 28. 24.

Lewin. *Inst. tab.* 28. *fig.* 1-4.

Lang. *Verz.* 2. *p.* 17. *n°.* 89-92.

Schwarz, *Raup. Calend. p.* 154.

Papilio Galathea. Scop. *Ent. Carn. p.* 151. *n°.* 427.

Rossi, *Faun. Etr. tom.* 2. *p.* 148. *n°.* 1009.

Fuessl. *Suiss. Inst. p.* 29. *n°.* 562.

Fuessl. *Alt. Magaz. tom.* 1. *p.* 250. *tab.* 2. *fig.* 3. (La chrysalide.)

Naturf. 14. *tab.* 2. *fig.* 7. (La chenille.) *fig.* 2. 3. (La chrysalide.)

Papilio Liriope. Cyrill. *Ent. Neap. Specim.* 1. *tab.* 12. *fig.* 8. (Var.)

Papilio Galathea. Hubn. *Pap. tab.* 41. *fig.* 185. 185.

Papilio Leucomelas. Hubn. *Pap. tab.* 102. *fig.* 517. 518. (Var.)

Papilio Galathea. Ochsenh. *Pap. Eur. tom.* 1. *p.* 242. *n°.* 35.

Man. Galathea. Schrank, *Faun. Boïc. tom.* 2. *p.* 170. *n°.* 1297.

Le Demi-Deuil. Geoffr. *Hist. Inst. tom.* 2. *p.* 74. *n°.* 46. *pl.* 11. *fig.* 3. 4.

Le Demi-Deuil. Engram. *Pap. d'Europe, tom.* 1. *p.* 134. *pl.* 30. *fig.* 60. a-d.

Engram. *Pap. d'Europe, tom.* 1. *p.* 324. 3e. *Suppl. pl.* 5. *fig.* 60. g. (Var.)

Il a environ deux pouces d'envergure. Ses quatre ailes sont légèrement dentées. Leur dessus est varié de noir & de blanc-jaunâtre, de telle manière que ces deux couleurs y dominent à peu près autant l'une que l'autre. En effet la base est noire, avec une tache blanche, grande & presqu'ovale ; le milieu blanc, avec de fines nervures noirâtres ; l'extrémité noire, avec des taches marginales & la frange des échancrures blanches. Les taches marginales sont triangulaires sur les ailes inférieures, & en forme de points sur les supérieures. Celles-ci ont environ les trois quarts antérieurs de la côte jaunâtre, & leur sommet offre, entre les taches du milieu & celles du bord, quatre autres taches blanches, sur la plus longue desquelles est un œil noir sans prunelle. Les secondes ailes n'ont pas d'yeux vers le bout, ou bien elles en ont tantôt trois, tantôt cinq peu prononcés.

Le dessous des premières ailes diffère du dessus en ce que les taches du bout sont triangulaires & plus grandes ; en ce que dans la femelle elles sont lavées de jaune-pâle, couleur qui s'étend sur toute

la côte & autour du petit œil, lequel eſt marqué ici d'un point bleuâtre pupillaire.

Le deſſous des ſecondes ailes eſt blanc dans le mâle, avec les nervures noires. Entre la baſe & le diſque, eſt une bande obſcure, tranſverſe, irrégulière, fortement étranglée dans ſon milieu, atteignant la côte ainſi que le bord interne. Le long du bord terminal ſont deux lignes noires, dont l'intérieure en feſton, & précédée en dedans de cinq petits yeux noirs, dont l'anal double, les deux antérieurs ſéparés des autres & groupés contre le bord d'en haut. Ces yeux ont une prunelle bleuâtre, & un iris jaunâtre qu'entoure un cercle d'atomes noirâtres. Dans la femelle le deſſous des mêmes ailes préſente des caractères ſemblables; mais il eſt lavé de jaune-fale, particulièrement ſur la bande tranſverſe & ſur les taches oculaires. Le corps eſt noir en deſſus, griſâtre en deſſous. Les antennes ſont annelées de blanc & de noir, avec la maſſue ferrugineuſe.

Eſper a figuré deux variétés priſes aux environs de Carlſtad en Croatie.

La première, *tab.* 111, *fig.* 4, a plus de noir que les individus ordinaires, attendu que les taches blanches marginales manquent aux quatre ailes en deſſus, & aux ſupérieures en deſſous.

La ſeconde, que cet auteur appelle *Galaxaeni*, a la tache de la baſe de chaque aile plus petite, & le ſommet des inférieures nu; ce qui la rend plus noire en deſſus.

La variété, que pluſieurs entomologiſtes ont donnée ſous le nom de *Leucomelas*, a le deſſous des ſecondes ailes tout blanc. On y voit ſeulement une légère empreinte des parties noires de la ſurface oppoſée.

La chenille eſt verte ou jaunâtre, avec trois lignes longitudinales plus obſcures, ſavoir : une ſur le dos & une ſur chacun des côtés. Sa tête eſt d'un brun-rougeâtre, & ſon corps ſe termine par une pointe bifide, ſur laquelle ſont deux petites épines rouges. On la trouve en mai ſur le *phleum pratenſe* (*la fléole des prés*), gramen auquel les Anglais donnent le nom de *timothy*.

La chryſalide eſt ovoïde, jaunâtre, avec deux taches noires, oculaires, ſur chaque côté de la tête. Le papillon paroît en juillet & en août dans les bois des parties tempérées de l'Europe. Il eſt très-commun aux environs de Paris.

92. Satyre Lachéſis.

Satyrus Lacheſis.

Sat. alis denticulatis, albis, baſi ſuprà immaculatâ, apice nigro maculis albis; poſticis ocellis duobus tribuſque nigris, utrinquè conſpicuis.

Papilio Arge Nemauſiaca. Esp. *Pap. part.* 1. *tab.* 96. *cont.* 51. *fig.* 1. 2.

Illig. *Magaz. tom.* 3. *p.* 196. — *tom.* 4. *p.* 272.

Papilio Lacheſis. Herbst, *Pap. tab.* 13[illegible]. *fig.* 2.

Papilio Lacheſis. Hubn. *Pap. tab.* 41. *fig.* 186. 187. (Le mâle.)

Papilio Lacheſis. Hubn. *Pap. tab.* 42. *fig.* 188. 189. (La femelle.)

Papilio Lacheſis. Hubn. *Beytr. tom.* 2. *taf.* 3. *fig.* P. 1. 2.

Papilio Lacheſis. Ochsenh. *Pap. Eur. tom.* 1. *p.* 247. *n°.* 36.

Le deſſous des deux ſexes eſt, à une légère nuance près, comme dans le *Galathée*.

Mais le deſſus, au lieu d'être noir à la baſe des ailes, avec une tache blanche ovale, eſt blanc, avec l'origine du bord interne un peu obſcure; & l'extrémité des ſecondes ailes offre conſtamment quatre à cinq yeux ſemblables à ceux du deſſous, ou pareil nombre de points bleuâtres.

De l'Eſpagne, du Portugal & du département des Pyrénées-Orientales. M. Duponchel l'a pris en juin dans les environs de Perpignan.

Nota. Engramelle n'a point connu cette eſpèce.

93. Satyre Argé.

Satyrus Arge.

Sat. alis denticulatis, flaveſcenti-albis, baſi ſuprà nigris maculâ albâ ſubovatâ: poſticis utrinquè ad apicem ocellis binis tribuſque lineâque angulatâ nigris.

Papilio S. Arge, *alis dentatis, albis, nigro ſtrigoſis: anticis ocello unico, poſticis quinque.* Fab. *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 43. *n°.* 422. — *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 239. *n°.* 746.

Papilio Arge Ruſſiæ. Esp. *Pap. part.* 1. *tab.* 84. *cont.* 34. *fig.* 1. 2.

Papilio Japygia, *alis dentatis, albido-luteſcentibus, nigro maculatis, maculis ſuprà marginalibus rotundatis albido-luteſcentibus: ſuperioribus utrinquè ocello unico, inferioribus duobus tribuſque diſtantibus.* Esp. *Pap. part.* 1. *p.* 66. *tab.* 105. *cont.* 60. *fig.* 3. (Le mâle.)

Papilio Japygia. Esp. *Pap. part.* 1. *tab.* 111. *cont.* 66. *fig.* 3. (La femelle.)

Papilio Japygia. Cyrill. *Ent. Neap. Specim.* 1. *tab.* 3. *fig.* 5.

Papilio Arge Ruſſiæ. De Prunner, *Lepid. pedem. p.* 70. *n°.* 136.

Papilio Arge Ruſſiæ. Borkh. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 107. *n°.* 51. — *part.* 2. *p.* 211.

Papilio Suwarovius. Herbst, *Pap. tab.* 182. *fig.* 5-7.

Papilio Clotho. Hubn. *Pap. tab.* 42. *fig.* 190. 191. (La femelle.)

Papilio Atropos. Hubn. *Pap. tab.* 43. *fig.* 192. 193. (Le mâle.)

Papilio Clotho. Illig. *Magaz. tom.* 3. *p.* 190.

Papilio Atropos. Illig. *Magaz. tom.* 3. *p.* 187.

Papilio Clotho. Schneid. *Syſt. Beſchr. p.* 86.

Papilio Clotho. Ochsenh. *Pap. Eur. tom.* 1. *p.* 248. *n°.* 37.

L'Eclair. Engram. *Pap. d'Europe, tom.* 1. *p.* 325. *pl.* 5. 3^e. *Suppl. fig.* 61. a. b. *bis.*

Il a près de deux pouces & demi d'envergure. Ses ailes ſupérieures ſe rapprochent infiniment des ailes correſpondantes du *Galathée*, mais les inférieures offrent des différences aſſez notables.

Les différences du deſſus conſiſtent en ce que la tache blanche de la baſe eſt accompagnée dans le *mâle* de deux taches extérieures plus petites, également blanches; en ce que l'extrémité eſt toujours de cette dernière couleur, avec cinq yeux bien diſtincts comme du côté oppoſé, puis deux lignes noires dont l'intérieure en feſton.

Les différences du deſſous portent ſur ce que la bande un peu obſcure n'a pas le milieu étranglé, & ſur ce que la couleur du fond eſt la même dans la femelle que dans le mâle, c'eſt-à-dire, d'un blanc légèrement jaunâtre.

Il habite le Piémont, la Calabre, la Hongrie & les parties les plus méridionales de la Ruſſie.

94. Satyre Amphitrite (1).

Satyrus Amphitrite.

Sat. alis denticulatis, albis, baſi ſuprà immaculatâ, apice nigro maculis albis; poſticis ocellis duobus tribuſque ſuprà nigris, ſubtùs rufis.

Papilio Argе. Esp. *Pap. part.* 1. *tab.* 27. *Suppl.* 3. *fig.* 1.

Papilio Argе. Esp. *Pap. part.* 1. *tab.* 70. *cont.* 20. *fig.* 1.

Papilio Argе, mas. Esp. *Pap. part.* 1. *tab.* 111. *cont.* 66. *fig.* 2.

Papilio Argе. Herbst, *Pap. tab.* 182. *fig.* 3. 4.

Papilio Argе. Sulz. *Inſ. edit.* Roem. *p.* 144. *tab.* 16. *fig.* 8. 9.

Papilio Argе. Fuessl. *Alt. Magaz. tom.* 1. *p.* 202.

Papilio Argе. Cyrill. *Ent. Neap. Specim.* 1. *tab.* 4. *fig.* 6.

Papilio Argе. Petagna, *Specim. Inſ. p.* 36. *tab. adjec. fig.* 25.

Papilio Argе. Bergstr. *Nomencl. tab.* 92. *fig.* 8. 9.

Papilio Argе. Schneid. *Syſt. Beſchr. p.* 85. *n°.* 28.

Papilio Argе. Ochsenh. *Pap. Eur. tom.* 1. *p.* 251. *n°.* 38.

Papilio Argе ſicula. Borkh. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 107 & 245. *n°.* 50.

Papilio Thetis. Hubn. *Pap. tab.* 43. *fig.* 196. 197. (Le mâle.)

Papilio Amphitrite. Hubn. *Pap. tab.* 43. *fig.* 194. 195. (La femelle.)

Papilio Amphitrite. Illig. *Magaz. tom.* 3. *p.* 205.

Le Demi-Deuil aux yeux bleus. Engram. *Pap. d'Europe, tom.* 1. *p.* 136. *pl.* 30. *fig.* 61. a. b.

Il eſt de la taille du *Galathée*. Ses ailes ſont blanches & légèrement dentées. Leur deſſus, dont l'origine eſt ſeulement un peu obſcure, a l'extrémité noire, avec des taches blanches comme dans les eſpèces précédentes, & en outre une ligne marginale également blanche, mais plus prononcée dans la femelle que dans le mâle. Avant les taches, les ſecondes ailes ont une bande interrompue de cinq yeux noirs à prunelle bleue. Les premières ailes ont deux yeux ſemblables vis-à-vis du ſommet, & une tache ou raie noire oblique entre la naiſſance & le milieu de la côte.

En deſſous, où les nervures ſont noires, on retrouve tous les caractères que nous venons d'indiquer; mais les yeux ſont d'un roux-vif, avec un iris jaunâtre qu'entoure un cercle noir, & les ſecondes ailes ont vers la baſe deux lignes noires, tranſverſales, dont l'extérieure double, & ſenſible en deſſous dans les mâles.

Il habite la Sicile, la Calabre, l'Eſpagne & le Portugal. — Engramelle ſe trompe en diſant qu'il ſe trouve en Allemagne.

95. Satyre Pſyché.

Satyrus Pſyche.

Sat. alis denticulatis, albis, baſi ſuprà immaculatâ, apice nigro maculis albis & ocellis nigris: poſticis ſubtùs venis, ocelliſque duobus & tribus, brunneis.

Papilio Syllius, *alis albis, apice nigro maculatis, ocellis obſoletis: ſubtùs ocellis quinque, venis fuſco marginatis.* Herbst, *Pap. part.* 8. *p.* 15. *tab.* 182. *fig.* 8. 9.

(1) Hubner a donné la femelle de cette eſpèce ſous le nom d'*Amphitrite*, & le mâle ſous celui de *Thétis*. Mais nous avons adopté le nom de la femelle, parce qu'il y a déjà une Nymphale qui porte le nom de *Thétis*.

Papilio Syllius. Ochsenh. *Pap. Eur. tom.* 1. *p.* 254. *n°.* 39.

Papilio Arge Occitanica, *alis dentatis, albo nigroque variis : inferioribus subtùs venis ocelliſque rufo inductis.* Esp. *Pap. part.* 1. *p.* 17. *tab.* 96. *cont.* 51. *fig.* 3. 4.

Papilio Pſyche. Hubn. *Pap. tab.* 44. *fig.* 198. 199. (La femelle.)

Papilio Pſyche. Illig. *Magaz. tom.* 3. *p.* 202.

Engram. *Pap. d'Europe, tom.* 1. *p.* 135. *pl.* 30. *fig.* 60. e. f.

Il ne diffère eſſentiellement de l'*Amphitrite* que parce que tout le deſſous des ſecondes ailes, & le deſſous des premières au ſommet, ſont veinés de brun, & parce que le fond des yeux eſt auſſi de cette couleur, au lieu d'être d'un roux-vif.

On le trouve dans le midi de la France, en Portugal, &c.; & non en Angleterre, comme l'a cru Engramelle.

96. Satyre Déjanire.

Satyrus Dejanira.

Sat. alis ſubdentatis, fuſcis : anticis utrinquè ocellis quinque : poſticis ſubtùs ſex in fuſciâ albâ repandâ, tertio minuto, anali bipupillato.

Papilio N. Dejanira, *alis dentatis, fuſcis : primoribus utrinquè ocellis quinque : poſticis ſubtùs ſex faſciâque albâ repandâ.* Linn. *Syſt. Nat.* 2. *p.* 774. *n°.* 154. — *Muſ. Lud. Ulr. p.* 282. *n°.* 100.

Papilio S. *Dejanira.* Fab. *Syſt. Entom. p.* 494. *n°.* 222. — *Spec. Inſ. tom.* 2. *p.* 76. *n°.* 336. — *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 38. *n°.* 393. — *Entom. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 230. *n°.* 719.

Papilio Dejanirus. Herbst, *Pap. tab.* 197. *fig.* 1. 2.

Roes. *Inſ.* 4. *tab.* 33. *fig.* 1. 2.

Papilio Dejanira. Esp. *Pap. part.* 1. *tab.* 9. *fig.* 2.

Papilio Dejanira. Wien. *Verz. p.* 166. *fam.* F. *n°.* 5.

Illig. *N. Aufg. Deſſ. tom.* 2. *p.* 177. *n°.* 5.

Papilio Dejanira. Bergestr. *Nomencl. tab.* 37. *fig.* 6. 7.

Borkh. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 70 & 231. *n°.* 7. — *part.* 2. *p.* 200.

Borkh. *Rhein. Magaz. tom.* 1. *p.* 239. *n°.* 19.

Schneid. *Syſt. Beſchr. p.* 177. *n°.* 56.

Fuessl. *Suiſſ. Inſ. p.* 29. *n°.* 566.

Lang. *Verz.* 2. *p.* 18. *n°s.* 104. 105.

Papilio Déjanira. Hubn. *Pap. tab.* 38. *fig.* 170. 171.

Papilio Dejanira. Ochsenh. *Pap. Eur. tom.* 1. *p.* 229. *n°.* 30.

Papilio Achine. Scop. *Ent. Carn. p.* 156. *n°.* 435.

La Bacchante. Geoffr. *Hiſt. Inſ. tom.* 2. *p.* 47. *n°.* 15.

La Bacchante. Engram. *Pap. d'Europe, tom.* 1. *p.* 115. *pl.* 25. *fig.* 48. a. b.

Sa largeur ordinaire eſt d'environ deux pouces. Les quatre ailes ſont légèrement dentées, d'un brun-obſcur en deſſus, avec une rangée courbe & tranſverſe de cinq yeux noirs à iris jaunâtre vers le bout des ſupérieures, & trois à quatre yeux ſemblables, mais dont les deux poſtérieurs plus grands, vers le bout des ailes inférieures.

En deſſous, où le fond eſt plus clair, ces yeux ont une prunelle blanche. Les cinq des premières ailes ſont précédés intérieurement d'une bande jaunâtre, pâle, tranſverſe & flexueuſe, dont l'empreinte paroît plus ou moins ſur la ſurface oppoſée. Ceux des ſecondes ailes ſont placés ſur une bande blanche, large, également flexueuſe, & ils ſont au nombre de ſix, dont le troiſième très-petit, & quelquefois effacé; le ſixième ou l'anal a prunelle double & moins grand que les deux qui le précèdent immédiatement. Il y a en outre, vers la baſe de chaque aile, un trait blanchâtre, tranſverſal, &, le long du bord poſtérieur, une double ligne jaunâtre, un peu ondulée. Les petites échancrures de ce bord ſont blanches de part & d'autre. Le corps eſt du même brun que les ailes. Les antennes ſont noires & annelées de blanc en deſſus, ferrugineuſes en deſſous.

Cette eſpèce paroît dans la première quinzaine de juin. Elle habite les bois. Son vol ſautillant, ou plutôt par ſaccades, lui a fait donner le nom français de *Bacchante*. On la trouvoit aſſez communément au bois de Boulogne; mais elle ne s'y montre plus depuis une vingtaine d'années. Il faut aller la chercher à Saint-Germain & à Bondy. On la rencontre auſſi à Meudon & à Vincennes du côté de Saint-Maur & de Fontenay-ſous-Bois. — En Piémont, & même dans le département de la Charente-Inférieure, elle eſt plus plus grande & plus colorée. M. de Lavaux, actuellement profeſſeur au Collége royal de Nîmes, a pris dans les environs de Saintes, lorſqu'il profeſſoit l'Hiſtoire naturelle à l'Ecole centrale de cette ville, des individus dont la taille ſurpaſſoit de près d'un demi-pouce celle des individus que l'on trouve autour de Paris.

La chenille, ſuivant Hubner, eſt verte, avec des lignes longitudinales plus foncées & des poils

menus. Elle vit, disent les auteurs du *Catalogue systématique des Lépidoptères des environs de Vienne*, sur le *lolium temulentum* (*l'ivraie annuelle*).

97. Satyre Minéus.

Satyrus Mineus.

Sat. alis fuscis : subtùs strigâ mediâ lineisque quatuor apicalibus albis ; posticis ocellis septem, 1°., 3°., 4°., 5°. majoribus.

Papilio D. F. Mineus, *alis integerrimis, subfuscis : subtùs posticis ocellis septem, anticis duobus, suprà unico.* Linn. *Syst. Nat. 2. p. 768. n°. 126?*

Papilio D. F. Mineus, *alis integerrimis, fuscis: anticis suprà ocello unico : posticis subtùs septem fasciâque albâ.* Fab. *Syst. Ent. p. 488. n°. 197. — Spec. Inf. tom. 2. p. 65. n°. 294. — Mant. Inf. tom. 2. p. 32. n°. 341.*

Papilio N. *Mineus.* Fab. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 158. n°. 488.*

Papilio N. Blasius, *alis integerrimis, fuscis, suprà immaculatis : subtùs anticis ocellis tribus, posticis septem.* Fab. *Ent. Syst. em. tom. 5. Suppl. p. 426. n°. 488-9.*

Papilio Justina. Cram. *pl. 326. fig. C.*

Papilio Drusia. Cram. *pl. 84. fig. C. D. (Var.?)*

Papilio Justinus. Herbst, *Pap. tab. 194. fig. 5.*

Papilio Mineus. Herbst, *Pap. tab. 196. fig. 1. 2. (Var.)*

Le *Mineus* & le *Blasius* de Fabricius ne font qu'une seule espèce, dont le port, la taille & la couleur sont comme dans le *Polydecta*. (*Voyez n°. 101.*)

Le *Blasius* est sans taches en dessus. Le *Mineus* a sur chacune des quatre ailes, ou sur les supérieures seulement, un œil plus ou moins gros, suivant le sexe, noir, avec une prunelle blanche & un iris jaunâtre.

Le dessous de toutes les ailes, dans le *Blasius* comme dans le *Mineus*, est traversé obliquement par une ligne blanche, discoïdale, à la suite de laquelle viennent deux lignes également blanches, tortueuses, réunies par leurs extrémités, embrassant des yeux-noirs qui ont une prunelle blanche & un iris jaune. Les yeux des secondes ailes forment une rangée de sept, dont l'antérieur, le troisième, le quatrième & le cinquième plus gros. Les yeux des premières ailes varient de deux à cinq, dont un, celui qui se reproduit en dessus, plus gros. Il y a en outre, le long du bord terminal de chaque aile, une ligne, double & ondulée, du même blanc que les précédentes.

De la Chine & du Bengale.

Nota. Linnæus ne dit pas si son papillon *Mineus* a des lignes blanches en dessous. Peut-être étoient-elles oblitérées dans l'individu qu'il a décrit, individu qui du reste ressemble parfaitement à la plupart de ceux que nous avons vus.

Quant au *Drusia* de Cramer, il offre les caractères que nous indiquons, mais il n'a que six yeux.

98. Satyre Héfione.

Satyrus Hesione.

Sat. alis fuscis, suprà immaculatis : subtùs strigâ communi albâ ocellisque singulatim annulo plumbeo cinctis, anticarum duobus, posticarum sesquitertiis.

Papilio N. Hesione, *alis integerrimis, fuscis : subtùs strigâ obliquâ albâ, anticis ocellis duobus, posticis sesquitertiis.* Fab. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 190. n°. 508.*

Papilio D. F. Medus, *alis integerrimis, fuscis : subtùs strigâ niveâ ocellisque anticarum duobus, posticarum tribus.* Fab. *Syst. Ent. p. 488. n°. 198. Spec. Inf. tom. 2. p. 66. n°. 295. — Mant. Inf. tom. 2. p. 32. n°. 342.*

Papilio Hesione. Cram. *Pap. pl. 11. fig. C. D.*

Papilio Hesione. Cram. *Pap. pl. 362. fig. C.*

Papilio Hesione. Herbst, *Pap. tab. 193. fig. 4. 5.*

Nous réunissons l'*Hesione* & le *Medus* de Fabricius, parce que le second n'est bien certainement qu'une variété du premier.

Il a à peu près deux pouces d'envergure. Le dessus des ailes est d'un brun-obscur, avec une ligne blanchâtre, ondulée & terminale.

Le dessous est un peu plus foncé que le dessus, du moins dans beaucoup d'individus, & traversé obliquement au milieu par une raie blanche, entre laquelle & le bord les premières ailes ont deux yeux séparés, & les secondes trois dont l'antérieur plus petit & contigu au suivant. Ces yeux sont noirs, avec une prunelle blanche & un iris jaunâtre ; ils sont en outre renfermés chacun dans un cercle couleur de mine de plomb. Il y a indépendamment de cela une double ligne jaunâtre sur le bord postérieur de chaque aile, bord qui est un peu sinué aux inférieures. Le corps est brun ; les antennes sont annelées de blanc & de noir, avec le bout de la massue roussâtre.

Trouvé dans l'île de Java par M. Leschenault, & dans celle de King (mer du Sud) par MM. Péron & Lesueur. C'est donc sur de faux renseignemens que Fabricius le dit de Surinam.

Le *Medus* du même n'est point du Cap de Bonne-Espérance, mais de Java. Ce n'est, comme nous l'avons dit, qu'une variété de l'*Hesione*. Elle

ne s'en distingue que parce que le cercle plombé qui entoure les yeux du dessous des ailes est nul ou plutôt effacé.

99. Satyre Constantius.

Satyrus Constantius.

Sat. alis integerrimis, obscurè cinereis, strigâ marginali punctorum fuscorum. Fab.

Papilio N. *Constantius.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 152. *n°.* 468.

Papilio Constantius. Jon. *Fig. pict.* 6. *tab.* 50. *fig.* 1.

Voici ce qu'en dit Fabricius : les quatre ailes sont cendrées. Leur dessus offre une rangée terminale de points noirâtres, entourés chacun d'une lunule blanche.

Leur dessous est traversé, au-delà du milieu, par une bande pâle, large, & sur laquelle il y a une série de points obscurs.

Il habite.....

100. Satyre Nécys.

Satyrus Necys.

Sat. alis integerrimis, supra nigricantibus, immaculatis : subtùs nebuloso-cinereis, strigis tribus fuscis serieque punctorum sex albidorum.

Il a environ un pouce & demi d'envergure. Ses ailes sont d'un brun-noirâtre, & sans taches en dessus.

Leur dessous est cendré, piqué de brun, avec trois lignes obscures, transverses & ondulées, dont deux entre la base & le milieu, la troisième presque marginale & précédée intérieurement à chaque aile d'une série de six points blanchâtres. Le corps est de la couleur des ailes. Les antennes sont brunâtres & annelées de gris en dessus, ferrugineuses en dessous.

Du Brésil.

101. Satyre Polydecta.

Satyrus Polydecta.

Sat alis fuscis : anticis supra ocello unico vel sesquialtero : subtùs omnibus strigis duabus nigricantibus ; posticis ocellis seu punctis ocellaribus septem.

Papilio N. Polydecta, *alis dentatis, fuscis : anticis ocello ; posticis supra duobus, subtus septem.* Fab. *Spec. Inf. tom.* 2. *p.* 85. *n°.* 375. — *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 46. *n°.* 450. — *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 107. *n°.* 329.

Papilio S.-Perseus, *alis integerrimis, fuscis : subtùs punctis ocellaribus, anticis tribus, posticis septem.* Fab. *Syst. Ent. p.* 488. *n°.* 199. — *Spec. Inf. tom.* 2. *p.* 66. *n°.* 296.—*Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 32. *n°.* 343. — *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 219. *n°.* 685.

Papilio Polydecta. Cram. *Pap. pl.* 144. *fig.* E. F.

Papilio Otrea. Cram. *Pap. pl.* 314. *fig.* A. B.

Papilio Mamerta. Cram. *Pap. pl.* 326. *fig.* D.

Papilio Francisca. Cram. *Pap. pl.* 326. *fig.* E. F.

Papilio Polydectus. Herbst, *Pap. tab.* 196. *fig.* 5. 6.

Papilio Otreus. Herbst, *Pap. tab.* 196. *fig.* 3. 4.

Papilio Mamertus. Herbst, *Pap. tab.* 194. *fig.* 6.

Papilio Franciscus. Herbst, *Pap. tab.* 194. *fig.* 7. 8.

Papilio Perseus. Donow. *Gen. Illust. of Entom. part.* 1. *an Epitome of the Ins. of New Holl. pl.* 26. *fig.* 3.

Papilio Perseus. Jon. *Fig. pict.* 6. *tab.* 49. *fig.* 1.

Le *Polydecta* & le *Perseus* de Fabricius nous paroissent ne former qu'une seule espèce, dont les papillons *Otrea*, *Mamerta* & *Francisca* de Cramer sont des variétés.

Sa taille varie entre un pouce & demi & deux pouces. Les quatre ailes sont d'un brun-obscur en dessus. Les supérieures, dont le bord terminal est entier, ont, entre ce même bord & le disque, un grand ou un moyen œil noir à prunelle blanche & à iris jaunâtre, indépendamment duquel on en voit parfois un autre très-petit vis-à-vis du sommet.

Les ailes inférieures sont sinuées. Leur dessus est ordinairement sans taches. Néanmoins, dans quelques individus de l'un & l'autre sexe, il y a, vers le milieu du bord postérieur, deux petits yeux colorés comme celui des premières ailes. Cela a lieu, par exemple, pour les *Polydecta*, *Otrea* & *Francisca* de Cramer.

Le dessous des quatre ailes est tantôt beaucoup plus pâle que le dessus, tantôt d'un brun-obscur à reflet vineux, avec une suite d'yeux ou de points oculaires, le plus souvent au nombre de quatre sur les premières ailes, & toujours au nombre de sept sur les secondes. Entre ces yeux & la base, sont deux lignes noirâtres, transverses, un peu ondulées, dont la postérieure ayant le côté interne plus ou moins éclairé de blanchâtre. Le long du bord terminal règne une double ligne obscure en feston, mais elle n'est bien distincte que dans le *Polydecta* proprement dit. Les points oculaires sont noirs, avec le milieu blanc ; & lorsqu'ils sont remplacés par des yeux, l'iris est grisâtre. Le corps

& les antennes ſont bruns. Celles-ci ont la maſſue rouſſâtre & le deſſous blanchâtre.

De la Chine & du Bengale.

N. B. Suivant Fabricius & Donowan cette eſpèce ſe trouveroit auſſi à la Nouvelle-Hollande. C'eſt du moins la patrie qu'ils aſſignent à leur *Perſeus* qui, comme nous l'avons dit, nous paroît être le même que le *Polydecta*.

102. SATYRE Martius (1).

SATYRUS Martius.

Sat. alis integerrimis, nigris : ſubtùs punctis ocellaribus, anticis quatuor, poſticis ſeptem. FAB.

Papilio S. *Martius.* FAB. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *n°.* 686.

Papilio Martius. JON. *Fig. pict.* 6. *tab.* 49. *fig.* 1.

Fabricius le décrit ainſi : il a le port du *Perſeus* (*Polydecta var.*), auquel il reſſemble. Mais il forme une eſpèce diſtincte. Le deſſus des ailes eſt noir & ſans taches.

Leur deſſous eſt pareillement noir, avec le bord plus pâle & précédé aux ailes ſupérieures de quatre yeux, dont le deuxième & le quatrième très-petits, & aux ailes inférieures de ſept, dont le troiſième plus grand.

Il habite.....

103. SATYRE Zachéus.

SATYRUS Zachœus.

Sat. alis integris, fuſcis, ſuprà ocellis duobus : ſubtùs anticis quatuor, poſticis ſex. FAB.

Papilio S. *Zachœus.* FAB. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 217. *n°.* 679.

Papilio Zachœus. JON. *Fig. pict.* 4. *tab.* 15. *fig.* 2.

Fabricius le décrit ainſi : il a le port du *Clérimon*. Le deſſus de ſes ailes eſt d'un brun-obſcur, avec deux yeux à prunelle blanche ſur chacune d'elles. Les inférieures en ont quelquefois un troiſième, plus petit, près de l'anus.

Le deſſous eſt de la même couleur que le deſſus, avec quatre yeux à prunelle blanche ſur les ailes de devant, & ſix ſemblables ſur celles de derrière.

Il habite.....

104. SATYRE Tabitha.

SATYRUS Tabitha.

Sat. alis dentatis, nigris : anticis ocello unico : ſubtùs obſcuris, ſtrigâ punctorum ocellatorum. FAB.

Papilio S. *Tabitha.* FAB. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 243. *n°.* 756.

Il a le port de l'*Eudora*. (*Voyez n°.* 164.) Ses ailes ſont dentées, noires en deſſus, avec un petit œil plus foncé & à prunelle blanche au ſommet des ſupérieures.

En deſſous le fond des quatre ailes eſt obſcur, avec une rangée de points blancs, oculaires.

Des Indes orientales.

(*Traduction de Fabricius.*)

105. SATYRE Clérimon.

SATYRUS Clerimon.

Sat. alis ſubrepandis, fuſcis : anticis ſuprà ocello atro : omnibus ſubtùs quatuor minutis. FAB.

Papilio S. *Clerimon.* FAB. *Entom. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p* 217. *n°.* 678.

Papilio Clerimon. JON. *Fig. pict.* 4. *tab.* 15. *fig.* 1.

Il eſt de la taille de l'*Hypéranthus*. (*Voyez n°.* 162.) Ses ailes ſont légèrement ſinuées. Leur deſſus eſt d'un brun-obſcur, avec un grand œil noir à prunelle blanche & à iris jaune ſur les ſupérieures, & deux petits yeux à prunelle ſemblable ſur les inférieures.

Le deſſous de chaque aile a l'extrémité plus pâle, avec quatre petits yeux à prunelle blanche.

Il habite.....

(*Traduction de Fabricius.*)

106. SATYRE Florimel.

SATYRUS Florimel.

Sat. alis integerrimis, fuſcis : ſubtùs anticis ocellis duobus, poſticis ſeptem. FAB.

Papilio S. *Florimel.* FAB. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 215. *n°.* 673.

Papilio Florimel. JON. *Fig. pict.* 6. *tab.* 50. *fig.* 2.

Il eſt de moyenne taille & d'un brun-obſcur en deſſus. Les ailes ſupérieures ont deux yeux dépourvus de prunelle. Les inférieures ſont ſans taches.

En deſſous le fond eſt plus pâle, & traverſé au milieu par une large bande brunâtre, derrière laquelle les premières ailes ont deux yeux, dont le poſtérieur plus grand, & les ſecondes ſept, dont le troiſième, à partir du bas, auſſi plus grand. Ces yeux ſont noirs, avec une prunelle blanche & un iris jaune.

Il habite.....

(*Traduction de Fabricius.*)

107. SATYRE

(1) N'ayant pas vu ce ſatyre, ni les trois ſuivans, nous ne ſommes pas ſûrs qu'ils forment des eſpèces diſtinctes. Nous penchons même à croire qu'ils doivent ſe rapporter au *Polydecte* ou au *Mincus*, leſquels ſont peut-être auſſi variétés l'un de l'autre.

107. Satyre Mergus.

Satyrus Mergus.

Sat. alis integerrimis, concoloribus, fuscis : anticis ocellis quatuor, anteriore pupillâ geminâ ; posticis quinque. Fab.

Papilio N. *Mergus.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 159. *n°.* 490.

Papilio Mergus. Jon. *Fig. pict.* 4. *tab.* 41. *fig.* 2.

Ses ailes sont de part & d'autre d'un brun-obscur, avec quatre yeux noirs à prunelle blanche & à iris fauve sur les supérieures, & cinq sur les inférieures. L'œil antérieur des premières ailes est double.

De l'Afrique.

(*Traduction de Fabricius.*)

108. Satyre Circé.

Satyrus Circe.

Sat. alis dentatis, fusco-nigris, suprà fasciâ communi albâ : posticis subtùs sesquialterâ : anticarum utrinquè maculari ocello sæpiùs unico.

Papilio S. Circe, *alis dentatis, fuscis, fasciâ utrinquè albâ : anticarum ocello unico.* Fab. *Syst. Entom. p.* 495. *n°.* 226. — *Spec. Inf. tom.* 2. *p.* 77. *n°.* 342. — *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 39. *n°.* 403. — *Entom. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 233. *n°.* 728.

Papilio Circe. Schœff. *Icon. tab.* 82. *fig.* 1. 2.

Papilio Circe. Rossi, *Faun. Etr. tom.* 2. *p.* 147. *n°.* 1006.

Roes. *Inf. part.* 1. *tab.* 27. *fig.* 3. 4.

Papilio Proserpina. Herbst, *Pap. tab.* 216. *fig.* 1. 4.

Papilio Proserpina. Esp. *Pap. part.* 1. *tab.* 39. *Suppl.* 15.

Papilio Proserpina. Esp. *Pap. part.* 1. *tab.* 42. *Suppl.* 18. *fig.* 3. — *tab.* 26. *Suppl.* 2. (La chenille.)

Papilio Proserpina. Wien. *Verz. p.* 169. *fam.* F. *n°.* 23.

Illig. *N. Ausg. Deff. tom.* 2. *p.* 196. *n°.* 23.

Illig. *Magaz. tom.* 3. *p.* 202.

Bergstr. *Nomencl. tab.* 95. *fig.* 1. 2. *& tab.* 126. *fig.* 1. 2.

Papilio Proserpina. Borkh. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 65. *n°.* 2. — *part.* 2. *p.* 199. *n°.* 2.

Schneid. *Syst. Beschr. p.* 92. *n°.* 34.

Lang. *Verz.* 2. *p.* 26. *n°.* 190-193.

Papilio Proserpina. Schwarz, *Raup. Cutond. p.* 45. *n°.* 180.

Papilio Proserpina. Schrank, *Faun. Boïc. tom.* 2. *p.* 184. *n°.* 1319.

Papilio Proserpina. Hubn. *Pap. tab.* 26. *fig.* 119. (Mas.) *fig.* 120. 121. (Fem.)

Papilio Proserpina. Ochsenh. *Pap. Eur. tom.* 1. *p.* 167. *n°.* 1.

Papilio Hermione. Fuessl. *Suiss. Inf. p.* 29. *n°.* 564.

Papilio Velleda. Naturf. *p.* 17. *n°.* 3.

Le Silène. Engram. *Pap. d'Europe, tom.* 1. *p.* 70. *pl.* 20. *fig.* 33. a. b.

Le Silène. Engram. *Pap. d'Europe, tom.* 1. *p.* 302. *pl.* 81. 2^e. *Suppl. pl.* 2. *fig.* c. (La chenille.) *fig.* d. e. (Variétés du pap.)

Il a près de trois pouces d'envergure. Les quatre ailes sont dentées, d'un noir-brun en dessus, avec une bande blanche, transverse, située vers le bord postérieur dont les échancrures sont également blanches. La bande des ailes inférieures est continue, un peu courbe en arrière & sinuée sur les côtés. Celle des ailes supérieures est composée de six taches dont l'antérieure oblongue & chargée dans son milieu d'un œil noir sans prunelle ; la suivante petite & pareillement oblongue ; les quatre autres presque triangulaires.

Le dessous des premières ailes diffère du dessus en ce que l'œil de la bande a une prunelle d'un blanc-vif ; en ce qu'il y a près du milieu de la côte deux taches blanches, parallèles & un peu orbiculaires ; en ce que toute la côte & le sommet sont piqués de grisâtre.

Le dessous des secondes ailes est d'un brun piqué de gris, avec deux bandes blanches, transversales, dont l'intérieure courte, dilatée à son origine, très-étroite vers son extrémité ; l'extérieure correspondante à celle du dessus, mais plus fortement sinuée en dedans, & précédée en dehors d'un point oculaire avoisinant l'angle anal. Le corps est de la couleur des ailes. Les antennes ont le bout de la massue fauve.

Engramelle a figuré deux variétés. L'une a un second œil plus petit, placé vers le milieu de la bande des ailes de devant.

L'autre a la bande extérieure du dessous des ailes de derrière roussâtre, au lieu de l'avoir blanche.

Cette espèce se trouve dans le midi de l'Allemagne, en Italie, & dans plusieurs contrées de la France. Elle donne en juillet & en août.

La chenille est, comme toutes celles du genre *Satyre*, terminée par une pointe bifide. Son corps est d'un brun-noirâtre, avec six raies longitudinales, dont deux grises sur le dos, une roussâtre sur chaque côté & une jaunâtre au dessus des pat-

tes. Pendant le jour elle fe tient cachée au pied de la plante, & ne fort pour manger qu'après le coucher du foleil. Sa démarche eft lente. Elle vit fur la *flouve odorante* (*anthoxantum odoratum*), l'*ivraie* (*lolium*), le *brome des bois* (*bromus fylvaticus*). Au mois de juin, elle fait fa chryfalide dans une cavité qu'elle pratique en terre.

109. Satyre Briféis.

Satyrus Briſeis.

Sat. alis dentatis, ſuprà fuſcis, vireſcentimicantibus, fafciâ communi albâ : anticarum maculari ocellis duobus diſſitis.

Papilio N. Briſeis, *alis dentatis, fuſcis, viridimicantibus, faſciâ albâ : anterioribus ocellis duobus, poſterioribus cœcis.* Linn. *Syſt. Nat.* 2. *p.* 770. *n°.* 139. — *Muſ. Lud. Ulr. p.* 226.

Papilio S. *Briſeis.* Fab. *Spec. Inſ. tom.* 2. *p.* 76. *n°.* 339. — *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 38. *n°.* 396. — *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 231. *n°.* 721.

Papilio Briſeis. Herbst, *Pap. tab.* 216. *fig.* 5. 6. *& tab.* 217. *fig.* 1. 2.

Papilio Briſeis. Naturf. 10. *tab.* 2. *fig.* 3. 4.

Papilio Briſeis. Schœff. *Icon. tab.* 274. *fig.* 5. 6.

Papilio Briſeis. Rhein. *Magaz. tom* 1. *p.* 246. *n°.* 34.

Papilio Briſeis. Lang. *Verz.* 2. *p.* 25. *n°.* 179-182.

Papilio Briſeis. Wien. *Verz. p.* 169. *fam.* F. *n°.* 20.

Papilio Briſeis. Ochsenh. *Pap. Eur. tom.* 1. *p.* 170. *n°.* 3.

Papilio Anthe. Ochsenh. *Pap. Eur. tom.* 1. *p.* 169. *n°.* 2. (Var. fem.?)

Illig. *N. Aufg. Deſſ. tom.* 2. *p.* 193. *n°.* 20.

Illig. *Magaz. tom.* 3. *p.* 188.

Illig. *Magaz. tom.* 5. *p.* 182. (Var. fem.?)

Papilio Briſeis. Schrank, *Faun. Boïc. tom.* 2. *p.* 182. *n°.* 1316.

Papilio Janthe. Schrank, *Faun. Boïc. tom.* 2. *p.* 183. *n°.* 1317.

Papilio Briſeis. Borkh. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 69 *&* 230. *n°.* 5.

Papilio Janthe. Borkh. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 68 *&* 229. *n°.* 4.

Papilio Daedale. Borkh. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 67 *&* 229. *n°.* 3.

Papilio Briſeis. Bergstr. *Nomencl. tab.* 96. *fig.* 1. 2.

Papilio Janthe. Bergstr. *Nomencl. tab.* 94. *fig.* 4. 5.

Papilio Daedale. Bergstr. *Nomencl. tab.* 94. *fig.* 1. 2.

Papilio Janthe major. Esp. *Pap. part.* 1. *tab.* 26. *Suppl.* 2. *fig.* 1.

Papilio Janthe minor. Esp. *Pap. part.* 1. *tab.* 26. *Suppl.* 2. *fig.* 2.

Papilio Pirata, *alis dentatis, fuſcis : ſuperioribus faſciâ rufeſcente in ſex areolas diviſâ maculiſque duabus rotundatis nigris ſubtùs albo pupillatis ; poſticis ſuprà faſciâ rufeſcente, ſubtùs albidis atomis griſeſcentibus numeroſis.* Esp. *Pap. part.* 1. *tab.* 100. *cont.* 55. *fig.* 3. (Var. fem.)

Papilio Briſeis. Hubn. *Pap. tab.* 28. *fig.* 130. 131.

Papilio Pirata. Hubn. *Pap. tab.* 118. *fig.* 604. 605. (Var. fem.)

Papilio Perſephone. Hubn. *tab.* 115. *fig.* 589. 590. (Var. fem.?)

Papilio Janthe. Schneid. *Syſt. Beſchr. p.* 95. *n°.* 36.

Papilio Janthe. Pallas, *Voy. p.* 17. *n°.* 58.

Papilio Pirata. De Prunner, *Lepid. Pedem. p.* 73. *n°.* 149.

L'Hermite. Engram. *Pap. d'Europe, tom.* 1. *p.* 73. *pl.* 21. *fig.* 36. a-d.

L'Hermite. Engram. *Pap. d'Europe, tom* 1. *p.* 254. *pl.* 63. *Suppl.* 9. *fig.* 36. a-f.

Il a d'ordinaire à peu près un pouce de moins que le *Circé*. Les ailes ſupérieures ſont légèrement dentées ; les inférieures le ſont davantage, ſurtout dans la femelle. Le deſſus des quatre eſt d'un brun-noirâtre à reflet verdâtre, avec une bande oblique d'un blanc-ſale. La bande des ſecondes ailes eſt continue, un peu ſinuée & dilatée dans ſon milieu. Celle des premières ailes eſt partagée en ſix ou ſept taches longitudinales, dont l'antérieure & la quatrième chargées chacune d'un œil noir à prunelle blanche, mais moins prononcé dans le mâle que dans la femelle, ſurtout le poſtérieur. La côte de ces ailes eſt en outre blanchâtre juſqu'auprès du ſommet.

Le deſſous des mêmes ailes eſt moins foncé que le deſſus ; la bande blanche y eſt plus large, moins interrompue, teintée de rouſſâtre ſur le côté externe ; le ſommet & le bord terminal y ſont griſâtres ; la partie antérieure de la ſurface eſt cendrée ou blanchâtre, avec une tache noire preſqu'orbiculaire & appuyée ſous le milieu de la côte.

Le deſſous des ſecondes ailes eſt cendré à la baſe, avec deux taches noirâtres dans le mâle, ſans taches dans la femelle; blanchâtre ou plus clair ſur la partie qui correſpond à la bande du deſſus; puis d'un brun-obſcur, avec deux ou trois points blancs, dont le poſtérieur ocellé; enfin, terminé par une bande blanchâtre ou centrée qui a le côté interne ſinué. Les deux ſurfaces du corps ſont de la couleur des ailes. Les antennes ſont brunâtres en deſſus, pâles en deſſous.

Le *Pirata* de quelques auteurs n'eſt qu'une variété femelle qui a la bande du deſſus des quatre ailes rouſſâtre, au lieu de l'avoir blanche. On la trouve particulièrement dans le midi de la France.

Le *Perſephone* d'Hubner, ou *Anthe* de M. Ochſenheimer, ne paroît différer de cette variété qu'en ce que les yeux des ailes de devant ſont ſans prunelle de part & d'autre; en ce que les ailes de derrière ont un œil ſemblable près de l'angle de l'anus, & que leur deſſous eſt partout du même brun, avec des marbrures griſâtres.

Le *Briſéis* habite à peu près toute l'Europe. Il paroît en juillet & en août dans les endroits pierreux. Nous l'avons pris ſur la côte d'Aunay près de Paris. — Dans le Midi les individus ſont plus grands & plus colorés que dans le Nord.

110. Satyre Hermione.

Satyrus Hermione.

Sat. alis dentatis, fuſcis, vireſcenti-micantibus, utrinquè fuſciâ communi albidâ : anticarum ocellis duobus diſſitis, poſticarum unico.

Papilio N. Hermione, *alis dentatis, fuſcis, fuſciâ pallidâ : primoribus ocellis ſuprà duobus, ſubtùs unico.* Linn. *Syſt. Nat.* 2. *p.* 773. *n°.* 149. — *Muſ. Lud. Ulr. p.* 281. *n°.* 99.

Papilio S. *Hermione.* Fab. *Syſt. Entom. p.* 495. *n°.* 225. — *Spec. Inſ. tom.* 2. *p.* 77. *n°.* 341. — *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 30. *n°.* 402. — *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 232. *n°.* 727.

Papilio Hermione. Herbst, *Pap. tab.* 215. *fig.* 1-6.

Papilio Hermione. Wien. *Verz. p.* 169. *fam.* F. *n°.* 22.

Papilio Alcyone. Wien. *Verz. p.* 169. *fam.* F. *n°.* 21.

Illig. *N. Auſg. Deſſ. tom.* 2. *p.* 194. *n°s.* 21 & 22.

Illig. *Magaz. tom.* 3. *p.* 184 & *p.* 194. — *tom.* 4. *p.* 36.

Bergstr. *Nomenclat. tab.* 95. *fig.* 3. 4. — *tab.* 126. *fig.* 3-5. — *tab.* 127. *fig.* 1, 2. 3.

Papilio Hermione. Borkh. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 63 & 228. *n°.* 1. — *part.* 2. *p.* 199.

Borkh. *Rhein. Magaz. tom.* 1. *p.* 248. *n°.* 35.

Papilio Hermione. Schneid. *Syſt. Beſchr. p.* 91. *n°.* 33.

Papilio Alcyone. Schneid. *Syſt. Beſchr. p.* 89. *n°.* 32.

Papilio Hermione. Lang, *Verz.* 2. *p.* 26. *n°.* 185-186.

Papilio Alcyone. Lang. *Verz.* 2. *p.* 26. *n°.* 187-189.

Papilio Hermione minor. Esp. *Pap. part.* 1. *tab.* 8. *fig.* 2.

Papilio Hermione major. Esp. *Pap. part.* 1. *tab.* 8. *fig.* 3.

Papilio Hermione major. Esp. *Pap. part.* 1. *tab.* 70. *cont.* 20. *fig.* 4. (Mas. Var.)

Roes. *Inſ. part.* 3. *tab.* 34. *fig.* 5. 6.

Papilio Hermione. Hubn. *Pap. tab.* 27. *fig.* 122. (Mas.) *fig.* 123. 124. (Fem.)

Papilio Alcyone. Hubn. *Pap. tab.* 27. *fig.* 125. 126.

Papilio Hermione. Schrank, *Faun. Boïc. tom.* 2. *p.* 183. *n°.* 1318.

Papilio Hermione. Ochsenh. *Pap. Eur. tom.* 1. *p.* 173. *n°.* 4.

Papilio Alcyone. Ochsenh. *Pap. Eur. tom.* 1. *p.* 176. *n°.* 5.

Rossi, *Faun. Etr. tom.* 2. *p.* 147. *n°.* 1005.

Papilio Fagi. Scop. *Ent. Carn. p.* 151. *n°.* 428.

Papilio Jurtina. Hufnag. *Magaz. tom.* 2. *p.* 78. *n°.* 42.

Naturf. 6. *p.* 10. *n°.* 42.

La Silène. Geoffr. *Hiſt. Inſ. tom.* 2. *p.* 46. *n°.* 13.

Le Silvandre. Engram. *Pap. d'Europe, tom.* 1. *p.* 71. *pl.* 20. *fig.* 34. a. b. c.

Le petit Silvandre. Engram. *Pap. d'Europe, tom.* 1. *p.* 253. *pl.* 63. *Suppl.* 8. *fig.* 35. a. b. c.

Il eſt preſqu'auſſi grand que le *Circé.* Les quatre ailes ſont dentées & bordées de blanc aux échancrures. Leur deſſus eſt d'un brun-noirâtre, légèrement glacé de verdâtre, avec une bande poſtérieure d'un blanc plus ou moins ſale. Cette bande, dont le côté interne eſt crénelé, eſt courbe aux ſecondes ailes & précédée en dehors, vers l'angle anal, d'un petit œil noir à prunelle blanche : aux premières ailes, elle eſt marquée

de deux yeux semblables, & écartés, dont le supérieur un peu plus grand.

Le dessous de ces mêmes ailes ressemble au dessus, mais la côte & le sommet y sont piqués de gris; la bande y est plus claire & n'offre le plus souvent dans les mâles que l'œil antérieur; nous disons le plus souvent, parce que les deux yeux se retrouvent dans des mâles plus petits, & que plusieurs auteurs ont désignés sous le nom d'*Alcyone*.

Le dessous des ailes inférieures diffère du dessus, en ce que tout le fond est piqué de gris, & la bande de brun; en ce que celle-ci est bordée de noir sur les côtés, & en ce qu'il y a vers la base une ligne transverse & ondulée également noire. Le corps & les antennes sont du même ton que les ailes.

La chenille vit sur la *houque laineuse*, vulgairement appelée *foin blanc* ou *foin de mouton* (*holcus lanatus*). Elle est grisâtre, avec une ligne noire le long du dos.

Cette espèce se trouve dans toute l'Europe, au mois d'août. Elle fréquente les bois & les hauteurs. Elle est très-commune à Fontainebleau.

L'*Alcyone*, que nous avons cité tout-à-l'heure, n'est, comme l'ont pensé Linnæus & Fabricius, qu'une variété plus petite, ayant deux yeux de part & d'autre sur la bande des ailes supérieures du mâle. Cette variété se prend avec les individus ordinaires, mais elle paroît s'être multipliée dans les endroits où la plante qui fert de nourriture à la chenille acquiert moins de développement.

III. SATYRE SÉMÉLÉ.

SATYRUS Semele.

Sat. alis dentatis, suprà fuscis, fasciâ lutescente, sinuatâ, interruptâ: anticarum utrinquè biocellata: posticis subtùs cinereo fuscoque marmoratis, fasciâ albidâ, angulatâ.

Papilio N. Semele, *alis dentatis, fuscis, fulvo fasciatis: posterioribus albo nigroque variis.* Linn. *Syst. Nat.* 2. *p.* 772. *n°.* 148. — *Faun. Suec. edit.* 2. *p.* 276. *n°.* 1051.

Papilio S. Semele, *alis dentatis, fasciâ maculari fulvâ ocellisque duobus: anticis subtùs disco basios fulvo.* Fab. *Syst. Ent. p.* 494. *n°.* 224. — *Spec. Inf. tom.* 2. *p.* 76. *n°.* 341. — *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 39. *n°.* 400. — *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 232. *n°.* 725.

Papilio Semele. Wien. *Verz. p.* 169. *fam.* F. *n°.* 17.

Illig. *N. Aufg. Deff. tom.* 2. *p.* 191. *n°.* 17.

Illig. *Magaz. tom.* 3. *p.* 204.

Schœff. *Icon. tab.* 207. *fig.* 3. 4.

Sulz. *Inf. tab.* 17. *fig.* 5. 6.

Bergstr. *Nomencl. tab.* 28. *fig.* 7. 8. — *tab.* 32. *fig.* 3.

Papilio Semele. Esp. *Pap. part.* 1. *tab.* 8. *fig.* 1.

Panz. *Faun. Germ.* 76. 23.

Papilio Semele. Herbst, *Pap. tab.* 211. *fig.* 5-8.

Papilio Semele. Borkh. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 69 & 230. *n°.* 6.

Borkh. *Rhein. Magaz. tom.* 1. *p.* 246. *n°.* 33.

Papilio Semele. Lewin. *Inf. tab.* 17. *fig.* 1-4.

Schneid. *Syst. Beschr. p.* 88. *n°.* 31.

Lang. *Verz.* 2. *p.* 25. *n°.* 175-178.

Muller, *Zool. Dan. p.* 115. *n°.* 1323.

Papilio Semele. Schrank, *Faun. Boïc. tom.* 2. *p.* 181. *n°.* 1314.

Fuessl. *Suiss. Inf. p.* 29. *n°.* 563.

Rossi, *Faun. Etr. tom.* 2. *p.* 147. *n°.* 1004.

Papilio Semele. Hubn. *Pap. tab.* 31. *fig.* 143. 144. (Mas.)

Papilio Semele. Ochsenh. *Pap. Eur. tom.* 1. *p.* 197. *n°.* 15.

Papilio Danae. Hufnag. *Magaz. tom.* 2. *p.* 82. *n°.* 50.

L'Agreste, Engram. *Pap. d'Europe, tom.* 1. *p.* 76. *pl.* 22. *fig.* 38. a. b. c.

Il a de deux pouces à deux pouces & un quart d'envergure. Les quatre ailes sont dentelées, notamment les inférieures, avec les échancrures ciliées de blanc. Leur dessus est d'un brun-obscur depuis la base jusqu'au-delà du milieu; ensuite noirâtre jusqu'au bout, avec une bande d'un jaune plus ou moins fauve, sinuée, interrompue, terminée aux ailes inférieures par un petit œil noir à prunelle blanche, offrant aux supérieures deux yeux semblables, mais plus grands, dont l'antérieur placé sur le milieu de la première tache à partir d'en haut, le postérieur sur le milieu de la quatrième.

En dessous, les ailes de devant ont le milieu fauve, avec la côte & le bord interne cendrés. Leur bande du dessus reparoît ici chargée de ses deux yeux, mais elle y est plus pâle, continue, & la portion du bord antérieur où elle prend son origine est marquetée de blanc.

Le dessous des ailes de derrière est cendré, piqué de brun, avec une bande blanchâtre, transverse, anguleuse, discoïdale, plus prononcée dans le mâle que dans la femelle, & un petit œil correspondant à celui de la surface opposée. Le corps est de la couleur des ailes. Les antennes sont brunâtres en dessus, grises en dessous.

Le mâle a la bande fauve du deſſus des ailes moins prononcée que la femelle.

On trouve cette eſpèce, en juillet & en août, dans preſque toutes les parties de l'Europe. Elle aime les bois ſecs, les lieux pierreux, & s'attache volontiers aux arbres qui ſuintent. — Les parcs de Saint-Cloud, de Boulogne, de Vincennes, ſont les endroits des environs de Paris où on la prend le plus communément.

112. Satyre Alcyone.

Satyrus Alcyone.

Sat. alis dentatis, ſuprà fuſcis, faſciâ luteâ nigro marginatâ : anticarum haud ſinuatâ, utrinquè biocellatâ : poſticis ſubtùs cinereo fuſcoque marmoratis, faſciâ nulla.

Papilio S. Alcyone, *alis dentatis, fuſcis, flavo faſciatis : anticis utrinquè ocellis duobus : poſticis ſubtùs marmoratis.* Fab. *Mant. Inſ. tom. 2. p. 38. n°. 399. — Ent. Syſt. em. tom. 3. pars 1. p. 231. n°. 724.*

Papilio Agave. Esp. *Pap. part. 1. tab. 84. cont. 34. fig. 4.*

Papilio Agave. Borkh. *Pap. Eur. part. 1. p. 102. n°. 43. — part. 2. p. 210.*

Papilio Agave. Hubn. *Pap. tab. 30. fig. 139. 140.* (Fem.)

Papilio Hippolyte. Herbst, *Pap. tab. 211. fig. 3. 4.*

Papilio Hippolyte. Schneid. *Syſt. Beſchr. p. 87. n°. 30.*

Papilio Hippolyte. Ochsenh. *Pap. Eur. tom. 1. p. 206. n°. 20.*

L'Hippolyte. Engram. *Pap. d'Europe, tom. 1. p. 332. pl. 8. 3°. Suppl. fig. 36. a. b.*

Il a de très-grands rapports avec le *Sémélé*. Mais ce qui l'en diſtingue, c'eſt que la bande jaune du deſſus des ailes eſt mieux détachée du fond & bordée de noir; qu'elle eſt droite & preſque continue aux ſupérieures; qu'elle n'a aucune tache, du moins bien diſtincte, aux inférieures; que le deſſous de celles-ci eſt dépourvu de bande blanche anguleuſe; que le deſſous de celles-là, à l'exception des bords qui ſont bruns, eſt partout d'un jaune-pâle & en outre coupé tranſverſalement par des lignes noires, ondulées.

Il habite les lieux très-élevés des parties les plus méridionales de la Ruſſie.

N. B. On ne doit pas le confondre avec cet *Hermione* variété, dont quelques auteurs ont, comme nous l'avons dit, fait une eſpèce à part, ſous le nom d'*Alcyone*.

113. Satyre Aréthuſe.

Satyrus Arethuſa.

Sat. alis dentatis, ſuprà fuſcis, faſciâ maculari fulvâ ocello cæco : poſticis ſubtùs cinereo fuſcoque marmoratis, faſciâ albidâ recurvâ.

Papilio S. Arethuſa, *alis dentatis, ſuprà fuſcis faſciâ maculari rufâ : anterioribus utrinquè ocello unico.* Fab. *Mant. Inſ. tom. 2. p. 39. n°. 401. — Ent. Syſt. em. tom. 3. pars 1. p. 232. n°. 726.*

Papilio Arethuſus. Herbst, *Pap. tab. 206. fig. 3-6.*

Papilio Arethuſa. Wien. *Verz. p. 169. fam. F. n°. 16.*

Illig. *N. Aufg. Deſſ. tom. 2. p. 196. n°. 16.*

Illig. *Magaz. tom. 3. p. 186. — tom. 5. p. 182.*

Papilio Arethuſa. Esp. *Pap. part. 1. tab. 69. cont. 19. fig. 3. 4.*

Papilio Arethuſa. Borkh. *Pap. Eur. part. 1. p. 99 & 244. n°. 39. — part. 2. p. 208.*

Schneid. *Syſt. Beſchr. p. 87. n°. 29.*

Papilio Arethuſa. Hubn. *Pap. tab. 34. fig. 154. 155.*

Papilio Arethuſa. Ochsenh. *Pap. Eur. tom. 1. p. 208. n°. 21.*

Le petit Agreſte. Engram. *Pap. d'Europe, tom. 1. p. 77. pl. 22. fig. 39. a. b. c.*

Le Mercure. Engram. *Pap. d'Europe, tom. 1. p. 258. pl. 64. Suppl. 10. fig. 38. a. b. bis.*

Il eſt un peu plus petit que le *Sémélé*. Ses quatre ailes ſont foiblement dentées, d'un brun-obſcur en deſſus, avec une bande fauve poſtérieure & maculaire, offrant vis-à-vis du ſommet des ſupérieures & près de l'angle anal des inférieures un œil noir ſans prunelle.

Le deſſous des premières ailes eſt d'un roux plus ou moins vif, avec les bords obſcurs & entrecoupés de noirâtre, ſurtout l'antérieur; plus un œil noir à prunelle blanche, correſpondant à celui de la ſurface oppoſée.

Le deſſous des ſecondes ailes eſt cendré, piqué de brun, avec une bande blanchâtre, tranſverſe, diſcoïdale, courbe en arrière, un peu ſinuée en avant, & précédée en dehors d'un petit œil noir à prunelle blanche. Les échancrures du bord poſtérieur ſont blanchâtres, & le corps eſt de chaque côté de la même couleur que les ailes inférieures.

Il habite la Ruſſie, la Hongrie, le midi de l'Allemagne & pluſieurs contrées de la France. On le trouve communément, au mois d'août, dans les forêts de Senart, de Fontainebleau, & près de Verſailles.

N. B. Les femelles ont quelquefois deux yeux ſur chaque ſurface des premières ailes. On voit

au contraire des mâles, comme le *Mercure* d'Engramelle, qui n'en ont pas aux fecondes ailes.

114. Satyre Autonoé.

Satyrus Autonoe.

Sat. alis dentatis, fuprà fufcis, fufcià flavefcente : anticarum utrinquè biocellatâ : poſticis fubtùs nebuloſis, venis ſtrigiſque aliquot albidis.

Papilio S. Autonoe, *alis dentatis, fuſcis, flavo ſubfaſciatis ocelliſque duobus pupillatis : anticis ſubtùs baſi fuſcis.* Fab. *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 38. *n°.* 598. — *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 231. *n°.* 723.

Papilio Autonoe. Esp. *Pap. part.* 1. *tab.* 86. *cont.* 36. *fig.* 1-2. 3.

Papilio Autonoe. Herbst, *Pap. tab.* 212. *fig.* 1-6.

Papilio Autonoe. Borkh. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 103. — *part.* 2. *p.* 210. *n°.* 45.

Papilio Autonoe. Schneid. *Syſt. Beſchr. p.* 94. *n°.* 35.

Papilio Autonoe. Illig. *Magaz. tom.* 3. *p.* 187.

Papilio Autonoe. Hubn. *Pap. tab.* 30. *fig.* 137. 138. (Fem.)

Papilio Autonoe. Ochsenh. *Pap. Eur. tom.* 1. *p.* 177. *n°.* 6.

Jon. *Fig. pict.* 4. *tab.* 47. *fig.* 2.

L'Icare. Engram. *Pap. d'Europe, tom.* 1. *p.* 333. *pl.* 8. 3e. *Suppl. fig.* 40. a. b. *bis.*

Il eſt approchant de la taille du *Sémélé*. Le deſſus des ailes eſt d'un brun-obſcur, avec une bande jaunâtre, poſtérieure & tranſverſe. La bande des premières ailes eſt plus prononcée & chargée de deux yeux noirs à prunelle blanche, & aſſez éloignés l'un de l'autre. Celle des fecondes ailes offre, près de l'angle de l'anus, un œil beacoup plus petit, qu'accompagnent quelquefois deux points blancs extérieurs.

Le deſſous des premières ailes reſſemble au deſſus, excepté que le diſque eſt rouſſâtre.

Le deſſous des fecondes ailes eſt cendré, piqué de brun, avec des veines blanchâtres, longitudinales, & trois raies tranſverſes de cette couleur. On y retrouve en outre le petit œil de la ſurface oppoſée. Le bord de chaque aile eſt dentelé & ciſié de blanc.

Des bords du Volga.

N. B. La phraſe ſpécifique de Fabricius pourroit faire croire que le milieu des ailes ſupérieures eſt obſcur, tandis qu'il eſt rouſſâtre.

115. Satyre Aello.

Satyrus Aello.

Sat. alis dentatis, fuprà fufcefcenti-luteis, faſciâ dilutiore : anticis utrinquè (fem.) *punctis duobus ocellatis, ſubtùs* (mas) *unico : poſticarum pagmâ inferiori fuſco cinereoque marmoratâ, venis albidis.*

Papilio N. Ph. Aello, *alis fuſcis, limbo lato fulvefcente : ſuperioribus vittâ longitudinali crenatâ nigricante, ocello apicis cœco altero ve minori anguli poſtici : inferioribus fuprà ocellis duobus ad angulum ani, ſubtus punctis ſtrigiſque numeroſis, venis albis.* Esp. *Pap. part.* 1. *p.* 109. *tab.* 115. *cont.* 70. *fig.* 1.

Papilio Aello. Illig. *Magaz. tom.* 3. *p.* 184.

Papilio Aello. Hubn. *Pap. tab.* 51. *fig.* 141. 142. (Fem.)

Papilio Aello. Hubn. *Pap. tab.* 102. *fig.* 519. 520. (Mas.) *fig.* 521. (Var. fem.)

Papilio Aello. Ochsenh. *Pap. Eur. tom.* 1. *p.* 199. *n°.* 16.

Il eſt à peu près de la taille du précédent. Ses ailes ſont dentelées, avec les échancrures d'un blanc-grifâtre. Leur deſſus eſt d'un jaune plus ou moins obſcur, ſuivant le ſexe, avec une bande poſtérieure un peu plus claire, ſur laquelle le mâle offre à chaque aile deux points blancs bordés de noirâtre, & la femelle deux points ſemblables aux ailes de devant, un ſeul à celles de derrière.

Le deſſous des premières ailes eſt de la couleur du deſſus, avec l'angle & le bord poſtérieur marbrés de brun & de gris, & un point oculaire dans le mâle, deux dans la femelle.

Le deſſous des ſecondes ailes eſt cendré, aſpergé de brun-obſcur, avec les nervures blanchâtres, & un point oculaire près de l'angle de l'anus.

Des Alpes & du Tyrol.

116. Satyre Norna.

Satyrus Norna.

Sat. alis dentatis, ſuprà fuſcefcenti-luteis, faſciâ dilutiore : anticis utrinquè (mas) *punctis duobus ocellatis,* (fem.) *tribus : poſticis ſubtùs albido cinereoque marmoratis, faſciâ fuſcâ, ſinuatâ, mediâ.*

Papilio Norna, *alis cinereo-flavefcentibus : poſticis ſubtùs fuſco marmoratis.*

Var. α. *Alæ anticæ ſuprà punctis ſeſquitertiis, ſubtùs ocellis tribus minutis ; poſticæ ſuprà puncto, ſubtùs ocello unico.*

Var. β. *Alæ anticæ ſuprà punctis duobus, ſubtùs ocellis totidem ; poſticæ abſque punctis & ocellis.* Thunberg, *Diſſert. Acad. tab.* 5. *fig.* 11.

Papilio Norna. Ochsenh. *Pap. Eur. tom.* 1. *p.* 201. *n°.* 17.

Papilio Celæno. Hubn. *Pap. tab.* 30. *fig.* 142. (Fem.)

Papilio Celæno. Hubn. *Pap. tab.* 34. *fig.* 152. 153. (Mas.)

Papilio Jutta. Hubn. *Pap. tab.* 120. *fig.* 614. 615.

Papilio Hilda. Schneid. *Ent. Magaz.* 4. *p.* 414. *n°.* 5.

Papilio Norna. Schneid. *Ent. Magaz.* 5. *p.* 586.

Il eſt abſolument de la taille & de la couleur de l'*Aello*. Mais il s'en diſtingue par le nombre des points oculaires & par le deſſous des ailes inférieures. Le mâle a de part & d'autre deux de ces points aux ailes ſupérieures, & la femelle trois, dont l'intermédiaire plus petit. Les ſecondes ailes des deux ſexes n'en offrent qu'un, encore manque-t-il quelquefois. Le deſſous de ces dernières n'a pas de veines blanchâtres, du moins bien prononcées, & le milieu de la ſurface eſt traverſé par une bande plus obſcure que le fond, & ſinuée ſur les côtés.

Telles ſont les différences que nous a fournies la comparaiſon de pluſieurs individus de l'un & de l'autre ſexe. Elles s'accordent bien avec ce que Thunberg dit de ce ſatyre dans ſes *Diſſertations académiques*.

Du nord de la Laponie.

117. Satyre Fortunatus.

Satyrus Fortunatus.

Sat. alis teneris, denticulatis, flaveſcenti-griſeis, margine poſtico extùs nigro punctato : poſticis ſubtùs atomis ſtrigiſque duabus undulatis fuſcis.

Papilio S. Fortunatus, *alis integris, fuſcis : poſticis ſubtùs albo nigroque marmoratis.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 214. *n°.* 670.

Papilio Bore, *alis rotundatis, pallidè ochreaceis, atomis fuſcis : inferioribus utrinquè faſciis nebuloſis nigricantibus.* Esp. *Pap. part.* 1. *tab.* 100. *cont.* 55. *fig.* 1.

Papilio Bore. Esp. *Pap. part.* 1. *tab.* 108. *cont.* 63. *fig.* 1.

Papilio Bore. Hubn. *Pap. tab.* 29. *fig.* 134. (Mas.) *fig.* 135. 136. (Fem.)

Papilio Bore. Ochsenh. *Pap. Eur. tom.* 1. *p.* 205. *n°.* 19.

Illig. *Magaz. tom.* 3. *p.* 188.

Papilio Norna, *alis dentatis, ſuprà griſeo-teſtaceis, fuſco marginatis : poſticis ſubtùs faſciatis marmoratiſque.* Schneid. *Magaz.* 4. *p.* 415. *n°.* 4.

Il n'a guère que deux pouces d'envergure. Ses ailes ſont minces, légèrement dentées, d'un griſ-jaunâtre en deſſus, avec les échancrures blanchâtres & ſéparées par de petits points noirâtres.

Le deſſous des ailes ſupérieures eſt à très-peu de choſe près ſemblable au deſſus.

Le deſſous des ailes inférieures eſt griſâtre, avec des atomes d'un brun-obſcur, épars ſur toute la ſurface, mais plus ſerrés à la baſe & formant ſur le milieu deux raies tranſverſes, parallèles, ondulées & un peu viſibles du côté oppoſé. Le corps eſt de la couleur des ailes. Les antennes ſont noirâtres, avec le bout de la maſſue jaunâtre.

Il ſe trouve en Laponie.

118. Satyre Tarpéius.

Satyrus Tarpeius.

Sat. alis integris, ſuprà fuſceſcenti-luteis : omnibus utrinquè ſerie punctorum 4-5 nigrorum : poſticis ſubtùs nebuloſis, faſciâ repandâ obſcuriore veniſque albidis.

Papilio S. Tarpeius, *alis integris, fulvis : omnibus ocellis quatuor cœcis.* Fab. *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 32. *n°.* 338. — *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 214. *n°.* 669.

Papilio Tarpeia, *alis flaveſcenti-fuſcis, utrinquè ſerie punctorum nigrorum, ſubtùs ſubpupillatis ; inferioribus nebuloſis.* Esp. *Pap. part.* 1. *tab.* 83. *cont.* 33. *fig.* 1. 2.

Papilio Tarpeius. Herbst, *Pap. tab.* 213. *fig.* 5-8.

Papilio Tarpeia. Borkh. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 101. *n°.* 41. — *part.* 2. *p.* 209.

Papilio Tarpeia. Ochsenh. *Pap. Eur. tom.* 1. *p.* 205. *n°.* 18.

Papilio Celamene. Cram. *Pap. pl.* 375. *fig.* E. F.

Il eſt de la taille du *Fortunatus*. Le deſſus des ailes eſt d'un fauve-obſcur, avec le bord terminal brun & précédé d'un rang de gros points noirs, au nombre de quatre ſur chaque aile, & quelquefois de cinq ſur les inférieures.

Le deſſous des premières ailes reſſemble au deſſus, mais le fond eſt plus pâle & le ſommet légèrement rayé de gris.

Le deſſous des ſecondes ailes eſt cendré, moucheté de brun, avec une bande plus obſcure, diſcoïdale, ſinuée, & des veines blanchâtres, longitudinales, qui ſe dilatent ſur les côtés de la bande ſuſdite. Les points de la ſurface oppoſée ſe reproduiſent ici, mais ils ſont moins noirs & preſque oculaires.

Il habite les bords du Volga.

119. Satyre Phrynéus.

Satyrus Phryneus.

Sat. alis teneris, integris, suprà luteis, immaculatis : subtùs fuscis, venis argenteo-candidis fasciâque pallidâ ocellis 5-6.

Papilio S. Phryneus, *alis integerrimis, supra albis : subtùs fuscis, albo venosis, ocellis quinque.* Fab. *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 55. *n°.* 354. — *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 222. *n°.* 697.

Papilio Phryne. Pallas, *Voy. part.* 1. *p.* 572. *n°.* 60.

Papilio Phryne. Esp. *Pap. part.* 1. *tab.* 89. *fig.* 3. 4.

Papilio Phryne. Esp. *Pap. part.* 1. *tab.* 113. *cont.* 68. *fig.* 6.

Papilio Phryneus. Herbst, *Pap. tab.* 213. *fig.* 1-4.

Papilio Tircis. Herbst, *Pap. tab.* 183. *fig.* 7. 8.

Papilio Phryne. Borkh. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 108 & 246. *n°.* 52. — *part.* 2. *p.* 211.

Papilio Phryne. Hubn. *Pap. tab.* 44. *fig.* 200. 201.

Papilio Phryne. Ochsenh. *Pap. Eur. tom.* 1. *p.* . *n°.* .

Phryne. Engram. *Pap. d'Europe, tom.* 1. *p.* 333. 5e. *Suppl. fig.* 58. a. b. *bis.*

Il n'a guère que quinze lignes d'envergure. Ses ailes sont très-minces, entières, d'un blanc de lait & sans taches en dessus, avec une frange à peine cendrée.

Le dessous est d'un brun-obscur, avec un trait discoïdal & de larges veines d'un blanc-argenté. Indépendamment de cela, il y a vers l'extrémité une bande pâle, chargée d'yeux noirs à prunelle blanche, lesquels sont au nombre de cinq & un peu plus grands sur les ailes supérieures, au nombre de cinq ou de six, dont l'anal très-petit, sur les ailes inférieures. Le corps est blanc, avec la partie antérieure du corselet brunâtre.

Il se trouve en Russie, sur les bords du Volga. Pallas dit qu'il ne l'a rencontré qu'auprès de *Syfrane.*

120. Satyre Fidia.

Satyrus Fidia.

Sat. alis dentatis, fuscis, virescenti-micantibus : anticis ocellis duobus utrinque pupillatis punctisque totidem albis intermediis : posticis subtùs fusco alboque variis, strigâ sesquialterâ nigrâ, flexuosâ.

Papilio N. Fidia, *alis dentatis, supra fuscis, cœruleo micantibus : anterioribus ocellis duobus punctisque duobus albis.* Linn. *Syst. Nat.* 2. *p.* 770. *n°.* 138.

Papilio S. Fidia, *alis dentatis, supra fuscis : anticis ocellis duobus punctisque duobus albis : posticis subtùs strigâ angulatâ atrâ.* Fab. *Syst. Entom. p.* 491. *n°.* 209. — *Spec. Inf. tom.* 2. *p.* 71. *n°.* 317. — *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 55. *n°.* 370. — *Entom. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 225. *n°.* 706.

Papilio Fidia. Herbst, *Pap. tab.* 199. *fig.* 5. 6.

Papilio Fidia. Esp. *Pap. part.* 1. *tab.* 49. *Suppl.* 25. *fig.* 3.

Papilio Fidia. Devillers, *Ent. Linn. tom.* 2. *p.* 22. *n°.* 31. *tab.* 4. *fig.* 8.

Borkh. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 72 & 233. *n°.* 10. — *part.* 2. *pag.* 201.

Illig. *Magaz. tom.* 3. *p.* 193.

Schneid. *Syst. Beschr. p.* 98. *n°.* 39.

Rossi, *Mant. tom.* 2. *p.* 9. *n°.* 345.

Papilio Fidia. Hubn. *Pap. tab.* 52. *fig.* 147. (Mas.) 148. (Fem.)

Papilio Fidia. Ochsenh. *Pap. Eur. tom.* 1. *p.* 179. *n°.* 7.

Le Faune. Engram. *Pap. d'Europe, tom.* 1. *p.* 75. *pl.* 21. *fig.* 37. c. d.

Il a environ deux pouces & un quart d'envergure. Les quatre ailes sont dentelées, avec les échancrures des supérieures & le bord entier des inférieures ciliés de blanc de part & d'autre. Leur dessus est d'un brun-obscur, légèrement glacé de verdâtre. Celui des inférieures offre, vers le bout, deux yeux noirs à prunelle blanche, & séparés par deux points de cette dernière couleur. Le dessus des ailes inférieures a, non loin du bord terminal, une ligne arquée de quatre ou cinq points blanchâtres, dont le postérieur ocellé ou entouré de noir.

Le dessous des premières ailes diffère du dessus, en ce que le fond est plus pâle; en ce que les deux yeux ont un iris jaunâtre & qu'ils sont précédés intérieurement d'une bande blanche, transverse, étroite, anguleuse, bordée de noirâtre du côté de la base & un peu sensible en dessus; en ce qu'il y a sur le milieu du bord d'en haut deux traits noirâtres, transversaux, dont l'intérieur droit, l'extérieur presqu'en *S.*

Le dessous des secondes ailes est varié de brun-cendré & de blanc, & l'on voit sur son milieu deux lignes noires, transversales & flexueuses, dont l'intérieure beaucoup plus courte. Au point oculaire de la surface opposée correspond ici un point semblable. Le corps est de la couleur des ailes. Les antennes sont noirâtres en dessus, cendrées en dessous.

Il est très-commun, au mois de juillet, en Italie, en Portugal & dans le midi de la France.

121. Satyre Fauna.

Satyrus Fauna.

Sat.

Sat. alis dentatis, fuscis, virescenti-micantibus : anticis ocellis duobus supra cœcis punctisque totidem albis intermediis : posticis subtùs cinereis, strigâ sesquialterâ fuscâ, flexuosâ, fasciâque media albicante.

Papilio S. Fauna, *alis dentatis, suprà fuscis : anticis ocellis duobus punctisque duobus albis : posticis subtùs griseis.* Fab. *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 85. *n°.* 371. — *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 226. *n°.* 739.

Papilio N. Allionia, *alis dentatis, fuscis : anticis subtùs ocellis duobus, posteriori cæco.* Fab. *Spec. Inf. tom.* 2. *p.* 83. *n°.* 366. — *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 45. *n°.* 442. — *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 104. *n°.* 522.

Papilio Fauna. Sulz. *Inf. tab.* 17. *fig.* 8. 9.

Papilio Fauna. Panz. *Faun. Germ.* 34. 23.

Papilio Fauna. Esp. *Pap. part.* 1. *tab.* 29. *Suppl.* 5.

Papilio Fauna. Esp. *Pap. part.* 1. *tab.* 63. *cont.* 13. *fig.* 7.

Papilio Fidia, var. Esp. *Pap. part.* 1. *tab.* 52. *fig.* 4.

Papilio Arachne. Esp. *Pap. part.* 1. *tab.* 95. *cont.* 50. *fig.* 2. 3.

Papilio Allionia. Esp. *Pap. part.* 1. *tab.* 105. *cont.* 60. *fig.* 4.

Papilio Arachne. Wien. *Verz.* p. 169. *fam.* F. *n°.* 18.

Papilio Fauna. Illig. *Magaz. tom.* 1. *p.* 450. — *tom.* 3. *p.* 193. — *tom.* 4. *p.* 30 & 34.

Illig. *N. Ausg. Deff. tom.* 2. *p.* 192. *n°.* 18.

Papilio Fauna. Borkh. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 72 & 233. *n°.* 11. — *part.* 2. *p.* 201.

Papilio Allionia. Borkh. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 84. *n°.* 22.

Papilio Arachne. Borkh. *Rhein. Magaz. tom.* 1. *p.* 250. *n°.* 37.

Papilio Fauna. Schneid. *Syst. Beschr. p.* 96. *n°.* 37.

Papilio Fauna. Rossi, *Mant. tom.* 2. *p.* 10. *n°.* 346.

Bergstr. *Nomencl. tab.* 132. *fig.* 3. 4.

Fuessl. *Magaz. tom.* 1. *part.* 2. *p.* 204.

Papilio Arachne. Lang. *Verz.* 2. *p.* 23. *n°s.* 161-164.

Papilio Fidia. De Prunn. *Lepid. Pedem. p.* 72. *n°.* 145.

Papilio Allionia. De Prunn. *Lepid. Pedem. p.* 72. *n°.* 146.

Papilio Adrast. De Villers, *Ent. Linn. tab.* 4. *fig.* 9.

Papilio Fauna. Hubn. *Pap. tab.* 32. *fig.* 145. 146.

Papilio Fauna. Hubn. *Pap.* 100. *fig.* 507-511.

Papilio Allionia. Cyrill. *Entom. Neap.* 1. *tab.* 2. *fig.* 13.

Papilio Fidia, mas. Herbst, *Pap. tab.* 200. *fig.* 1. 2.

Papilio Statilinus. Herbst, *Pap. tab.* 200. *fig.* 5-6.

Papilio Allionius. Herbst, *Pap. tab.* 201. *fig.* 5. 6.

Papilio Statilinus. Naturf. 6. *p.* 13. *n°.* 52.

Papilio Statilinus. Hunaf. *Magaz. tom.* 2. *p.* 84.

Papilio Allionia. Ochsenh. *Pap. Eur. tom.* 1. *p.* 181. *n°.* 8.

Papilio Statilinus. Ochsenh. *Pap. Eur. tom.* 1. *p.* 184. *n°.* 9.

Le Faune (& *par correctif* Coronis). Engram. *Pap. d'Europe, tom.* 1. *p.* 75. *pl.* 21. *fig.* 37. a. b.

Le Faune. Engram. *Pap. d'Europe, tom.* 1. *p.* 255. *pl.* 63. *Suppl.* 9. *fig.* 37. e. f.

L'Arachné. Engram. *Pap. d'Europe, tom.* 1. *p.* 257. *pl.* 63. *Suppl.* 9. *fig.* 37. a. b. c. *bis.*

Le satyre *Fauna* & la nymphale *Allionia* de Fabricius ne font qu'une seule espèce à laquelle se rapportent le *Coronis* & l'*Arachné* d'Engramelle.

Cette espèce ressemble beaucoup au *Fidia*, mais elle est ordinairement plus petite ; les cils du bord terminal de ses quatre ailes sont gris & non d'un beau blanc ; les deux yeux du dessus des premières ailes & l'œil postérieur de leur dessous sont sans prunelle ; le dessous des secondes ailes, au lieu d'être panaché de brun & de blanc, est cendré, finement piqué de brun-obscur, & traversé dans son milieu par une bande blanchâtre, que borde du côté de la base la plus longue des deux lignes noires flexueuses. Cette bande est plus prononcée dans les individus du midi de l'Europe que dans ceux du nord, & c'est la seule différence réelle qu'il y ait entre le *Fauna* & l'*Allionia* de Fabricius, ou si l'on veut entre le *Coronis* & l'*Arachné* d'Engramelle.

Commune, au mois d'août, dans les environs de Paris, & particulièrement au bois de Boulogne. Elle aime les lieux arides.

122. Satyre Cordula.

Satyrus Cordula.

Sat. alis subdentatis, suprà fuscis, fasciâ rufâ, obsoletâ : anticarum utrinquè ocellis duobus pupillatis punctisque totidem albis intermediis : posticis subtùs cinereis fasciâ margineque postico albidis, punctis duobus atris ad angulum ani interpositis.

Papilio S. Cordula, *alis dentatis, fuscis : utrinquè anticis ocellis duobus punctisque duobus albis ; posticis punctis duobus atris.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 226. *n°.* 708.

Papilio Cordula. Ochsenh. *Pap. Eur. tom.* 1. *p.* 190. *n°.* 12.

Papilio Cordula. Hubn. *Pap. tab.* 121. *fig.* 619. 620. (La femelle.)

Papilio Peas. Hubn. *Pap. tab.* 29. *fig.* 132. 133. (La femelle.)

Papilio Peas. Esp. *Pap. part.* 1. *tab.* 112. *cont.* 67. *fig.* 1.

Papilio Peas. De Prunner, *Lepid. Pedem. p.* 70. *n°.* 137.

Illig. *Magaz. tom.* 3. *p.* 200. — *tom.* 5. *p.* 180.

Papilio Cyrillus. Herbst, *Pap. tab.* 206. *fig.* 1. 2.

Papilio Proserpina. Cyrill. *Ent. Neap.* 1. *tab.* 2. *fig.* 11.

Il a le port & la taille du *Fidia*. Ses ailes sont légèrement dentées. Leur deſſus eſt d'un brun-noirâtre, chatoyant, avec une bande rouſſe, poſtérieure, peu prononcée, offrant aux ſupérieures deux grands yeux noirs à prunelle blanche, entre leſquels ſont deux points blancs ; & , vers l'angle anal des inférieures, un œil ſemblable à ceux dont nous venons de parler, mais très-petit.

Le deſſous des premières ailes eſt d'un jaune-rouſſâtre, plus foncé dans le mâle que dans la femelle, avec la baſe & les bords obſcurs. On y retrouve les deux yeux & les deux points de la ſurface oppoſée.

Le deſſous des ſecondes ailes eſt cendré, avec deux bandes blanchâtres, dont l'extérieure marginale & ſéparée de la précédente par deux points noirs, peu diſtans du bord interne. Le corps eſt de part & d'autre de la même couleur que le fond des ailes. Les antennes ſont brunâtres.

Il habite l'Italie, le Piémont & le midi de la France.

123. Satyre Bryce.

Satyrus Bryce.

Sat. alis integris, fuscis : anticis utrinquè ocellis duobus atris punctisque totidem albis intermediis : posticis subtùs fasciis duabus griseis, angustatis.

Papilio N. G. Actæa, *alis repandis, suprà fuscis : anticis ocellis duobus punctisque duobus albis : posticis subtùs marmoratis.* Fab. *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 35. *n°.* 369.

Papilio S. *Actæa.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 225. *n°.* 705.

Papilio S. Ferula, *alis repandis, nigris : subtùs anticis ocellis duobus, posticis fasciâ cinereâ.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 225. *n°.* 707. (An var. ?)

Papilio Actæa. Var. (Fem.) Esp. *Pap. part.* 1. *tab.* 85. *cont.* 35. *fig.* 4.

Illig. *Magaz. tom.* 3. *p.* 188.

Papilio Bryce. Hubn. *Pap. tab.* 33. *fig* 149. 150.

Papilio Bryce. Ochsenh. *Pap. Eur. tom.* 1. *p.* 188. *n°.* 11?

Papilio Hippolythus. Herbst, *Pap. tab.* 201. *fig.* 3. 4.

Il a le port & à peu près la taille du *Fidia*. Le mâle eſt d'un brun preſque noir & jetant un petit reflet violet. La femelle eſt moins foncée, mais également chatoyante. Celle-ci a de part & d'autre aux premières ailes, & le mâle auſſi le plus ſouvent, deux yeux très-noirs, dont l'antérieur plus gros, & entouré d'un iris jaunâtre mieux prononcé en deſſous qu'en deſſus. Ces yeux ſont ſéparés par deux points blancs, & ils ont chacun une prunelle de cette couleur.

Le deſſus des ſecondes ailes n'offre aucune tache. Leur deſſous eſt cendré, piqué de noirâtre, & traverſé entre le milieu & le bord terminal par deux bandes griſâtres, étroites, un peu ſinuées, tantôt plus, tantôt moins diſtinctes.

Le deſſous des premières ailes a ſur la côte des lignes noires, tranſverſes & flexueuſes, dont les antérieures très-courtes, deux des poſtérieures deſcendant juſqu'au bord interne & embraſſant les yeux.

Le corps & les antennes ſont du même brun que les ailes.

On avoit cru juſqu'à préſent que ce ſatyre étoit excluſivement propre à la Ruſſie. Nous avons la certitude qu'il habite auſſi la France ; car M. Duponchel, amateur que nous aurons ſouvent occaſion de citer pour la juſteſſe de ſes obſervations, a pris dans la Lozère pluſieurs ſujets des deux ſexes.

Nota. Le *Ferula* de Fabricius doit-il être cité comme une variété du *Bryce* ? Il n'en diffère que parce qu'il a un point ocellé à l'angle anal des ſecondes ailes.

124. Satyre Actæa.

Satyrus Actæa.

Sat. alis integris, fuscis : anticis utrinquè

(mas) *ocello unico*, (fem.) *duobus, interpositis totidem punctis albis & in mare tantummodò subtùs conspicuis : posticis subtùs fasciis duabus albis, crenatis, anteriore latiori, vividiore.*

Papilio N. G. Actæa, *alis subdentatis, fuscis, raro micantibus : primoribus utrinquè ocello punctisque subtùs duobus albis : inferioribus subtùs nebulosis fasciisque duabus crenatis.* Esp. *Pap. part.* 1. *tab.* 57. *cont.* 7. *fig.* 1. a. (Mas.) *fig.* 1. b. (Fem.)

Papilio Actea. Hubn. *Pap. tab.* 33. *fig.* 151. 152. (Mas.)

Papilio Actæa. Hubn. *Pap. tab.* 119. *fig.* 610. 611. (Fem.)

Papilio Actæa. Borkh. *Pap. Eur. part.* 1. *tab.* 98. *n°.* 38. — *part.* 2. *p.* 208.

Papilio Actæa. Schneid. *Syst. Beschr. p.* 97. *n°.* 38.

Papilio Actæa. De Villiers, *Ent. Linn. tom.* 2. *p.* 36. *n°.* 54. *tab.* 4. *fig.* 9.

Papilio Actæa. Ochsenh. *Pap. Eur. tom.* 1. *p.* 195. *n°.* 13.

Papilio Actæus. Herbst, *Pap. tab.* 201. *fig.* 1. 2.

Bergstr. *Nomencl. tab.* 131. *fig.* 3-6.

L'Actéon. Engram. *Pap. d'Europe, tom.* 1. *p.* 256. *pl.* 63. *Suppl.* 9. *fig.* 37. g. h.

Engram. *Pap. d'Europe, tom.* 1. *p.* 303. *pl.* 81. 2e. *Suppl. pl.* 2. *fig.* 37. a-d. *bis.*

Il a de très-grands rapports avec le *Bryce*, mais il eſt un peu plus petit. Le mâle n'a de part & d'autre qu'un ſeul œil aux premières ailes, & cet œil n'eſt ſuivi de deux points blancs qu'en deſſous. Dans l'un & dans l'autre ſexe, les deux bandes du deſſous des ſecondes ailes ſont blanches, notamment l'antérieure, qui eſt en outre plus large & qui a le côté interne crénelé, au lieu de l'avoir un peu ſinué comme dans le *Bryce*.

La femelle eſt toujours moins foncée que le mâle.

Il habite l'Italie & les parties méridionales de la France. M. Marchand l'a trouvé aux environs de Chartres, & M. l'abbé Dubois, dans la forêt d'Orléans. Il a été pris auſſi près de Crécy (Seine & Marne).

125 Satyre Podarcé.

Satyrus Podarce.

Sat. alis integris, fuscis : anticis utrinquè (mas) *ocello unico*, (fem.) *duobus, interpositis totidem punctis albis & in mare tantummodò subtùs conspicuis : posticis subtùs fasciis duabus transversis venisque albis.*

Papilio Podarce, *alis subdentatis, fuscis : anticis utrinquè ocello punctisque subtùs duobus albis ; posticis suprà immaculatis, subtùs albo fuscoque marmoratis fasciâ crenatâ concolore albo marginatâ venisque albis.* Ochsenh. *Pap. Eur. tom.* 1. *p.* 195. *n°.* 14.

Il diffère du *Bryce* par les mêmes caractères que l'*Actæa*, & en outre par les veines blanches, longitudinales, qu'il a ſur la ſurface inférieure des ſecondes ailes.

Du Portugal.

126. Satyre Phædra (1).

Satyrus Phædra.

Sat. alis dentatis, fuscis : anticis utrinquè ocellis duobus atris pupillâ violaceâ.

Papilio N. Phædra, *alis dentatis, fuscis, concoloribus : anterioribus ocellis duobus violaceis.* Linn. *Syst. Nat.* 2. *p.* 773. *n°.* 150.

Papilio S. *Phœdra.* Fab. *Syst. Ent. p.* 495. *n°.* 227. — *Spec. Inf. tom.* 2. *p.* 78. *n°.* 343. — *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 39. *n°.* 404. — *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 233. *n°.* 729.

Papilio Phœdra. Sulz. *Inf. tab.* 17. *fig.* 10.

Papilio Phœdra. Schœff. *Icon. tab.* 210. *fig.* 1. 2.

Papilio Phœdra. Herbst, *Pap. tab.* 199. *fig.* 1-4.

Papilio Phœdra. Schrank, *Faun. Boïc. tom.* 2. *part.* 1. *p.* 181. *n°.* 1315.

Papilio Phœdra. Rossi, *Faun. Etr. tom.* 2. *p.* 148. *n°.* 1007.

Fuessl. *Suiss. Inf. p.* 29. *n°.* 565.

Papilio Phœdra. Wien. *Verz. p.* 169. *fam.* F. *n°.* 19.

Illig. *N. Aufg. Deff. tom.* 2. *p.* 193. *n°.* 19.

Illig. *Magaz. tom.* 3. *p.* 200.

Klem. *Beytr. tab.* 19. *fig.* 1. 2.

Bergstr. *Nomencl. tab.* 24. *fig.* 1. 4.

Bergstr. *Nomencl. tab.* 32. *fig.* 4. 5.

Lang. *Verz.* 2. *p.* 24. *n°.* 166-173.

Papilio Phœdra. Ochsenh. *Pap. Eur. tom.* 1. *p.* 186. *n°.* 10.

Papilio Phœdra. Hubn. *Pap. tab.* 28. *fig.* 127. (Mas.) 128. 129. (Fem.)

Papilio Phœdra. Borkh. *Rhein. Magaz. tom.* 1. *p.* 245. *n°.* 1.

(1) Cette eſpèce & les ſuivantes, juſqu'à l'*Hypéranthus* inclusivement, ſont connues ſous le nom de *nègres*.

Papilio Phædra. Borkh. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 71 & 231. *n°.* 9.

Papilio Athene. Borkh. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 71 & 231. *n°.* 8.

Papilio Brifeis. Esp. *Pap. part.* 1. *tab.* 6. *fig.* 1.

Papilio Dryas. Esp. *Pap. part.* 1. *tab.* 40. *cont.* 16. *fig.* 1. ?.

Papilio Dryas. Scop. *Ent. Carn. pag.* 153. *n°.* 429.

Papilio Dryas. Schneid. *Syſt. Beſchr. p.* 100.

Le grand Nègre des bois. Engram. *Pap. d'Europe, tom.* 1. *p.* 79. *pl.* 23. *fig.* 40. a-e.

Le grand Nègre des bois. Engram. *Pap. d'Europe, tom.* 1. *p.* 238. *pl.* 64. *Suppl.* 10. *fig.* 40. g. h. (Var.)

Il a de deux pouces à deux pouces & demi d'envergure. Ses ailes ſupérieures ſont foiblement dentées, les inférieures le ſont davantage. Le deſſus des unes & des autres eſt d'un brun plus ou moins noirâtre, ſuivant le ſexe. Les premières, dont le deſſous reſſemble au deſſus, ont, entre le milieu & le bord terminal, deux yeux écartés, d'un noir foncé, avec une prunelle bleuâtre & un iris très-pâle ou preſque nul.

Les ſecondes ailes ſont ſans taches en deſſus dans les femelles; mais dans les mâles, elles ont ſouvent un point oculaire près de l'angle de l'anus. Leur deſſous varie beaucoup : tantôt il eſt abſolument comme le deſſus, & tantôt il eſt traverſé au milieu par une bande blanchâtre, peu prononcée. Quelquefois la moitié poſtérieure eſt plus claire que l'antérieure; dans certains individus, le tout eſt de la même nuance de brun, avec une multitude d'atomes plus foncés. Le corps & les antennes ſont de la couleur des ailes. Celles-ci ont le bout de la maſſue jaunâtre.

La chenille eſt d'un gris-cendré, avec deux rangs de taches noires, dorſales, alongées. Elle vit ſur l'*avoine élevée* ou *fromental* (*avena elatior*).

L'inſecte parfait paroît en juillet & en août dans les grands bois. Il ſe repoſe volontiers ſur la *bruyère commune* (*erica vulgaris*).

N. B. La variété g. h, *pl.* 64, *Suppl.* 10, *fig.* 40, d'Engramelle, a la couleur du fond plus claire; les ailes ſupérieure & inférieure du côté gauche ſont preſqu'entièrement traverſées, en deſſus & en deſſous, par une bande blanchâtre, large, & les taches oculaires de ce côté ſont brunes, avec la prunelle blanche, tandis que ſur les ailes de droite elles ſont comme dans les individus ordinaires. Nous avons pris cette même variété dans les environs d'Auxerre, où l'eſpèce eſt aſſez commune.

127. Satyre Alopé.

Satyrus Alope.

Sat. alis integris, fuſco-nigris : anticis utrinquè fuſciâ ochreaceâ ocellis duobus diſſitis; fine.is ſubtùs undatis; poſticis ocellis ſex, quatuor obſoletis.

Papilio S. Alope, *alis dentatis, fuſcis : anticis utrinquè fuſciâ flavâ ocellis duobus; poſticis ocello ſuprà unico, ſubtùs ſex.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 229. *n°.* 715.

Papilio Alope. Jon. *Fig. pict.* 4. *tab.* 12. *fig.* 1.

Il a un peu plus de deux pouces d'envergure. Le deſſus de ſes ailes eſt d'un noir-obſcur. Leur deſſous eſt plus pâle, & finement ondé de noir. Les premières ont de part & d'autre, parallèlement au bord terminal, une bande d'un jaune-d'ocre, large, courbe en arrière, un peu finuée en avant, n'atteignant ni la côte, ni le bord oppoſé. Cette bande offre, loin l'un de l'autre, deux yeux noirs à prunelle bleuâtre.

Le deſſus des ſecondes ailes a parfois, vers l'angle de l'anus, un petit œil ſemblable aux deux dont il vient d'être queſtion. Leur deſſous a une rangée de ſix yeux, dont les quatre antérieurs, ou bien les deux extrêmes & les deux plus intermédiaires à peine diſtincts. Ces yeux ſont tantôt ſans iris, & tantôt ils en ont un jaunâtre. Le corps eſt de la couleur des ailes. Les antennes ſont annelées de blanc & de noir.

De l'Amérique ſeptentrionale, d'où il a été envoyé au Muſéum d'hiſtoire naturelle par M. le peintre Milbert.

Nota. Fabricius parle d'une ligne noire, placée tranſverſalement ſur la bande jaune des ailes ſupérieures, entre les deux taches oculaires & le bord terminal. L'individu qu'il a décrit étoit probablement une variété, car tous ceux que nous avons vus n'avoient pas cette ligne.

128. Satyre Pégala.

Satyrus Pegala.

Sat. alis dentatis, fuſcis : anticis fuſciâ rufâ ocelloque unico : poſticis ſuprà ocello, ſubtùs ſex. Fab.

Papilio N. G. *Pegala.* Fab. *Syſt. Ent. p.* 494. — *Spec. Inſ. tom.* 2. *p.* 76. *n°.* 338. — *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 38. *n°.* 395.

Papilio S. *Pegala.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 230. *n°.* 720.

Voici ce qu'en dit Fabricius : le corps eſt brun. Les ailes ſupérieures ſont d'un brun-obſcur, avec une large bande rouſſe qui n'atteint point les bords. Elles ont en outre, de part & d'autre, un ſeul œil noir à prunelle blanche.

Le deſſus des ſecondes ailes eſt d'un brun-obſcur, avec un œil noir à prunelle blanche & à iris fauve. Leur deſſous eſt panaché, & l'on y voit ſix yeux, dont trois réunis vers le bord interne, le cinquième très-grand. Ces yeux, que Fabricius dit varier quant au nombre & quant à la forme, ſont d'un noir-foncé, avec la prunelle blanchâtre & l'iris ferrugineux.

De l'Amérique.

129. Satyre Zangis.

Satyrus Zangis.

Sat. alis integerrimis, ſuprà fuſco-nigris: ſubtùs ferrugineis, ſtrigis quatuor nigris; anticis ocello bipupillato, poſticis duobus, anali cæco.

Papilio D. F. Zangis, *alis integerrimis, fuſcis: omnibus ſubtùs ocello, anticarum bipupillato.* Fab. *Syſt. Ent. p.* 486. *n°.* 193. — *Spec. Inſ. tom.* 2. *p.* 65. *n°.* 290. — *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 31. *n°.* 336.

Papilio S. *Zangis.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 218. *n°.* 682.

Papilio Agnes. Cram. *pl.* 325. *fig.* A. B.

Papilio Zangis. Herbst, *Pap. tab.* 203. *fig.* 3. 4.

Il a environ un pouce & demi d'envergure. Le deſſus de ſes ailes eſt d'un noir-brun-velouté, mais un peu plus pâle vers le bout, avec un petit œil très-noir à iris jaunâtre au bas de l'échancrure anale des inférieures. Cette échancrure eſt plus ſenſible que dans les eſpèces qui précèdent & qui ſuivent.

Le deſſous des quatre ailes eſt d'un rouge-ferrugineux, avec quatre lignes noires, tranſverſes & ondulées, dont deux entre la baſe & le milieu, les deux autres près du bord terminal. Indépendamment de ces lignes, les ailes ſupérieures ont, vis-à-vis du ſommet, un grand œil très-noir à iris rouſſâtre & à double prunelle blanche; & les ailes inférieures deux yeux, dont l'anal comme en deſſus, l'autre ſemblable à celui des premières ailes, mais un peu oblong, & ſurmonté de trois points blancs, plus diſtincts dans certains individus que dans d'autres. Le corps eſt de la couleur des ailes.

Des Antilles & de la Caroline.

130. Satyre Servatius.

Satyrus Servatius.

Sat. alis: integerrimis, ſuprà cæruleſcenti-nigris, immaculatis: ſubtùs ferrugineo-fuſcis, ſtrigis quatuor violaceis; anticis ocellis duobus, poſticis ſeptem, 5°. majore.

Papilio Evadne. Cram. *pl.* 222. *fig.* E. F.

Papilio Evadne. Herbst, *Pap tab.* 185. *fig.* 1. 2.

Il a un peu plus d'un pouce & demi d'envergure. Ses quatre ailes ſont entières, d'un noir-violet-luiſant & ſans aucune tache en deſſus.

Leur deſſous eſt d'un brun tirant ſur le ferrugineux, avec quatre lignes violâtres, pâles, tranſverſes & ſinuées, dont deux entre le milieu & la baſe, les deux autres rapprochées du bord terminal & renfermant des yeux très-noirs à prunelle d'un blanc-bleuâtre & à iris d'un jaune-rouſſâtre. Les yeux des premières ailes ſont ſéparés, au nombre de deux, dont le poſtérieur plus grand. Les yeux des ſecondes ailes ſont au nombre de ſept, dont le cinquième double au moins de tous les autres. Le corps eſt de la couleur des ailes. Les antennes ſont annelées de noir & de blanc, & leur maſſue eſt entièrement ferrugineuſe.

Cramer le dit de Sierra-Léone, en Afrique; mais nous le ſoupçonnons de l'Amérique.

Nota. Le deſſus des ſecondes ailes offre près de la baſe un bouquet de poils griſâtres, divergens.

131. Satyre Hyſius.

Satyrus Hyſius.

Sat. alis integerrimis, fuſcis: poſticis ſuprà, anticis utrinque areolâ ferrugineâ ſubterminali: omnibus ſubtùs ſtrigâ griſeâ ocelloque unico, anticarum bipupillato.

Il eſt petit; d'un brun-obſcur en deſſus, avec un eſpace d'un rouge-ferrugineux vers le bord terminal de chaque aile.

En deſſous, ſa couleur eſt la même qu'en deſſus, avec un œil noir à iris jaunâtre & à double prunelle bleuâtre au ſommet des ailes ſupérieures; avec un œil ſemblable, mais à prunelle ſimple, à l'angle anal des inférieures. Celles-ci ont en ſus trois points blancs, alignés entre l'œil & la côte. Les ailes ſupérieures ont l'eſpace rougeâtre du deſſus, & un autre plus grand près de la baſe. Outre cela, les quatre ailes offrent, ſur le milieu, une ligne griſâtre, tranſverſe, ſinuée; &, vers le bout, qui eſt auſſi griſâtre, une ligne noirâtre en feſton.

Sa patrie nous eſt inconnue; mais nous le ſoupçonnons de l'Amérique ſeptentrionale.

132. Satyre Clytus.

Satyrus Clytus.

Sat. alis integerrimis, fuſco-nigris: anticis utrinque faſciâ ochraceâ, biſidâ ocelloſque duos includente: poſticis ſubtùs ocellis binis quinisque.

Papilio D. F. Clytus, *alis integerrimis fuſcis: primoribus faſcia flavâ ocelloque ſubtripupillato; poſticis ocellis quinque.* Linn. *Syſt. Nat.* 2. *p.* 768. *n°.* 124. — *Muſ. Lud. Ulr. p.* 263.

Papilio S. *Clytus*. Fab. *Syſt. Ent. p.* 485. *n°.* 188. — *Spec. Inſ. tom.* 2. *p.* 65. *n°.* 283. — *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 30. *n°.* 327. — *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 214. *n°.* 671.

Papilio Clytus. Esp. *Pap. tab.* 66. *cont.* 16. *fig.* 2. 3. 4.

Papilio Clytus. Herbst, *Pap. tab.* 213. *fig.* 9. 10.

Papilio Clytus. Wulfen, *Deſcrip. Cap. Inſ. p.* 31. *n°.* 30.

Papilio S. Tiſiphone, *alis dentatis, fuſcis : anticis utrinquè ocellis duobus, poſticis ſex pupillâ violaceâ*. Fab. *Gen. Inſ. Mant. p.* 265. — *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 245. *n°.* 737.

Papilio Tiſiphone. Nature. *p.* 16. *n°.* 2. *tab.* 1. *fig.* 1. 2.

Papilio Tiſiphone. Borkh. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 259. *n°.* 21.

Le Héros. Engram. *Pap. d'Europe, tom.* 1. *pl.* 46. a. b.

Fabricius a fait de ce ſatyre deux eſpèces différentes, dont l'une, exotique, ſous le nom de *Clytus ;* l'autre, indigène, ſous celui de *Tiſiphone*. Sa mépriſe vient de ce que le Naturfoscher (le naturaliſte) a, ſur la foi du Père Engramelle, décrit & figuré ce même ſatyre comme propre à l'Allemagne.

Il a environ deux pouces & un quart d'envergure. Ses ailes ſont entières & d'un noir-brun. Les premières ont, vers le bout, une bande d'un jaune-d'ocre pâle, tranſverſe, maculaire, courbe en dehors, atteignant en deſſus la côte & le bord interne, mais ne deſcendant pas en deſſous juſqu'au milieu de la ſurface. Cette bande a de part & d'autre, à ſa partie antérieure, une fiſſure large & profonde dans laquelle ſont deux yeux très-noirs à prunelle bleue.

Le deſſus des ſecondes ailes offre, parallèlement au bord terminal, une rangée de cinq yeux ſemblables, mais dont l'anal plus petit, & pourvu, ainſi que chacun des quatre autres, d'un iris ferrugineux.

Le deſſous des mêmes ailes eſt traverſé, à partir de la baſe, par trois lignes noires, en zig-zag, & bordées de gris ſur un de leurs côtés. Vient enſuite un cordon de ſept yeux, dont deux groupés près du bord antérieur, les cinq autres placés plus bas. Ces yeux reſſemblent à ceux du deſſus ; mais ils ſont tous égaux, leur iris eſt plus pâle, environné d'un cercle gris, & le ſeptième ou l'anal a une double prunelle. Les antennes ſont ferrugineuſes.

Le mâle reſſemble à la femelle, mais il a la bande jaune du deſſus des ailes ſupérieures plus foncée vers le bord interne.

Du Cap de Bonne-Eſpérance.

Nota. Il arrive quelquefois que les ſecondes ailes n'ont que ſix yeux en deſſous : l'œil antérieur manque. C'eſt probablement un individu à ſix yeux, que le *Naturfoſcher* a donné pour ſon *Tiſiphone*.

133. Satyre Caſſus.

Satyrus Caſſus.

Sat. alis integerrimis, fuſco-nigris : anticis utrinquè diſco ferrugineo ocelloque apicis bipupillato ; poſticis ſuprà ocellis 4-5, *ſubtùs* 7 *obſoletis*.

Papilio D. F. Caſſus, *alis integerrimis, fuſcis : primoribus ocello didymo ; poſticis ocellis tribus*. Linn. *Syſt. Nat.* 2. *p.* 768. *n°.* 125. — *Muſ. Lud. Ulr. p.* 269.

Papilio Caſſus. Cram. *pl.* 314. *fig.* C. D.

Papilio Caſſus. Herbst, *Pap. tab.* 204. *fig.* 1. 2.

Il eſt de la taille & de la couleur du précédent, mais il a un reflet bleuâtre en deſſus. Ses ailes ſupérieures ont de part & d'autre le milieu d'un rouge-ferrugineux, & le ſommet précédé d'un grand œil noir à double prunelle blanche. En deſſous, où le rouge s'étend moins vers l'extrémité, cet œil eſt renfermé entre deux lignes tranſverſes, dont l'intérieure noire, l'extérieure d'un cendré-jaunâtre.

Le deſſus des ſecondes ailes offre une rangée courbe & poſtérieure de quatre à cinq yeux noirs à prunelle blanche & à iris d'un rouge-ferrugineux.

Le deſſous des mêmes ailes eſt traverſé dans ſon milieu, d'un bord à l'autre, par deux lignes en zig-zag d'un cendré-jaunâtre, & bordées de noir, la première en avant, la ſeconde en arrière. Aux yeux de la ſurface oppoſée correſpond une ſérie de ſept yeux, dont la prunelle & l'iris ſont de la couleur des lignes tranſverſes ſuſdites.

Du Cap de Bonne-Eſpérance.

Nota. Nous avons vu deux ſujets mâles dont le deſſus des premières ailes n'offre point d'œil au ſommet, mais dont le deſſous eſt abſolument comme dans le commun des individus.

134. Satyre Caſſius.

Satyrus Caſſius.

Sat. alis integerrimis, fuſcis : anticis utrinquè diſco ferrugineo ocelloque apicis bipupillato ; poſticis ſuprà ocellis duobus approximatis, ſubtùs tribus minutis.

Papilio D. F. *Hyperbius*. Fab. *Syſt. Ent. p.* 485. *n°.* 188. — *Spec. Inſ. tom.* 2. *p.* 65. *n°.* 284. — *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 31. *n°.* 328.

Papilio S. *Hyperbius*. Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 215. *n°.* 672.

Papilio Hyperbius. Cram. *pl.* 168. *fig.* C. D. (Le mâle.) *fig.* E. F. (Var. fem.?)

Papilio Hippia. Cram. *pl.* 222. *fig.* C. D. (La femelle.)

Papilio Hyperbius. Herbst, *Pap. tab.* 203. *fig.* 5. 6. (Le mâle.) *fig.* 7. 8. (Var. fem.?)

Papilio Hippius. Herbst, *Pap. tab.* 204. *fig.* 5. 6. (La femelle.)

Fabricius l'a réuni au précédent ſous le nom d'*Hyperbius;* mais il forme bien certainement une eſpèce diſtincte. D'abord il n'a guère qu'un pouce & demi d'envergure; le deſſus de ſes ailes inférieures n'a que deux yeux, placés près de l'angle de l'anus, & ils ont la prunelle bleue dans les deux ſexes, & l'iris jaune dans la femelle; le deſſous des mêmes ailes eſt d'un gris plus ou moins obſcur, avec trois yeux très-petits, dont deux correſpondant à ceux du deſſus, le troiſième avoiſinant la côte ou bord antérieur.

Quelquefois les trois petits yeux dont il vient d'être queſtion manquent dans le mâle.

Du Cap de Bonne-Eſpérance.

135. Satyre Hyperbius.

Satyrus Hyperbius.

Sat. alis integerrimis, ſuſcis, areâ rufâ : anticis ocello bipupillato : poſticis ſubtùs ſeptem punctatis. Linn.

Papilio D. F. *Hyperbius*. Linn. *Syſt. Nat.* 2. *p.* 769. *n°.* 130. — *Muſ. Lud. Ulr. p.* 267.

Papilio Hyperbius, *alis integerrimis nigris, areâ mediâ coffaceo-rufâ : primoribus ocello bipupillato : poſticis ſubtùs ſeptem punctatis.* Wulfen, *Deſcrip. Cap. Inſ. p.* 32. *n°.* 31.

N'ayant point vu ce ſatyre, nous le donnons d'après Linnæus & Wulfen.

Il eſt à peu près de la taille du précédent. Ses ailes ſont entières, d'un noir-brun, avec un eſpace diſcoïdal ferrugineux. Les ſupérieures, dont le deſſous reſſemble au deſſus, ont, vis-à-vis du ſommet, un grand œil noir à double prunelle d'un blanc-bleuâtre.

Les ailes inférieures ſont tantôt ſans yeux en deſſus, & tantôt elles en ont un très-petit près de l'angle de l'anus. Le deſſous de ces mêmes ailes eſt noirâtre, ſaupoudré de gris à la baſe, traverſé au milieu par une ligne arquée de ſept points blanchâtres peu diſtincts, & marqué à l'angle anal d'un petit œil correſpondant à celui de la ſurface oppoſée.

Du Cap de Bonne-Eſpérance.

136. Satyre Gorgé.

Satyrus Gorge.

Sat. alis integris, ſuprà ſuſco-nigris, ſuſcià ferrugineâ : anticis utrinquè ocello didymo, poſticis ſimplici : poſticis ſubtùs cinereis, ſtrigis tribus nigricantibus, undulatis.

Papilio Gorge, *alis ſubdentatis, nigro-ſuſcis, rufo ſuffuſatis : anticis utrinquè ocellis duobus approximatis pupillâ albâ : poſticis ſubtùs atro cinereoque marmoratis faſciatiſque.* Ochsenh. *Pap. Eur. tom.* 1. *p.* 294. *n°.* 61.

Papilio Gorge. Esp. *Pap. part.* 1. *tab.* 119. *cont.* 74. *fig.* 4. (Le mâle.) *fig.* 5. (La femelle.)

Papilio Erynis. Esp. *Pap. part.* 1. *tab.* 121. *cont.* 76. *fig.* 3. (Var.)

Papilio Gorge. Illig. *Magaz. tom.* 3. *p.* 194. — *tom.* 5. *p.* 179.

Papilio Gorge. Hubn. *Pap. tab.* 99. *fig.* 502. 503. (Le mâle.) *fig.* 504. 505. (La femelle.)

Son envergure n'eſt guère que d'un pouce & demi. Ses ailes ſont entières, d'un noir-brun en deſſus, avec une bande ferrugineuſe, poſtérieure, large (ſurtout dans la femelle), offrant au ſommet des premières un double œil noir à prunelle blanche, & vers le ſommet des ſecondes un œil ſimple, très-petit.

Le deſſous des ailes ſupérieures eſt d'une couleur briquetée, mais plus claire à l'endroit de la bande, avec les bords obſcurs & un double œil comme du côté oppoſé.

Le deſſous des ailes inférieures eſt cendré, avec trois lignes noirâtres, flexueuſes, dont une près du bord terminal, les deux autres ſur le milieu de la ſurface. On y voit en outre un petit œil correſpondant à celui du deſſus.

La variété qu'Eſper donne ſous le nom d'*Erynis* eſt ſans yeux de part & d'autre.

Du Tyrol, de la Suiſſe & des Pyrénées.

137. Satyre Manto.

Satyrus Manto.

Sat. alis ſuprà ſuſco-nigris : anticis utrinquè ſuſcià ferrugineâ punctis quatuor atris : poſticis ſubtùs griſeis, ſtrigis tribus nigricantibus, anterioribus undulatis, poſteriore punctiformi.

Papilio S. Manto, *alis ſubdentatis, ſuſcis, punctis ocellaribus, ant. carum quatuor poſticarum tribus : poſticis ſubtùs cinereis, ſuſco-undatis.* Fab. *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 38. *n°.* 597. — *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 231. *n°.* 722.

Papilio S. Erina, *alis dentatis, ſuſcis, ſuſcià maculari fulvâ punctis ocellaribus nigris.* Fab. *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 41. *n°.* 414. — *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 237. *n°.* 759.

Papilio Manto. Wien. *Verz. p.* 169. *fam.* F. *n°.* 15.

Papilio Manto. Illig. *N. Aufg. Deff. tom.* 2. *p.* 190. *n°.* 15.

Papilio Manto. Illig. *Magaz. tom.* 3. *p.* 198.

Papilio Manto. Hubn. *Pap. tab.* 45. *fig.* 107. 108. (Fem.)

Papilio Manto. Hubn. *Pap. tab.* 101. *fig.* 512. 513. (Mas.) *fig.* 514. (Fem.)

Papilio Manto. Ochsenh. *Pap. Eur. tom.* 1. *p.* 296. *n°.* 62.

Papilio Manto. Borkh. *Pap. Eur. part.* 2. *p.* 209. *n°.* 40.

Papilio Zilia. Borkh. *Pap. Eur. part.* 2. *n°s.* 40. 41.

Papilio Pandroſe. Borkh. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 95. *n°s.* 34.

Papilio Aglauros. Borkh. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 95. *n°.* 35. a.

Papilio Pandroſus. Herbst, *Pap. tab.* 202. *fig.* 7. 8.

Papilio Aglauros. Herbst, *Pap. tab.* 203. *fig.* 1. 2.

Papilio Caſtor. Esp. *Pap. part.* 1. *tab.* 67. *cont.* 17. *fig.* 2.

Papilio Pollux. Esp. *Pap. part.* 1. *tab.* 67. *cont.* 17. *fig.* 3.

Papilio Lappona. Esp. *Pap. part.* 1. *tab.* 108. *cont.* 63. *fig.* 3.

Papilio N. G. Lappona, *alis fuſcis; anticis fuſciâ rufâ punctis quatuor nigris; poſticis ſuprà fuſcis, ſubtùs griſeis fuſciâ dentatâ fuſcâ.* Thunb. *Differt. Acad. vol.* 3. *p.* 51. *tab.* 5. *fig.* 6. 6.

Papilio Caſtor. Schneid. *Syſt. Beſchr. p.* 108. *n°.* 49.

Papilio Pollux. Schneid. *Syſt. Beſchr. p.* 109. *n°.* 50.

Papilio Lappona. Schneid. *Entom. Magaz. tom.* 1. *part.* 1. *p.* 426. *n°.* 9.

Papilio Caſtor. De Prunner, *Lepid. Pedem. p.* 20. *n°.* 37.

Papilio Pollux. De Prunner, *Lepid. Pedem. p.* 20. *n°.* 38.

Papilio Dubius. Fuessl. *Neuef. Magaz. tom.* 3. *part.* 4. *p.* 551. *n°.* 128.

Man. Baucis. Schrank, *Faun. Boïc. tom.* 2. *p.* 177. *n°.* 1507.

Le grand Nègre Bernois. Engram. *Pap. d'Europe, tom.* 1. *p.* 260. *pl.* 65. *Suppl.* 11. *fig.* 42. a. b. *tert.*

Pollux. Engram. *Pap. d'Europe, tom.* 1. *p.* 321. *pl.* 4. 3^e. *Suppl. fig.* 42. a b. *quint.*

Il eſt un peu plus grand que le *Gorgé*. Ses ailes ſont entières, d'un noir-brun en deſſus, avec un léger reflet bleuâtre. Les ſupérieures ont, vers le bout, une bande ferrugineuſe, courbe & tranſverſale, diviſée dans le ſens de ſa longueur par une rangée de quatre points très-noirs. Les ſecondes ailes ont trois points ſemblables, entourés chacun d'un petit cercle ferrugineux, plus ou moins diſtinct.

Le deſſous des ailes de devant eſt rougeâtre, ſurtout dans les femelles, avec les bords obſcurs, & le même nombre de points noirs que du côté oppoſé.

Le deſſous des ailes de derrière eſt d'un gris-blanchâtre dans le mâle, d'un gris-cendré dans la femelle, avec trois lignes noirâtres, dont la poſtérieure formée de trois à quatre points, les deux antérieures ondulées, parallèles, & ſe prolongeant ſur les ailes ſupérieures.

On rencontre des individus qui n'ont que deux point noirs aux premières ailes. Il en eſt d'autres qui n'en ont également que deux aux ſecondes, & dont le deſſous de ces mêmes ailes n'eſt traverſé par aucune ligne noirâtre.

Il habite la Laponie, l'Autriche, la Stirie, la Suiſſe, le Piémont & les Pyrénées.

138. Satyre Dromus.

Satyrus Dromus.

Sat. alis integris, fuſco-nigris: anticis utrinquè ocellis duobus approximatis: poſticis ſubtùs nitenti-griſeis, ſtrigis duabus fuſcis, undulatis.

Papilio S. Dromus, *alis integerrimis, nigris: anticis utrinquè diſco rufo ocello gemino.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 22. *n°.* 701.

Papilio D. F. Tyndarus, *alis integris, rotundatis, fuſcis: ſuperioribus ocellis duobus approximatis: inferioribus ſubtùs ſtriga in medio fuſcâ, dentatâ.* Esp. *Pap. part.* 1. *p.* 97. *tab.* 67. *cont.* 17. *fig.* 1.

Papilio Caſſioides. Esp. *Pap. part.* 1. *tab.* 103. *cont.* 58. *fig.* 2. 3. (Var.)

Papilio Tyndarus. Schneid. *Syſt. Beſchr. p.* 108. *n°.* 48.

Papilio Tyndarus. Ochsenh. *Pap. Eur. tom.* 1. *p.* 299. *n°.* 63.

Papilio Tyndarellus. Herbst, *Pap. tab.* 202. *fig.* 5. 6.

Papilio Herſe. Borkh. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 94. *n°.* 33.

Papilio

Papilio Cleo. Hubn. *Pap. tab.* 46. *fig.* 209. 210. (Le mâle.) *fig.* 211. 212. (La femelle.)

Papilio Cleo. Illig. *Magaz. tom.* 3. *p.* 189.

Il n'a guère que quinze lignes d'envergure. Ses ailes sont entières, d'un noir-brun en dessus, avec un léger reflet verdâtre. Les supérieures ont, vers l'extrémité, une bande ferrugineuse, sur laquelle il y a deux petits yeux rapprochés, noirs, à prunelle blanche. Les ailes inférieures sont tantôt sans taches, & tantôt elles ont une suite de trois ou quatre yeux dont l'iris est rougeâtre.

Le dessous des premières ailes est ferrugineux, avec les bords grisâtres & deux petits yeux correspondant à ceux de la surface opposée.

Le dessous des secondes ailes est d'un gris plus ou moins luisant, avec deux lignes brunes, transverses, ondulées, discoïdales, se prolongeant dans les femelles jusqu'à la côté des premières ailes. L'extrémité offre quelquefois une ligne semblable, mais beaucoup moins apparente.

Ce satyre nous a présenté deux variétés. La première est tout-à-fait sans yeux aux ailes de devant.

La seconde, qu'Esper donne sous le nom de *Cassioides*, a tout le dessous des ailes de derrière d'un noir-brun & foiblement saupoudré de gris.

Il habite la Stirie, la Suisse, l'Italie, &c.

139. Satyre Areté.

Satyrus Arete.

Sat. alis integris, suprà fusco-nigris, fusciâ ferrugineâ : anticarum ocello didymo alterove remoto : posticis subtùs griseo-virescentibus, strigâ punctorum alborum.

Papilio S. Arete, *alis integris, fusco-nigris, fusciâ rufâ : posticis utrinquè strigâ punctorum alborum.* Fab. *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 42. *n°.* 418. — *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 238 *n°.* 743.

Papilio Arete. Illig. *Magaz. tom.* 3. *p.* 186.

Papilio Arete. Hubn. *Pap. tab.* 50. *fig.* 231. 232. (Fem.)

Papilio Arete. Ochsenh. *Pap. Eur. tom.* 1. *p.* 301. *n°.* 64.

Papilio Claudine. Borkh. *Pap. Eur. part.* 2. *p.* 204. *n°.* 16.

Nous ne connoissons ce satyre que par sa femelle.

Il est de la taille du précédent. Ses ailes sont entières, d'un noir-brun en dessus, avec une bande ferrugineuse. La bande des ailes supérieures a, vis-à-vis du sommet, un double œil noir, pupillé de blanc, & quelquefois un autre simple vers l'angle interne. La bande des ailes inférieures est maculaire, & l'on y voit ordinairement quatre yeux.

Le dessous des ailes de devant ressemble au dessus, mais il a le disque d'un roux-fauve.

Le dessous des ailes de derrière est d'un vert-grisâtre, avec une rangée de sept points blancs, correspondante à la bande de la surface opposée.

Des parties montagneuses de l'Autriche.

140. Satyre Arachné.

Satyrus Arachne.

Sat. alis integris, fusco-nigris, cærulescenti micantibus : anticis utrinquè fusciâ ferrugineâ ocellis duobus approximatis alterove remoto : posticis subtùs cinereis, fasciâ mediâ repandâ margineque postico nigricantibus.

Papilio S. Arachne, *alis integris, atris : anticis utrinquè fasciâ rufâ ocellis duobus : posticis subtùs fusciâ dentatâ cinereâ.* Fab. *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 41. *n°.* 415. — *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 237. *n°.* 740.

Papilio Arachne. Hubn. *Pap. tab.* 47. *fig.* 214. (Mas.) *fig.* 216. 217. (Fem.)

Papilio Pitho. Hubn. *Pap. tab.* 112. *fig.* 574. 575. (Mas.) *fig.* 576. 577. (Fem.)

Papilio Arachne. Borkh. *Pap. Eur. part.* 2. *p.* 203. *n°.* 16. c.

Papilio Pronoe. Borkh. *Pap. Eur. part.* 2. *p.* 98. *n°.* 37.

Papilio Pronoe. Herbst, *Pap. tab.* 210. *fig.* 1. 2.

Papilio Pronoe. Esp. *Pap. part.* 1. *tab.* 54. *cont.* 4. *fig.* 1.

Papilio Persephone. Esp. *Pap. part.* 1. *tab.* 121. *cont.* 76. *fig.* 4. 5. 6.

Papilio Pronoe. Schneid. *Syst. Beschr. p.* 107. *n°.* 47.

Papilio Pronoe. Ochsenh. *Pap. Eur. tom.* 1. *p.* 290. *n°.* 59.

Il a près de deux pouces d'envergure. Ses ailes sont entières, d'un noir-brun, & leur dessus jette un léger reflet violet. Les supérieures ont une bande ferrugineuse, ordinairement plus prononcée en dessous qu'en dessus. Cette bande offre, vis-à-vis du sommet, deux yeux très-rapprochés, noirs, avec une prunelle blanche; &, plus bas, un autre œil moins gros, manquant même dans beaucoup de mâles.

Le dessus des ailes inférieures est tantôt sans taches, tantôt coupé par une bande rougeâtre, courte & maculaire, sur laquelle on voit de deux à trois points ocellés. Le dessous des mêmes ailes est d'un cendré-grisâtre dans le mâle, d'un cendré-jaunâtre dans la femelle, avec une bande discoïdale, large, sinuée, & le bord postérieur, noirâtres.

Il habite la Hongrie, la Stirie, la Suiſſe, &c.

141. Satyre Goante.

Satyrus Goante.

Sat. alis integris, ſuprà fuſco-nigris, faſciâ ferrugineâ : anticis utrinquè ocello didymo alteroque minori remoto : poſticis ſubtùs nebuloſo-griſeis, faſciâ mediâ obſcuriore alboque marginatâ.

Papilio N. G. Goante, *alis ſuprà fuſcis, faſciâ fulvâ : ſuperioribus utrinquè ocello apicis didymo alterove minori ſolitario ; inferioribus ſuprà ocellis tribus, ſubtùs fuſco nigroque maculatis ſtriâ tranſverſâ crenis marginalibus veniſque albidis.* Esp. *Pap. part.* 1. *p.* 115. *tab.* 116. *cont.* 71. *fig.* 1.

Papilio Goante. Illig. *Magaz. tom.* 3. *p.* 203.

Papilio Goante. Ochsenh. *Pap. Eur. tom.* 1. *p.* 293. *n°.* 60.

Papilio Scœa. Hubn. *Pap. tab.* 50. *fig.* 233. 234.

Il eſt preſque de la taille du précédent. Ses ailes ſont entières, d'un noir-brun en deſſus, avec une bande ferrugineuſe, courbe, poſtérieure, offrant d'ordinaire aux ailes inférieures trois yeux également éloignés l'un de l'autre ; & aux ſupérieures trois auſſi, mais dont deux réunis en face du ſommet, le troiſième plus petit & placé iſolément vers l'angle interne. Ces yeux ſont très-noirs, avec la prunelle blanche.

Le deſſous des ailes ſupérieures a le milieu ferrugineux, & l'extrémité traverſée par une bande plus pâle, ſur laquelle il y a le même nombre d'yeux que du côté oppoſé.

Le deſſous des ſecondes ailes eſt gris, aſpergé de brun, avec une bande diſcoïdale & anguleuſe plus obſcure que le fond, & ayant les côtés bordés de blanc. Aux yeux du deſſus correſpond pareil nombre de taches noires à prunelle blanche.

Dans la femelle, les nervures du deſſous des ſecondes ailes ſont blanches.

Il habite la Suiſſe, le Piémont, la Savoie, &c.

Nota. Nous avons vu une variété femelle qui avoit de part & d'autre cinq yeux aux ſecondes ailes ; & une autre qui en avoit quatre ſur le deſſus des premières ailes.

142. Satyre Stirius.

Satyrus Stirius.

Sat. alis integris, ſuprà fuſco-nigris, faſciâ ferrugineâ : primariis utrinquè ocello didymo alteroque remoto, ſecundariis quatuor : ſecundariis ſubtùs cinereis, faſciâ poſticâ dilatiore. (Fem.)

Son envergure eſt d'environ deux pouces. Toutes ſes ailes ſont entières, d'un noir-brun en deſſus, avec une bande ferrugineuſe, ſur laquelle les ſupérieures ont deux yeux, dont l'antérieur double, l'autre ſolitaire ; & les inférieures quatre.

Le deſſous des premières ailes eſt ferrugineux, avec les bords cendrés, & des yeux comme du côté oppoſé.

Le deſſous des ſecondes ailes eſt entièrement cendré, mais il offre vers ſon extrémité une bande plus claire & ſinuée, ſur laquelle ſont quatre yeux correſpondant à ceux du deſſus.

Décrit d'après un individu femelle, pris aux environs de Clagenfurt, dans les alpes de Stirie, par M. le lieutenant-général baron Dejean.

143. Satyre Dalmata.

Satyrus Dalmata.

Sat. alis integris, fuſco-nigris, ſtrigâ utrinquè ocellorum : anticis ocellulo apicis externo : poſticis ſubtùs ad extimum griſeo venoſis. (Fem.)

Son envergure eſt auſſi d'environ deux pouces. Toutes ſes ailes ſont entières, d'un noir-brun, avec une rangée poſtérieure d'yeux très-noirs à prunelle blanche & à iris ferrugineux. Les yeux des premières ſont au nombre de ſix, dont cinq contigus, le ſixième plus petit & placé extérieurement près du ſommet. Les yeux des ſecondes ailes ſont au nombre de ſix, tous placés à la ſuite l'un de l'autre.

En deſſous, les ailes ſupérieures ont le milieu rougeâtre, & leur extrémité n'offre que cinq yeux, par la raiſon que celui qui avoiſine l'angle interne manque.

Le deſſous des ailes inférieures eſt veiné de gris depuis le milieu juſqu'au bout, & l'on y compte ſept yeux à iris cendré.

Décrit ſur un individu unique & femelle, pris au bord de la mer, dans les environs de Sebennico en Dalmatie, par M. le lieutenant-général baron Dejean.

144. Satyre Afra.

Satyrus Afra.

Sat. alis integris, fuſco-nigris : anticis utrinquè, poſticis ſuprà faſciâ ferrugineâ maculari ocellis 5-6 : *poſticis ſubtùs venis albidis ſtrigâque ocellorum* 6-7.

Papilio S. Afra, *alis integris, fuſcis, ocellis ſex : poſticis cinereo venoſis.* Fab. *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 41. *n°.* 413. — *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 256. *n°.* 738.

Papilio Afer, *alis rotundatis, integerrimis, rufeſcenti-fuſcis : ſuperioribus ocello connato, adjacente minori, ſerie ad marginem ocellorum nigrorum : inferioribus venis dilatatis albidis.* Esp. *Pap. part.* 1. *tab.* 83. *cont.* 33. *fig.* 4. 5.

Papilio Afer. Herbst, *Pap. tab.* 201. *fig.* 7. 8.

Papilio Afer. Herbst, *Pap. tab.* 202. *fig.* 1. 2.

Papilio Afer. Schneid. *Syſt. Beſchr. p.* 104. *n°.* 44.

Papilio Afer. Ochsenh. *Pap. Eur. tom.* 1. *p.* 273. *n°.* 51.

Papilio Phegea. Bokrh. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 101. *n°.* 42. — *part.* 2. *p.* 210. *n°.* 42.

Papilio Phegea. Hubn. *Pap. tab.* 98. *fig.* 500. 501. (Le mâle.)

Illig. *Magaz. tom.* 3. *p.* 200.

Il a environ deux pouces d'envergure. Ses ailes ſont entières, d'un noir-brun en deſſus, avec une bande ferrugineuſe, poſtérieure & maculaire, offrant à chaque aile de cinq à ſix yeux noirs à prunelle blanche. Parmi les yeux des ailes de devant, il y en a deux qui ſont réunis en face du ſommet.

Le deſſous de ces ailes reſſemble au deſſus, mais le milieu eſt rougeâtre.

Le deſſous des ailes inférieures eſt brun, avec des veines blanchâtres, longitudinales, aſſez larges, & une ſérie de ſix à ſept yeux dont l'iris eſt griſâtre.

Des parties déſertes de la Ruſſie méridionale.

145. Satyre Griela.

Satyrus Griela.

Sat. alis ſubdentatis, fuſco-nigris : anticis utrinquè ocellis 4-5 ſubcœcis : poſticis ſubtùs cinereis, fuſciâ nigricante, mediâ, repandâ : alarum omnium ſinubus griſeis.

Papilio S. Griela, *alis ſubdentatis, atris : anticis utrinquè ocellis quatuor connatis.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 236. *n°.* 737.

Papilio S. Ethus, *alis integerrimis, fuſcis : anticis ocello bipupillato ; poſticis ſuprà ocellis tribus, ſubtùs atris punctо medio albo.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 217. *n°.* 680.

Papilio Griela. Hubn. *Pap. tab.* 49. *fig.* 228. 229. (Fem.)

Papilio Dioxippe. Hubn. *Pap. tab.* 105. *fig.* 538. 539. (Mas.)

Papilio Stheno. Hubn. *Pap. tab.* 109. *fig.* 561. 562. (Mas.)

Papilio Griela. Illig. *Magaz. tom.* 3. *p.* 194.

Papilio Stheno. Illig. *Magaz. tom.* 3. *p.* 204.

Papilio Geſſion. Esp. *Pap. part.* 1. *tab.* 108. *cont.* 63. *fig.* 2.

Papilio Geſſion. Schneid. *Ent. Magaz. tom.* 1. *p.* 412. *n°.* 2.

Papilio Embla. Schneid. *Ent. Magaz. tom.* 1. *p.* 411. *n°.* 1.

Papilio N. G. Diſa, *alis fuſcis : anticis fuſciâ ferrugineâ, quadripunctatâ : poſticis ſubtùs cinereis fuſciâ latâ arcuque nigris.* Thunb. *Differt. Acad. vol.* 3. *p.* 51.

Papilio N. G. Embla, *alis fuſcis, ſuprà ocellis quatuor : ſubtùs anticis quadriocellatis, poſticis quadripunctatis maculiſque duabus albis.* Thunb. *Differt. Acad. vol.* 3. *p.* 52. *tab.* 5. *fig.* 8. 8.

Papilio Embla. Ochsenh. *Pap. Eur. tom.* 1. *p.* 287. *n°.* 58.

Papilio Sophia. Acerbi, *Voy. au Cap Nord, vol.* 3. *p.* 175. *pl.* 16. *n°s.* 1. 2.

M. Ochſenheimer réunit le *Griela* & l'*Ethus* de Fabricius. Comme il a été plus à même que nous de conſtater l'identité, nous ſuivons ſon exemple, mais en conſervant le premier des deux noms adoptés par l'entomologiſte de Kiel.

La taille du *Griela* eſt la même que celle du précédent. Ses ailes ſont d'un noir-brun un peu luiſant, & légèrement dentées, avec les échancrures griſâtres. Les ſupérieures ont, de part & d'autre, tantôt immédiatement ſur le fond de l'aile, tantôt ſur une bande ferrugineuſe oblitérée, cinq yeux très-noirs, avec une prunelle blanche, petite ou à peine diſtincte.

Le deſſus des ailes inférieures eſt le plus ſouvent ſans taches. Leur deſſous eſt cendré, avec une bande noirâtre, tranſverſe, diſcoïdale, large, ſinueuſe, moins foncée dans ſon milieu.

Il habite les plus hautes montagnes de la Laponie.

N. B. Dans quelques individus, tels que l'*Ethus* de Fabricius, les ſecondes ailes ont, de part & d'autre, trois à quatre petits yeux ou points oculaires, & leur deſſous eſt marqué au milieu d'une ou de deux taches blanches.

146. Satyre Æthiops (1).

Satyrus Æthiops.

Sat. alis integris, fuſco-nigris, ſuprà faſciâ ferrugineâ ocellis 3-4 : anticis concoloribus : poſticis ſubtùs faſciâ repandâ nitenti-cinereâ punctis ocellaribus.

Papilio N. G. Blandina, *alis dentatis, fuſcis, faſciâ ruſâ, ocellatâ : poſticis ſubtùs fuſcis, faſciâ cinereâ.* Fab. *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 41. *n°.* 412.

Papilio S. *Blandina.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 236. *n°.* 736.

(1) Nous avons pris le nom d'Eſper, parce que Fabricius a deux papillons *Blandina*, dont l'un ſe rapporte à l'eſpèce ici mentionnée, l'autre à une Biblis que nous donnons dans le Supplément.

Papilio Æthiops. Esp. *Pap. part.* 1. *tab.* 25. *Suppl.* 1. *fig.* 3. (Le mâle.)

Papilio Æthiops. Esp. *Pap. part.* 1. *tab.* 63. *cont.* 13. *fig.* 1. (La femelle.)

Papilio Æthiops. Schneid. *Syst. Beschr. p.* 106. *n°.* 46.

Papilio Æthiops. Herbst, *Pap. tab.* 209. *fig.* 3. 4. (Le mâle.)

Papilio Meduſa. Herbst, *Pap. tab.* 209 *fig.* 1. 2. (La femelle.)

Man. Meduſa. Schrank, *Faun. Boïc. tom.* 2. *p.* 175. *n°.* 1304.

Papilio Meduſa. Lang. *Verz.* 2. *p.* 21. *n°s.* 133-136.

Papilio Meduſa. Borkh. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 75 & 235. *n°.* 15. — *part.* 2. *p.* 201.

Papilio Medea. Wien. *Verz. p.* 167. *fam.* F. *n°.* 7.

Papilio Medea. Hubn. *Pap. tab.* 48. *fig.* 220. (Le mâle.) *fig.* 221. 222. (La femelle.)

Papilio Medea. Illig. *N. Aufg. Deſſ. tom.* 2. *p.* 179. *n°.* 7.

Illig. *Magaz. tom.* 3. *p.* 198.

Papilio Medea. Ochsenh. *Pap. Eur. tom.* 1. *p.* 281. *n°.* 55.

Papilio Ligea. Var. 2. Scop. *Ent. Carn. p.* 158. *n°.* 436. ?

Naturf. 8. *p.* 115. *tab.* 3. *fig.* C.

Le grand Nègre à bandes fauves. Engram. *Pap. d'Europe, tom.* 1. *p.* 83. *pl.* 24. a. b. e. f. g.

Engram. *Pap. d'Europe, tom.* 1. *pl.* 65. *Suppl.* 11. *fig.* 43. h. i. (Var. femelle.)

Il a approchant deux pouces d'envergure. Ses quatre ailes ſont entières ou à peine ſinuées, & d'un noir-brun-chatoyant. Les ſupérieures, dont le deſſous reſſemble au deſſus, ont, vers l'extrémité, une bande tranſverſe, ferrugineuſe ou d'un rouge-fauve, ſur laquelle il y a tantôt trois, tantôt quatre yeux, dont les deux antérieurs réunis. Ces yeux ſont noirs, avec la prunelle d'un blanc-bleuâtre.

Le deſſus des ſecondes ailes offre, parallèlement au bord poſtérieur, une bande ferrugineuſe, courbe, maculaire ou continue, avec trois yeux, comme ceux qui viennent d'être mentionnés. A ces yeux correſpondent en deſſous trois ou quatre petits points blancs oculaires, alignés ſur une bande d'un cendré plus ou moins luiſant, laquelle s'étend du bord antérieur à l'angle anal & a les côtés ſinués. Dans les femelles, il y a une autre bande cendrée à la baſe.

Engramelle donne une variété femelle dont la bande ferrugineuſe eſt très-pâle, & dont le deſſous des ſecondes ailes eſt d'une teinte verdâtre.

Ce ſatyre habite les bois un peu élevés. On le trouve en Allemagne, dans les départemens de l'Eſt & du centre de la France, &c. Il paroît en juillet.

147. Satyre Ligéa.

Satyrus Ligea.

Sat. alis ſubdentatis, fuſco-nigris, utrinquè faſciâ ferrugineâ ocellis 3 4 *: poſticis ſubtùs ſtrigâ albâ, faciei ferrugineæ intùs innatâ : alarum omnium ſinubus albis.*

Papilio N. Ligea, *alis ſubdentatis, fuſcis, faſciâ rufâ : utrinquè primoribus ocellis quatuor, poſticis tribus.* Linn. *Syſt. Nat.* 2. *pag.* 772. *n°.* 144. — *Faun. Suec. edit.* 2. *p.* 275. *n°.* 1050.

Papilio Alexis. Linn. *Faun. Suec. edit.* 1. *p.* 239. *n°.* 787.

Papilio N. G. Ligea, *alis dentatis, fuſcis, faſciâ rufâ : utrinquè anticis ocellis quatuor; poſticis tribus, ſubtùs albo maculatis.* Fab. *Syſt. Ent. p.* 496. *n°.* 229. — *Spec. Inſ. tom.* 2. *p.* 78. *n°.* 347. — *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 40. *n°.* 409.

Papilio S. *Ligea.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 234. *n°.* 732.

Papilio Ligea. Wien. *Verz. p.* 167. *fam.* F. *n°.* 6.

Papilio Ligea. Illig. *N. Aufg. Deſſ. tom.* 2. *p.* 178. *n°.* 6.

Papilio Ligea. Illig. *Magaz. tom.* 3. *p.* 197.

Papilio Ligea. Herbst, *Pap. tab.* 208. *fig.* 5-8.

Papilio Ligea. Borkh. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 76 & 235. *n°.* 16. — *part.* 2. *p.* 202.

Papilio Ligea. Borkh. *Rhein. Magaz. tom.* 1. *p.* 240. *n°.* 21.

Papilio Ligea. Muller, *Zool. Dan. p.* 114. *n°.* 1522.

Papilio Ligea. Fuessl. *Suiſſ. Inſ. p.* 29. *n°.* 561.

Papilio Ligea. Rossi, *Faun. Etr. tom.* 2. *p.* 148. *n°.* 1008.

Papilio Ligea. Ochsenh. *Pap. Eur. tom.* 1. *p.* 283. *n°.* 56.

Man. Ligea. Schrank, *Faun. Boïc. tom.* 2. *p.* 174. *n°.* 1303.

Papilio Ligea. Hubn. *tab.* 49. *fig.* 225-227.

Papilio Alexis. Esp. *Pap. part.* 1. *tab.* 44. *Suppl.* 20. *fig.* 1. 2.

Esp. *Pap. part.* 1. *tab.* 54. *cont.* 4. *fig.* 2. (Var.)

Papilio N. G. Philomela, *alis denticulatis, fuscis : superioribus fasciâ utrinquè rufâ ocello didymo alterove solitario ; posticis suprà fasciâ rufâ immaculatâ, subtùs serie ocellorum minimorum quinque maculâque disci albidâ, obliteratâ.* Esp. *Pap. part.* 1. *p.* 118. *tab.* 16. *cont.* 71. *fig.* 4. (Var.)

Papilio Alexis. De Geer, *Mem. Inf. tom.* 2. *part.* 1. *p.* 210. *pl.* 2. *fig.* 7. 8.

Papilio Alexis. Schneid. *Syst. Beschr. p.* 103. *n°.* 43.

Papilio Alexis. Lang. *Verz.* 2. *p.* 20. *n°.* 125-130.

Le grand Nègre hongrois. Engram. *Pap. d'Europe, tom.* 1. *p.* 82. *pl.* 23. *fig.* 42. a. b.

«. Engram. *Pap. d'Europe, tom.* 1. *pl.* 24. *fig.* 43. c. d. (Var.)

Engram. *Pap. d'Europe, tom.* 1. *p.* 64. *Suppl.* 10. *fig.* 42. c.

Il a environ deux pouces d'envergure. Ses quatre ailes sont légèrement dentées, d'un noir-brunchatoyant, avec les échancrures blanches. Parallèlement au bord postérieur, il y a une bande ferrugineuse, sur laquelle les premières ailes ont de part & d'autre trois ou quatre yeux très-noirs, dont les deux antérieurs réunis.

La bande des secondes ailes n'offre ordinairement que trois yeux, &, en dessous, elle est plus pâle & bordée intérieurement par une ligne blanche, sinuée, plus ou moins longue, continue ou maculaire, & quelquefois par une seule tache placée près du milieu de la surface. Les yeux ont une prunelle bleuâtre, plus apparente dans certains individus que dans d'autres. Le corps est de la couleur des ailes. Les antennes sont noirâtres en dessus, blanchâtres en dessous.

Dans la femelle, le dessous des ailes supérieures a le milieu roussâtre.

La variété «, figurée dans l'ouvrage d'Engramelle, a quatre yeux de part & d'autre aux secondes ailes, & le dessous de ces mêmes ailes présente vers la base une liture d'un cendré-jaunâtre & presqu'en forme d'*S*.

Le *Philoméla* d'Esper, qui paroît devoir être rapporté ici comme variété, a la bande des ailes inférieures sans taches en dessus, & chargée en dessous de cinq points oculaires.

Ce satyre habite les prairies, & surtout les bois. On le trouve dans plusieurs contrées du nord & de l'est de l'Europe. Nous l'avons pris dans les forêts du Morvan, où il est assez commun au mois d'août.

148. Satyre Euryale.

Satyrus Euryale.

Sat. alis subdentatis, fusco-nigris : suprà fasciâ ferrugineâ ocellis 3-4 *: posticis subtùs fasciâ dentatâ albidâ seu flavescente, punctis ocellaribus : alarum omnium sinubus albis.*

Papilio Euryale, *alis subdentatis, fuscis, fulvo fasciatis serie ocellorum nigrorum : posticis subtùs fasciâ dentatâ luteâ, nigro punctatâ.* Ochsenh. *Pap. Eur. tom.* 1. *p.* 286. *n°.* 57.

Papilio Euryale. Esp. *Pap. part.* 1. *tab.* 118. *cont.* 73. *fig.* 2. (Le mâle.) *fig.* 3. (La femelle.)

Papilio Philomela. Hubn. *Pap. tab.* 47. *fig.* 218. 219.

Le dessus des quatre ailes est comme dans le *Ligéa*, mais les yeux n'ont pas de prunelle.

Le dessous des ailes supérieures est aussi comme dans les deux sexes du *Ligéa*.

Le dessous des ailes inférieures est brun, avec une bande grisâtre ou jaunâtre, ayant au côté interne des dents très-inégales, & sur le côté externe de deux à cinq points noirs, oculaires. La femelle a en outre vers la base de ces ailes une ligne cendrée, transversale, plus ou moins distincte.

On le trouve dans les forêts montagneuses.

149. Satyre Mnestra.

Satyrus Mnestra.

Sat. alis integris, fusco-nigris, suprà fasciâ ferrugineâ : anticarum latâ punctis seu ocellis duobus : posticis subtùs apice cinerascentibus, immaculatis.

Papilio Mnestra, *alis rotundatis, nigro-fuscis : anticis suprà fasciâ latâ rufa punctis duobus nigris* (fem. *utrinquè ocellis*), *subtùs disco rufo absque punctis ; posticis suprà fasciâ abbreviatâ rufâ* (fem. *ocellis tribus minutis*), *subtùs immaculatis fasciâ obliteratâ antè marginem exteriorem.* Ochsenh. *Pap. Eur. tom.* 1. *p.* 264. *n°.* 45.

Papilio Mnestra. Esp. *Pap. part.* 1. *tab.* 120. *cont.* 75. *fig.* 5. 6.

Papilio Mnestra. Hubn. *Pap. tab.* 106. *fig.* 540. 541. (Mas.) *fig.* 542. 543. (Fem.)

Papilio Mnestra. Illig. *Magaz. tom.* 3. *p.* 199. — *tom.* 5. *p.* 180.

Il a environ un pouce & demi d'envergure. Le dessus de ses ailes est d'un noir-brun, avec une bande postérieure ferrugineuse. La bande des premières ailes est large & marquée vis-à-vis du sommet de deux points noirs dans le mâle, de deux yeux à prunelle blanche dans la femelle. La bande des secondes ailes est courte, sans taches dans le mâle, chargée de trois petits yeux dans la femelle.

Le deſſous des ailes ſupérieures eſt d'un rouge-fauve dans les deux ſexes, avec les bords bruns, & des points ou des yeux comme du côté oppoſé.

Le deſſous des ailes inférieures eſt de la couleur du deſſus, avec le bout légèrement cendré & ſans taches.

De la Suiſſe.

150. Satyre Stygné.

Satyrus Stygne.

Sat. alis integris, fuſco-nigris, ſuprà faſciâ ferrugineâ : anticis utrinquè ocello didymo alteroque minori remoto, poſticis tribus.

Papilio Stygne, *alis integris, nigro-fuſcis, ferrugineo faſciatis : anticis ocello didymo alteroque minori ſolitario : poſticis ſubtùs faſciâ obliteratâ verſus marginem exteriorem, ocellis utrinquè tribus.* Ochsenh. *Pap. Eur. tom.* 1. *p.* 276. *n°.* 52.

Papilio Stygne. Hubn. *Pap. tab.* 125. *fig.* 639. 640. (Fem.)

Papilio Pirene. Hubn. *Pap. tab.* 48. *fig.* 233. 234. (Mas.)

Papilio Pirene. Illig. *Magaz. tom.* 3. *p.* 201. — *tom.* 5. *p.* 181.

Papilio N. G. Pyrene, *alis atris, fulvo faſciatis : ſuperioribus utrinquè ocello didymo majori alterove minori ſolitario ; inferioribus ocellis quatuor, ſubtùs minoribus faſciæ crenatæ griſeæ inſertis.* Esp. *Pap. part.* 1. *p.* 117. *tab.* 116. *cont.* 71. *fig.* 3.

Il eſt de la taille & de la couleur du *Mneſtra*, & en outre un peu glacé de violet. Le deſſus de ſes ailes a, parallèlement au bord terminal, une bande ferrugineuſe, courbe, & allant toujours en diminuant de largeur juſque vers l'angle interne. Sur cette bande les ailes ſupérieures ont trois yeux, dont deux réunis en face du ſommet, le troiſième plus petit & placé beaucoup plus bas. Les ailes inférieures ont auſſi trois yeux, mais ils ſont également éloignés l'un de l'autre. Ces yeux ſont noirs, avec une prunelle blanche.

Le deſſous des premières ailes ne diffère pas du deſſus dans le mâle; dans la femelle il a, de plus, le diſque d'un ferrugineux-foncé.

Le deſſous des ſecondes ailes offre trois petits yeux, correſpondans à ceux du deſſus; mais dans la femelle ils repoſent ſur une apparence de bande cendrée dont le côté interne eſt denté, tandis que dans le mâle ils ſont immédiatement ſur le fond qui eſt partout d'un noir-brun.

Nous avons vu une variété mâle qui avoit quatre yeux aux premières ailes, mais ſeulement en deſſus.

Des montagnes du Tyrol, de la Suiſſe & du Piémont.

151. Satyre Mélas.

Satyrus Melas.

Sat. alis integris, fuſco-nigris : anticis utrinquè faſciâ ferrugineâ (maris obliteratâ) *ocello didymo alterove minori remoto ; poſticis tribus, ſed ſuprà faſciâ nullâ.*

Papilio Melas, *alis integris, atris, cæruleo micantibus, anticis apice ocello didymo ; poſticis punctis occellaribus nigris pupillâ albâ.* Ochsenh. *Pap. Eur. tom.* 1. *p.* 277. *n°.* 53.

Papilio Melas. Herbst, *Pap. tab.* 210. *fig.* 4. 5. (Mas.) *fig.* 6. 7. (Fem.)

Papilio N. G. Maurus, *alis ſuperioribus rotundatis, aterrimis, cæruleo micantibus, concoloribus, ocellis duobus approximatis ; inferioribus tribus marginalibus minutis.* Esp. *Pap. part.* 1. *p.* 75. *tab.* 107. *cont.* 62. *fig.* 3. 4. (Mas.) — *p.* 93. *tab.* 110. *cont.* 65. *fig.* 4. (Fem.)

Papilio Nelo. Hubn. *Pap. tab.* 45. *fig.* 105. 106. (Mas.)

Illig. *Magaz. tom.* 3. *p.* 199.

Il reſſemble beaucoup au *Stygné*. Néanmoins il s'en diſtingue, en ce que le deſſus de ſes ailes inférieures n'offre point de bande, mais ſeulement trois yeux; en ce que la bande ferrugineuſe des premières ailes eſt moins prononcée ou preſque nulle dans les mâles; & en ce que le petit œil ſolitaire des mêmes ailes n'eſt pas conſtant comme dans le *Stygné*.

De la Hongrie.

152. Satyre Alecton.

Satyrus Alecto.

Sat. alis integris, fuſco-nigris : anticis utrinquè faſciâ ferrugineâ, obliteratâ, in mare *ocellis nullis aut duobus, in* fœminâ *quatuor : poſticis ſubtùs atris, cæcis.*

Papilio Alecto, *alis integris, fuſco-atris, cæruleo micantibus : anticis utrinquè faſciâ obliteratâ ferrugineâ ocellis duobus albo pupillatis : poſticis ſubtùs aterrimis, immaculatis.* Ochsenh. *Pap. Eur. tom.* 1. *p.* 279. *n°.* 54.

Papilio Alecto. Hubn. *Pap. tab.* 101. *fig.* 515. 516. (Fem.)

Papilio Alecto. Hubn. *Pap. tab.* 104. *fig.* 528. 529. (Mas.)

Papilio D. F. Atratus, *alis integerrimis, fuſco-atris : ſuperioribus utrinquè faſciâ maculari obliteratâ fulveſcente.* Esp. *Pap. part.* 1. *p.* 60. *tab.* 104. *cont.* 59. *fig.* 1.

Papilio N. G. Glacialis, *alis fuſco-nigricantibus, viridi nitentibus immaculatis : omnibus*

fasciâ latâ obsoletâ rufâ : inferioribus subtùs saturatioribus fasciâ tenuiori griseâ. Esp. *Pap. part.* 1. *p.* 116. *cont.* 71. *fig.* 2.

Papilio Pluto. Esp. *Pap. part.* 1. *tab.* 121. *cont.* 16. *fig.* 1. (Var.)

Papilio Tisiphone. Esp. *Pap. part.* 1. *tab.* 122. *cont.* 77. *fig.* 5.

Illig. *Magaz. tom.* 3. *p.* 185.

Il a le port, la taille, la couleur & le glacé des deux précédens. Ses premières ailes ont de part & d'autre une bande ferrugineuse, postérieure, large, plus ou moins apparente, sans taches ou avec un groupe de deux petits yeux noirs à prunelle blanche dans le mâle, avec quatre yeux semblables dans la femelle. Les secondes ailes du mâle sont absolument sans taches, mais leur dessous est d'un noir plus décidé que leur dessus. Les secondes ailes de la femelle ont en dessus une bande ferrugineuse, oblitérée, & en dessous une apparence de bande grisâtre, dépourvue d'yeux.

Du Tyrol & de la Suisse.

153. Satyre Machabée (1).

Satyrus Machabæus.

Sat. alis integris, fusco-nigris : anticis utrinquè fasciâ ferrugineâ punctis duobus atris approximatis : posticis subtùs maculis duabus baseos fasciâque posticâ lutescentibus.

Papilio S. Pyrrha, *alis integris, fusco-nigris, fasciâ rubrâ : anticarum nigro punctatâ, posticarum maculari.* Fab. *Mant. inf. tom.* 2. *p.* 42. *n°.* 416. — *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 257. *n°.* 741.

Papilio Pyrrha. Wien. *Verz. p.* 167. *fam.* F. *n°.* 9.

Papilio Pyrrha. Ochsenh. *Pap. Eur. tom.* 1. *p.* 267. *n°.* 46.

Papilio Pyrrha. Illig. *N. Ausg. Deff. tom.* 2. *p.* 183. *n°.* 9.

Papilio Pyrrha. Illig. *Magaz. tom.* 3. *p.* 205. — *tom.* 4. *p.* 28. *n°.* 34.

Papilio Cœcilia. Illig. *Magaz. tom.* 3. *p.* 188.

Papilio Pyrrha. Hubn. *Pap. tab.* 50. *fig.* 235. 236. (Mas.)

Papilio Pyrrha. Hubn. *Pap. tab.* 120. *fig.* 616. (Fem.)

Papilio Cœcilia. Hubn. *Pap. tab.* 46. *fig.* 213. 214. (Var.)

(1) Nous avons pris le nom adopté par Herbst, parce que le nom de *Pyrrha* est appliqué à une Piéride, & celui de *Pyrrhus*, à une Nymphale.

Papilio Pyrrha. Borkh. *Pap. Eur. part.* 2. *p.* 205. *n°.* 16.

Papilio Manto. Borkh. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 100 & 245. *n°.* 40.

Papilio Manto. Schneid. *Syst. Beschr. p.* 111. *n°.* 52.

Papilio Manto. Lang. *Verz.* 2. *p.* 21. *n°.* 141. 142.

Papilio Manto. Esp. *Pap. part.* 1. *tab.* 70. *cont.* 20. *fig.* 2. 3.

Papilio Manto, var. Esp. *Pap. part.* 1. *tab.* 119. *cont.* 74. *fig.* 6. (Var. fem.)

Papilio Œme. Esp. *Pap. part.* 1. *tab.* 120. *cont.* 75. *fig.* 1. ?

Papilio Manto. Herbst, *Pap. tab.* 210. *fig.* 8. 9. — *tab.* 211. *fig.* 1. 2.

Papilio Maccabæus. Herbst, *Pap. tab.* 209. *fig.* 5. 6. (Var.)

Le petit Nègre hongrois. Engram. *Pap. d'Europe, tom.* 1. *p.* 81. *pl.* 23. *fig.* 41. a-d.

Il a approchant un pouce & demi d'envergure. Ses ailes sont entières & d'un noir-brun. Celles de devant ont de part & d'autre une bande ferrugineuse, sur laquelle sont deux points noirs faisant face au sommet.

Les ailes de derrière ont en dessus, vers le bout de la côte, une rangée de trois ou quatre taches ferrugineuses; &, en dessous, sur la partie qui correspond à ces taches, une bande maculaire jaunâtre, indépendamment de laquelle il y a près de la base, deux taches qui sont également jaunâtres dans la femelle, & d'un ferrugineux plus ou moins prononcé dans le mâle.

De la Hongrie, de l'Allemagne méridionale, de la Suisse.

154. Satyre Cassiope.

Satyrus Cassiope.

Sat. alis integris, fusco-nigris : anticis utrinquè fasciâ ferrugineâ punctis tribus atris : posticis suprà maculis 2-4 ferrugineis nigro pupillatis; subtùs fuscis aut cinerascentibus, punctis solis.

Papilio S. Cassiope, *alis integris, fuscis fasciâ rufâ punctis tribus ocellaribus nigris : posticis subtùs punctis solis.* Fab. *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 42. *n°.* 417. — *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 238. *n°.* 742.

Papilio Cassiope, *alis integris, fuscis fasciâ rufâ punctis tribus nigris; posticis suprà maculis rufis nigro punctatis, subtùs fœminæ cinerascentibus punctis solis.* Ochsenh. *Pap. tom.* 1. *p.* 261. *n°.* 44.

Papilio Caſſiope. Hubn. *Pap. tab.* 123. *fig.* 626. 627. (Mas.) *fig.* 628. 629. (Fem.)

Papilio Melampus. Herbst, *Pap. tab.* 209. *fig.* 7. 8.

Papilio Melampus. Esp. *Pap. part.* 1. *tab.* 78. *cont.* 28. *fig.* 2.

Papilio Melampus. Schneid. *Syſt. Beſchr. p.* 110. *n°.* 51.

Papilio Alcyone. Borkh. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 96 & 244. *n°.* 35. b.

Papilio N. G. Æthiops minor, *obſcurè fuſcus, faſciâ fulvâ ſæpius obliteratâ ocellis cæcis.* De Villers, *Ent.* Linn. *tom.* 2. *p.* 37. *n°.* 57.

Le petit Nègre à bandes fauves. Engram. *Pap. d'Europe, tom.* 1. *p.* 85. *pl.* 24. *fig.* 45. a. b.

Il n'a guère que quinze lignes d'envergure. Sa couleur eſt la même que celle des précédens. Les premières ailes ont de part & d'autre une bande ferrugineuſe, poſtérieure, preſque maculaire, ſur laquelle ſont trois points d'un noir-foncé.

Le deſſus des ſecondes ailes offre, vers l'extrémité, un rang de deux à quatre taches ferrugineuſes, chargées chacune d'un point noir. Leur deſſous eſt brun dans le mâle, cendré dans la femelle, avec des points noirs ſeulement.

De la Stirie, de la Suiſſe, du Languedoc, &c.

N. B. La deſcription qu'en donne Fabricius dans ſon Entomologie ſyſtématique, porte, en parlant de la bande ferrugineuſe : *in poſticis imprimis maculari, nigrâ & in hâc puncta tria rufa.* C'eſt une faute d'impreſſion. Il faut tranſpoſer *rufa* à la place de *nigra* & réciproquement.

155. Satyre Mélampus.

Satyrus Melampus.

Sat. alis integris, concoloribus, fuſco-nigris faſciâ ferrugineâ maculari : anticarum punctis duobus atris approximatis, poſticarum tribus diſſitis.

Papilio Melampus, *alis rotundatis, fuſcis faſciâ utrinquè ferrugineâ, poſticarum maculari punctis minutiſſimis nigris.* Ochsenh. *Pap. Eur. tom.* 1. *p.* 260. *n°.* 43.

Papilio Melampus. Fuessl. *Suiſſ. Inſ. p.* 31. *n°.* 604. *tab. adj. fig.* 6.

Papilio Melampus. Fuessl. *Alt. Magaz. tom.* 2. *p.* 282.

Papilio Melampus. Esp. *Pap. part.* 1. *tab.* 31. *Suppl.* 7. *fig.* 2.

Papilio Melampus, var. Esp. *Pap. part.* 1. *tab.* 103. *cont.* 58. *fig.* 1.

Papilio Melampus, Bergstr. *Nomencl. tab.* 50. *fig.* 7. 8.

Papilio Melampus. Bergstr. *Nomencl. tab.* 71. *fig.* 5. 6.

Bergstr. *Nomencl. tab.* 128. *fig.* 6. 7.

Bergstr. *Icon. Pap. diurn. dec.* 3. *tab.* 3. *fig.* 5. 6.

Papilio Alcyone. Borkh. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 96 & 244. *n°.* 35. c.

Papilio Janthe. Hubn. *Pap. tab.* 122. *fig.* 624. 625. (Mas.)

Le Montagnard. Engram. *Pap. d'Europe, tom.* 1. *p.* 304. *pl.* 81. 2°. *Suppl. pl.* 2. *fig.* 41. a. b. *bis.*

Il a le port, la taille & la couleur du précédent. Ses ailes ont, parallèlement au bord terminal, une bande ferrugineuſe, maculaire, ſur laquelle les ſupérieures offrent ordinairement de part & d'autre deux points noirs, rapprochés, en regard du ſommet ; & les inférieures trois ſemblables, également diſtans l'un de l'autre.

Des montagnes de la Carinthie, du Tyrol & de la Suiſſe.

N. B. Les taches de la bande des premières ailes ſont à peu près quadrangulaires & longitudinales, du moins le plus ſouvent ; celles de la bande des ſecondes ailes ſont toujours arrondies & plus petites.

156. Satyre Pharté.

Satyrus Pharte.

Sat. alis integris, concoloribus, fuſco-nigris, faſciâ ferrugineâ maculari punctis nullis.

Papilio Melampus, *alis integris, nigricantibus : anticis faſciâ, poſticis ſerie macularum fulvarum : utrinquè abſque ocellis.* Ochsenh. *Pap. Eur. tom.* 1. *p.* 259. *n°.* 42.

Papilio Pharte. Esp. *Pap. part.* 1. *tab.* 120. *cont.* 75. *fig.* 3. (Mas.) *fig.* 4. (Fem.)

Papilio Pharte. Hubn. *Pap. tab.* 97. *fig.* 491. 492. (Mas.) *fig.* 493. 494. (Fem.)

Papilio Pharte. Illig. *Magaz. tom.* 3. *p.* 200. — *tom.* 5. *p.* 180.

Il reſſemble au *Mélampus*, mais la bande ferrugineuſe de ſes ailes eſt ſans points noirs en deſſus & en deſſous.

Du Tyrol & du midi de la Suiſſe.

157. Satyre Epiphron.

Satyrus Epiphron.

Sat. alis integris, fuſco-nigris, vireſcenti nitidis, faſciâ ferrugineâ maculari : anticarum utrinquè ocellis 2-4, poſticarum ſubtùs 3-5.

Papilio S. Epiphron, *alis integris, nigris faſciâ*

ciâ rubrâ : anticis suprà ocellis duobus, subtùs tribus ; posticis suprà tribus, subtùs quinque. Fab. *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 40. *n°.* 411. — *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 255. *n°.* 735.

Papilio Epiphron, *alis integris, fuscis, viridi nitentibus, fasciâ rufâ utrinquè ocellis nigris pro individuis numero diversis.* Ochsenh. *Pap. Eur. tom.* 1. *p.* 258. *n°.* 41.

Papilio Epiphron. Knoch, *Beytr.* 3. *tab.* 6. *fig.* 7.

Papilio Epiphron. Herbst, *Pap. tab.* 210. *fig.* 3.

Papilio Janthe. Hubn. *Pap. tab.* 44. *fig.* 202.

Papilio Egea. Borkh. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 77 & *part.* 2. *p.* 202. *n°.* 16.

Illig. *Magaz. tom.* 3. *p.* 195.

Man. Egea? Schrank, *Faun. Boïc. tom.* 2. *p.* 176. *n°.* 1306.

Il a le port, la taille & la couleur des trois précédens; mais il eſt un peu glacé de verdâtre. Ses ailes ont une bande ferrugineuſe, poſtérieure, plus ou moins longue & légèrement diviſée aux premières ailes; maculaire aux ſecondes. La bande des ſupérieures offre de part & d'autre de deux à quatre yeux noirs à prunelle blanche; celle des inférieures en a ordinairement trois en deſſus, de trois à cinq en deſſous.

Des parties montagneuſes de l'Allemagne.

158. Satyre Œmé.

Satyrus Œme.

Sat. alis integris, fusco-nigris : anticis utrinquè maculâ apicis ferrugineâ ocellis duobus minutis : posticis maculis ocellaribus ferrugineis, suprà 3, *subtùs* 4-5.

Papilio Œme, *alis integris, nigris : anticis utrinquè maculâ apicis fulvâ punctis duobus ocellaribus : posticis fulvo maculatis punctatisque.* Ochsenh. *Pap. Eur. tom.* 1. *p.* 270. *n°.* 47.

Papilio Œme. Hubn. *Pap. tab.* 104. *fig* 530. 531. (Mas.) *fig.* 532. 533. (Fem.)

Illig. *Magaz. tom.* 3. *p.* 199.

Papilio Œme. Esp. *Pap. part.* 1. *tab.* 120. *cont.* 75. *fig.* 2.

Papilio Cœcilia. Esp. *Pap. part.* 1. *tab.* 121. *cont.* 76. *fig.* 2.

Il a environ un pouce & demi d'envergure. Ses ailes ſont entières & d'un noir-brun. Les ſupérieures ont de part & d'autre, vis-à-vis du ſommet, une tache ferrugineuſe, plus ou moins foncée, ſur laquelle ſont deux petits yeux noirs à prunelle blanche.

Les ailes inférieures ont en deſſus trois taches ferrugineuſes, chargées chacune d'un œil comme ceux dont il vient d'être queſtion; & en deſſous quatre taches ſemblables dans le mâle, cinq dans la femelle.

De la Suiſſe & du Tyrol.

159. Satyre Pſodéa.

Satyrus Psodea.

Sat. alis integris, concoloribus, fusco-nigris, fasciâ ferrugineâ maculari : anticarum ocello gemino aliisque minoribus; posticarum (mas.) 4, (fem.) 6.

Papilio Pſodea, *alis rotundatis, fuscis : anticis utrinquè fasciâ fulvâ ocello apicis gemino ; posticis fasciâ maculari fulvâ ocelliſque nigris albo pupillatis.* Ochsenh. *Pap. Eur. tom.* 1. *p.* 271. *n°.* 48.

Papilio Psodea. Hubn. *Pap. tab.* 98. *fig.* 497. (Mas.) *fig.* 498. 499. (Fem.)

Papilio Psodea. Illig. *Magaz. tom.* 3. *p.* 202.

Il eſt de la taille & de la couleur du précédent. Ses ailes, dont le deſſous reſſemble au deſſus, ont une bande ferrugineuſe, tantôt plus, tantôt moins foncée. La bande des ailes ſupérieures eſt légèrement diviſée, & elle préſente, vis-à-vis du ſommet, un double œil noir à prunelle blanche, à la ſuite duquel il y en a de un à trois autres plus petits.

La bande des ailes inférieures eſt maculaire & chargée de quatre yeux dans le mâle, de ſix dans la femelle.

De la Stirie & de la Hongrie.

160. Satyre Céto.

Satyrus Ceto.

Sat. alis integris, concoloribus, fusco-nigris, strigâ è maculis sex ferrugineis puncto ocellari fœtis.

Papilio Ceto, *alis integris, atro-fuscis, utrinquè serie macularum fulvarum punctis nigris albo pupillatis.* Ochsenh. *Pap. Eur. tom.* 1. *p.* 272. *n°.* 49.

Papilio Ceto. Hubn. *Pap. tab.* 112, *fig.* 578. 579. (Le mâle.)

Il eſt à peu près de la taille de l'*Œmé*. Ses ailes, dont le fond eſt d'un noir-brun & le bord poſtérieur entiér, ont, parallèlement à ce même bord, en deſſous, comme en deſſus, une rangée de ſix taches ferrugineuſes, chargées chacune d'un petit œil noir à prunelle blanchâtre.

Quelquefois l'œil de la première & de la ſixième taches des ailes de devant eſt nul ou à peine diſtinct.

Du midi de la Suiſſe & du Piémont.

161. Satyre Méduse.

Satyrus Meduſa.

Sat. alis integris aùt ſubdentatis, fuſco-nigris, faſciâ maculari ferrugineâ ſeu luteſcente : anticarum utrinquè ocellis 3-5, poſticarum ſubtùs 4-7.

Papilio S. Meduſa, *alis ſubdentatis, concoloribus, fuſcis : omnium faſciâ maculari flavâ ocellis ſubquatuor.* Fab. *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 40. *n°.* 410. — *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 235. *n°.* 734.

Papilio Meduſa. Wien. *Verz. p.* 167. *fam.* F. *n°.* 10.

Papilio Meduſa. Illig. *N. Aufg. Deſſ. tom.* 2. *p.* 184. *n°.* 10.

Papilio Meduſa. Illig. *Magaz. tom.* 3. *p.* 198.

Papilio Meduſa. Hubn. *Pap. tab.* 45. *fig.* 103. 104. (Mas.)

Papilio Meduſa. Schœff. *Icon. tab.* 183. *fig.* 2. 3.

Papilio Meduſa. Brahm. *Inſ. Calend. p.* 458. *n°.* 322.

Papilio Meduſa. Ochsenh. *Pap. Eur. tom.* 1. *p.* 273. *n°.* 50.

Papilio Medea. Herbst, *Pap. tab.* 208. *fig.* 3. 4.

Papilio Medea. Borkh. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 47 & 235. *n°.* 14. — *part.* 2. *p.* 201.

Papilio Medea. Borkh. *Rhein. Magaz. tom.* 1. *p.* 239. *n°.* 20.

Man. Medea. Schrank, *Faun. Boïc. tom.* 2. *p.* 173. *n°.* 1302.

Papilio Ligea. Esp. *Pap. part.* 1. *tab.* 7. *fig.* 2.

Papilio Ligea. Schneid. *Syſt. Beſchr. p.* 105. *n°.* 45.

Papilio Ligea. Lang. *Verz.* 2. *p.* 20. *n°.* 119-124.

Papilio Ligea, var. 4. Scop. *Ent. Carn. p.* 158. *n°.* 436.

Le moyen Nègre à bandes fauves. Engram. *Pap. d'Eur., tom.* 1. *p.* 85. *pl.* 24. *fig.* 44. a. b.

Le Franconien. Engram. *Pap. d'Europe, tom.* 1. *p.* 114. *pl.* 25. *fig.* 47. a. b.

Engram. *Pap. d'Europe, tom.* 1. *pl.* 65. *Suppl.* 11. *fig.* 44. c. d.

Il a près de deux pouces d'envergure. Ses ailes ſont entières ou légèrement dentées, ſuivant le ſexe, d'un noir-brun, avec une bande poſtérieure & maculaire d'un rouge-fauve dans le mâle, d'un jaune-rouſſâtre dans la femelle. Sur cette bande ſont des yeux noirs à prunelle blanche, yeux dont le nombre varie. En effet, les premières ailes en ont de trois à cinq de part & d'autre; les ſecondes trois ou quatre en deſſus, & de quatre à ſept en deſſous. Le corps & les antennes ſont auſſi d'un noir-brun.

La chenille, d'après Hubner, eſt pubeſcente ou un peu velue, d'un vert-tendre, avec des raies longitudinales, les unes blanchâtres, les autres d'un vert-foncé. Elle vit, ſelon les auteurs du Catalogue ſyſtématique des lépidoptères des environs de Vienne, ſur le *panic ſanguin* (*panicum ſanguinale*).

Le papillon eſt commun en mai & en juin dans les bois élevés de pluſieurs parties de l'Europe.

162. Satyre Hypéranthus.

Satyrus Hyperanthus.

Sat. alis integris, ſuprà fuſco-nigris : ſubtùs dilutioribus; poſticis ocellis duobus tribuſque.

Papilio D. F. Hyperanthus, *alis integerrimis, fuſcis : ſubtùs primoribus ocellis tribus, poſticis duobus tribuſque.* Linn. *Syſt. Nat.* 2. *p.* 768. *n°.* 127. — *Fauna Suec. edit.* 2. *p.* 273. *n°.* 1043.

Papilio S. *Hyperanthus.* Fab. *Syſt. Entom. p.* 486. *n°.* 192. — *Spec. Inſ. tom.* 2. *p.* 64. *n°.* 289. — *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 31. *n°.* 354. — *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 216. *n°.* 677.

Papilio media tota pulla, pronâ alarum parte ocellis aliquot è puncto albo, duplici circulo nigro & fordidè luteo cinclo compoſitis illuſtrata. Rai, *Inſ.* 129. *n°.* 7.

Papilio mediùs, omninò fuſcus, plurimis ocellis nigris in circulis luteis ſubtùs ornatus. Petiv. *Muſ. p.* 34. *n°.* 313.

Jac. l'Amir. *Inſ. tab.* 30.

Sepp. *Niederl. Inſ. tom.* 1. *tab.* 4. *fig.* 1-8.

Papilio Hyperanthus. Wien. *Verz. p.* 168. *fam.* F. *n°.* 11.

Illig. *N. Aufg. Deſſ. tom.* 2. *p.* 185. *n°.* 11.

Papilio Hyperanthus. Esp. *Pap. part.* 1. *tab.* 5. *fig.* 1.

Papilio Hyperanthus. Esp. *Pap. part.* 1. *tab.* 57. *fig.* 2-4. (Var.)

Papilio Hyperanthus. Herbst, *Pap. tab.* 197. *fig.* 5-6. 7. 8.

Papilio Hyperanthus. Herbst, *Pap. tab.* 198. *fig.* 1. 2. (Var.)

Papilio Hyperanthus. Fuessl. *Suiſſ. Inſ. p.* 29. *n°.* 556.

Papilio Hyperanthus. Ochsenh. *Pap. Eur. tom.* 1. *p.* 225. *n°.* 29.

Lang. *Verz.* 2. *p.* 21. *n°.* 137-140.

Schwarz, *Raup. Calend. p.* 345.

Naturf. 8. *tab.* 3. *fig.* D.

Papilio Hyperanthus. De Villers, *Ent. Linn. tom.* 2. *p.* 18. *n°.* 25. *tab.* 4. *fig.* 7.

Papilio Hyperanthus. Schneid. *Syſt. Beſchr. p.* 101. *n°.* 41.

Papilio Arete. Schneid. *Syſt. Beſchr. p.* 102. *n°.* 42.

Papilio Hyperanthus. Borkh. *Rhein. Magaz. tom.* 1. *p.* 245. *n°.* 30.

Papilio Arete. Borkh. *Rhein. Magaz. tom.* 1. *p.* 244. *n°.* 29.

Papilio Polymeda. Borkh. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 84 & 240. *n°.* 23.

Papilio Hyperanthus. Muller, *Zool. Dan. p.* 114. *n°.* 1318.

Papilio Arete. Muller, *Faun. Fried. p.* 36. *n°.* 330.

Papilio Vidua. Muller, *Faun. Fried. n°.* 331.

Papilio Hyperanthus. Bergstr. *Nomencl. tab.* 16. *fig.* 7. 8. & *tab.* 17. *fig.* 5-8.

Papilio Vidua. Bergstr. *Nomencl. tab.* 30. *fig.* 6. 7. & *tab.* 63. *fig.* 3. 4.

Papilio Polymeda. Hubn. *Pap. tab.* 38. *fig.* 172. 173. 173*.

Papilio Polymeda. Scop. *Ent. Carn. p.* 157. *n°.* 434.

Triſtan. De Geer. *Mem. Inſ. tom.* 2. *part.* 1. *p.* 150. *tab.* 2. *fig.* 9. 10.

Triſtan. Geoffr. *Hiſt. Inſ. tom.* 2. *p.* 47. *n°.* 14.

Le Triſtan. Engram. *Pap. d'Europe, tom.* 1. *p.* 122. *pl.* 27. *fig.* 52. a-f.

Il a un peu plus d'un pouce & demi d'envergure. Ses quatre ailes ſont entières, d'un noir-brun en deſſus, avec une petite frange blanchâtre au bord poſtérieur.

Le deſſous eſt plus clair que le deſſus, avec des yeux noirs à prunelle blanche & à iris jaunâtre. Les ſecondes ailes en ont conſtamment cinq, dont deux groupés tranſverſalement près du bord antérieur, les trois autres alignés dans le même ſens vers l'angle de l'anus. Les premières ailes en ont tantôt deux, tantôt trois, dont le troiſième ou le poſtérieur plus petit. Dans certains individus on voit en deſſus l'empreinte de quelques-uns de ces yeux. Les deux ſurfaces du corps ſont colorées comme celles des ailes. Les antennes ſont noires, annelées de gris, avec le deſſous de la maſſue ferrugineux.

Quelquefois les yeux du deſſous des ailes ſont remplacés par des points jaunâtres.

Très-commun, aux mois de juillet, d'août & de ſeptembre, dans les bois & dans les prairies de l'Europe.

La chenille eſt d'un gris-blanchâtre, avec une ligne noirâtre, dorſale. Elle vit ſolitairement ſur le *millet épars* (*milium effuſum*), le *paturin annuel* (*poa annua*).

La chryſalide eſt courte, preſque ronde, à peu près de la couleur de la chenille.

163. Satyre Janira.

Satyrus Janira.

Sat. alis dentatis, ſuprà fuſcis : anticis utrinquè ocello apicis unico : poſticis ſubtùs flaveſcenti-cinereis, faſciâ dilutiore punctis ocellaribus nigris 1-3.

Papilio N. Janira, *alis dentatis, fuſcis : primoribus ſubtùs luteis, ocello unico : poſterioribus ſubtùs punctis tribus vel duobus.* Linn. *Syſt. Nat.* 2. *p.* 774. *n°.* 156. — *Faun. Suec. edit.* 2. *p.* 276. *n°.* 1053. (Mas.)

Papilio N. Jurtina, *alis dentatis, fuſcis : primoribus ſuprà liturâ flavâ, ocello utrinquè unico ; poſterioribus cæcis.* Linn. *Syſt. Nat.* 2. *p.* 774. *n°.* 155. — *Faun. Suec. edit.* 2. *p.* 276. *n°.* 1052. (Fem.)

Papilio Coridon. Linn. *Faun. Suec. edit.* 1. *p.* 239. *n°.* 786. (Fem.)

Papilio N. *Janira.* Fab. *Syſt. Entom. p.* 497. *n°.* 235. — *Spec. Inſ. tom.* 2. *p.* 81. *n°.* 358.

Papilio N. *Jurtina.* Fab. *Syſt. Entom. p.* 498. *n°.* 236. — *Spec. Inſ. tom.* 2. *p.* 81. *n°.* 359.

Papilio Janira, β *Jurtina.* Fab. *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 44. *n°.* 433. — *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 241. *n°.* 752.

Petiv. *Muſ.* 34. *n°.* 309.

Rai, *Inſ.* 124. *n°*. 16. 17.

Albin. *Inſ. tab.* 55.

Jac. l'Amir. *Inſ. tab.* 29.

Reaum. *Inſ.* 1. *tab.* 11. *fig.* 1.

Roes. *Inſ. part.* 3. *tab.* 34. *fig.* 7. 8. *cluſſ.* 1. *Pap. diurn.*

Schœff. *Icon. tab.* 242. *fig.* 1. 2.

Schœff. *Icon. tab.* 273. *fig.* 1. 2. 5. 6.

Schneid. *Syſt. Beſchr. p.* 121. *n°.* 60.

Fuessl. *Suiſſ. Inſ. p.* 29. *n°.* 567. 568.

Lang. *Verz.* 2. *p.* 19. *n°.* 106-111.

Rossi, *Faun. Etr. tom.* 2. *p.* 149. *n°s.* 1011. 1012.

Schwarz, *Raup. Calend. p.* 38. 39. 483. 625.

Bergstr. *Nomencl. tab.* 23. *fig.* 1-9. (Var.)

Bergstr. *Nomencl. tab.* 93. *fig.* 5. 6. (Var.)

Sepp. *Niederl. Inf. tom.* 1. *tab.* 5. *fig.* 1-6.

Lewin. *Inf. tab.* 18. *fig.* 1-5.

Scop. *Ent. Carn. p.* 157. 158. *n°.* 435.

Muller, *Zool. Dan. p.* 115. *n°.* 1324.

Muller, *Faun. Fried. p.* 34. *n°s.* 316. 317.

Wien. *Verz. p.* 167. *fam.* F. *n°.* 8.

Papilio Janira. Ochsenh. *Pap. Eur. tom.* 1. *p.* 218. *n°.* 27.

Papilio Janira. Esp. *Pap. part.* 1. *tab.* 10. *fig.* 1. 2.

Papilio Janira. Esp. *Pap. part.* 1. *tab.* 82. *cont.* 32. *fig.* 5. (Aberratio.)

Papilio Hiſpulla. Esp. *Pap. part.* 1. *tab.* 119. *cont.* 74. *fig.* 1. (Mas.) *fig.* 2. (Fem.)

Papilio Erymanthea. Esp. *Pap. part.* 1. *tab.* 90. *cont.* 40. *fig.* 4. (Var.?)

Papilio Jurtina. Illig. *N. Aufg. Deſſ. tom.* 2. *p.* 181. *n°.* 8.

Papilio Hiſpulla. Illig. *Magaz. tom.* 5. *pag.* 182.

Papilio Jurtina. Hubn. *Pap. tab.* 36. *fig.* 161. 162. (Fem.)

Papilio Janira. Hubn. *Larv. Lepid.* 1. *Pap.* 1. *Nymph.* F. a. *fig.* 2. a. b.

Papilio Hiſpulla. Hubn. *Pap. tab.* 116. *fig.* 593. 594. (Mas.) *fig.* 595. 596. (Fem.)

Papilio Janirus. Herbst, *Pap. tab.* 206. *fig.* 7. 8.

Herbst, *tab.* 207. *fig.* 1. 2.

Papilio Erymanthea. Herbst, *Pap. tab.* 202. *fig.* 3. 4. (Var.?)

Papilio Janira. Borkh. *Rhein. Mag. tom.* 1. *p.* 245. *n°.* 32.

Borkh. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 73 & 234. *n°.* 12.

Papilio Erymanthea. Borkh. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 104. *n°.* 46. (Var.?)

Papilio Pamphilus. Hufnag. *Magaz. tom.* 2. *p.* 76. *n°.* 39. & *p.* 90.

Papilio Pamphilus. Naturf. 6. *p.* 9. *n°.* 39.

Maniola Lemur. Schrank, *Faun Boïc. tom.* 2. *p.* 175, *n°.* 1305.

Corydon. Geoffr. *Hiſt. Inf. tom.* 2. *p.* 49. *n°.* 17.

Myrtil. Geoffr. *Hiſt. Inf. tom.* 2. *p.* 50. *n°.* 18.

Le Mirtil. Engram. *Pap. d'Europe, tom.* 1. *p.* 125. *pl.* 28. *fig.* 54. a-h.

Le Mirtil. Engram. *Pap. d'Europe, tom.* 1. *p.* 263. *pl.* 66. *Suppl.* 12. *fig.* 54. l. m. i. k. (Var.)

Le Mirtil. Engram. *Pap. d'Europe, tom.* 1. *p.* 263. *pl.* 67. *Suppl.* 13. *fig.* 54. o. p. q. r.

Linnæus a donné le mâle de ce ſatyre ſous le nom de *Janira*, & la femelle primitivement ſous celui de *Coridon*, puis ſous celui de *Jurtina*. Pluſieurs auteurs ont fait de même.

Il a entre un pouce & demi & deux pouces d'envergure. Le deſſus des ailes eſt d'un brun-noirâtre, légèrement chatoyant. Les premières, dont le bord terminal eſt entier, ont, vis-à-vis du ſommet, un œil noir à prunelle blanche. Dans le mâle, cet œil eſt petit & entouré d'un cercle rouſſâtre; dans la femelle au contraire il eſt grand & placé ſur une bande fauve, tranſverſale, un peu bifide antérieurement, coupée dans toute ſa longueur par des nervures du même brun que le fond, & adhérant par ſon côté interne à un eſpace diſcoïdal également fauve. Les ſecondes ailes ſont dentées. Leur deſſus eſt ſans taches dans le mâle; mais dans la femelle on voit ordinairement un point fauve vers le milieu de la ſurface.

Le deſſous des ailes ſupérieures eſt fauve, avec les bords cendrés, & un œil comme du côté oppoſé.

Le deſſous des ailes inférieures eſt d'un cendré-jaunâtre, & traverſé obliquement au-delà du milieu par une bande plus claire, large, finuée intérieurement, ſans taches ou avec un ſeul point noir ocellé dans la femelle, offrant dans le mâle deux points ſemblables, très-éloignés l'un de l'autre, & parfois un troiſième plus petit & moins diſtinct, ſitué entre le poſtérieur & l'angle de l'anus. Les deux ſurfaces du corps ſont de la couleur de celles des ailes. Les antennes ſont noirâtres en deſſus; griſâtres en deſſous, avec la maſſue ferrugineuſe.

Tel eſt le *Janira* dans les régions ſeptentrionales & tempérées de l'Europe. A Ténériſſe, en Eſpagne, en Portugal, dans le midi de la France & même quelquefois aux environs de Paris, les femelles ont le deſſus des ailes inférieures, traverſé en majeure partie par une bande fauve, finuée; & le deſſous des mêmes ailes un peu glacé de violet, avec du jaune ſur la bande pâle. Eſper a fait de ces femelles une eſpèce particulière ſous le nom de *Hiſpula*, quoique leurs mâles ſoient comme dans les contrées du nord de l'Europe.

Engramelle repréſente des mâles tout blancs en deſſus, & une femelle dans laquelle le fauve eſt remplacé de part & d'autre par une couleur blanchâtre.

L'individu figuré par Eſper, *tab.* 82, eſt blanc en deſſus & en deſſous, avec le diſque des ailes ſupérieures fauve.

La chenille a l'anus terminé par une pointe bifide. Son corps eſt vert, avec une ligne blanche, longitudinale, placée de chaque côté au deſſus des pattes. Elle vit ſur le *paturin des prés* (*poa pratenſis*) & ſur quelques autres graminées.

La chryſalide eſt verdâtre, rayée de brun ſur l'enveloppe des ailes. Le papillon en ſort en juillet. Il eſt très-commun partout, notamment dans les endroits où il y a des ronces en fleurs.

N. B. L'*Erymanthea* d'Eſper & de quelques auteurs nous paroît en être une variété mâle, dont les ailes ſupérieures ont deux yeux en deſſus & trois en deſſous, & les ailes inférieures une ſuite de cinq points ocellés en deſſous. Elle eſt de la Hongrie.

164. Satyre Eudora.

Satyrus Eudora.

Sat. alis dentatis, ſuprà fuſceſcentibus : anticis (mas) *punctо nigro*, (fem.) *duobus, ſubtùs ocellis totidem : poſticis ſubtùs griſeſcenti-cinereis, faſciâ dilutiore immaculatâ.*

Papilio S. Eudora, *alis dentatis, fuſcis : anticis utrinquè diſco ferrugineo, ocello maris unico, fœminæ duobus.* Fab. *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 44. *n°.* 435. — *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 243. *n°.* 755.

Papilio Eudorus. Herbst, *Pap. tab.* 205. *fig.* 5-8.

Papilio Eudora. Esp. *Pap. part.* 1. *tab.* 45. *Suppl.* 21. *fig.* 1.

Papilio Eudora. Esp. *Pap. part.* 1. *tab.* 69. *cont.* 19. *fig.* 1. 2.

Papilio N. Janirula, *alis dentatis, fuſcis : primoribus ſuprà punctо obliterato nigro, ſubtùs ocello unico : poſticis ſubtùs punctis ocellaribus nullis.* Esp. *Pap. part.* 1. *tab.* 113. *cont.* 68. *fig.* 1. (Mas.)

Papilio Eudora. Schœff. *Icon. tab.* 213. *fig.* 1. 2.

Papilio Eudora. Borkh. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 74 & 235. *n°.* 15. — *part* 2. *p.* 201.

Papilio Eudora. Borkh. *Rhein. Magaz. tom.* 1. *p.* 238. *n°.* 18.

Schneid. *Syſt. Beſchr. p.* 123. *n°.* 61.

Lang. *Verz.* 2. *p.* 19. *n°.* 112-114.

Illig. *Magaz. tom.* 3. *p.* 192.

Papilio Eudora. Bergstr. *Nomencl.* 1. *tab.* 89. *fig.* 2. 3.

Papilio Eudora. Hubn. *Pap. tab.* 36. *fig.* 160. 163. (Mas.) *fig.* 164. (Fem.)

Papilio Eudora. Ochsenh. *Pap. Eur. tom.* 1. *p.* 223. *n°.* 28.

Papilio Lycaon. Nature. 3. *tab.* 2. *fig.* d. e. f.

Le Miſs. Engram. *Pap. d'Europe, tom.* 1. *p.* 127. *pl.* 28. *fig.* 55. a. b.

Engram. *Pap. d'Europe, tom.* 1. *p.* 264. *pl.* 67. *Suppl.* 13. *fig.* 55. c. d. e. f.

Il a de très-grands rapports avec le *Janira*; mais il eſt conſtamment plus petit & d'un brun moins noirâtre; l'œil du deſſus des ailes ſupérieures eſt remplacé dans le mâle par une tache noire, orbiculaire; la femelle a deux taches ſemblables ſur le deſſus des mêmes ailes, & deux yeux ſur leur deſſous; la ſurface inférieure des ſecondes ailes eſt d'un cendré moins jaunâtre, & la bande qui la traverſe eſt ſans points oculaires dans les deux ſexes; cette bande eſt d'ailleurs moins large & moins apparente.

On le trouve en Saxe, en Autriche, dans le midi de la France. M. Duponchel l'a pris communément dans le département de la Lozère & aux environs de Perpignan.

N. B. Fabricius ſe trompe en diſant que le milieu des premières ailes eſt fauve en deſſus dans chaque ſexe. Cela n'eſt vrai que pour la femelle. Le mâle, comme nous l'avons dit, ne diffère du mâle du *Janira*, que parce qu'il eſt un peu plus pâle, & parce que la tache noire du ſommet de ſes premières ailes n'a point de prunelle.

165. Satyre Clymène.

Satyrus Clymene.

Sat. alis dentatis, fuſcis : anticis utrinquè diſco rufo ocelloque apicis; poſticis ſerie macularum ocellatarum ſuprà 3-4, *ſubtùs* 7.

Papilio S. Clymene, *alis dentatis, fuſcis liturâ ferrugineâ : poſticis ocellis ſuprà ſubtribus, ſubtùs ſubſeptem.* Fab. *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 44. *n°.* 434. — *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 242. *n°.* 753.

Papilio N. Clymene, *alis dentatis, fuſcis : primoribus utrinquè liturâ diſci fulvâ & ocello in apice : poſticis ſuprà punctis tribus nigris, ſubtùs ſerie ocellorum ſeptem cæcorum.* Esp. *Pap. part.* 1. *p.* 165. *tab.* 85. *cont.* 35. *fig.* 1. 2. (Mas.) *fig.* 3. (Fem.)

Papilio Climene. Borkh. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 102. — *part.* 2. *p.* 210. *n°.* 44.

Schneid. *Syſt. Beſchr. p.* 121. *n°.* 59.

Illig. *Magaz. tom.* 3. *p.* 190.

Papilio Climene. Hubn. *Pap. tab.* 37. *fig.* 165. 166. (Fem.)

Papilio Clymene. Ochsenh. *Pap. Eur. tom.* 1. *p.* 215. *n°.* 25.

Il eſt un peu plus grand que le *Janira*. Ses

ailes supérieures sont entières, d'un brun-obscur de part & d'autre, avec le milieu d'un roux plus ou moins foncé, & le sommet précédé d'un œil noir à iris fauve, sans prunelle en dessus, pupillé de blanc en dessous.

Les secondes ailes sont dentées. Leur dessus est d'un brun-obscur, avec une rangée postérieure de trois à quatre taches fauves, orbiculaires, dont deux au moins chargées chacune d'un point noir.

Le dessous des mêmes ailes est d'un cendré-jaunâtre dans le mâle, d'un cendré-grisâtre dans la femelle, avec une suite de sept taches noires, ocellées, dont la seconde & la troisième, à partir d'en haut, plus petites & parfois peu distinctes, les deux postérieures réunies.

Des parties boisées qui avoisinent le Volga.

166. Satyre Tithonius.

Satyrus Tithonius.

Sat. alis denticulatis, suprà fulvis, basi orisque fuscis: anticis utrinquè ocello bipupillato: posticis subtùs nebulolo-flavescentibus, fasciâ sesquialterâ dilutiore punctisque ocellaribus quinque.

Papilio P. R. Tithonius, *alis subdentatis, concoloribus, disco luteis: primoribus ocello bipupillato, posticis punctis duobus albis.* Linn. *Mant.* 1. 537.

Papilio S. Pilosellæ, *alis dentatis, fuscis, disco fulvo: anticis utrinquè ocello nigro pupillâ geminâ: posticis subtùs punctis ocellaribus niveis.* Fab. *Syst. Entom. p.* 497. *n°.* 253. — *Spec. Inf. tom.* 2. *p.* 80. *n°.* 355. — *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 43. *n°.* 428. — *Entom. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 240. *n°.* 748.

Papilio Tithonius. Herbst, *Pap. tab.* 189. *fig.* 5-8.

Papilio Tithonius. Fuessl. *Suiff. Inf. p.* 31. *n°.* 603.

Papilio Tithonius. Bergstr. *Nomencl. tab.* 18. *fig.* 5-9.

Papilio Tithonius. Lewin. *Inf. tab.* 22. *fig.* 1-5.

Papilio Tithonus. Ochsenh. *Pap. Eur. tom.* 1. *p.* 210. *n°.* 22.

Sepp. *Niederl. Inf. tom.* 1. *tab.* 3. *fig.* 1-8.

Naturf. 3. *tab.* 2. *fig.* a. b. c.

Papilio Pilosellæ. Cyrill. *Ent. Neap.* 1. *tab.* 3.

Papilio Phædra. Esp. *Pap. part.* 1. *tab.* 9. *fig.* 1.

Papilio Phædra. Esp. *Pap. part.* 1. *tab.* 28. *Suppl.* 4. *fig.* 3.

Papilio Phædra. Schneid. *Syst. Beschr. p.* 124. *n°.* 62.

Papilio Herse. Wien. *Verz. p.* 320. *fam.* F. *n°s.* 8. 9.

Illig. *N. Aufg. Dess. tom.* 2. *p.* 182. *n°s.* 8. 9.

Illig. *Magaz. tom.* 3. *p.* 195.

Papilio Herse. Lang. *Verz.* 2. *p.* 19. *n°.* 115-118.

Papilio Herse. Hubn. *Pap. tab.* 35. *fig.* 156. 157. (Fem.)

Papilio Herse. Hubn. *Pap. tab.* 119. *fig.* 612. (Mas.)

Papilio Herse. Borkh. *Rhein. Magaz. tom.* 1. *p.* 244. *n°.* 28.

Papilio Amaryllis. Borkh. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 80 & 238. *n°.* 19. — *part.* 2. *p.* 205.

Amaryllis. Geoffr. *Hist. Inf. tom.* 2. *p.* 52. *n°.* 20.

L'Amarillis. Engram. *Pap. d'Europe, tom.* 1. *p.* 123. *pl.* 27. *fig.* 53. a-e.

L'Amarillis. Engram. *Pap. d'Europe, tom.* 1. *p.* 262. *pl.* 66. *Suppl.* 12. *fig.* 53. f. g. (Var.)

Il a environ un pouce & demi d'envergure. Les quatre ailes sont légèrement dentées, fauves en dessus, avec la base & le pourtour d'un brun-obscur. Les premières, dont le dessus ne diffère du dessous que parce qu'il est traversé au milieu dans les mâles par une bande brune un peu oblique, ont de part & d'autre, vis-à-vis du sommet, un œil noir à double prunelle blanche.

Le dessus des secondes ailes est sans taches dans les mâles. Dans les femelles, il offre à l'extrémité inférieure de la partie fauve deux yeux semblables à celui dont il vient d'être question, mais très-petits, surtout l'antérieur, & à prunelle simple.

Le dessous des mêmes ailes est d'un jaunâtre-obscur, avec deux bandes transverses plus claires, dont l'antérieure très-courte, appuyée sur le milieu du bord d'en haut & précédée en dehors de deux points blancs ocellés; la postérieure en zig-zag, atteignant les deux bords, & précédée aussi en dehors, mais vers l'angle anal, de trois points blancs ocellés. Ces points sont entourés de brun-ferrugineux, couleur qui domine sur le bord terminal de l'aile & que font encore ressortir les cils gris de ce même bord. Le corps est brun en dessus, jaunâtre en dessous. Les antennes sont noirâtres, annelées de gris, avec le bout de la massue ferrugineux.

Il est des femelles dont les deux surfaces des ailes supérieures ont un second œil très-petit, situé à égale distance du premier & de l'angle interne.

On rencontre quelquefois une variété dans la-

quelle le fauve eſt remplacé par du blanc-ſale. Engramelle l'a figurée pl. 66, *Suppl.* 12. *fig.* 55. f. g.

La chenille eſt d'un vert plus ou moins foncé, avec une ligne rougeâtre, longitudinale, ſur chacun des côtés. Sa tête eſt à peu près de cette dernière couleur. Elle vit ſur le *paturin annuel* (*poa annua*), & ſe métamorphoſe à la fin de mai ou au commencement de juin.

La chryſalide eſt grisâtre, avec quelques taches noirâtres. Elle eſt ſuſpendue par la queue. Le papillon en ſort en juillet. Il fréquente les bois de l'Europe & ſe repoſe ſur la bruyère commune. Très-abondant au bois de Boulogne.

167. Satyre Ida.

Satyrus Ida.

Sat. alis denticulatis, ſuprà fulvis, baſi oriſque fuſcis : anticis utrinquè ocello bipupillato : poſticis ſubtùs nebuloſo-griſeſcentibus, ſuſciis duabus dilutioribus punctiſque ocellaribus nullis.

Papilio S. Ida, *alis ſubdentatis, fuſcis, diſco fulvo : anticis utrinquè ocello nigro bipupillato : poſticis ſubtùs griſeo-variis.* Fab. *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 43. *n°.* 429. — *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 240. *n°.* 749.

Papilio Ida. Esp. *Pap. part.* 1. *tab.* 92. *cont.* 42. *fig.* 2. (Fem.)

Papilio Ida. Esp. *Pap. part.* 1. *tab.* 102. *cont.* 57. *fig.* 3. (Mas.)

Papilio Ida. Herbst, *Pap. tab.* 190. *fig.* 1-4.

Papilio Ida. Borkh. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 105. *n°.* 47. — *part.* 2. *p.* 210.

Papilio Ida. Rossi, *Mant. tom.* 2. *p.* 10. *n°.* 348.

Illig. *Magaz. tom.* 3. *p.* 195.

Papilio Ida. Hubn. *Pap. tab.* 35. *fig.* 158. (Mas.) *fig.* 159. (Fem.)

Papilio Ida. Ochsenh. *Pap. Eur. tom.* 1. *p.* 212. *n°.* 23.

Papilio Actæa. Lang. *Verz.* 2. *p.* 23. *n°.* 165.

Engram. *Pap. d'Europe, tom.* 1. *p.* 524. 3°. *Suppl. pl.* 5. *fig.* 53. h.

Le mâle & la femelle de ce ſatyre reſſemblent aux deux ſexes du *Tithonius*, par le deſſus des quatre ailes & par le deſſous des ſupérieures.

Mais le deſſous des inférieures offre des différences qui conſiſtent en ce que le fond eſt d'un gris-obſcur, au lieu d'être jaunâtre; en ce que les deux bandes plus claires ſont blanchâtres & atteignent l'une & l'autre le bord d'en haut & le bord interne; en ce que la bande poſtérieure, qui eſt plus diſtincte, a la partie ſupérieure bifide; enfin, en ce qu'il n'y a aucun point ocellé ſur le côté externe de ces bandes.

Il habite l'Italie, le Portugal, l'Eſpagne & le midi de la France. — Fabricius ſe trompe en diſant qu'il ſe trouve en Allemagne.

N. B. Quelquefois le deſſus des ſecondes ailes de la femelle eſt tout-à-fait dépourvu d'yeux.

168. Satyre Bathſéba.

Satyrus Bathſeba.

Sat. alis denticulatis, ſuprà fulvis baſi oriſque fuſcis : anticis utrinquè ocello bipupillato : poſticis ſubtùs nigricantibus, faſciâ flaveſcente, mediâ, extùs unidentatâ ocelliſque quinis marginatâ.

Papilio S. Bathſeba, *alis repandis, fuſcis, diſco ferrugineo : anticis utrinquè ocello bipupillato : poſticis ſubtùs fuſcis, faſciâ albâ.* Fab. *Entom. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 235. *n°.* 730.

Papilio S. Salome, *alis anticis fuſcis, faſciâ rufâ ocello unico : poſticis tribus, ſubtùs ſtriga dentatâ albâ ocelliſque quinque.* Fab. *Entom. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 238. *n°.* 744.

Papilio Paſiphae. Esp. *Pap. part.* 1. *tab.* 67. *cont.* 17. *fig.* 4.

Papilio Paſiphae. Esp. *Pap. part.* 1. *tab.* 97. *cont.* 52. *fig.* 1.

Papilio Paſiphae. Herbst, *Pap. tab.* 190. *fig.* 5.-8.

Papilio Paſiphae. Borkh. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 97. *n°.* 36. — *part.* 2. *p.* 208.

Schneid. *Syſt. Beſchr. p.* 113. *n°.* 53.

Illig. *Magaz. tom.* 3. *p.* 200.

Papilio Paſiphae. Hubn. *Pap. p.* 37. *fig.* 167. (Mas.) *fig.* 168. 169. (Fem.)

Papilio Paſiphae. Ochsenh. *Pap. Eur. tom.* 1. *p.* 214. *n.* 24.

Le Titire. Engram. *Pap. d'Europe, tom.* 1. *p.* 262. *pl.* 67. *Suppl.* 12. *fig.* 53. a. b. *bis.*

Le *Salome* & le *Bathſeba* de Fabricius ne ſont qu'une ſeule eſpèce, dont le premier eſt le mâle & le ſecond la femelle.

Elle a le port & à peu près la taille du *Tithonius*. Elle eſt auſſi de la même couleur en deſſus, mais le brun-obſcur domine davantage à la baſe des ailes, ſurtout dans les mâles. Celles de devant, dont le deſſous eſt fauve, avec les bords noirâtres, ont de part & d'autre, vis-à-vis du ſommet, un œil noir à double prunelle blanche.

Le deſſus des ſecondes ailes a une rangée courbe & poſtérieure de trois à quatre yeux plus petits & à prunelle ſimple. Le deſſous des mêmes ailes eſt d'un brun-noirâtre-clair, avec une bande jaune, pâle, tranſverſe & arquée, dont le côté externe eſt unidenté dans ſon milieu, & précédé

dans toute ſa longueur par une rangée de cinq yeux noirs à prunelle blanche & à iris rouſſâtre. Il arrive que quelques-uns de ces yeux ſont effacés ; c'eſt ce qui fait dire à Fabricius, en décrivant ſon *Bathſeba*, qu'il y en a tantôt quatre, tantôt moins. Le corps eſt brun. Les antennes ſont noirâtres, annelées de gris, avec le deſſous de la maſſue ferrugineux.

Quelquefois la femelle a un point noirâtre vers le milieu du bord interne des ailes ſupérieures.

On trouve cette eſpèce dans le midi de la France, en Eſpagne, &c. M. le chevalier Deſfontaines l'a rapportée de la Barbarie où elle eſt très-commune.

169. Satyre Œdipe.

Satyrus Œdipus.

Sat. alis integris, ſuprà fuſco-nigris : ſubtùs fuſceſcenti-lutois ; poſticis ocellis ſex ſerie digeſtis extùſque lineâ argenteâ marginatis, anteriori remoto.

Papilio S. Œdipus, *alis integerrimis, ſuprà nigris, immaculatis : ſubtùs fuſcis ; anticis ocellis ſubtribus, poſticis quinque.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 218. *n°.* 681. (Mas.)

Papilio S. Miris, *alis integerrimis, fuſcis : poſticis ſuprà ocellis duobus minutis, ſubtùs ſex, exteriori remoto.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 5. *Suppl. p.* 429. *n°.* 693. 4. (Fem.)

Papilio Œdipus. Ochsenh. *Pap. Eur. tom.* 1. *p.* 315. *n°.* 71.

Papilio Œdippe. Borkh. *Pap. Eur. part.* 2. *p.* 205. *n°s.* 23. 24.

Papilio Œdipus. Hubn. *Pap. tab.* 138. *fig.* 702. 703. (Fem.)

Papilio Pylarge. Hubn. *Pap. tab.* 52. *fig.* 245. 246.

Papilio Pylarge. Illig. *Magaz. tom.* 3. *p.* 202.

Papilio Geticus. Esp. *Pap. part.* 1, *tab.* 107. *cont.* 62. *fig.* 5. (Mas.)

Papilio Geticus. Esp. *Pap. part.* 1. *tab.* 102. *cont.* 57. *fig.* 2. (Fem.)

Papilio Iphigenus. Herbst, *Pap. tab.* 198. *fig.* 5.-8.

L'*Œdipus* & le *Miris* de Fabricius ne font qu'une ſeule eſpèce, dont le premier eſt le mâle & le ſecond la femelle.

Elle eſt un peu plus petite que l'*Hypéranthus*, auquel elle reſſemble en deſſus.

Le deſſous de ſes ailes eſt d'un jaune-rouſſâtre, mais un peu nébuleux dans le mâle, avec des yeux noirs à prunelle blanche & à iris d'un jaune-pâle. Les premières ailes en ont tantôt cinq, dont les deux extrêmes fort petits ; tantôt trois ; quelquefois un ſeul, & quelquefois pas du tout. Les ſecondes ailes en ont le plus ſouvent ſix, dont l'antérieur iſolé, les cinq autres contigus & inégaux. Ces yeux ſont précédés en dehors ſur les quatre ailes d'une ligne argentée, courbe en arrière & parallèle au bord poſtérieur dont elle ſuit le contour.

Dans quelques individus femelles, les yeux des ailes inférieures ſont précédés intérieurement par un trait blanchâtre, interrompu, & plus rarement par une bande argentée. Le corps eſt d'un brun-obſcur. Les antennes ſont annelées de blanc & de noir ; elles ont le deſſous de la maſſue ferrugineux.

On le trouve, dans le courant de juin, en Ruſſie, en Hongrie & en Piémont.

N. B. Dans les femelles, ou du moins dans la plupart d'entr'elles, l'empreinte des yeux des ſecondes ailes eſt ſenſible en deſſus.

170. Satyre Héro.

Satyrus Hero.

Sat. alis integris, ſuprà nigricanti-fuſcis : ſubtùs pallidioribus ; poſticis ocellis ſex ſerie digeſtis intùſque vittâ albâ angulatâ, extùs lineâ argentea, marginatis.

Papilio P. R. Hero, *alis integerrimis, fuſcis : ſubtùs anterioribus ocello, poſterioribus ſenis.* Linn. *Syſt. Nat.* 2. *p.* 793. *n°.* 255. — *Faun. Suec. edit.* 2. *p.* 274. *n°.* 1047.

Papilio S. Sabæus, *alis integerrimis, fuſcis : poſticis ſuprà ocellis quatuor cœcis, ſubtùs ſex pupillatis.* Fab. *Syſt. Ent. p.* 530. *n°.* 371. — *Spec. Inſ. tom.* 2. *p.* 67. *n°.* 302. — *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 33. *n°.* 331. — *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 221. *n°.* 694.

Papilio Hero. Esp. *Pap. part.* 1. *tab.* 22. *fig.* 4.

Papilio Hero. Herbst, *Pap. tab.* 198. *fig.* 3. 4.

Papilio Hero. Wien. *Verz. p.* 321. *n°.* 13.

Illig. *N. Auſg. Deſſ. tom.* 2. *p.* 186. *n°.* 13.

Illig. *Magaz. tom.* 3. *p.* 195. — *tom.* 4. *p.* 31.

Naturf. 8. *tab.* 3. *fig.* E. F.

Papilio Hero. Borkh. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 89 & 243. *n°.* 26. — *part.* 2. *p.* 207.

Borkh. *Rhein. Magaz. tom.* 1. *p.* 240. *n°.* 22.

Schneid. *Syſt. Beſchr. p.* 128. *n°.* 65.

Lang. *Verz.* 2. *p.* 23. *n°.* 157-160.

Maniola Hero. Schrank, *Faun. Boïc. tom.* 2. *p.* 179. *n°.* 1310.

Papilio Hero. Hubn. *Pap. tab.* 53. *fig.* 252. 253.

Papilio

Papilio Hero. Ochsenh. *Pap. Eur. tom.* 1. *p.* 313. *n°.* 70.

Le Mœlibée. Engram. *Pap. d'Europe, tom.* 1. *p.* 132. *pl.* 29. *fig.* 59. a. b.

Le fatyre dont il eſt ici queſtion eſt le véritable pap. *Hero* de Linnæus ou le *Sabœus* de Fabricius. Il eſt petit. Ses quatre ailes ſont entières, d'un brun-noirâtre en deſſus, avec une frange blanchâtre. Les ſupérieures n'ont pas de taches dans le mâle, mais dans la femelle elles ont au ſommet un œil noir, à iris fauve & ſans prunelle. Les ailes inférieures ont, vers le bout, une rangée de quatre yeux ſemblables, dont les deux extrêmes conſtamment plus petits, & même manquant dans beaucoup de mâles; il y a en outre un arc fauve à l'extrémité du bord interne.

Le deſſous des quatre ailes eſt un peu moins foncé que le deſſus. Celui des inférieures a un cordon de ſix yeux, dont le quatrième & le cinquième, à partir d'en haut, plus grands: ces yeux, qui ont le fond noir, avec la prunelle d'un blanc-vif, & l'iris d'un fauve-rougeâtre, ſont précédés en dehors par une ligne argentée, courbe en arrière, s'appuyant ſur une ligne fauve, marginale, pareillement courbe, & en dedans par une bande blanche, étroite, dentée extérieurement. Le deſſous des ailes ſupérieures a, vis-à-vis du ſommet, un petit œil plus ou moins diſtinct, placé parfois ſur une bande blanchâtre, interrompue, peu apparente, laquelle eſt ſéparée du bord terminal par une ligne argentée, preſque toujours moins brillante que celle des ailes inférieures. Les deux ſurfaces du corps ſont du même brun que celles des ailes. Les antennes ſont annelées de noir & de blanc, avec le deſſous de la maſſue légèrement rouſſâtre.

Il habite pluſieurs contrées de l'Allemagne & les départemens ſeptentrionaux de la France. On le prend, au mois de juin, dans la forêt de Bondi & dans celle de Meudon près de Paris.

N. B. Dans la femelle, le dernier œil du deſſous des ailes inférieures eſt quelquefois double.

171. Satyre Iphis.

Satyrus Iphis.

Sat. alis integris: anticis utrinquè ruſeſcentibus: poſticis ſuprà fuſcis, ſubtùs vireſcenti-cinereis, ocellis ſex ſerie digeſtis intùs que faſciâ albâ interruptâ, extùs lineâ plumbeâ, marginatis.

Papilio S. Hero, *alis integerrimis, fulvis: ſubtùs anticis ocello, poſticis ſenis.* Fab. *Syſt. Ent. p.* 530. *n°.* 372. — *Spec. Inſ. tom.* 2 *p.* 67. *n°.* 305. — *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 33. *n°.* 352. — *Entom. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 222. *n°.* 695.

Schæff. *Icon. tab.* 208. *fig.* 3. 4.

Papilio Iphis. Wien. *Verz. p.* 321. *n°.* 25. (13-24.)

Illig. *N. Aufz. Deſſ. tom.* 2. *p.* 188. *n°s.* 13. 14.

Illig. *Magaz. tom.* 3. *p.* 196. — *tom.* 4. *p.* 31.

Papilio Iphis. Hubn. *Pap. tab.* 53. *fig.* 249. (Mas.) *fig.* 250. 251. (Fem.)

Papilio Iphis. Ochsenh. *Pap. Eur. tom.* 1. *p.* 310. *n°.* 69.

Papilio Tiphon, *alis integerrimis, ſuprà flaveſcentibus margine paullò ſaturatiore; inferioribus fuſcis, ſubtùs griſeis fuſciâ ſæpiùs interruptâ ocelliſque ſenis minoribus obliteratis.* Esp. *Pap. part.* 1. *p.* 341. *tab.* 35. *Suppl.* 11. *fig.* 3. 4.

Papilio Tiphon. De Prunner, *Lepid. Pedem. p.* 22. *n°.* 44.

Papilio Tiphon. Herbst, *Pap. tab.* 189. *fig.* 1-4.

Bergstr. *Nomencl. tab.* 123. *fig.* 5. 6.

Papilio Tiphon. Schneid. *Syſt. Beſchr. p.* 126. *n°.* 63.

Papilio Tiphon. Lang. *Verz.* 2. *p.* 22. *n°s.* 147-150.

Papilio Tiphon. Borkh. *Rhein. Magaz. tom.* 1. *p.* 243. *n°.* 26.

Papilio Glycerion. Borkh. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 90 & 243. *n°.* 27. — *part.* 2. *p.* 207.

Papilio Amyntas. Poda, *Muſ. Græc. p.* 79. *n°.* 52.

Maniola Manto. Schrank, *Faun. Boïc. tom.* 2. *p.* 180. *n°.* 1313.

Engram. *Pap. d'Europe, tom.* 1. *pl.* 29. *fig.* 56. c. d.

Engram. *Pap. d'Europe, tom.* 1. *p.* 265. *pl.* 68. *Suppl.* 14. *fig.* 56. e. f.

C'eſt le fatyre que Fabricius a donné ſous le nom de *Hero*, le prenant, mais à tort, pour l'eſpèce que Linnæus avoit nommée de la même manière.

Le deſſus des premières ailes eſt d'un rouſſâtre plus ou moins nébuleux, ſuivant le ſexe. Leur deſſous eſt fauve, avec le bout verdâtre & marqué parfois au ſommet d'un petit œil noir, à prunelle blanche & à iris jaunâtre. Cet œil, lorſqu'il exiſte, eſt précédé dans les femelles d'une petite bande blanchâtre, placée tranſverſalement du côté de la baſe.

Le deſſus des ſecondes ailes eſt d'un brun-obſcur, avec une ligne fauve, terminale, plus ou moins diſtincte, tantôt ſeule, tantôt ſurmontée vers l'angle anal d'une à trois taches oculaires. Le deſſous des mêmes ailes eſt d'un cendré-verdâtre, avec une ſuite de ſix petits yeux noirs à prunelle blanche & à iris jaunâtre, leſquels ſont ren-

fermés en dedans par une bande blanche, irrégulière, très-souvent interrompue dans son milieu, & en dehors par une ligne arquée couleur de mine de plomb & s'appuyant sur une ligne fauve correspondante à celle de la surface opposée. Le bord de chaque aile a une légère frange grisâtre. Le corps est brun. Les antennes sont annelées de blanc & de noir.

On le trouve, en juin & en juillet, dans les bois de plusieurs parties de l'Allemagne & des départemens de l'est de la France.

172. Satyre Arcanius.

Satyrus Arcanius.

Sat. alis integris : anticis utrinquè fulvis, extimo fusco : posticis supra fuscis ; subtùs cinereo-rufescentibus, fasciâ albâ angulatâ ocellis 5-6, anteriori remoto, cæteris lineâ argenteâ extùs marginatis.

Papilio P. R. Arcanius, *alis integerrimis, ferrugineis : subtùs primoribus ocello unico ; posticis quinis, primo fasciâ remoto.* Linn. *Syst. Nat.* 2. *p.* 791. *n°.* 242.

Papilio Arcania. Linn. *Faun. Suec. edit.* 2. *p.* 273. *n°.* 1045.

Papilio S. *Arcanius.* Fab. *Syst. Ent. p.* 530. *n°.* 369. — *Spec. Inst. tom.* 2. *p.* 67. *n°.* 301. — *Mant. Inst. tom.* 2. *p.* 35. *n°.* 349. — *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 22. *n°.* 692.

Schæff. *Elem. tab.* 94. *fig.* 3.

Schæff. *Icon. tab.* 127. *fig.* 4. 5.

Papilio Arcanius. Wien. *Verz. p.* 168. *fam.* F. *n°.* 12.

Illig. *N. Aufg. Dess. tom.* 2. *p.* 186. *n°.* 12.

Papilio Arcanius. De Geer, *Mem. Inst. tom.* 2. *part.* 1. *p.* 148. *tab.* 2. *fig.* 5. 6.

Papilio Arcanius. Esp. *Pap. part.* 1. *tab.* 21. *fig.* 4.

Papilio Arcanius. Herbst, *Pap. tab.* 188. *fig.* 1. 2.

Papilio Arcania. Ochsenh. *Pap. Eur. tom.* 1. *p.* 317. *n°.* 72.

Papilio Arcanius. Borkh. *Rhein. Magaz. tom.* 1. *p.* 242. *n°.* 25.

Papilio Arcania. Borkh. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 88 & 242. *n°.* 25. — *part.* 2. *p.* 206.

Schneid. *Syst. Beschr. p.* 130. *n°.* 67.

Lang. *Verz.* 2. *p.* 22. *n°.* 153-156.

Fuessl. *Suiss. Inst. p.* 31. *n°.* 603.

Rossi, *Faun. Etr. tom.* 2. *p.* 146. *n°.* 1001.

Papilio Arcania. Hufnag. *Magaz. tom.* 2. *p.* 72. *n°.* 31.

Naturf. 6. *p.* 7. *n°.* 31. — 8. *p.* 121.

Papilio Arcania. Hubn. *Pap. tab.* 51. *fig.* 240-242.

Papilio Amyntas. Scop. *Ent. Carn. p.* 174. *n°.* 457.

Papilio Tullius. Muller, *Faun. Fried. p.* 36. *n°.* 332.

Céphale. Geoff. *Hist. Inst. tom.* 2. *p.* 53. *n°.* 22.

Le Céphale. Engram. *Pap. d'Eur. tom.* 1. *p.* 129. *pl.* 29. *fig.* 57. a. b. c. d.

Il a environ un pouce & demi d'envergure. Ses ailes supérieures sont fauves de part & d'autre, avec le bord terminal d'un brun-noirâtre en dessus, moins foncé en dessous, où l'on voit souvent, vis-à-vis du sommet, un petit œil noir à prunelle blanche & à iris jaunâtre.

Le dessus des ailes inférieures est d'un brun-obscur, avec une petite tache jaunâtre, anale, surmontant un arc fauve. Leur dessous est roussâtre, avec la base d'une teinte cendrée-verdâtre, & le milieu traversé obliquement par une bande blanche, anguleuse, laquelle offre à l'origine de son côté interne un œil noir à prunelle d'un blanc vif, & sur son côté externe quatre ou cinq yeux semblables, dont les deux antérieurs, & l'anal, lorsqu'il existe, plus petits. Il y a en outre une ligne argentée, courbe, tout le long du bord postérieur, lequel est, ainsi que celui des ailes de devant, garni de cils grisâtres. Le corps est brunâtre. Les antennes sont annelées de blanc & de noir, avec le bout de la massue ferrugineux.

Dans quelques femelles, le dessus des ailes inférieures offre deux petits yeux sans prunelle.

Très-commun, en mai & en juillet, aux environs de Paris & dans les départemens voisins.

La chenille est verte avec des lignes dorsales plus foncées, & des lignes latérales jaunes. Elle vit sur la mélique ciliée (*melica ciliata*).

La chrysalide est obtuse, ramassée, noirâtre.

173. Satyre Corinus (1).

Satyrus Corinus.

Sat. alis integris, fulvis : anticis ocello, supra cæco : posticis subtùs cinereo-rufescentibus, fasciâ albâ interruptâ ocellis quinque, anteriori remoto, cæteris lineâ argenteâ extùs marginatis.

Papilio Corinna. Hubn. *Pap. tab.* 105. *fig.* 536. 537.

Papilio Corinna. Illig. *Magaz. tom.* 3. *p.* 190.

(1) Nous n'avons pas pris le nom des auteurs, parce que nous avons une Vanesse appelée *Corinne.*

Papilio Corinna. Ochsenh. *Pap. Eur. tom.* 1. *p.* 223. *n°.* 75.

Il eſt un peu plus petit que l'*Arcanius*. Ses quatre ailes ſont fauves en deſſus, ſans taches aux ſupérieures, avec un œil noir dépourvu de prunelle au ſommet des ſupérieures.

Le deſſous de ces dernières ailes eſt également fauve, avec un œil correſpondant à celui de la ſurface oppoſée, mais ayant une prunelle blanche.

Le deſſous des ſecondes ailes eſt rouſſâtre, avec la baſe cendrée; le milieu traverſé par une bande blanche, interrompue, ſur laquelle ſont cinq yeux, dont l'antérieur iſolé, les quatre autres précédés en dehors d'une ligne argentée, courbe. Ces yeux ſont ſemblables à celui des premières ailes, leſquelles ont auſſi une ligne argentée ſur leur bord terminal.

De la Sicile.

174. Satyre Philéus.

Satyrus Phileus.

Sat. alis integris, ſuprà fuſcis : anticis utrinquè diſco fulvo : poſticis ſubtùs virescenti-nebuloſis, faſciâ albâ recurvâ ocellis ſex lineâ argenteâ extùs marginatis.

Papilio Philea. Hubn. *Pap. tab.* 53. *fig.* 254. 255. (Mas.)

Papilio Philea. Illig. *Magaz. tom.* 3. *p.* 201.

Papilio Satyrion. Esp. *Pap. part.* 1. *tab.* 132. *cont.* 77. *fig.* 2.

Papilio Satyrion, *alis integerrimis, ochreaceis, ſuprà immaculatis : ſubtùs poſticis viridi-fuſcis faſciâ albâ ocelliſque ſenis albo pupillatis.* Ochsenh. *Pap. Eur. tom.* 1. *p.* 322. *n.* 74.

Il eſt un peu plus petit que l'*Arcanius*. Ses ailes ſont entières, d'un brun-obſcur en deſſus, avec le milieu des premières, & une ligne courbe ſur le limbe poſtérieur des ſecondes, fauves.

Le deſſous des ailes ſupérieures ne diffère du deſſus que parce que les bords ſont d'un brun plus clair, & parce qu'il y a quelquefois au ſommet un point noir oculaire.

Le deſſous des ailes inférieures eſt d'un brun-verdâtre, avec une bande blanche, poſtérieure, courbe en dehors, ſinuée en dedans, chargée ſur ſon milieu d'un rang de ſix yeux contigus, noirs & à prunelle très-blanche. Derrière cette bande, il y a une ligne fauve, arquée, que diviſe dans le ſens de ſa longueur une ligne argentée, plus étroite. Le bord terminal de chaque aile eſt garni de part & d'autre d'une petite frange blanchâtre. Le corps eſt de la couleur des ailes. Les antennes ſont annelées de blanc & de noir.

Des montagnes du Tyrol, de la Suiſſe & du Piémont.

N. B. On trouve des individus mâles qui n'ont pas ou preſque pas de fauve aux ailes ſupérieures en deſſus.

175. Satyre Dorus.

Satyrus Dorus.

Sat. alis integris : anticis ſuprà (mas) *fuſcoſcentibus*, (fem.) *luteis ocello cæco : poſticis luteis, ſubtùs faſciâ albidâ extùs argenteo marginatâ ocellis ſex, anteriori remoto.*

Papilio P. R. *Dorus, alis integerrimis : ſuperioribus fuſcoſcentibus unico* (ſæpè 2-3); *inferioribus utrinquè flavis, ocellis ſuprà quatuor cæcis, ſubtùs ſenis pupillatis.* Esp. *Pap. part.* 1. *tab.* 78. *cont.* 28. *fig.* 1.

Papilio Dorus. Herbst, *Pap. tab.* 188. *fig.* 5-8.

Papilio Dorus. Schneid. *Syſt. Beſchr. p.* 129. *n°.* 66.

Papilio Dorus. De Prunner, *Lepid. Pedem. p.* 74. *n°.* 152.

Papilio Dorus. Ochsenh. *Pap. Eur. tom.* 1. *p.* 320. *n°.* 73.

Papilio Dorion. Hubn. *Pap. tab.* 52. *fig.* 247. 248. (Mas.)

Bergstr. *Nomencl. tab.* 122. *fig.* 3. 4.

Papilio Dorion. Illig. *Magaz. tom.* 3. *p.* 192.

Papilio Dorilis. Borkh. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 93. *n°.* 31.

Papilio Lizetta. Cram. *Pap. pl.* 323. *fig.* F. G.

Palémon. Engram. *Pap. d'Europe, tom.* 1. *p.* 267. *pl.* 68. *Suppl.* 14. *fig.* 57. a. b. *bis.*

Il eſt petit, & il a les ailes entières. Les ſupérieures ont le deſſus d'un brun-jaunâtre dans le mâle, avec un petit œil noir à iris fauve vis-à-vis du ſommet; elles ſont d'un jaune-fauve dans la femelle, avec les bords obſcurs & un gros point noir, ſuivi parfois de deux autres plus petits.

Le deſſus des ſecondes ailes eſt d'un jaune-fauve dans les deux ſexes, avec la baſe, la côte, le bord poſtérieur, obſcurs, & une ligne arquée de trois à quatre points noirs. Le bord poſtérieur eſt en outre longé par une ligne fauve, & garni, ainſi que celui des premières ailes, de cils griſâtres.

Le deſſous des quatre ailes eſt d'un jaune-fauve, dans le mâle comme dans la femelle, avec un œil noir à prunelle blanche au ſommet des ſupérieures; avec une bande blanchâtre, large, ſinuée, vers l'extrémité des inférieures. Cette bande, que borde en dehors une ligne argentée, courbe, offre ſix yeux, dont l'antérieur iſolé, le ſuivant & l'anal plus petits que tous les autres.

Les ailes supérieures ont aussi une ligne marginale argentée, & l'œil de leur sommet est précédé du côté de la base par une ligne transverse plus pâle que le fond. Le corps est cendré. Les antennes sont annelées de blanc & de noir, & le bout de leur massue est ferrugineux.

Il se trouve, en juillet, dans le midi de la France, en Espagne & en Portugal.

176. Satyre Léandre.

Satyrus Leander.

Sat. alis integris : anticis fulvis, margine fusco ; posticis fuscis, fascia fulvâ supra serie punctorum nigrorum, subtùs ocellorum lineaque argenteâ marginali.

Papilio S. Leander, *alis integerrimis, fusce-centibus : posticis subtùs cinereis, apice fulvis ocellis sex.* Fab. *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 33. *n°.* 350. — *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 222. *n°.* 693.

Papilio Leander. Esp. *Pap. part.* 1. *tab.* 89. *cont.* 59. *fig.* 5. (Mas.)

Papilio Leander. Ochsenh. *Pap. Eur. tom.* 1. *p.* 309. *n°.* 68.

Papilio Leander. Herbst, *Pap. tab.* 187. *fig.* 7. 8.

Papilio Amaryllis. Herbst, *Pap. tab.* 186. *fig.* 1. 2.

Papilio Amaryllis. Cram. *Pap. pl.* 391. *fig.* A. B.

Papilio Clite. Hubn. *Pap. tab.* 103. *fig.* 526. 527. (Fem.)

Papilio Clite. Illig. *Magaz. tom.* 3. *p.* 190.

Papilio Philadilis. Borkh. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 93. *n°.* 32. — *part.* 2. *p.* 208.

Il est de la taille de l'*Arcanius*. Les premières ailes sont brunes en dessus dans le mâle, avec le milieu fauve ; elles sont fauves dans la femelle, avec le bord postérieur obscur & précédé d'un rang de deux à quatre points noirs. Le dessus des secondes ailes est d'un brun-obscur dans les deux sexes, avec une bande fauve, courbe, postérieure & maculaire, sur laquelle sont alignés de quatre à sept points noirs.

Le dessous des ailes supérieures est constamment fauve, avec un seul œil dans le mâle ; avec deux ou quatre dans la femelle, suivant le nombre qu'il y a du côté opposé.

Le dessous des ailes inférieures est d'un cendré-obscur, avec six ou sept yeux noirs, à prunelle blanche & à iris jaunâtre, disposés sur le côté interne d'une bande fauve que borde en dehors une ligne argentée, courbe. Il y a aussi une ligne semblable, mais moins distincte, sur le bord terminal des ailes de devant.

De la Russie.

N. B. D'après Cramer, le dessus des ailes inférieures est fauve. Cet auteur a-t-il représenté une variété, ou sa figure est-elle inexacte ?

177. Satyre Irius.

Satyrus Irius.

Sat. alis integris, suprà fulvis, margine exteriori fusco : posticis subtùs cinerascentibus, fascia terminali latescente ocellis duobus punctoque intermedio intùs lineâ ferrugineâ, extùs argenteâ, marginatis.

Papilio N. Irius, *alis integerrimis, disco fulvo : posticis suprà ocello, subtùs duobus.* Fab. *Syst. Ent. p.* 487. *n°.* 196. — *Spec. Inf. tom.* 2. *p.* 65. *n°.* 293. — *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 32. *n°.* 340. — *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 158. *n°.* 487.

Papilio Irius. Donow. *Gen. Illustr. of Entom. part.* 1. *an Epitome of the Inf. of New Holl. pl.* 28. *fig.* 1.

Il est petit, fauve en dessus, avec tout le contour extérieur d'un brun-obscur, & un œil noir à prunelle blanche près de l'angle anal des secondes ailes.

Le dessous des ailes supérieures est généralement plus pâle que le dessus.

Le dessous des inférieures est d'un cendré-clair, avec une bande jaunâtre, terminale, large, sur laquelle sont deux yeux noirs à prunelle blanche & à iris fauve, entourés chacun d'un large cercle argenté, & séparés l'un de l'autre par un gros point de cette dernière couleur. Il y a en outre sur le côté interne de la bande susdite une ligne ferrugineuse en zig-zag, & sur son côté externe une ligne argentée courbe. Le corps est noirâtre en dessus, grisâtre en dessous. Les antennes sont annelées de blanc & de noir.

De la Nouvelle-Hollande.

Il y a, dans la collection du Jardin des Plantes, une variété qui se distingue du commun des individus, en ce que ses ailes supérieures sont entièrement brunes de part & d'autre, & avec un petit œil vis-à-vis du sommet en dessous ; en ce que le dessus des inférieures est également brun, avec une bande jaunâtre, correspondante à celle du dessous, mais moins large & atteignant à peine l'œil de l'angle de l'anus.

De la Nouvelle-Hollande.

178. Satyre Lyllus.

Satyrus Lyllus.

Sat. alis integris, suprà dilutè fulvis, limbo posteriori fusco : subtùs anticis ocello unico & lineâ argenteâ subterminali, abbreviatâ ; pos-

ticis flavescenti-griseis fasciâ albidâ obliteratâ punctisque 3-4 niveis nigro cinctis.

Papilio Lyllus. Esp. *Pap. part.* 1. *tab.* 122. *cont.* 77. *fig.* 1. (Mas.)

Papilio Lyllus, *alis integris pallidè ochreaceis: anticis suprà ocello cæco, subtùs albo pupillato strigâque dimidiatâ ad marginem exteriorem argenteâ: posticis subtùs ocellis minutis albo pupillatis.* Ochsenh. *Pap. Eur. tom.* 1. *p.* 307. *n°.* 67.

Papilio Pamphila. Hubn. *Pap. tab.* 109. *fig.* 557. 558. (Fem.)

Papilio Pamphile. Illig. *Magaz. tom.* 3. *p.* 200.

Il reſſemble extrêmement au *Pamphile* (*voyez* n°. 179, ci-après). Les ſeules différences qui l'en ſéparent conſiſtent, en ce que le limbe poſtérieur du deſſus des quatre ailes eſt plus largement & plus fortement obſcur; en ce que le deſſous des ſupérieures offre, du moins dans les femelles, une ligne argentée, preſque terminale, n'atteignant ni le bord d'en haut, ni le bord oppoſé; en ce que les points blancs du deſſous des ailes inférieures ſont entourés de noir & non de brun-rouſſâtre, & en ce que la baſe des mêmes ailes eſt d'un gris-jaunâtre, au lieu d'être d'un cendré-verdâtre.

Il habite l'Eſpagne, le Portugal & le midi de la France. On nous a dit qu'il avoit été trouvé près de Paris. M. Dupouchel l'a pris, en juillet & en août, aux environs de Nîmes, où il n'a pas vu le *Pamphile*, qui paroît cependant à la même époque.

179. Satyre Pamphile.

Satyrus Pamphilus.

Sat. alis integris, ſupra pallidè fulvis, limbo poſtico fuſcescente: ſubtùs anticis ocello unico; poſticis virescenti-griseis, fasciâ albidâ ſinuatâ punctiſque niveis 3-4 ferrugineo cinctis.

Papilio P. R. Pamphilus, *alis integerrimis, flavis: ſubtùs primoribus ocello; poſticis cinereis. faſciâ ocelliſque quatuor obliteratis.* Linn. *Syſt. Nat.* 2. *p.* 791. *n°.* 239. — *Faun. Suec. edit.* 2. *p.* 273. *n°.* 1044.

Papilio Tithyrus. Linn. *Faun. Suec. edit.* 1. *n°.* 789.

Papilio D. F. *Pamphilus.* Fab. *Spec. Inſ. tom.* 2. *p.* 66.

Papilio S. *Pamphilus.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 221. *n°.* 691.

Papilio Pamphilus. Esp. *Pap. part.* 1. *tab.* 21. *fig.* 3. — *tab.* 78. *cont.* 28. *fig.* 4. (Var.)

Papilio Pamphilus. Herbst, *Pap. tab.* 186. *fig.* 78. — *tab.* 187. *fig.* 1-4.

Papilio Pamphilus. Wien. *Verz. p.* 168. *fam.* F. *n°.* 14.

Papilio Pamphilus. Borkh. *Rhein. Magaz. tom.* 1. *p.* 243. *n°.* 27.

Papilio Pamphilus. Schneid. *Syſt. Beſchr. p.* 131. *n°.* 68.

Papilio Pamphilus. Petagna, *Inſt. Entom. tom.* 2. *p.* 450. *n°.* 23.

Papilio Pamphilus. Ochsenh. *Pap. Eur. tom.* 1. *p.* 305. *n°.* 66.

Papilio Pamphilus. Fuessl. *Suiſſ. Inſ. p.* 31. *n°.* 601.

Papilio Pamphilus. Rossi, *Faun. Etr. tom.* 2. *p.* 146. *n°.* 1000.

Papilio Pamphilus. Lang. *Verz.* 2. *p.* 22. *n°.* 143-146.

Papilio Pamphilus. Brahm. *Inſ. Kalend. p.* 358. *n°.* 239.

Maniola Pamphilus. Schrank, *Faun. Boïc. tom.* 2. *part.* 1. *p.* 180. *n°.* 1312.

Papilio Pamphilus. Schwarz, *Raup. Kalend. p.* 42.

Papilio Pamphilus. Bergstr. *Nomencl. tab.* 88. *fig.* 3-6.

Papilio Pamphilus. Lewin, *Inſ. tab.* 23. *fig.* 1-4.

Schæff. *Icon. tab.* 164. *fig.* 2. 3.

Roes. *Inſ.* 3. *tab.* 34. *fig.* 7. 8.

De Geer. *Mem. Inſ. tom.* 2. *part.* 1. *tab.* 2. *fig.* 3.

Papilio Nephele. Borkh. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 87 & 241. *n°.* 24. — *part.* 2. *p.* 206.

Papilio Nephele. Hufnag. *tab. imp. Berl. Magaz. tom.* 2. *p.* 78. *n°.* 43.

Papilio Nephele. Naturf. 4. *p.* 10. *n°.* 43.

Papilio Nephele. Illig. *N. Aufg. Deſſ. tom.* 2. *p.* 189. *n°.* 14.

Papilio Nephele. Hubn. *Pap. tab.* 51. *fig.* 237. (Mas.) *fig.* 238. 239. (Fem.)

Papilio Menalcas. Poda, *Muſ. Græc. p.* 78. *n°.* 50.

Papilio Menalcas. Scop. *Ent. Carn. p.* 175. *n°.* 458.

Papillon Procris. Geoff. *Hiſt. Inſ. tom.* 2. *p.* 33. *n°.* 21.

Le Procris. Engram. *Pap. d'Europe, tom.* 1. *p.* 128. *pl.* 29. *fig.* 56. a. b. — *pl.* 63. *Suppl.* 14. *fig.* 56. g. h. (Var.)

Linnæus avoit d'abord fait de ce Lépidoptère une *Danaïde bigarrée*, mais il l'a mis en dernier lieu parmi les *Plébéiens ruraux*.

Il a de quatorze à quinze lignes d'envergure. Le deſſus des quatre ailes eſt d'un fauve-pâle ou jaunâtre, avec le bord poſtérieur légèrement obſcur & garni d'une frange blanchâtre.

Le deſſous des premières ailes eſt de la même couleur que le deſſus, avec un petit œil noir à prunelle blanche & à iris pâle. Cet œil fait face au ſommet, & dans les femelles, il eſt pour l'ordinaire précédé intérieurement d'une ligne ferrugineuſe-tranſverſale. On le voit quelquefois en deſſus, mais il n'y forme qu'un ſimple point noirâtre.

Le deſſous des ſecondes ailes eſt d'un cendré-verdâtre à la baſe; traverſé au milieu par une bande blanchâtre, oblitérée, étroite, preſqu'en forme d'accolade; enſuite griſâtre juſqu'au bout, avec une rangée de trois à quatre points très-blancs, cerclés de ferrugineux-pâle. Geoffroy & De Geer diſent que ces ailes ſont ſans yeux. Il faut qu'ils ne les aient pas bien examinées, ou qu'ils n'aient vu que des ſujets paſſés; car les points blancs dont nous venons de parler exiſtent toujours. On en voit même quelquefois juſqu'à ſix. Les antennes ſont brunes & annelées de blanchâtre. Le corps eſt griſâtre.

Le Pamphile eſt commun dans toute l'Europe. Il habite les bois, les prairies, les berges des chemins. On le trouve, pour la première fois, au mois de mai, & pour la ſeconde, vers la fin de juillet.

Sa chenille eſt raſe, verte, avec le dos obſcur, une ligne blanche le long de chaque côté, & l'anus fourchu. Elle vit ſur la *crételle de prés* (*cynoſurus criſtatus*).

La chryſalide eſt anguleuſe, verdâtre, & ſuſpendue par la queue.

Nota. Geoffroy s'eſt trompé en prenant la chenille de l'Argynne *Cinxia* (page 281) pour celle de ce ſatyre.

180. SATYRE Davus.

SATYRUS Davus.

Sat. alis integris, fuſceſcentibus : anticis ſuprà punctis duobus aut unico nigris, ſubtùs ocellis totidem; poſticarum paginâ inferiori virescenti-rufâ, faſciâ albâ interruptâ ocelliſque ſex nigris.

Papilio Tetrapus, alis rotundatis, fulvis : ſubtùs cinereſcentibus, faſcia alboidâ ocelliſque quinis. LINN. *Faun. Suec. edit.* 1. *p.* 240. *n°.* 790.

Papilio D. F. DAVUS, *alis integerrimis, fulvis : anticis ocello : ſubtùs albo faſciatis, poſticis ocellis ſex.* FAB. *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 33. *n°.* 347.

Papilio S. Davus. FAB. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 221. *n°.* 69.

Papilio Davus. OCHSENH. *Pap. Eur. tom.* 1. *p.* 302. *n°.* 65.

Papilio Davus. HERBST, *Pap. part.* 8. *p.* 36. *tab.* 186. *fig.* 3-6.

Papilio Laidion. HERBST, *Pap. part.* 8. *pag.* 36. *tab.* 187. *fig.* 5. 6.

Papilio Laidion, *alis integerrimis, fulvis : anticis ſubtùs ocello unico, poſticis ſubtribus marginalibus maculiſque duabus ſublunaribus obſoletis, albis.* BORKH. *Rhein. Magaz. tom.* 1. *p.* 241. *n°.* 24. (Var.)

Papilio Iphis. BORKH. *Rhein. Magaz. tom.* 1. *n°.* 23. (Var.)

Papilio Philoxenus. ESP. *Pap. tab.* 54. *cont.* 4. *fig.* 3. — *tab.* 78. *cont.* 28. *fig.* 3.

Papilio Philoxenus. SCHNEID. *Syſt. Beſchr. p.* 172. *n°.* 64.

Papilio Philoxenus. LANG. *Verz.* 2. *p.* 22. *n°.* 151. 152.

Papilio Tiphon. NATURF. 6. *p.* 15. *n°.* 1.

Maniola Tiphon. SCHRANK, *Faun. Boïc. tom.* 2. *p.* 179. *n°.* 1311.

Papilio Tullia. ILLIG. *Magaz. tom.* 3. *p.* 205.

Papilio Tullia. HUBN. *Pap. tab.* 52. *fig.* 243. 244.

Papilio Tullia, *alis ſubdentatis, flavis : ſubtùs faſciâ dentatâ albâ margineque poſteriorum ocellis ſeptem.* MULLER, *Faun. Fridr. p.* 36. *n°.* 336.

Papilio Isis, *alis integris, ferrugineis, ſuprà immaculatis : ſubtùs anticis faſciâ albâ ocelloque ſolitario; poſticis arcu albo ocelloque ſeſquialtero.* THUNBERG, *Diſſert. Acad. vol.* 3. *p.* 45. (Var.)

Papillon Héro. De GEER, *Mem. Inſ. tom.* 2. *part.* 1. *p.* 147. *tab.* 2. *fig.* 4.

Le Daphnis, ENGRAM. *Pap. d'Europe, tom.* 1. *p.* 131. *pl.* 29. *fig.* 58. a. b.

Il a de quinze à dix-huit lignes d'envergure. Le deſſus des ailes eſt d'un fauve-jaunâtre-obſcur, un peu plus foncé dans le mâle que dans la femelle, avec un point noirâtre ocellé au ſommet des ſupérieures.

Le deſſous de ces dernières ailes reſſemble au deſſus, mais le ſommet eſt plus pâle, & le point ocellé eſt remplacé par un œil noir à prunelle très-blanche. Cet œil eſt précédé intérieurement, dans la femelle, d'une liture blanchâtre, tranſverſale.

Le deſſous des ailes inférieures eſt verdâtre à la baſe; roux au milieu, avec une bande blanche,

transverse, courbe, dentée, souvent interrompue; grisâtre à l'extrémité, avec une série de six (quelquefois de sept) petits yeux noirs à prunelle blanche & à iris d'un jaune-paille. Les antennes & le corps sont, à une légère nuance près, comme dans l'espèce précédente.

On rencontre des individus qui ont deux yeux au sommet des ailes supérieures.

Borkhausen a décrit, sous le nom de *Laidion*, une variété dont le dessous des ailes inférieures n'offroit que trois taches oculaires.

Thunberg a nommé *Isis* une autre variété qui n'avoit à la surface inférieure des secondes ailes que deux yeux, dont un moitié plus petit que l'autre.

De l'est & du nord de l'Europe.

181. Satyre Narcisse.

Satyrus Narcissus.

Sat. alis integris, supra fuscis, areâ fulvâ; subtùs rufescentibus, undis brunneis : utrinquè anticis ocello unico, posticis duobus minutis.

Papilio S. Narcissus, *alis integerrimis, fuscis, areâ rufâ : anticis utrinquè ocello, posticis duobus minutis.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 5. *Suppl. p.* 428. *n°.* 672-3.

Il a environ un pouce & demi d'envergure. Le dessus des ailes est d'un brun-noirâtre, avec un espace fauve, presque discoïdal. L'espace des premières ailes offre un œil noir à prunelle blanche, devant lequel il y a une liture brune, transversale. L'espace des secondes ailes est terminé en arrière par deux yeux semblables, mais plus petits.

Le dessous des quatre ailes est roussâtre & finement ondé de brun, avec la répétition des yeux du dessus. Les antennes sont brunes & annelées de blanchâtre depuis la base jusqu'à la massue. Le corps est de la couleur des ailes.

De l'Ile-de-France. — Selon Fabricius, il se trouveroit aussi au Cap de Bonne-Espérance.

182. Satyre Magus.

Satyrus Magus.

Sat. alis integerrimis, obscurè fulvis : anticis utrinquè ocello pupillâ geminâ; posticis supra duobus, subtùs tribus. Fab.

Papilio. S. *Magus.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 223. *n°.* 700.

Pap. Magus. Jon. *Fig. pict.* 4. *tab.* 33. *fig.* 1.

Le corps est petit, brun. Les premières ailes, dont les deux surfaces se ressemblent à peu près, sont fauves, avec le bord postérieur obscur & précédé d'un grand œil noir à double prunelle blanche. Les secondes ailes ont le dessus d'un fauve-obscur, avec deux petits yeux; le dessous panaché, avec trois.

Il habite.....

(*Traduction de Fabricius.*)

183. Satyre Aphnius.

Satyrus Aphnius.

Sat. alis integris, fuscis : anticis ocello maximo pupillâ geminâ : posticis supra fasciâ fulvâ ocellis quatuor minutis; subtùs albo cinereoque undatis, punctis totidem ocellaribus.

Il a environ un pouce & demi d'envergure. Les premières ailes sont d'un brun-obscur de part & d'autre, avec un grand œil noir à iris fauve & à double prunelle d'un bleu-luisant.

Le dessus des secondes ailes est d'un brun-obscur, avec une bande fauve, large & postérieure, sur laquelle sont alignés quatre petits yeux noirs à simple prunelle bleuâtre. Le dessous est ondé de blanc & de cendré, & l'on y voit quatre points noirs oculaires, correspondant aux yeux de dessus.

De l'Ile-de-France.

184. Satyre Baldus.

Satyrus Baldus.

Sat. alis integris, supra fuscis : anticis utrinquè ocello bipupillato : posticis subtùs ocellis sex geminatis.

Papilio D. F. Baldus, *alis integerrimis, fuscis : anticis utrinquè ocello pupillâ gemina; posticis supra ocellis quatuor, subtùs sex.* Fab. *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 34. *n°.* 556.

Papilio S. *Baldus.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 323. *n°.* 699.

Papilio Lysandra. Cram. *Pap. pl.* 293. *fig.* G. H.

Il est de la taille du précédent. Le dessus des ailes est d'un brun-obscur, avec un œil noir à iris jaune & à double prunelle bleue aux supérieures, & trois ou quatre yeux semblables, mais plus petits & à prunelle simple, aux inférieures.

Le dessous diffère du dessus en ce qu'il est finement ondé de blanchâtre, & que les yeux des ailes inférieures sont au nombre de six & groupés deux à deux. Ces yeux sont plus apparens dans les femelles que dans les mâles.

Nous avons vu un mâle qui n'avoit qu'un seul œil sur le dessus des secondes ailes.

Des Indes orientales.

185. Satyre Arctoüs.

Satyrus Arctous.

Sat. alis integris, suprà fuscis, subtùs dilutioribus cinerascentique griseo undulatis : omnium utrinquè ocello unico, anticarum bipupillato majoreque.

Papilio D. F. Arctous, *alis integerrimis, fuscis : anticis utrinquè ocello bipupillato, posticis suprà subcœcis.* Fab. *Mant. Inf. tom. 2. p. 33. n°. 353.*

Papilio S. *Arctous.* Fab. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 222. n°. 696.*

Papilio Arctous. Donow. *Gen. Illustr. of Entom. an Epitome of the Inf. of Asia, pl. 24. fig. 2.*

Il est de la taille des deux précédens. Ses ailes sont brunes en dessus, plus pâles & ondées de gris-cendré en dessous, & elles ont chacune de part & d'autre un œil noir à iris jaune & à prunelle bleue. L'œil des ailes supérieures est plus grand, & sa prunelle est double.

De la Nouvelle-Hollande.

Observation. *Ici commence la division des Chenilles ovales ou en forme de cloportes, et dont les chrysalides sont courtes, contractées, obtuses aux deux bouts.*

L'insecte parfait a le dernier article des palpes inférieurs, ou le troisième, presque nu; les crochets des tarses très-petits, à peine saillans; la cellule discoïdale des secondes ailes ouverte en arrière et non rétrécie vers son milieu.

GENRE ÉRYCINE.

CARACTÈRES DU GENRE.

Les deux pattes antérieures notablement plus courtes et très-velues, au moins dans les mâles.

Ce genre comprend les genres ci-après de Fabricius (*Syst. Glossat.*) :

Genre Erycina. (Pap. *Lysippus*, *Melibœus*, etc., Fab.)

Genre Nymphidium. (Pap. *Caricæ*, *Phareus*, *Manthus*, *Telephus*, etc., Fab.)

Genre Emesis. (Pap. *Ovidius*, *Arminius*, Fab., ou *Fatima*, *Mandana*, Cram.)

Genre Helicopis. (Pap. *Gnidus*, *Cupido*, etc., Fab.)

Genre Danis. (Établi, d'après l'indication d'Illiger, sur des espèces nouvelles, qui nous sont inconnues.)

Nota. Nous avons senti la nécessité de former plusieurs genres de notre genre Érycine; mais il nous a été impossible d'y parvenir, parce que nous n'avions qu'un petit nombre d'espèces, souvent mal conservées, ou dont l'un des sexes nous manquoit. En attendant, nous nous en tenons aux divisions et subdivisions que fournissent les différentes formes des ailes.

ESPÈCES.

A. Bord postérieur des premières ailes convexe et entier. Bord analogue des secondes avec six queues linéaires, dont la troisième, à compter de celle de l'angle de l'anus, beaucoup plus large que les autres.

Nota. Dans cette division, les deux sexes ont les pattes antérieures plus courtes et velues.

1. Erycine Gnidus.

Ailes blanches, avec le limbe postérieur noir : dessous des supérieures avec une ligne blanchâtre; dessous des inférieures avec des gouttes argentées à l'extrémité.

2. Erycine Cupidon.

Ailes blanches, avec le limbe postérieur noir : les deux surfaces des inférieures avec des gouttes à l'extrémité, le dessous des supérieures avec une ligne marginale, argentées.

B. Ailes supérieures triangulaires. Ailes inférieures alongées dans le sens de la longueur du corps, largement tronquées vers leur angle anal, et ayant l'angle extérieur de la troncature prolongé en une queue oblique, tantôt longue et plus ou moins aiguë, tantôt courte et obtuse.

a. Queue des ailes inférieures très-longue et aiguë.

ERYCINE. (Insecte.)

Nota. Les espèces de la subdivision α sont remarquables en ce que leurs ailes sont entièrement vitrées, ou en ce qu'elles ont des bandes un peu transparentes. Le *Licarsis*, placé en tête de cette subdivision, se distingue de ses congénères par la longueur extraordinaire de ses palpes inférieurs. Ce caractère nous auroit déterminés à former un genre particulier, s'il avoit été commun à d'autres espèces.

3. Erycine Licarsis.

Ailes semblables de part et d'autre, noires, avec deux bandes d'un blanc-bleuâtre : les supérieures avec un point basilaire, les inférieures avec une tache anale, d'un rouge-écarlate.

4. Erycine Dorillis.

Ailes semblables de part et d'autre, noires : milieu des supérieures avec une tache arrondie, milieu des inférieures avec une bande oblique, d'un blanc-transparent.

5. Erycine Curius.

Ailes en queue, semblables de part et d'autre, très-noires : supérieures avec deux bandes transparentes, inférieures avec une seule blanche. Fab.

6. Erycine Octavius.

Ailes transparentes, avec les nervures, une bande commune, et les bords, noirs : les inférieures ayant l'angle anal largement écarlate.

β. Queue des ailes inférieures courte et obtuse.

7. Erycine Iphinoé.

Dessous des ailes d'un brun-noirâtre, avec deux bandes blanches : supérieures avec une ligne à l'origine de la côte, inférieures avec trois taches à l'angle de l'anus, d'un rouge-écarlate.

8. Erycine Aulétès.

Ailes semblables de part et d'autre, noires, avec deux bandes fauves.

9. Erycine Mélibée.

Ailes d'un noir-brun, ayant en dessus deux lignes rouges, dont une plus courte; et en dessous deux bandes d'un bleu-luisant.

10. Erycine Aristote.

Ailes entières, presque semblables de part et d'autre, noires, avec deux bandes transverses, dont l'une orangée ou blanche, l'autre pâle.

11. Erycine Lysippe.

Ailes d'un noir-brun, avec une bande orangée sur chaque : leur dessous ponctué de fauve vers la base.

12. Erycine Echérius.

Ailes un peu dentées, couleur de terre d'ombre, avec une ligne plus foncée sur le milieu : dessous des inférieures avec trois et deux points noirs cerclés de blanc.

13. Erycine Allica.

Ailes dentelées, presque semblables de part et d'autre, couleur de terre d'ombre, avec des points noirs, nombreux et chargés chacun d'un point blanc.

14. Erycine Labdacus.

Ailes dentées, fauves en dessus, avec les bords noirs : leur dessous d'un blanc-bleuâtre, avec trois lignes transverses ferrugineuses sur les supérieures, et deux sur les inférieures.

15. Erycine Gémellus.

Ailes très-entières, d'un brun-obscur en dessus, avec le disque roux : leur dessous d'un blanc-satiné, avec une ligne commune d'un jaune-souci.

ERYCINE. (Insecte.)

16. Erycine Midas.

Ailes entières, d'un brun-obscur : leur dessous blanc ou plus pâle à la base, et offrant à l'extrémité deux lignes rousses, transversales, dont l'extérieure des inférieures ponctuée de noir.

C. Ailes supérieures triangulaires. Ailes inférieures plus ou moins alongées dans le sens de la longueur du corps.

17. Erycine Salimba.

Ailes entières, ayant le dessus d'un violet-luisant, avec le sommet d'un noir-brun : leur dessous plus pâle, avec une ligne ferrugineuse postérieure.

18. Erycine Euritéus.

Ailes entières, noires en dessus, avec une bande bleue luisante : leur dessous blanc au milieu, avec deux bandes ferrugineuses.

19. Erycine Gélon.

Ailes entières, d'un brun-obscur en dessus : leur dessous d'un jaune-pâle, avec trois lignes brunes à l'extrémité.

20. Erycine Sabinus.

Ailes entières, d'un brun-obscur en dessus, avec le bord antérieur des supérieures incarnat : dessous des quatre pâle, avec trois lignes blanches à l'extrémité.

21. Erycine Hyginius.

Ailes entières, d'un brun-obscur et sans taches en dessus : leur dessous d'un violet-pâle, avec deux lignes rousses aux supérieures, et des taches noires triangulaires aux inférieures.

22. Erycine Orfita.

Ailes entières, d'un brun-noirâtre à reflet violet : leur dessous avec deux raies ferrugineuses et une rangée postérieure de taches en fer de flèche.

23. Erycine Gélanor.

Ailes un peu dentées, ayant le dessus d'un brun-noirâtre à reflet violet : leur dessous orangé, avec une ligne ferrugineuse et une rangée marginale de points oculaires aux inférieures.

D. Ailes supérieures triangulaires. Ailes inférieures arrondies.

24. Erycine Arbas.

Ailes entières, d'un brun à reflet bleuâtre : leur dessous avec une ligne discoïdale et le bord postérieur fauves ; un point noir près du milieu de ce bord, aux inférieures.

25. Erycine Arcas.

Ailes entières, d'un bleu-violet-luisant en dessus : supérieures avec quelques points blancs sur le milieu ; inférieures avec un espace noir sur la côte.

26. Erycine Priolas.

Ailes entières, noires et glacées de violet en dessus, avec des veines bronzées au sommet des supérieures : dessous des inférieures tacheté de blanc.

27. Erycine Préma.

Ailes entières, noires en dessus, avec des bandes maculaires d'un vert-doré : leur dessous d'un brun-clair, avec des bandes blanchâtres et une rangée terminale de points noirs.

28. Erycine Prétus.

Ailes entières, noires en dessus, avec des taches vertes : leur dessous d'un brun-tanné, avec des taches blanchâtres.

29. Erycine Pétrone.

Ailes entières, d'un bleu-luisant en dessus, avec des lignes transverses et le sommet noirs : leur dessous cendré et ponctué de brun.

ERYCINE. (Insecte.)

30. Erycine Hébrus.

Ailes entières, ayant le dessus noir et varié de bleu, avec le bord interne des inférieures blanc : dessous des quatre d'un bleu-pâle, avec des points noirs.

31. Erycine Méris.

Ailes un peu dentées, et parsemées de points noirs : leur dessus bronzé ; leur dessous panaché de brun et de gris.

32. Erycine Lucinde.

Ailes entières, couleur d'acier en dessus, rousses en dessous, ayant de part et d'autre cinq lignes ondulées et des points marginaux d'un brun-noirâtre.

33. Erycine Dyndima.

Ailes entières, couleur d'acier en dessus, d'un blanc-bleuâtre en dessous, ayant de part et d'autre cinq lignes ondulées et des points marginaux d'un brun-noirâtre.

34. Erycine Arminius.

Ailes entières, fauves, avec quatre lignes ondulées et des points marginaux, obscurs en dessus, ferrugineux en dessous.

35. Erycine Ovide.

Ailes entières, fauves en dessus, d'un jaune-pâle en dessous, ayant de part et d'autre des lignes ondées, noires dans la femelle, *sablées d'or dans le* mâle.

36. Erycine Zéanger.

Ailes entières, fauves en dessus, avec le sommet des supérieures noir et marqué de litures bleuâtres : dessous des quatre blanchâtre, avec une multitude de taches noires.

37. Erycine Eupolémie.

Ailes entières, rousses en dessus, d'un blanc-bleuâtre en dessous, ayant de part et d'autre des lignes transverses de points noirs.

38. Erycine Ptolémée.

Ailes entières, ferrugineuses en dessus, avec des taches noires, et l'extrémité des nervures mine de plomb : leur dessous violet dans le mâle, *roux dans la* femelle, *avec la base d'un bleu-pâle.*

39. Erycine Azora.

Ailes entières, fauves, ponctuées de noir de part et d'autre : leur bord antérieur obscur en dessus, leur bord postérieur avec deux lignes mine de plomb.

40. Erycine Gynéa.

Ailes entières, brunes en dessus, ferrugineuses en dessous, ayant de part et d'autre des lignes noires ponctuées, et deux lignes terminales mine de plomb.

41. Erycine Avius.

Ailes entières, semblables de part et d'autre, d'un brun-noirâtre, avec des lignes transverses plus foncées, et deux lignes terminales bleues.

42. Erycine Cléone.

Ailes entières, noires, ayant en dessus deux lignes marginales mine de plomb, et une seule en dessous.

43. Erycine Cléodora.

Ailes entières, noires, ayant en dessus deux lignes marginales mine de plomb, et en dessous des points noirs.

ERYCINE. (Insecte.)

44. Erycine Argiopé.

Ailes entières, noires, sablées de vert-doré en dessus : dessous des supérieures offrant à la base une tache d'un rouge cire d'Espagne.

45. Erycine Domitien.

Ailes entières, obscures : supérieures avec une tache, inférieures avec une raie transverse, vertes : leur dessous brun, avec des points et une ligne marginale argentés. Fab.

46. Erycine Géminus.

Ailes arrondies, bleues, ayant le limbe postérieur noir et longé par une ligne bleue : dessous des inférieures légèrement fascié de brun. Fab.

47. Erycine Stilbé.

Ailes entières, semblables de part et d'autre, fauves, avec des points noirs, et une ligne terminale argentée.

48. Erycine Hisbon.

Ailes entières, d'un noir-brun, ayant de part et d'autre trois bandes d'un jaune d'ocre : dessus des quatre avec une ligne terminale mine de plomb.

49. Erycine Ouranus.

Ailes entières, noires, ayant de part et d'autre une bande blanche avec les extrémités rousses : dessus des supérieures avec une ligne terminale mine de plomb.

50. Erycine Phillone.

Ailes entières, d'un brun-noirâtre, avec deux bandes blanches séparées par une ligne fauve : base des quatre annelée.

51. Erycine Lysimon.

Ailes sinuées, brunes, avec une bande blanche, commune, discoïdale : limbe postérieur des quatre avec une ligne fauve et des anneaux bleuâtres.

52. Erycine Lamis.

Ailes sinuées, d'un beau blanc, avec tout le pourtour extérieur brun et annelé de bleuâtre : limbe postérieur avec une bande fauve.

53. Erycine du figuier.

Ailes sinuées, d'un beau blanc, avec tout le pourtour extérieur brun et annelé de bleuâtre : limbe antérieur avec des taches, limbe postérieur avec une bande, fauves.

54. Erycine Pélops.

Ailes sinuées, d'une jaune-pâle, avec tout le pourtour extérieur brun et chargé d'une bande fauve sur laquelle il y a une série de points noirs.

55. Erycine Cachrys.

Ailes sinuées, d'un jaune-pâle, avec tout le pourtour extérieur noir : limbe postérieur avec une ligne bleuâtre, anguleuse.

56. Erycine Ménalcas.

Ailes entières, semblables de part et d'autre, d'un jaune-pâle, avec tout le pourtour extérieur noir : limbe postérieur cilié de roux.

57. Erycine Anapis.

Ailes entières, d'un brun-pâle, traversées de part et d'autre par une ligne obscure, discoïdale : limbe postérieur des inférieures longé en dessus par une ligne jaunâtre en feston.

58. Erycine Oditès.

Ailes entières, presque semblables de part et d'autre, couleur de terre d'ombre, avec des anneaux à la base, une bande au milieu, une ligne transverse à l'extrémité, blancs.

ERYCINE. (Insecte.)

59. Erycine Tytius.

Ailes entières, ferrugineuses ou d'un brun-obscur en dessus, plus pâles en dessous, avec la base des quatre et le limbe postérieur des inférieures chargés de points noirs oculaires.

60. Erycine Tutana.

Ailes entières, semblables de part et d'autre, brunes, avec l'extrémité plus claire : inférieures avec une rangée marginale de points noirs oculaires.

61. Erycine Soronus.

Nous l'avons décrite comme Nymphale (page 426, n°. 241); *mais elle doit être rapportée ici.*

62. Erycine Phylacis.

Nous l'avons donnée comme Nymphale (page 426, n°. 242); *mais c'est ici qu'il faut la mettre.*

63. Erycine Epigia.

Nous l'avons mise parmi les Nymphales (page 426, n°. 243); *mais c'est ici qu'elle doit être.*

64. Erycine Emylius.

Ailes entières, brunes en dessus : supérieures avec une bande discoïdale d'un roux-blanchâtre, inférieures avec des points marginaux ocellés : dessous des quatre d'un jaune-pâle et ponctué de noir.

65. Erycine Manthus.

Ailes entières, noires, avec une bande discoïdale blanche, des annelets et des atomes marginaux d'un bleu-d'azur.

66. Erycine Damis.

Ailes entières, noires, avec un espace blanc commun et discoïdal : les deux surfaces des supérieures et le dessous des inférieures avec une bande marginale d'un bleu-azuré-luisant.

67. Erycine Bélise.

Ailes entières, noires, avec une bande commune, blanche, environnée de bleu en dessus, renfermée dans un cercle fauve en dessous.

68. Erycine Arthémon.

Ailes entières, blanches : supérieures avec le pourtour extérieur noir, tacheté de bleu et de blanc.

69. Erycine Icare.

Ailes entières, blanches en dessus, avec cinq lignes brunes, transversales : leur dessous brun, avec des bandes blanches, dont la postérieure ponctuée de noir.

70. Erycine Thasus.

Ailes entières, brunes, ayant de part et d'autre des lignes transverses plus pâles et le bord postérieur ponctué de blanc.

71. Erycine Actoris.

Ailes entières, brunes, ayant de part et d'autre une multitude de taches blanches ocellées.

72. Erycine Isala.

Ailes entières, brunes en dessus, blanches en dessous, ayant de part et d'autre des points noirs ocellés.

73. Erycine Thersandra.

Ailes entières, brunes, saupoudrées de bleu dans le mâle, *de gris dans la* femelle : *leurs deux surfaces avec des taches ferrugineuses ocellées.*

74. Erycine Cénéus.

Ailes entières, noires en dessus, avec des ondes bleues : leur dessous cendré, avec des taches blanches bordées de noir.

ERYCINE. (Insecte.)

75. Erycine Æmulius.

Ailes entières, cendrées, avec des taches brunes et des taches blanches : dessus des inférieures pâle : dessous des quatre ponctué de brun. Fab.

76. Erycine Epone.

Ailes entières, brunes, avec des points blancs et des points fauves : les deux surfaces des inférieures avec un espace blanc, discoïdal.

77. Erycine Tarquin.

Ailes entières, noires : supérieures avec une tache oblongue et sinuée à la base ; inférieures avec l'angle anal jaune et tacheté de noir. Fab.

78. Erycine Penthée.

Ailes entières, ferrugineuses, avec des taches noires, simples en dessus, ocellées en dessous : inférieures (mâle) *ayant la moitié postérieure blanche.*

79. Erycine Ariste.

Ailes entières, brunes, annelées de bleu-pâle en dessus et en dessous : inférieures (mâle) *ayant la moitié postérieure blanche.*

80. Erycine Philoclès.

Ailes entières, d'un noir-bleu en dessus : supérieures ayant de part et d'autre un œil tripupillé sur le milieu ; inférieures avec la moitié postérieure blanche et ondée de brun.

81. Erycine Crésus.

Ailes entières, semblables de part et d'autre, bleues, avec des lignes transverses et le bord postérieur noirs : supérieures avec un œil tripupillé sur le milieu.

82. Erycine Ephynès.

Ailes entières, bleues en dessus, jaunâtres en dessous, avec des bandes brunes : supérieures avec un œil tripupillé sur le milieu.

83. Erycine Euménus.

Ailes entières, moitié brunes et moitié bleues, avec des lignes transverses noires à l'extrémité : supérieures avec un œil tripupillé sur le milieu, inférieures avec un œil sans prunelle à la base.

84. Erycine Réné.

Ailes entières, d'un noir-brun, avec une bande blanche commune : milieu des supérieures offrant de part et d'autre un œil tripupillé ; dessous des inférieures avec un œil sans prunelle à la base.

85. Erycine Osinia.

Ailes entières, semblables de part et d'autre, brunes, avec des ondes pâles à la base, puis une bande blanche commune : milieu des supérieures avec un œil tripupillé.

86. Erycine Hyphéus.

Ailes entières, semblables de part et d'autre, blanches, avec trois bandes et le bord terminal bruns : milieu des supérieures avec un œil tripupillé.

87. Erycine Tullius.

Ailes entières, d'un cendré-obscur : supérieures brunes au sommet, et ayant de part et d'autre sur leur milieu un œil tripupillé. Fab.

88. Erycine Odicé.

Ailes entières, d'un cendré-pâle, avec des lignes ondées et le sommet obscurs : milieu des supérieures avec un œil tripupillé.

ERYCINE. (Insecte.)

89. Erycine Rhodia.

Ailes entières, noirâtres en dessus, avec l'extrémité plus claire; cendrées en dessous, avec trois lignes brunes: milieu des supérieures avec un œil tripupillé.

90. Erycine Tisis.

Ailes entières, couleur d'acier en dessus: leur dessous brun, avec trois lignes terre d'ombre; celui des supérieures offrant sur le milieu un œil tripupillé.

91. Erycine Ulric.

Ailes entières, d'un bleu-luisant en dessus: leur dessous terre d'ombre, avec un œil tripupillé sur le milieu des supérieures.

92. Erycine Lysidice.

Ailes entières, bleues, ayant en dessus le limbe postérieur, et en dessous cinq bandes, noirs: troisième bande des inférieures marquée de trois points argentés.

93. Erycine Archimède.

Ailes entières, noires, avec le disque bleu: leur dessous brun et sans taches. Fab.

94. Erycine Virgile.

Ailes entières, noires, avec le bord interne bleu: leur dessous gris, avec trois lunules blanchâtres, chargées d'un point noir aux inférieures. Fab.

95. Erycine Hiria.

Ailes entières, d'un noir-bleu en dessus, cendrées et ponctuées de brun en dessous: les quatre ayant de part et d'autre trois taches blanches, transparentes.

96. Erycine Misène.

Ailes entières, brunes en dessus, avec un point blanc sur la côte des supérieures: leur dessous d'un bleu-pâle, avec des taches brunes.

97. Erycine Abaris.

Ailes entières, presque semblables de part et d'autre, brunes et ponctuées de noir, avec le limbe postérieur roux: supérieures avec trois taches jaunes.

98. Erycine Amésis.

Ailes entières, presque semblables de part et d'autre, brunes: extrémité des supérieures avec des rayons, extrémité des inférieures avec des anneaux, fauves.

99. Erycine Epulus.

Ailes entières, brunes, avec une multitude de taches, fauves en dessus, blanches en dessous.

100. Erycine Timandra.

Ailes entières, d'un jaune-fauve tachetée de noir en dessus, avec le sommet des supérieures brun et ponctué de blanc: dessous des quatre brun, avec des taches noires cerclées de blanc.

101. Erycine Zachéa.

Ailes entières, fauves, avec des taches noires: dessous des inférieures varié de brun et de blanc. Fab.

102. Erycine Polyménus.

Ailes entières, ponctuées de ferrugineux, de brun et de noir: leur dessous jaunâtre, avec des ondes brunes. Fab.

103. Erycine Acanthus.

Ailes entières, brunes et sans taches en dessus: leur dessous ferrugineux, avec des bandes bleues et tout le pourtour extérieur d'un jaune-fauve.

ERYCINE. (Insecte.)

104. Erycine Gyas.

Ailes entières, brunes et sans taches en dessus : leur dessous roux, avec des lignes transverses et interrompues d'un vert-doré.

105. Erycine Ampyx.

Ailes entières, brunes en dessus, avec deux taches jaunes aux supérieures : dessous des quatre jaune, avec des taches ferrugineuses à prunelle d'or.

106. Erycine Pyramis.

Ailes entières, brunes et glacées de violet, avec une tache fauve : dessous des inférieures gris. Fab.

107. Erycine Lucanus.

Ailes entières, noires, avec le disque jaune : dessous des inférieures rouge, avec des taches carrées brunes. Fab.

108. Erycine ? Alphonse.

Ailes entières, d'un noir-foncé : supérieures avec deux taches, inférieures avec une seule à la base, jaunes. Fab.

109. Erycine Procas.

Ailes entières, semblables de part et d'autre, d'un noir-foncé, avec le disque des quatre, et une tache au sommet des supérieures, jaunes. Fab.

110. Erycine Numitor.

Ailes entières, brunes : inférieures jaunes en dessus au milieu, entièrement jaunes et sans taches en dessous. Fab.

111. Erycine Ædon.

Ailes entières, brunes, avec plusieurs bandes de taches fauves. Fab.

112. Erycine Télèphe.

Ailes entières, noires en dessus, avec un espace d'un rouge-fauve : leur dessous d'un blanc-bleuâtre, avec des points noirs.

113. Erycine Lucien.

Ailes entières, ponctuées de noir, ayant le dessus roux, le dessous d'un blanc-cendré.

114. Erycine Pharéus.

Ailes entières, cramoisies, avec tout le pourtour extérieur noir : noir de la côte des supérieures formant des dents en dessus, très-large en dessous.

115. Erycine Tacite.

Ailes entières, semblables de part et d'autre, cramoisies, avec tout le pourtour extérieur noir : noir de la côte des supérieures très-large et tacheté de jaune.

116. Erycine Epalia.

Ailes entières, semblables de part et d'autre, d'un rouge-fauve, avec tout le pourtour extérieur noir.

117. Erycine Cingulus.

Ailes entières, semblables de part et d'autre, noires, avec une bande rouge, commune, discoïdale.

118. Erycine Talus.

Ailes entières, cendrées, fasciées de noir de part et d'autre : leur dessus avec une bande rouge, commune, courte.

119. Erycine Nicon.

Ailes entières, semblables de part et d'autre, noires, avec deux bandes courtes et des points marginaux jaunes.

ERYCINE. (Insecte.)

120. Erycine Régulus.

Ailes entières, semblables de part et d'autre, noires, avec deux bandes blanches ou jaunâtres : bande postérieure des supérieures interrompue.

121. Erycine ? Thucydide.

Ailes entières, noires, avec une tache jaune sur le disque : leur dessous cendré et ondé de roux.

122. Erycine Arius.

Ailes entières, semblables de part et d'autre, brunes et tachetées de noir : supérieures avec une ligne blanche, transverse, courte, discoïdale.

123. Erycine Sagaris.

Ailes entières, noires, ayant en dessus une bande fauve, courte : dessous des supérieures blanchâtre au bord interne.

E. Ailes un peu oblongues ou alongées dans le sens du diamètre du corps.

124. Erycine ? Hélius.

Ailes entières, brunes : inférieures fauves au bord d'en haut.

125. Erycine Probétor.

Ailes entières, d'un brun-noirâtre en dessus : extrémité des supérieures avec des veines cendrées ; bord antérieur des inférieures d'un rouge-sanguin.

126. Erycine Agyrtus.

Ailes entières, d'un noir-brun : supérieures ayant de part et d'autre une bande rousse, courte : dessous des quatre avec une bande jaune, commune.

127. Erycine Perditus.

Ailes entières, d'un noir-foncé à reflet bleu, ayant chacune de part et d'autre une bande souci, transverse, discoïdale.

128. Erycine Phéréclus.

Ailes entières, d'un noir-bleu : supérieures ayant de part et d'autre une bande fauve, atteignant les bords : dessous des inférieures sans taches au limbe postérieur.

129. Erycine Phéréphatte.

Ailes entières, d'un noir-bleu : supérieures ayant de part et d'autre une bande fauve, courte : dessous des inférieures (femelle) *avec une rangée marginale de points blancs.*

130. Erycine Electron.

Ailes entières, semblables de part et d'autre, d'un noir-foncé, avec un point rouge à la base : supérieures avec une bande courte, fauve ou blanche.

131. Erycine Ménéria.

Ailes entières, noires, avec une bande commune, et une petite ligne à la base des supérieures, d'un rouge-vermillon : disque des quatre ponctué de blanc en dessus.

A. Bord postérieur des premières ailes convexe & entier. Bord analogue des secondes avec six queues linéaires, dont la troisième, à compter de celle de l'angle de l'anus, beaucoup plus longue que les autres.

Nota. Dans cette division, les deux sexes ont les pattes antérieures plus courtes & velues.

1.° Erycine Gnidus.

Erycina Gnidus.

Eryc. alis albis, limbo nigro : subtùs anticis strigâ marginali albidâ, posticis guttis apicalibus argenteis.

Hesperia R. Gnidus, *alis sexdentato-caudatis, limbo atro : posticis subtùs maculis argenteis.* Fab. *Spec. Inf. append.* 504. — *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 64. *n°.* 607. — *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 258. *n°.* 2.

Papilio Endymion. Cram. *pl.* 244. *fig.* C. D. (Le mâle.) *fig.* E. F. (La femelle.)

Stoll, *Suppl. à* Cram. *pl.* 4. *fig.* 5. A. (La chenille.) *fig.* 5. B. (La chrysalide.)

La Goutte argentée. (*Nom vulgaire.*)

Le mâle a environ un pouce trois quarts d'envergure. Ses ailes sont blanches de part & d'autre, avec la base fauve & l'extrémité noire. L'extrémité des inférieures offre en dessus une suite de petits traits blancs, dont les deux extrêmes doubles.

En dessous, les ailes supérieures ont sur le bord terminal une ligne blanchâtre qui ne monte pas jusqu'au sommet. Les ailes inférieures ont vers ce même bord vingt-une gouttes argentées, dont les trois de chaque bout alongées & placées sur un fond blanc, les autres rondes & se détachant sur un fond ferrugineux. Toutes ces gouttes sont bordées de noir.

La femelle, dont l'envergure est de deux pouces, présente les mêmes caractères que le mâle; mais le fauve de la base & le noir de l'extrémité des quatre ailes ont beaucoup plus d'étendue, & tous les traits blancs marginaux du dessus des inférieures sont simples.

Le corps est blanc, avec le corselet jaunâtre. Les antennes sont noires, & annelées de blanc depuis leur base jusqu'à leur massue.

La chenille, selon Stoll, est blanche, avec des poils latéraux de cette couleur. Sa tête est entièrement jaune, & son cou offre un bouquet de poils d'un rouge-incarnat. Elle vit sur la *grenadille* ou *fleur de la passion.*

La chrysalide est brune & couverte d'un duvet jaunâtre, avec une touffe de poils rouges à chaque extrémité. Elle est attachée par la queue & par le milieu du corps.

De Surinam.

2. Erycine Cupidon.

Erycina Cupido.

Eryc. alis albis, limbo nigro : posticis utrinquè guttis apicalibus, anticis subtùs strigâ marginali, argenteis.

Papilio P. R. Cupido, *alis posticis sexdentato-caudatis : subtùs albidis, maculis argenteis.* Linn. *Syst. Nat.* 2. *p.* 787. *n°.* 217. — *Mus. Lud. Ulr. p.* 313.

Papilio P. R. *Cupido.* Fab. *Syst. Ent. p.* 518. *n°.* 320. — *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 64. *n°.* 606.

Hesperia R. *Cupido.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 258. *n°.* 1.

Petiv. *Gazoph. tab.* 10. *fig.* 9.

Merian, *Surin. Inf. tab.* 10.

Roes. *Inf.* 4. *tab.* 3. *fig.* 7.

Seba, *Mus.* 4. *tab.* 33. *fig.* 5-8.

Daubenton, *pl. enl.* 18. *fig.* 4. 5.

Papilio Cupido. Cram. *pl.* 164. *fig.* D. E. (Le mâle.) *fig.* F. G. (La femelle.)

Stoll, *Pap. Suppl. à* Cram. *pl.* 4. *fig.* 6. A. (La chenille.) *fig.* 6. B. (La chrysalide.)

La Goutte dorée. (*Nom vulgaire.*)

Ce qui distingue surtout cette espèce de la précédente, c'est qu'elle est constamment plus petite; qu'elle a des gouttes d'argent sur chaque surface des secondes ailes, mais moins en dessus qu'en dessous, & que ces gouttes ne sont pas bordées de noir. C'est qu'enfin le dessous des ailes supérieures a tout le bord terminal longé par une ligne argentée.

La chenille ressemble beaucoup à celle du *gnidus;* mais sa tête est rouge, avec les mandibules jaunes; & son corps, qui est entièrement garni de poils blancs, offre trois lignes bleuâtres longitudinales. Outre cela, l'anus est rouge. Elle se nourrit des feuilles du *citronier* & de celles du *cotonnier.*

La chrysalide est brune, avec de longs poils blancs, & une touffe rouge sur la tête seulement. Elle est aussi attachée par la queue & par le milieu du corps.

De Surinam. — Plus commune que le *Gnidus*, & se trouvant dans la saison des pluies.

B. Ailes supérieures triangulaires. Ailes inférieures alongées dans le sens de la longueur du corps, largement tronquées vers leur angle anal, & ayant l'angle extérieur de la troncature prolongé en une queue oblique, tantôt longue & plus ou moins aiguë, tantôt courte & obtuse.

a. Queue des ailes inférieures très-longue & aiguë.

Nota. Les espèces de la subdivision « sont remarquables en ce que leurs ailes sont entièrement vitrées, ou en ce qu'elles ont des bandes un peu transparentes. Le *Licarsis*, placé en tête de cette subdivision, se distingue de ses congénères par la longueur extraordinaire de ses palpes. Ce caractère nous auroit déterminés à former un genre particulier, s'il avoit été commun à d'autres espèces.

3. Erycine Licarsis.

Erycina Licarsis.

Eryc. alis concoloribus, nigris, fasciis duabus cærulescenti-albis : anticis puncto baseos, posticis maculâ anguli ani, coccineis.

Papilio E. A. Licarsis, *alis caudatis, atris, fasciis duabus albis, angulo ani rubro bimaculato.* Fab. *Mant. Inf. tom. 2. p. 9. n°. 73. — Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 28. n°. 83.*

Papilio Licarsis. Herbst, *Pap. tab. 58. fig. 4.*

Papilio Rhetus. Cram. *pl. 63. fig. C.*

Papilio Butes. Clerck, *Icon. tab. 46. fig. 6.*

Elle a environ un pouce & demi d'envergure. Toutes ses ailes sont noires de part & d'autre, avec deux bandes d'un blanc-bleuâtre, communes & un peu transparentes. L'origine de la côte des premières ailes offre un point écarlate; & il y a, avant l'angle anal des secondes, une tache rouge, glacée de bleu, & surmontant une liture blanche qui est maculaire ou continue. La queue de ces dernières ailes a le dessus d'un violet-luisant, le dessous noir, avec l'extrémité tout-à-fait blanche.

Dans la femelle, la tache rouge des secondes ailes est double.

De la Guyane & du Brésil.

4. Erycine Dorillis (1).

Erycina Dorillis.

Eryc. alis concoloribus, nigris : disco anticarum maculâ rotundâ, posticarum fasciâ obliquâ, hyalino-albis.

Papilio Dorilas. Cram. *pl. 48. fig. C.* (Le mâle.)

Papilio Dorilas. Herbst, *Pap. tab. 60. fig. 3.*

Elle n'a guère qu'un pouce d'envergure. Toutes ses ailes sont noires de part & d'autre, avec une bande blanche, oblique & un peu transparente, vers la base des inférieures; & une tache ronde, également blanche & un peu transparente, sur le milieu des supérieures. Ces dernières ailes ont un gros point rouge, s'alignant avec la bande blanche dont il vient d'être question.

Dans le mâle, cette bande est d'un ton jaunâtre.

De la Guyane & du Brésil.

5. Erycine Curius.

Erycina Curius.

Eryc. alis caudatis, concoloribus, atris : anticis fasciis duabus hyalinis, posticis unicâ albâ. Fab.

Papilio E. A. *Curius.* Fab. *Mant. Inf. tom. 2. p. 9. n°. 71. — Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 28. n°. 81.*

Suivant Fabricius, que nous traduisons ici, ce lépidoptère seroit de Siam; mais il paroît se rapprocher trop de ceux de cette subdivision pour ne pas être aussi de l'Amérique méridionale.

Le corps est petit, brun en dessus, blanchâtre en dessous, avec des points noirs sur les côtés de l'abdomen. Les ailes supérieures sont noires de part & d'autre, avec deux bandes transparentes, dont la postérieure plus large & coupée par des nervures de la couleur du fond de l'aile.

Les ailes inférieures sont d'un noir foncé, avec une bande blanche, courte. Leur queue est très-longue, avec le côté externe & le bout blancs.

6. Erycine Octavius.

Erycina Octavius.

Eryc. alis hyalinis, nervis, strigâ communi margineque nigris : inferis utrinquè angulo ani latè coccineo.

Papilio E. A. Octavius, *alis caudatis, hyalinis, margine strigâque rubris* (*nigris*). Fab. *Mant. Inf. tom. 2. p. 9. n°. 72. — Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 28. n°. 82.*

Papilio Faunus. Fab. *Spec. Inf. tom. 2. p. 16. n°. 63.*

Papilio Octavius. Herbst, *Pap. tab. 60. fig. 2.*

Papilio Chorineus. Cram. *pl. 59. fig. A.*

Elle a approchant un pouce & demi d'envergure. Les premières ailes & la moitié antérieure des secondes sont transparentes, avec les nervures, les bords & une bande très-étroite sur le milieu, noirs. La moitié postérieure des secondes ailes est opaque, avec un point blanc près de l'extrémité de la bande sus-mentionnée, puis une grande tache écarlate s'étendant de l'angle anal à l'origine de la queue. Celle-ci est noire, avec le côté externe & le bout blancs.

Le dessous des quatre ailes ressemble au dessus,

(1) Comme il y a un polyommate qui porte le nom de *Dorylas*, nous avons été obligés de changer le nom de Cramer.

mais la tache rouge des inférieures eſt marquée de deux points blancs.

Le mâle ne nous a pas paru différer de la femelle.

De Surinam.

Nota. Il y a une faute dans la phraſe ſpécifique de Fabricius. Au lieu de *margine ſtrigâque rubris*, il faut lire : *margine ſtrigâque nigris.*

B. Queue des ailes inférieures courte & obtuſe.

7. Erycine Iphinoé (1).

Erycina Iphinoe.

Eryc. alis ſubtùs fuſcis, faſciis duabus albis : anticis lineâ coſtali, poſticis maculis tribus anubus coccineis. (Mas *ſuprà cæruleo nitidus.*)

Papilio Periander. Cram. *pl.* 188. *fig.* C. (La femelle.)

Elle a un peu plus d'un pouce & demi d'envergure.

Le deſſus du mâle eſt noir, avec un reflet d'un bleu-violet-vif ſur le milieu de toutes les ailes, & trois gros points écarlates près de l'angle anal des inférieures.

Le deſſus de la femelle eſt d'un brun-noirâtre, avec deux bandes blanches, dont l'antérieure plus large, & trois points rouges correſpondant à ceux du mâle. Il y a en outre une liture blanche à l'origine de la queue.

Le deſſous des deux ſexes eſt comme le deſſus de la femelle; mais la moitié antérieure de la côte des premières ailes eſt rouge, & il y a trois petits points de cette couleur à la baſe des ſecondes ailes. On voit encore quelques points rouges ſur le milieu du ventre.

De la Guyane & du Bréſil.

8. Erycine Aulétès.

Erycina Auletes.

Eryc. alis concoloribus, nigris, faſciis duabus fulvis.

Papilio Auleſtes. Cram. *pl.* 128. *fig.* G.

Papilio Thedea. Cram. *pl.* 102. *fig.* A. (Le mâle.)

Papilio Auletes. Herbst, *Pap. tab.* 60. *fig.* 1.

Papilio Tedea. Herbst, *Pap. tab.* 59. *fig.* 6. (Le mâle.)

Elle a environ un pouce & demi d'envergure. Ses ailes ſont noires, avec deux bandes fauves, partant de la côte des ſupérieures, & formant chacune un coude vers l'extrémité des inférieures.

Le deſſous reſſemble au deſſus, mais il eſt un peu plus pâle, & il a la bande extérieure plus prononcée.

Le papillon *Thedea* de Cramer eſt le mâle, ou du moins une variété mâle, car il ne diffère de la femelle que parce qu'il a les deux pattes antérieures plus courtes & parce qu'il eſt plus petit.

De Surinam.

9. Erycine Mélibée.

Erycina Melibœus.

Eryc. alis fuſco-nigris, ſuprà ſtrigâ ſeſquialterâ ſanguineâ, ſubtùs faſciis duabus nitidè cyaneis.

Papilio E. A. Melibæus, *alis caudatis, faſciis : anticis ſtrigâ, poſticis duabus, ſanguineis : ſubtùs cyaneo-nitidiſſimis.* Fab. *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 9. *n°.* 75. — *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 29. *n°.* 84.

Papilio Melibœus. Herbst, *Pap. tab.* 59. *fig.* 4. 5.

Papilio Pyretus. Cram. *pl.* 144. *fig.* A. B.

Elle a environ un pouce & demi d'envergure. Le deſſus de ſes ailes eſt d'un noir-brun, avec deux lignes communes, dont l'intérieure rouge & diſcoïdale, l'extérieure obſcure, ſurtout aux premières ailes. Il y a en outre une liture rouge vers l'origine de la queue.

Le deſſous des quatre ailes eſt du même noir que le deſſus, avec deux bandes bleues, obliques & très-luiſantes, dont l'intérieure terminée aux ſecondes ailes par un point blanc, au deſſus duquel il y a un point écarlate.

De Surinam & du Bréſil.

10. Erycine Ariſtote.

Erycina Ariſtoteles.

Eryc. alis integris, ſubconcoloribus, nigris, faſciis duabus tranſverſis, alterâ aurantiacâ aut albâ, alterâ pallidâ.

Erycina Ariſtoteles, *antennis clavâ obovatâ, elongatâ; palpis breviſſimis; alis quatuor trigonis; anticis integris; poſticis elongatis, ſubſinuatis, ad apicem obtuſis aut veluti truncatis; his & illis utrinquè nigris, faſciis duabus tranſverſis, rectis; priori in medio poſitâ, aurantiaco-rufâ, continuâ; poſteriori limbum poſticum verſus ſuprà nervis valdè diviſâ, ſuprà obſoletâ & dilutè fuſcâ, infrà albicanti; alis poſticis ex utrôque parte ad marginem poſticum albo maculatis, angulumque analem ſuprà maculâ aurantiaco-rufâ, tranſverſâ, emarginatâ notatis.* Recueil d'Obſerv. de zool. & d'anat. comp., par

(1) Nous n'avons pas adopté le nom de Cramer, 1°. parce que cet iconographe n'a connu que la femelle, 2°. parce qu'il y a une Nymphale qui porte le nom de *Périandre.*

Al. de Humboldt & A. Bonpland, *vol.* 1. *p.* 243. *pl.* 24. *fig.* 5. 6.

Erycina Pallas. *Antennis clavâ obovatâ, elongatâ; palpis brevissimis; alis quatuor trigonis; anticis integris; posticis elongatis, subsinuatis, ad apicem obtusis aut veluti truncatis; his & illis utrinquè nigneantibus, fasciis duabus transversis, rectis; priori in medio positâ, albâ, ad apices angustato-acuminatâ; posteriori limbum posticum versus nervis valdè divisâ, suprà minùs conspicuâ & diluto-fuscâ, infrà albidâ; alis posticis ex utràque parte ad marginem posticum albo maculatis, angulumque analem suprà maculâ aurantiaco-rufâ, bipartitâ, transversâ, notatis.* Recueil d'Obferv. de zool., &c. *vol.* 1. *p.* 244. *pl.* 24. *fig.* 7. 8.

Elle a près d'un pouce & demi d'envergure. Ses ailes ſont noires de part & d'autre & traverſées par deux bandes dont l'antérieure orangée, diſcoïdale & continue; la poſtérieure d'un noirâtre-clair en deſſus, blanchâtre en deſſous, & très-diviſée par les nervures. Les ſecondes ailes offrent en outre, près de l'angle de l'anus, une tache fauve, bilobée, & leur bord poſtérieur eſt entrecoupé de blanc. Le corps eſt noir, avec une bande rouſſâtre le long de chaque côté du ventre.

L'Erycine *Pallas* a le fond des ailes plus clair, la bande antérieure d'un blanc-jaunâtre, & la tache anale partagée en deux. Du reſte, elle reſſemble parfaitement à l'Erycine *Ariſtote*, dont elle n'eſt qu'une variété.

Des bords de la rivière de la Madelaine, Amérique méridionale.

11. Erycine Lyſippe.

Erycina Lyſippus.

Eryc. alis fusco-nigris, singularum utrinquè fasciâ aurantiacâ: subtùs ad basin flavido punctatis.

Papilio P. R. Lyſippus, *alis subangulatis, utrinquè atris: omnibus fasciâ lineari rubrâ.* Linn. *Syſt. Nat.* 2. *p.* 793. *n°.* 250. — *Muſ. Lud. Ulr. p.* 552.

Papilio P. R. Lyſippus, *alis angulatis, fuscis: omnibus strigâ rubrâ: subtùs cinereo-punctatis.* Fab. *Syſt. Ent. p.* 529. *n°.* 365. — *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 83. *n°.* 755.

Heſperia R. *Lyſippus.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 321. *n°.* 218.

Papilio Lyſippus. Clerck, *Icon. tab.* 22. *fig.* 3. 4.

Papilio Lyſippus. Drury, *Inſ. tom.* 1. *pl.* 2. *fig.* 2.

Papilio Lyſippus, Cram. *pl.* 380. *fig.* A.

Papilio Lyſippus. Herbst, *Pap. tab.* 284. *fig.* 7. 8.

Elle eſt de la même taille que les précédentes, mais ſes queues ſont plus courtes.

Le deſſus des ailes eſt noir, avec une bande orangée, plus ou moins étroite. La bande des premières ailes deſcend obliquement du milieu de la côte à l'angle interne, où elle forme un peu le coude. La bande des ſecondes ailes eſt arquée en dehors, & elle s'étend du ſommet à l'angle anal, angle près duquel il y a un point orangé.

Le deſſous diffère du deſſus, en ce qu'il eſt moins noir; en ce que l'eſpace compris entre la baſe & la bande des quatre ailes offre une multitude de petits points d'un jaune-d'ocre-pâle; enfin, en ce que l'origine de la côte des ailes ſupérieures & tout le bord interne des inférieures ſont longés par une ligne fauve.

Le corps eſt noir, avec une ligne rouſſâtre ſur le milieu du ventre. Les antennes ſont brunes, avec le deſſous annelé de blanchâtre.

De la Guyane & du Bréſil.

Nota. Nous n'avons pas vu la femelle.

12. Erycine Echérius.

Erycina Echerius.

Eryc. alis subdentatis, umbrinis, strigâ mediâ saturatiore: posticis subtùs punctis tribus duobusque nigris albo cinctis.

Papilio Echerius. Stoll, *Pap. Suppl. à* Cram. *pl.* 31. *fig.* 1. A. B.

Son envergure eſt d'un pouce & demi. Le deſſus des ailes eſt couleur de terre d'ombre & traverſé au milieu par une ligne obſcure qui eſt légèrement finuée.

En deſſous, où le fond eſt chatoyant & un peu plus clair vers l'extrémité, cette ligne eſt bordée de blanchâtre en dehors, & les ſecondes ailes offrent parallèlement à leur bord poſtérieur cinq points noirs cerclés de blanc: il y en a trois près du ſommet, & deux près de l'angle de l'anus. Ces points ſont quelquefois viſibles en deſſus, notamment dans la femelle. Le corps eſt du même ton que les ailes. Les antennes ſont brunes, annelées de blanc, & terminées de rouſſâtre.

De la Chine.

Nota. On voit par cette eſpèce & par la ſuivante que les Erycines ne ſont pas excluſivement propres à l'Amérique.

13. Erycine Allica.

Erycina Allica.

Eryc. alis denticulatis, subconcoloribus, umbrinis, punctis nigris, numerosis albòque fœtis.

Papilio S. Allica, *alis dentatis, subconcoloribus, obscurè fulvis, punctis numerosis albo fœtis.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 244. *n°.* 761.

Papilio Flegyas. Cram. *pl.* 280. *fig.* E. F.

Elle a environ un pouce & demi d'envergure. Le dessus de ses ailes est couleur de terre d'ombre, avec une multitude de points noirs, chargés chacun d'un point blanc.

Le dessous ne diffère du dessus que parce qu'il est un peu plus clair. Les antennes sont noires, annelées de blanc, avec le bout de la massue jaune ou roussâtre.

Chine, Bengale, île de Java.

14. Erycine Labdacus.

Erycina Labdacus.

Eryc. alis dentatis, suprà fulvis, oris nigris: subtùs cœrulescenti-albis, anticarum strigis tribus, posticarum duabus, ferrugineis.

Papilio Labdacus. Cram. *pl.* 336. *fig.* G. H.

Nous n'avons vû que le mâle de cette espèce. Il a environ un pouce & demi d'envergure. Le dessus de ses ailes est d'un fauve-luisant, avec tous les bords noirs.

Le dessous est blanc, mais un peu bleuâtre vers les bords, avec deux lignes ferrugineuses, communes & sinuées. Il y a en outre quelques taches & une ligne plus obscures à l'extrémité des premières ailes, & une ligne noire en zig-zag sur le bord postérieur des secondes. Ce bord est denté & marqué d'un point ferrugineux à chaque échancrure. Le corps est fauve en dessus, blanchâtre en dessous. Les antennes sont noirâtres.

De la Guyane & du Brésil.

15. Erycine Gémellus.

Erycina Gemellus.

Eryc. alis integerrimis, suprà fuscis, disco rufo: subtùs holosericeo-niveis, strigâ communi calthaceâ.

Hesperia R. Gemellus, *alis integerrimis, flavescentibus, limbo fusco: subtùs albis strigâ medià lunulisque marginalibus fangaineis.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 319. *n°.* 208. (Le mâle.)

Papilio Gemellus. Jon. *Fig. pict.* 6. *tab.* 36. *fig.* 2.

Papilio Teleclus. Stoll, *Pap. Suppl. à* Cram. *pl.* 5. *fig.* 4 & 4 E. (La femelle.)

Fabricius a décrit le mâle de cette espèce sous le nom de *Gemellus*, & Stoll a figuré la femelle sous celui de *Teleclus*.

Son envergure est d'environ un pouce & demi. Le dessus des quatre ailes est d'un brun-obscur, avec une tache rouffe, oblongue & discordale.

Le dessous est d'un blanc-satiné, avec une bande d'un jaune-souci sur le milieu de toutes les ailes, & un rang de petites lunules noires sur le bord terminal des inférieures.

Dans la femelle, la bande souci est précédée en dehors d'une ligne cendrée, & le bout des premières ailes est également cendré.

De Surinam & de Cayenne.

Nota. Fabricius a probablement décrit le mâle d'après la figure de Jones; car s'il l'avoit vu en nature, il ne se feroit pas servi du mot *sanguineus* pour désigner la couleur de la bande du dessous des ailes. Cette bande est toujours souci, & non d'un rouge de sang.

16. Erycine Midas.

Erycina Midas.

Eryc. alis integris, fuscis: subtùs basi albis aut pallidioribus, apice strigis duabus rufis, externâ posticarum nigro punctatâ.

Papilio P. R. Midas, *alis subangulatis, fuscis, maculâ albidâ: subtùs basi albis strigâque rufâ.* Fab. *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 79. *n°.* 718. (Le mâle.)

Hesperia R. *Midas.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 306. *n°.* 162. (Le mâle.)

Papilio Crotopus. Cram. *pl.* 390. *fig.* G. H. (Le mâle.)

Papilio Crotopus. Cram. *pl.* 336. *fig.* E. F. (La femelle.)

Stoll, *Pap. Suppl. à* Cram. *pl.* 6. *fig.* 7. (La chenille.) *fig.* 7. F. (La chrysalide.)

Papilio Crotopus. Herbst, *Pap. tab.* 322. *fig.* 8-11.

Le *Midas* de Fabricius répond, selon nous, au mâle du papillon *Crotopus* de Cramer.

Il a un peu plus d'un pouce d'envergure. Le dessus de ses ailes est d'un brun-cendré, avec deux taches d'un blanc-sale au milieu des supérieures, & une semblable près du sommet des inférieures. — Le dessous est blanc depuis la base jusqu'au-delà du milieu; ensuite brunâtre jusqu'au bout, avec deux lignes rousses, transverses & arquées, dont la postérieure des secondes ailes chargée d'une suite de points noirs.

La femelle a le dessus d'un brun-noirâtre, avec un espace roussâtre vis-à-vis du sommet des ailes supérieures. En dessous, elle ressemble au mâle, mais la base des quatre ailes est d'un brun-clair & chatoyant, & les points noirs placés sur la ligne postérieure des secondes ailes sont bordés de blanchâtre en dehors. Ces dernières ailes sont d'ailleurs plus alongées que dans le mâle.

Nous avons vu une variété femelle dont le dessus des secondes ailes étoit fauve à la région du bord interne.

La chenille, suivant Soll, est pubescente, d'un

noir-brun, avec une rangée longitudinale de points blancs sur chaque côté du dos, & une petite frange blanchâtre aux bords du ventre. Elle a derrière la tête deux épines blanches, droites, longues, & garnies à leur base d'une touffe de poils rouges. On la trouve dans l'herbe.

La chrysalide est ovale, un peu velue, d'un fauve-verdâtre.

De la Guyane.

C. Ailes supérieures triangulaires. Ailes inférieures plus ou moins alongées dans le sens de la longueur du corps.

17. Erycine Salimba.

Erycina Salimba.

Eryc. alis integris, suprà violaceis, nitidis, apice fusco : subtùs pallidioribus, strigâ posticâ ferrugineâ.

Papilio Lisias. Cram. *pl.* 152. *fig.* F. G.

Elle a environ un pouce & demi d'envergure. Le dessus des ailes est d'un violet-luisant, avec la côte des supérieures & le sommet des quatre d'un noir-brun.

Le dessous est plus pâle que le dessus, avec une ligne ferrugineuse avoisinant le bord postérieur dont la tranche est blanche.

Nous n'avons vu que le mâle.

De Surinam.

18. Erycine Euritéus.

Erycina Euriteus.

Eryc. alis integris, suprà nigris, fasciâ cœruleâ, nitidâ : subtùs medio albis, fasciis duabus ferrugineis.

Papilio P. R. Euriteus, *alis integris, atris, maculâ cœruleâ : subtùs medio rufis, fasciis albis.* Fab. *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 83. *n°.* 751.

Hesperia R. *Euriteus.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 321. *n°.* 216.

Papilio Euriteus. Cram. *pl.* 152. *fig.* D. E.

Papilio Euriteus. Herbst, *Pap. tab.* 321. *fig.* 3. 4.

Elle a approchant un pouce & demi d'envergure. Le dessus des ailes est noir, avec une bande bleue, luisante, partant de la base des supérieures, se courbant vers leur centre, & allant aboutir au milieu du bord terminal des inférieures.

Le dessous est jaune à la base & à l'extrémité; blanc au milieu, avec deux bandes ferrugineuses, communes. Le jaune de l'extrémité des secondes ailes offre une tache, partie noire, partie blanche.

De Surinam.

19. Erycine Gélon.

Erycina Gelon.

Eryc. alis integris, suprà fuscis : subtùs flavescentibus, apice strigis tribus brunneis.

Papilio Gelon. Stoll, *Suppl. à* Cram. *pl.* 5. *fig.* 2 *&* 2 B.

Elle a un peu plus d'un pouce d'envergure. Le dessus de ses ailes est d'un brun-obscur, avec la région de l'angle anal des inférieures fauve.

Le dessous est d'un jaune-pâle, avec trois lignes brunes, postérieures & parallèles. Outre cela, le bord terminal des secondes ailes est fauve.

Nous n'avons vu qu'un seul individu, que nous croyons femelle.

De Surinam.

20. Erycine Sabinus.

Erycina Sabinus.

Eryc. alis integris, suprà fuscis, anticarum margine antico carneo : subtùs omnibus pallidis, strigis tribus apicalibus albis.

Papilio Sabinus. Stoll, *Suppl. à* Cram. *pl.* 9. *fig.* 3 *&* 3 A.

Elle a environ un pouce & demi d'envergure. Le dessus de ses ailes est d'un brun-violet & chatoyant, avec le bord antérieur des premières incarnat.

Le dessous est d'un brun-pâle, avec trois lignes blanches, communes & postérieures. Outre cela, le bord terminal des secondes ailes prend une teinte fauve vers l'angle de l'anus.

Nous n'avons pu reconnoître le sexe de l'individu que nous décrivons.

De Surinam.

21. Erycine Hyginius.

Erycina Hyginius.

Eryc. alis integris, suprà fuscis, immaculatis : subtùs pallidè violaceis, anticis strigis duabus rufis, posticis maculis nigris trigonis.

Papilio Hyginius. Stoll, *Suppl. à* Cram. *pl.* 9. *fig.* 2 *&* 2 A.

Elle a un peu plus d'un pouce d'envergure. Le dessus de ses ailes est d'un brun-obscur, sans taches.

Le dessous est d'un violet-pâle, avec deux lignes discoïdales, & la tranche du bord postérieur, roussâtres. Derrière la seconde ligne, les ailes inférieures ont une suite de cinq ou six taches noires, triangulaires & bordées de blanc.

De Surinam.

22. Erycine Orfita.

Erycina Orfita.

Eryc. alis integris, fuſcis, violaceo micantibus : ſubtùs ſtrigis duabus ferrugineis ſerieque poſticâ è maculis ſagittatis.

Papilio Orfita. Cram. *pl.* 112. *fig.* D. E. F.

Elle a d'un pouce & demi à deux pouces d'envergure. Le deſſus de ſes ailes eſt d'un brun-noirâtre à reflet violet & ſans taches.

Le deſſous eſt plus pâle & moins chatoyant que le deſſus, avec deux raies ferrugineuſes, obliques & diſcoïdales, bordées de blanc en dehors dans la femelle, & de bleuâtre dans le mâle. Entre ces raies & le bord poſtérieur, il y a une rangée tranſverſe de tachès blanchâtres en fer de flèche, & parmi leſquelles on voit à chaque aile un œil bleuâtre.

Du Bengale, ſelon Cramer. — Eſt-ce bien là qu'elle ſe trouve ?

23. Erycine Gélanor.

Erycina Gelanor.

Eryc. alis ſubdentatis, ſuprà fuſcis, violaceo micantibus : ſubtùs aurantiis, poſticis ſtrigâ ferrugineâ ſerieque marginali è punctis ocellatis.

Papilio Gelanor. Cram. *pl.* 336. *fig.* C. D.

Papilio Gelanor. Herbst, *Pap. tab.* 323. *fig.* 1. 2.

Nous n'avons vu que le mâle. Il a environ un pouce & demi d'envergure. Le deſſus de ſes ailes eſt d'un brun-noirâtre, avec un reflet violet.

Le deſſous eſt d'une couleur orangée chatoyante, ſans taches aux ailes ſupérieures; avec une ligne ferrugineuſe tranſverſe, & une rangée marginale de points noirs oculaires, aux inférieures.

De la Guyane & du Bréſil.

D. Ailes ſupérieures triangulaires. Ailes inférieures arrondies.

24. Erycine Arbas.

Erycina Arbas.

Eryc. alis integris, fuſcis, cæruleſcenti nitidis : ſubtùs ſtrigâ mediâ margineque fulvis, interjectâ poſticarum punctis nigris.

Papilio Arbas. Cram. *pl.* 379. *fig.* L. M.

Papilio Arbas. Herbst, *Pap. tab.* 326. *fig.* 9. 10.

Elle a environ un pouce & demi d'envergure. Le deſſus de ſes ailes eſt d'un brun-noirâtre à reflet violet & ſans taches.

Le deſſous eſt d'un brun-clair à reflet purpurin, avec une ligne diſcoïdale & le bord poſtérieur fauves. La ligne des ſecondes ailes forme un coude, derrière lequel il y a un gros point noir accompagné de petites veines jaunâtres.

Nous n'avons vu qu'un ſeul ſujet, qui paroît être femelle.

De Surinam.

25. Erycine Arcas.

Erycina Arcas.

Eryc. alis integris, ſuprà violaceo-cæruleis, nitidis : anticis punctis aliquot albis mediis, poſticis areâ nigrâ coſtali.

Papilio N. Arcas, *alis integerrimis, cæruleis : anticis albo maculatis, poſticis maculâ atrâ albâque marginali.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 157. *n°.* 483.

Papilio Arcas. Cram. *pl.* 179. *fig.* E. F.

Papilio Arcas. Herbst, *Pap. tab.* 301. *fig.* 9. 10.

Elle a environ deux pouces d'envergure. Le deſſus des ailes eſt d'un bleu-violet-luiſant, avec quatre à cinq points blancs vers le milieu des ſupérieures, & un eſpace noir au milieu du bord antérieur des inférieures.

Le deſſous eſt d'un gris-de-perle, avec quelques points blancs ſur le milieu des premières ailes, & quelques points obſcurs ſur le milieu des ſecondes.

De Surinam.

26. Erycine Priolas.

Erycina Priolas.

Eryc. alis integris, ſuprà nigris, violaceo micantibus : anticis apice æneo venoſis : poſticis ſubtùs albo maculatis.

Elle a près d'un pouce & demi d'envergure. Le deſſus des ailes eſt noir, avec un reflet violet au bord poſtérieur des quatre, & des veines d'un vert-bronzé vis-à-vis du ſommet des ſupérieures.

Le deſſous des premières ailes eſt d'un brun-pâle, avec l'extrémité veinée de blanchâtre. Le deſſous des ſecondes ailes eſt également d'un brun-pâle, avec des taches blanchâtres, dont les antérieures marquées d'un point obſcur, & les poſtérieures d'un point noir. Le corps a le deſſus noir, le deſſous gris. Les antennes ſont noirâtres, avec la maſſue blanche.

Nous n'avons vu que des mâles.

Du Bréſil.

27. Erycine Préma.

Erycina Prema.

Eryc. alis integris, ſuprà nigris, fuſciis macu-

laribus aurato-viridibus : subtùs fuscescentibus, fasciis albidis seriequè terminali è punctis nigris.

Elle a environ un pouce & demi d'envergure. Le dessus des ailes est noir, avec trois bandes transverses & maculaires d'un vert-doré.

Le dessous est d'un brun-clair & chatoyant, avec trois bandes blanchâtres continues, & une rangée terminale de points noirs ocellés, dont le deuxième, à compter du bord antérieur, sablé de vert aux secondes ailes.

Décrite d'après un individu unique, dont la patrie nous est inconnue.

28. Erycine Prétus.

Erycina Pretus.

Eryc. alis integris, suprà nigris, viridi maculatis : subtùs corticinis, albido maculatis.

Papilio P. U. Pretus, *alis subcaudatis, atris, viridi maculatis : subtùs subferrugineis, flavo maculatis.* Fab. *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 86. *n°.* 783.

Hesperia U. *Pretus.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 333. *n°.* 266.

Papilio Pretus. Cram. *pl.* 182. *fig.* C. D.

Fabricius place cette espèce parmi les *Plébéiens urbicoles*, & Cramer parmi les *Plébéiens ruraux;* mais, comme elle nous paroît avoir tous les caractères des Erycines, nous l'agrégeons provisoirement à ces dernières.

Elle a un pouce & demi d'envergure. Le dessus des ailes est noir, avec une multitude de taches vertes, formant cinq bandes transversales.

Le dessous est d'un brun-tanné, avec beaucoup de taches blanchâtres ou jaunâtres.

Du Cap de Bonne-Espérance, selon Fabricius & Cramer. Mais est-ce bien là qu'elle se trouve?

Nota. L'angle anal des secondes ailes est un peu prolongé.

29. Erycine Pétrone.

Erycina Petronius.

Eryc. alis integris, suprà nitidè cæruleis, strigis apiceque nigris : subtùs cinereis, fusco punctatis.

Hesperia R. Petronius, *alis integerrimis, cæruleis, nigro strigosis : subtùs fusco-cinereis, nigro punctatis.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 324. *n°.* 227. (Le mâle.)

Papilio Menander. Cram. *pl.* 334. *fig.* C. D. (La femelle.)

Papilio Menander. Herbst, *tab.* 327. *fig.* 3. 4. (La femelle.)

Fabricius a décrit le mâle sous le nom de *Pétronius*, & Cramer a figuré la femelle sous celui de *Menander.*

Son envergure est d'environ un pouce & demi. Le dessus des ailes est d'un bleu-luisant & changeant, avec des lignes flexueuses & le sommet noirs. Les lignes traversent entièrement les quatre ailes de la femelle, mais elles ne descendent pas jusqu'au milieu des ailes inférieures du mâle.

Le dessous des deux sexes est d'un gris-cendré, avec une multitude de points bruns, dont les postérieurs plus gros & séparés les uns des autres par une ligne ondulée, également brune. La frange des quatre ailes est noire & entrecoupée de blanc. Le corps est brun en dessus, gris en dessous.

De la Guyane & du Brésil.

30. Erycine Hébrus.

Erycina Hebrus.

Eryc. alis integris, suprà nigris cæruleoque variis, posticarum margine interiori albo : omnibus subtùs cærulescentibus, nigro punctatis.

Papilio H. R Hebrus, *alis integris, fuscis, cæruleo variis; posticis cæruleis, margine interiori albo.* Fab. *Mant. Inf. tom.* 2. *pag.* 77. *n°.* 700. — *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *pag.* 301. *n°.* 141.

Papilio Hebrus. Cram. *Pap. pl.* 50. *fig.* E. F.

Elle a de quinze à dix-sept lignes d'envergure. Le dessus de ses ailes est noir, avec des atomes azurés, disposés par bandes transverses aux supérieures, très-denses au milieu & à l'angle anal des inférieures. Ces dernières ailes ont le bord interne largement blanc de part & d'autre, ou en dessus seulement.

Le dessous des quatre ailes est d'un bleu-pâle, avec des points noirs à la base & le long du bord postérieur.

De la Guyane & du Brésil.

31. Erycine Méris.

Erycina Meris.

Eryc. alis subdendatis, nigro multipunctatis, suprà æneis, subtùs brunneo griseoque variegatis.

Papilio Meris. Cram. *pl.* 366. *fig.* B. C.

Papilio Meris. Herbst, *Pap. tab.* 327. *fig.* 7. 8.

Erycina Agesilas. *Antennarum capitulo parvo, fusiformi; palpis mediocribus, parùm pilosis, articulo ultimo brevi, cylindrico conico; alis trigonis, ad marginem posticum breviter angulatis, nigro aut fusco utrinquè confertissimè punctatis; posticis ecaudatis; his & illis suprà chalybeo-æneis, infrà brunneis griseo variegatis; marginis postici incisuris albo fimbriatis.* Rec. d'Observ. de zool. & d'anat. comp. par Al. de Humboldt & A. Bonpland, *vol.* 1. *pag.* 251. *pl.* 25. *fig.* 7. 8.

Elle a entre un pouce & un pouce & demi d'envergure. Le deſſus des ailes eſt d'un bronzé-bleuâtre, mais qui varie ſelon les individus, avec une multitude de petites taches noires, inégales, & dont les poſtérieures preſqu'ocellées.

Le deſſous eſt d'un brun-chatoyant & plus ou moins panaché de griſâtre, avec des taches noires, ſemblables à celles du deſſus. Le bord poſtérieur eſt en outre frangé de blanc aux échancrures. Le corps a le deſſus d'un noir-bronzé, le deſſous griſâtre. Les palpes & le contour de la tête ſont blancs. Les antennes ſont noires, avec des anneaux & la ſommité de la maſſue blanchâtres.

De l'Amérique équinoxiale.

Nota. Cramer a repréſenté les antennes un peu crochues par le bout, ce qui pourroit faire croire que cette eſpèce eſt une *Heſpérie*, tandis que c'eſt véritablement une *Erycine* par la conformation des pattes de devant.

32. Erycine Lucinde.

Erycina Lucinda.

Eryc. alis integris, ſuprà chalybdineis, ſubtùs rufis, utrinquè ſtrigis quinque undulatis punctiſque marginalibus fuſcis.

Papilio D. F. Lucindus, *alis integerrimis, nigro faſciatis, ſuprà cæruleis, ſubtùs fulvis.* Fab. *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 30. *n°.* 319.

Papilio N. *Lucindus.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 154. *n°.* 476.

Papilio Lucinda. Cram. *pl.* 1. *fig.* E. F.

Papilio Lucinda. Herbst, *Pap. tab.* 324. *fig.* 1. 2.

Séba, *Muſ.* 4. *tab.* 13. *fig.* 25. 26.

Elle a environ un pouce & demi d'envergure. Ses ailes ſont couleur d'acier en deſſus, d'un roux-foncé en deſſous, & elles ont de part & d'autre cinq lignes ondulées & tranſverſes, plus une rangée de points marginaux, d'un brun-noirâtre. La ligne qui précède les points eſt plus large que les quatre autres.

De la Guyane & du Bréſil.

Nota. Dans beaucoup d'individus, il y a, vis-à-vis du ſommet, un eſpace qui eſt de part & d'autre plus clair que le fond.

33. Erycine Dyndima.

Erycina Dyndima.

Eryc. alis integris, ſuprà chalybdineis, ſubtùs cæruleſcenti-albis, utrinquè ſtrigis quinque undulatis punctiſque marginalibus fuſcis.

Papilio Dyndima. Cram. *pl.* 171. *fig.* E. F.

Nous avons placé ce lépidoptère parmi les Nymphales (*p.* 407, *n°.* 188); mais, comme nous l'avons revu depuis en meilleur état, nous le décrivons de nouveau en le rapportant au genre auquel il appartient.

Il ne diffère du précédent que parce qu'il a le deſſous des quatre ailes d'un blanc-bleuâtre, au lieu de l'avoir d'un roux-foncé, & parce que l'eſpace qui précède le ſommet des ailes ſupérieures eſt blanc en deſſus.

Ne ſeroit-ce pas une variété de l'Erycine lucinde?

De Surinam.

34. Erycine Arminius.

Erycina Arminius.

Eryc. alis integris, fulvis, ſtrigis quatuor undatis punctiſque marginalibus, ſuprà fuſcis, ſubtùs ferrugineis.

Papilio N. Arminius, *alis integris, concoloribus, fulvis, lunulis punctiſque rufeſcentibus.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 155. *n°.* 478.

Papilio Arminius. Jon. *Fig. pict.* 6. *tab.* 32. *fig.* 4.

Erycina Ops. *Antennis in capitulum gracile, parvum, cylindrico-obconicum, abruptè acuminatum deſinentibus; palpis brevibus articulo ultimo minimo, conico: alis integris, trigonis, ſuprà ſaturato-ferrugineis, lineolis fuſcis; infrà aurantio-luteis, lineolis punctiſque in ſeriem ad limbum poſticum ordinatis, rubido-rufis.* Recueil d'Obſ. de zool. & d'anat. comp. par Al. de Humboldt & A. Bonpland, *vol.* 2. *p.* 89. *pl.* 27. *fig.* 3. 4. (Le mâle.)

Papilio Mandana. Cram. *pl.* 271. *fig.* E. F. (Var. mâle.)

Elle a environ un pouce & demi d'envergure. Le deſſus de toutes ſes ailes eſt d'un fauve-rougeâtre-obſcur, avec quatre lignes brunes, tranſverſes, ondulées, & une rangée marginale de points noirâtres, plus ou moins diſtincts.

Le deſſous eſt d'un jaune-foncé-chatoyant dans le mâle, d'un jauve-fauve dans la femelle, avec des lignes ferrugineuſes correſpondant aux lignes brunes de deſſus. Les points du bord poſtérieur ſont tantôt noirâtres, tantôt rouſſâtres, & les ailes inférieures en ont deux ou trois plus gros que les autres.

Quelquefois le deſſous des ailes du mâle eſt d'un jaune moins gai, comme dans la variété que Cramer a donnée ſous le nom de *Mandana.*

Nous avons vu une autre variété mâle qui étoit d'un fauve-tanné en deſſus & en deſſous.

De l'Amérique méridionale.

35. Erycine Ovide.

Erycina Ovidius.

Eryc. alis integris, ſuprà fulvis, ſubtùs flaveſ-

centibus, utrinquè ſtrigis undatis, feminæ *nigris*, maris *auro pulverulentis.*

Heſperia R. Ovidius, *alis integerrimis, auro punctatis, ſuprà fulvis, ſubtùs flaveſcentibus.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 320. *n°.* 212. (Le mâle.)

Papilio Ovidius. Jon. *Fig. pict.* 6. *tab.* 39. *fig.* 4.

Papilio Fatima. Cram. *pl.* 271. *fig.* A. B. (Le mâle.) *fig.* C. D. (La femelle.)

Elle a d'un pouce & demi à deux pouces d'envergure. Ses ailes ſont fauves en deſſus, d'un jaune-pâle en deſſous, & elles ont de part & d'autre ſix lignes noires, tranſverſes, dont les cinq antérieures flexueuſes & interrompues, la ſixième marginale & formée par des points.

Dans le mâle, ces lignes ſont couvertes d'atomes dorés.

Des Indes occidentales.

36. Erycine Zéanger.

Erycina Zeanger.

Eryc. alis integris, ſuprà fulvis, anticarum apice nigro lituris cæruleſcentibus : ſubtùs omnibus albidis, nigro multimaculatis.

Papilio Zeanger. Stoll, *Suppl. à* Cram. *pl.* 37. *fig.* 2 & 2 B.

Elle a environ un pouce & demi d'envergure. Le deſſus des ailes eſt fauve, avec un rang de points noirs ſur le limbe terminal des ſecondes, & quelques lignes tranſverſes de cette couleur à la baſe des premières. Celles-ci ont en outre le ſommet noir, avec deux litures bleuâtres.

Le deſſous des quatre ailes eſt d'un blanc-bleuâtre, avec des points & des traits noirs. Le corps eſt jaune de part & d'autre, avec la poitrine blanche. Les antennes ſont noires.

La femelle reſſemble au mâle, mais elle a le bord poſtérieur des ſecondes ailes noir en deſſus.

De Surinam.

37. Erycine Eupolémie.

Erycina Eupolemia.

Eryc. alis integris, ſuprà rufis, ſubtùs cæruleſcenti-albis, utrinquè ſtrigis nigris punctato-interruptis.

Nous ne connoiſſons ce lépidoptère que par un individu défectueux. Il n'a qu'un pouce d'envergure. Ses ailes ſont d'un roux-vif en deſſus, d'un blanc-bleuâtre en deſſous, & elles ont de part & d'autre ſix lignes tranſverſes de points noirs, dont les extérieurs arrondis, les autres plus ou moins alongés.

De l'Amérique.

38. Erycine Ptolomée.

Erycina Ptolomæus.

Eryc. alis integris, ſuprà ferrugineis, nigro maculatis, nervorum extimo plumbeo : ſubtùs (mas) *violaceis*, (fem.) *rufis, baſi cæruleſcente.*

Heſperia R. Ptolomæus, *alis integerrimis, ferrugineis, fuſco ſtrigoſis : ſubtùs cæruleis, baſi pallidioribus.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 319. *n°.* 209. (Le mâle.)

Papilio Ptolomæus. Jon. *Fig. pict.* 6. *tab.* 36. *fig.* 3.

Heſperia R. Lucius, *alis integerrimis, ſubconcoloribus, fulvis, nigro undatis.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 320. *n°.* 211. (La femelle.)

Papilio Lucius. Jon. *Fig. pict.* 6. *tab.* 39. *fig.* 1.

Fabricius a donné le mâle ſous le nom de *Ptolomæus*, & la femelle ſous celui de *Lucius.* Mais on aura ſouvent occaſion de remarquer qu'il ſépare preſque toujours les deux ſexes lorſqu'ils diffèrent l'un de l'autre.

Elle a environ un pouce & demi d'envergure. Le deſſus des ailes eſt d'un ferrugineux-pourpre dans le mâle, d'un ferrugineux-fauve dans la femelle, avec des taches noires, dont les poſtérieures marginales & en forme de points. Outre cela (ce que ne dit pas Fabricius), l'extrémité des nervures eſt couleur de mine de plomb.

Le deſſous du mâle eſt d'un violet-luiſant, le deſſous de la femelle ferrugineux, avec des taches noires comme en deſſus, & la baſe des quatre ailes d'un bleu-cendré-pâle.

Du Bréſil.

39. Erycine Azora.

Erycina Azora.

Eryc. alis integris, fulvis, utrinquè nigro punctatis : omnium ſuprà margine anteriori fuſco, poſteriori ſtrigis duabus plumbeis.

Nous n'avons vu que le mâle. Il eſt petit. Ses ailes ont le deſſus fauve, ponctué de noir, avec la côte d'un brun-obſcur & le bord poſtérieur longé par deux lignes mine de plomb. Le brun de la côte des premières ailes ſe courbe vis-à-vis du ſommet & deſcend en manière de bande juſqu'à l'angle interne.

Le deſſous des quatre ailes eſt d'un fauve à reflet purpurin, avec des points noirs correſpondant à ceux du deſſus, mais cependant peu prononcés à l'extrémité des ailes ſupérieures. Les antennes ſont brunes & annelées de blanc.

Du Bréſil.

40. Erycine Gynéa.

Erycina Gynæa.

Eryc. alis integris, suprà fuscis, subtùs ferrugineis : utrinquè strigis nigris, punctato interruptis, duabusque limbi posticis plumbeis.

Nous n'avons vu que le mâle. Il eſt petit. Ses ailes ſont brunes en deſſus, ferrugineuſes en deſſous, & elles ont de part & d'autre quatre lignes tranſverſes de points noirs, plus deux lignes marginales couleur de mine de plomb. La frange du bord poſtérieur eſt entrecoupée de gris, & ce bord eſt ferrugineux en deſſus.

Du Bréſil.

41. Erycine Avius.

Erycina Avius.

Eryc. alis integris, concoloribus, fuscis, strigis obscurioribus duabusque limbi posticis cœruleis.

Papilio P. R. Avius, *alis integris, concoloribus, fuscis, strigis duabus apicis cœruleis.* Fab. *Mant. Inſ. tom. 2. p. 77. n°. 701.*

Heſperia R. *Avius.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom. 3. pars 1. p. 301. n°. 142.*

Papilio Avius. Herbst, *Pap. tab. 317. fig. 9.*

Papilio Anius. Cram. *pl. 92. fig. B.*

Elle n'a guère qu'un pouce d'envergure. Le deſſus de ſes ailes eſt d'un brun-noirâtre; avec cinq lignes tranſverſes plus foncées. Il y a en outre le long du bord poſtérieur deux lignes d'un bleu-verdâtre.

Le deſſous ne diffère du deſſus que parce qu'il a un reflet pourpré.

Nous n'avons pas vu la femelle.

Des Indes occidentales.

42. Erycine Cléone.

Erycina Cleonus.

Eryc. alis integris, nigris, suprà strigis duabus marginalibus, subtùs unicâ, plumbeis.

Papilio Cleonus. Cram. *pl. 380. fig. H. I.*

Papilio Cleonus. Herbst, *Pap. tab. 318. fig. 3.*

Elle a approchant un pouce d'envergure. Le deſſus de ſes ailes eſt noir, avec deux lignes mine de plomb, parallèles au bord poſtérieur, & renfermant une bande brune ſur laquelle il y a une ſérie de points noirs. Outre cela, la frange eſt blanche, mais entrecoupée de noir vers le ſommet des ailes ſupérieures.

Le deſſous des quatre ailes eſt d'un noir à reflet bleu, & longé parallèlement au bord poſtérieur par une ligne mine de plomb, laquelle eſt beaucoup plus large aux premières ailes qu'aux ſecondes. Les antennes ſont annelées de blanc & de noir.

Nous avons vu un individu un peu plus grand & que nous ſoupçonnons être la femelle ou une variété de la femelle. Il ſe diſtingue des mâles que nous venons de décrire en ce que la bande brune du deſſus eſt plus claire vis-à-vis du ſommet des ailes ſupérieures, & enſuite nulle juſqu'à l'angle anal des inférieures. Une autre différence que nous devons auſſi mentionner, c'eſt que la ligne mine de plomb du deſſous n'eſt pas plus large aux premières ailes qu'aux ſecondes.

De la Guyane & du Bréſil.

43. Erycine Cléodora.

Erycina Cleodora.

Eryc. alis integris, nigris, suprà strigis duabus marginalibus plumbeis, subtùs nigro punctatis.

Elle a un demi-pouce de plus que l'Erycine *Cléone*, à laquelle elle reſſemble en deſſus.

Le deſſous de ſes ailes eſt glacé de bleu & ponctué de noir. Les points de l'extrémité ſont preſque oculaires.

La femelle nous eſt inconnue.

Du Bréſil.

44. Erycine Argiopé.

Erycina Argiope.

Eryc. alis integris, nigris, suprà aurato-viridi pulverulentis : subtùs anticis maculâ baseos miniaceâ.

Son envergure n'eſt guère que d'un pouce. Le deſſus des ailes eſt noir & parſemé d'atomes d'un vert-doré, derrière leſquels les premières ailes offrent parallèlement à leur bord poſtérieur une ligne mine de blomb.

Le deſſous eſt d'un noir-brun, avec une tache longitudinale d'un rouge cire d'Eſpagne près de la baſe des premières ailes. Le corps eſt ſablé de vert comme le deſſus des ailes.

Nous n'avons vu que le mâle.

Du Bréſil.

45. Erycine Domitien.

Erycina Domitianus.

Eryc. alis integris, fuscis : anticis maculâ, posticis strigâ, viridibus : subtùs brunneis, punctis strigâque marginali argenteis. Fab.

Heſperia R. *Domitianus.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom. 3. pars 1. p. 315. n°. 193.*

Elle eſt petite. Toutes ſes ailes ſont obſcures, avec le bord poſtérieur un peu brun. Les ailes ſupérieures ont ſur le milieu une grande tache d'un vert-luiſant, avant le brun du bord une rangée de

points noirs, & sur le bord même une ligne argentée. Les ailes inférieures ont avant le bord de derrière une ligne verte, & le long de ce bord une ligne argentée.

Le dessous des quatre ailes est brun, avec une multitude de points, & une ligne terminale, argentés.

De la Guadeloupe.

(*Traduction de Fabricius.*)

46. Erycine Géminus.

Erycina Geminus.

Eryc. alis rotundatis, cæruleis, limbo atro strigâ cæruleâ: posticis subtùs fusco subfasciatis. Fab.

Hesperia R. *Geminus.* Fab. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 322. n°. 220.*

Papilio Geminus. Jon. *Fig. pict. 6. tab. 35. fig. 2.*

Elle est de moyenne taille. Toutes ses ailes sont arrondies, bleues, avec le limbe postérieur noir & longé par une ligne bleue. Outre cela, il y a au sommet des ailes supérieures une bande, & à la base des inférieures une tache, noires.

Le dessous des quatre ailes est bleu, avec une ligne sur les premières & leur extrémité, & plusieurs bandes sur les secondes, d'un brun-obscur.

De l'Amérique.

(*Traduction de Fabricius.*)

47. Erycine Stilbé.

Erycina Stilbe.

Eryc. alis integris, concoloribus, fulvis, nigro punctatis, strigâ terminali argenteâ.

Elle est petite. Ses ailes sont fauves de part & d'autre, avec une multitude de points noirs, & une ligne argentée presque terminale. Cette ligne est continue en dessus, maculaire en dessous.

Du Bréfil.

48. Erycine Hisbon.

Erycina Hisbon.

Eryc. alis integris, fusco-nigris, utrinquè fasciis tribus ochraceis: omnibus supra lineâ terminali plumbeâ.

Papilio P. R. Hisbon, *alis integerrimis, atris, fasciis tribus flavescentibus: posticâ abbreviatâ.* Fab. *Mant. Inf. tom. 2. p. 83. n°. 748.*

Hesperia R. *Hisbon.* Fab. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 318. n°. 206.*

Papilio Hisbon. Cram. *pl. 83. fig. C.*

Papilio Hisbon. Herbst, *Pap. tab. 321. fig. 1.*

Elle n'a guère qu'un pouce d'envergure. Ses ailes sont d'un noir-brun de part & d'autre, avec trois bandes communes d'un jaune d'ocre. Outre cela, le bord postérieur est longé en dessus par une ligne couleur de plomb.

Quelquefois les deux bandes extrêmes sont moins apparentes en dessus qu'en dessous, notamment dans les mâles.

Du Bréfil.

49. Erycine Ouranus.

Erycina Ouranus.

Eryc. alis integerrimis, utrinquè fasciâ albâ apicibus rufis: posticis supra lineâ terminali plumbeâ.

Hesperia R. Ouranus, *alis integerrimis, concoloribus, atris, fasciâ communi albâ, maculâ sanguineâ terminatâ.* Fab. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 317. n°. 200.*

Papilio Ouranus. Cram. *pl. 335. fig. C.*

Papillio Ouranus. Herbst, *Pap. tab. 319. fig. 10.*

Papilio Ouranus. Jon. *Fig. pict. 6. tab. 55. fig. 4.*

Elle a près d'un pouce & demi d'envergure. Ses ailes sont noires de part & d'autre, & elles ont le milieu traversé par une bande blanche ou jaunâtre dont les extrémités sont fauves. Cette bande est coudée & dilatée aux premières ailes, tandis qu'elle est presque droite & linéaire aux secondes. Outre cela, le dessus des secondes ailes offre, avant la frange, une ligne couleur de mine de plomb.

De la Guyane & du Bréfil.

50. Erycine Phillone.

Erycina Phillone.

Eryc. alis integris, fuscis, fasciis duabus albis strigâque intermediâ fulvâ: omnibus basi annulatis.

Papilio Philiasus. Cram. *pl. 192. fig. A. B.*

Clerck, *Icon. tab. 41. fig. 5.*

Elle a entre un pouce & demi & deux pouces d'envergure. Ses ailes sont d'un brun-noirâtre de part & d'autre, avec deux bandes blanches, communes, dont l'antérieure discoïdale, plus large, & séparée de la postérieure par une ligne fauve arquée. Le bord terminal, dont la frange est entrecoupée de blanc, offre une ligne blanche sinuée, & il y a près de la base de chaque aile quelques anneaux cendrés parmi lesquels on distingue quelques taches fauves.

Le dessous ressemble au dessus, mais la bande blanche de l'extrémité des secondes ailes se con-

fond avec la ligne marginale, & elle eſt chargée d'un rang de points noirs, dont le ſecond & l'anal beaucoup plus gros.

De la Guyane & du Bréſil.

51. Erycine Lyſimon.

Erycina Lyſimon.

Eryc. alis repandis, fuſcis, faſciâ albâ, communi, mediâ: omnium limbo poſtico ſtrigâ fulvâ annuliſque cæruleſcentibus.

Papilio Liſimon. Stoll, *Pap. Suppl. à* Cram. *pl.* 39. *fig.* 1 & 1 A.

Elle n'a guère plus d'un pouce d'envergure. Ses ailes ſont brunes, avec une bande blanche, diſcoïdale, étroite, ſe terminant en pointe vers le ſommet des ſupérieures. Parallèlement à cette bande, le limbe poſtérieur de toutes les ailes offre une ligne fauve, puis un rang d'anneaux bleuâtres. Il y a auſſi de pareils anneaux ſur la côte des ailes de devant.

Le deſſous reſſemble au deſſus, ſeulement la ligne fauve eſt plus pâle, & les anneaux du limbe renferment chacun un point noir.

Cette deſcription, faite d'après pluſieurs individus, prouve que le Lyſimon a tous les caractères du *Lamis*, mais qu'il eſt toujours plus petit, & que le brun domine ſur ſes ailes de manière à n'y laiſſer qu'une bande blanche étroite.

De Surinam.

52. Erycine Lamis.

Erycina Lamis.

Eryc. alis repandis, niveis, margine omni exteriore fuſco cæruleſcentique annulato: poſtico faſciâ fulvâ.

Papilio P. R. Lamis, *alis integris, fuſcis, faſciâ communi abbreviatâ albâ fulvâque.* Fab. *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 78. *n°.* 714.

Heſperia R. *Lamis.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 305. *n°.* 157.

Papilio Lamis. Cram. *pl.* 335. *fig.* F. G.

Papilio Lamis. Herbst, *Pap. tab.* 319. *fig.* 4. 5.

Elle a entre un pouce & demi & deux pouces d'envergure. Ses ailes ſont très-blanches, avec la côte des premières & le limbe poſtérieur des quatre bruns & annelés de bleu-cendré. Le limbe poſtérieur offre en outre une bande fauve, placée avant les anneaux, & il a la frange entrecoupée de blanc.

Le deſſous reſſemble au deſſus, mais les anneaux ſont blancs, & ceux du limbe poſtérieur renferment chacun un point noir. L'abdomen eſt tout blanc dans le mâle, brun en deſſus dans la femelle.

De la Guyane & du Bréſil.

53. Erycine du Figuier.

Erycina Caricæ.

Eryc. alis repandis, niveis, margine omni exteriore fuſco cæruleſcentique annulato: antico maculis, poſtico faſcia fulvis.

Papilio P. R. Caricæ, *alis integerrimis, fulvis, diſco communi albo, limbo cinereo ocellato.* Linn. *Syſt. Nat.* 2. *p.* 792. *n°.* 244. — *Muſ. Lud. Ulr.* 324.

Clerck, *Icon. tab.* 20. *fig.* 2.

Merian, *Surin. Inſ. tab.* 40.

Papilio Caricæ. Cram. *pl.* 170. *fig.* E.

Papilio Caricæ. Herbst, *Pap.* 319. *fig.* 1.

Papilio P. R. Caricæ, *alis integerrimis, fuſcis, diſco communi albo, limbo cinereo ſubocellato.* Fab. *Syſt. Ent. p.* 526. *n°.* 352. — *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 78. *n°.* 712.

Heſperia R. *Caricæ.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 305. *n°.* 155.

Elle a de très-grands rapports avec l'Erycine *Lamis*; mais elle eſt conſtamment plus petite, & la côte de ſes premières ailes offre de part & d'autre un rang de quatre taches fauves.

On la trouve dans l'Amérique méridionale, ſur le figuier.

54. Erycine Pélops.

Erycina Pelops.

Eryc. alis repandis, flaveſcentibus, margine omni exteriore fuſco fuſciâ fulvâ nigro punctatâ.

Papilio Pelops. Cram. *pl.* 170. *fig.* F.

Papilio Pelops. Herbst, *Pap. tab.* 319. *fig.* 2.

Papilio P. R. Pelops, *alis integris albis, limbo communi fuſco maculis ſtrigâque poſtica fulvis.* Fab. *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 78. *n°.* 713.

Heſperia R. *Pelops.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 305. *n°.* 156.

Elle a un peu plus d'un pouce d'envergure. Ses ailes ſont d'un jaune-pâle, avec tout le contour extérieur brun, & chargé d'une bande fauve ſur laquelle il y a une rangée de points noirs. La frange eſt outre cela entrecoupée de blanc.

Le deſſous ne diffère du deſſus que parce que la bande fauve du limbe eſt moins apparente. L'abdomen a le deſſus blanc dans le mâle, brun dans la femelle.

De la Guyane.

55. Erycine Cachrys.

Erycina Cachrys.

Eryc. alis repandis, flaveſcentibus, margine

omni exteriore nigro : poſtico ſtrigâ cæruleſcente, angulati.

Papilio P. R. Cachrus, *alis integris, flaveſcentibus, limbo communi fuſco, albo maculato.* Fab. *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 78. *n°.* 715.

Heſperia R. *Cachrys.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 306. *n°.* 158.

Papilio Damon. Stoll, *Pap. Suppl. à* Cram. *pl.* 39. *fig.* 5 & 5 D.

L'Heſpérie *Cachrys* de Fabricius ſe rapporte inconteſtablement au Papillon *Damon* de Stoll.

Elle a près d'un pouce & demi d'envergure. Ses ailes ſont d'un jaune-pâle, avec la côte des premières, & le limbe poſtérieur des quatre, d'un noir-brun. Le limbe poſtérieur eſt entièrement diviſé par deux lignes bleuâtres, dont l'intérieure en feſton, l'extérieure arquée. Outre cela, la frange des premières ailes eſt entrecoupée de blanc.

Le deſſous reſſemble au deſſus; mais le limbe poſtérieur de toutes les ailes offre trois taches blanches entre les deux lignes dont nous venons de parler, & il y a quelques anneaux blanchâtres ſur la côte des ailes de devant.

Nous avons vu une variété qui n'avoit pas de noir au milieu de la côte des premières ailes, & dont le limbe terminal des quatre étoit tacheté de blanc en deſſus comme en deſſous.

De la Guyane & du Bréſil.

56. Erycine Ménalcus.

Erycina Menalcus.

Eryc. alis integris, concoloribus, flaveſcentibus, margine omni exteriore nigro : poſtico fimbriâ rufâ.

Papilio Menalcus. Cram. *pl.* 390. *fig.* K.

Papilio Menalcus. Herbst, *Pap. tab.* 319. *fig.* 3.

Elle a de grands rapports avec l'Erycine *Cachrys*; mais ſes ailes ſont très-entières, ſemblables de part & d'autre, & leur bord poſtérieur a une frange rouſſe.

De Surinam.

Nota. Il faudroit avoir vu pluſieurs individus, & connoître la chenille, pour décider ſi c'eſt une eſpèce diſtincte ou bien ſimplement une variété de l'Erycine *Cachrys.*

57. Erycine Anapis.

Erycina Anapis.

Eryc. alis integris, ſuſceſcentibus, utrinquè ſtrigâ mediâ ſaturatiore : poſticarum limbo poſtico ſuprà lineâ angulatâ flavidâ.

Elle a environ un pouce & demi d'envergure. Ses ailes ſont d'un brun-pâle de part & d'autre; & traverſées un peu au-delà de leur milieu par une ligne obſcure, légèrement flexueuſe. Outre cela, le bord poſtérieur des ſecondes ailes eſt précédé en deſſus d'une ligne jaunâtre en feſton. Le corps eſt de la couleur des ailes. Les antennes ſont brunes & annelées de blanchâtre.

La femelle nous eſt inconnue.

Du Bréſil.

58. Erycine Oditès.

Erycina Odites.

Eryc. alis integris, ſubconcoloribus, umbrinis, annulis baſeos, ſaſciâ mediâ ſtrigâque poſticâ albis.

Papilio Odites. Cram. *pl.* 11. *fig.* E. F.

Papilio Odites. Herbst, *Pap. tab.* 325. *fig.* 8. 9.

Elle a environ deux pouces d'envergure. Le deſſus des ailes eſt couleur de terre d'ombre, avec une bande blanche, diſcoïdale, anguleuſe, s'élargiſſant ſur les inférieures, & ſuivie d'une ligne blanchâtre parallèle au bord poſtérieur, lequel a une frange entrecoupée de blanc-vif. Outre cela, la baſe des premières ailes a quelques anneaux blanchâtres.

Le deſſous ne diffère du deſſus que parce que la baſe des quatre ailes eſt d'un ton verdâtre.

Le mâle nous eſt inconnu, & nous n'avons vu qu'une ſeule femelle.

De Surinam.

59. Erycine Tytius.

Erycina Tytius.

Eryc. alis integris, ſuprà ferrugineis aut fuſcis, ſubtùs pallidioribus, omnium baſi poſticarumque limbo punctis ocellaribus nigris.

Papilio F. Tytius, *alis integerrimis, fuſcis, albo maculatis : anticis punctis ocellaribus atris.* Fab. *Spec. Inſ. tom.* 2. *p.* 54. *n°.* 240. — *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 27. *n°.* 278. — *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 48. *n°.* 147. (La femelle.)

Papilio Tytia. Cram. *Pl.* 121. *fig.* C. D.

Papilio Tytia. Herbst, *Pap.* 145. *fig.* 5. 6.

Nous avons, mais à tort, placé cette eſpèce parmi les Nymphales (*p.* 426, *n°.* 240); & comme la deſcription que nous en avons donnée eſt inexacte, nous en offrons ici une nouvelle.

Son envergure eſt d'un peu plus d'un pouce & demi. Le deſſus du mâle eſt ferrugineux, le deſſus de la femelle d'un brun-obſcur, avec des points noirs preſqu'oculaires à la baſe des quatre ailes & le long du bord terminal des inférieures.

Le deſſous des deux ſexes eſt plus pâle que le deſſus,

deſſus, & les points oculaires dont nous venons de parler ont l'iris blanchâtre.

Dans les femelles, le deſſus de toutes les ailes offre ſur le milieu une bande blanchâtre, interrompue & plus ou moins apparente.

On voit des individus de l'un & de l'autre ſexe qui ont, entre les points de la baſe & du bord poſtérieur des ſecondes ailes, une double ligne maculaire, tantôt brune, tantôt blanchâtre.

De Surinam.

60. Erycine Tutana.

Erycina Tutana.

Eryc. alis integris, concoloribus, fuſcis, apice dilutiore : poſticis ſtrigâ marginali è punctis ocellaribus nigris.

Nous ne connoiſſons ce Lépidoptère que par un individu femelle, appartenant à M. le duc de Rivoli.

Il a environ un pouce & demi d'envergure. Ses ailes ont la moitié antérieure d'un brun-obſcur, la moitié poſtérieure plus claire, avec une rangée de points noirs ocellés le long du bord terminal des inférieures.

Le deſſous eſt, à une légère nuance près, ſemblable au deſſus.

Du Bréſil.

61. Erycine Soronus.

Erycina Soronus.

Nous l'avons décrite comme Nymphale (*p.* 426, *n°.* 241); mais elle doit être rapportée ici.

62. Erycine Phylacis.

Erycina Phylacis.

Nous l'avons donnée comme Nymphale (*p.* 426, *n°.* 242); mais c'eſt ici qu'il faut la mettre.

63. Erycine Epigia.

Erycina Epigia.

Nous l'avons miſe parmi les Nymphales (*p.* 426, *n°.* 243); mais c'eſt ici qu'elle doit être.

64. Erycine Emylius.

Erycina Emylius.

Eryc. alis integris, ſuprà fuſcis : anticis faſciâ mediâ ex albido-rufâ, poſticis punctis marginalibus ocellatis : ſubtùs omnibus flaveſcentibus, nigro punctatis.

Papilio P. R. Emylius, *alis integerrimis, nigris, albo punctatis : anticis faſciâ flavâ : omnibus ſubtùs variegatis.* Fab. *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 78. *n°.* 711.

Heſperia R. *Emylius.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 305. *n°.* 154.

Papilio Emylius. Cram. *pl.* 66. *fig.* G. H.

Papilio Emylius. Herbst, *tab.* 318. *fig.* 9. 10.

Elle a un peu plus d'un pouce d'envergure. Le deſſus des ailes eſt brun, avec deux taches fauves à la baſe, & une rangée de points noirs à iris cendré le long du bord poſtérieur. Le milieu des premières ailes offre en outre une bande oblique, d'un jaune-fauve dans le mâle, d'un blanc-rouſſâtre dans la femelle.

Le deſſous des quatre ailes eſt d'un blanc-ſale, avec des points noirs à la baſe & au bord poſtérieur. Les points de la baſe ſont beaucoup plus petits que les autres, & le ſommet des ailes de devant eſt brun.

De la Guyane & du Bréſil.

65. Erycine Manthus.

Erycina Manthus.

Eryc. alis integris, nigris, faſciâ mediâ albâ, annulis atomiſque marginalibus cyaneis.

Papilio P. R. Mantus, *alis oblongis, integerrimis, cœruleo fuſcoque variis, faſciâ communi albâ.* Fab. *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 78. *n°.* 717.

Heſperia R. *Mantus.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 306. *n°.* 161.

Papilio Manthus. Cram. *pl.* 47. *fig.* F. G.

Papilio Mantus. Herbst, *tab.* 317. *fig.* 1. 2.

Elle a environ un pouce & demi d'envergure. Le deſſus des ailes eſt noir, avec des anneaux & des atomes d'un bleu-azuré-luiſant ſur tout le pourtour extérieur des premières & ſur le bord terminal des ſecondes. Le milieu des quatre ailes eſt traverſé par une bande blanche, derrière laquelle les inférieures ont deux points fauves avoiſinant le bord interne.

Le deſſous offre le même deſſin que le deſſus, mais le fond & toutes les parties bleues ſont beaucoup plus pâles.

De la Guyane & du Bréſil, & non de l'Afrique équinoxiale, comme le dit Fabricius.

66. Erycine Damis.

Erycina Damis.

Eryc. alis integris, nigris, diſco communi albo : anticis utrinquè, poſticis ſubtùs faſcii marginali nitidè cyaneâ.

Papilio Damis. Cram. *pl.* 70. *fig.* E. F. (Le mâle.)

Papilio Damis. Herbst, *Pap. tab* 321. *fig.* 10. 11.

Séba, *Muſ. tom.* 4. *tab.* 25. *fig.* 5. 6. 12. 13.

Séba, *Muſ. tom.* 4. *tab.* 37. *fig.* 5. 6.

Nous ne connoiſſons que le mâle. Il a un peu plus d'un pouce & demi d'envergure. Le deſſus de toutes ſes ailes eſt noir, avec un eſpace blanc, commun & diſcoïdal. Outre cela, les premières ailes ont une bande bleue, luiſante, ſuivant tout le contour extérieur depuis la baſe juſqu'à l'angle interne.

Le deſſous des premières ailes reſſemble tout-à-fait au deſſus.

Le deſſous des ſecondes ailes eſt auſſi ſemblable au deſſus; mais on y voit deux bandes bleues, luiſantes & tranſverſes, dont l'antérieure baſilaire, la poſtérieure marginale, diviſée par les nervures & chargée d'un rang de ſix gros points noirs. La frange de chaque aile eſt entrecoupée de blanc.

Pris dans l'île Rawak (terre des Papous), par MM. Quoy & Gaimard, médecins de l'expédition de M. le capitaine Freycinet.

Nota. Cramer avoit d'abord dit que ce papillon étoit des Indes occidentales; mais il ajoute enſuite par correction qu'il ſe trouve dans l'île d'Amboine; ce qui eſt très-probable, car il n'y a que cent lieues d'Amboine à l'île Rawak. Il réſulte delà que l'Amérique n'eſt pas, comme on le croyoit, la ſeule partie du Globe qui poſſède des *Erycines*. La forme de la cellule diſcoïdale des ailes inférieures & celle des deux pattes antérieures ne nous permettent pas du moins de douter que le Damis ne ſoit une *Erycine*.

67. Erycine Béliſe.

Erycina Beliſe.

Eryc. alis integris, nigris, faſciâ communi albâ, ſuprà cœruleo innatâ, ſubtùs annulo fulvo cinctâ.

Papilio Beliſe. Cram. *pl.* 376. *fig.* E. F.

Elle a un peu plus d'un pouce & demi d'envergure. Le deſſus des ailes eſt noir, avec une bande blanche, largement environnée de bleu-pâle. Cette bande traverſe entièrement les ſecondes ailes, & elle va en ſe rétréciſſant expirer au milieu des premières, non loin d'une liture blanche, plus ou moins prononcée.

Le deſſous eſt d'un brun-noirâtre, avec une bande ſemblable à celle du deſſus, mais renfermée dans un anneau fauve que borde extérieurement une double ligne blanche, maculaire. Outre cela, la baſe des premières ailes offre deux lignes longitudinales, dont la ſupérieure blanche, l'inférieure fauve. Le corps eſt blanc, avec tout le corſelet & la baſe de l'abdomen noirs.

De la Guyane & du Bréſil.

68. Erycine Arthémon.

Erycina Arthemon.

Eryc. alis integris, albis: anticis margine exteriori nigro, cœruleo alboque maculato.

Papilio P. R. Arthemon, *alis integerrimis, ſubfuſcis, diſco communi albo, faſciâ dimidiatâ fuſcâ.* Linn. *Syſt.* 2. *p.* 792. *n°.* 243. — *Muſ. Lud. Ulr.* 323.

Papilio P. R. *Arthemon.* Fab. *Syſt. Ent. p.* 528. *n°.* 362.—*Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 83. *n°.* 747.

Heſperia R. *Arthemon.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 318. *n°.* 204.

Papilio Arthemon. Clerck, *Icon. tab.* 37. *fig.* 2.

Papilio Arthemon, var. Clerck, *Icon. tab.* 46. *fig.* 3.

Séba, *Muſ.* 4. *tab.* 27. *fig.* 25. 26.

Heſperia R. Coenus, *alis integerrimis, albis: anticis margine exteriori fuſco, albo maculato.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 308. *n°.* 169.

Papilio Coenus. Jon. *Fig. pict.* 6. *tab.* 55. *fig.* 2.

Le papillon *Coenus* de Fabricius & le papillon *Arthemon* de Linné ne forment qu'une ſeule eſpèce, dont le premier eſt le mâle, le ſecond la femelle.

Elle a depuis un pouce juſqu'à un pouce & demi d'envergure. Ses ailes ſont blanches en deſſus, avec tout le pourtour extérieur des premières d'un noir-brun, & marqué de trois taches blanches qu'accompagne une tache bleue-luiſante, placée longitudinalement à l'origine de la côte. Dans la femelle, les ſecondes ailes ſont en outre terminées par une bande noire, & l'on voit près de leur baſe une ligne oblique de cette couleur. Les ſecondes ailes du mâle ont quelquefois un liſeré noir, mais il ne deſcend pas juſqu'à l'angle de l'anus.

Le deſſous des deux ſexes ne diffère du deſſus que parce que la bordure noire eſt variée de ferrugineux & de bleu-luiſant, & parce qu'il y a une ligne ferrugineuſe à la baſe des ſecondes ailes. Cette ligne eſt ordinairement double dans les femelles, attendu qu'elles ont en deſſus une ligne noire oblique.

Du Bréſil.

69. Erycine Icare.

Erycina Icarus.

Eryc. alis integris, ſuprà albis, ſtrigis quinque fuſcis: ſubtùs fuſcis, faſciis albis, poſticâ nigro punctatâ.

Papilio P. R. Icarus, *alis integris, ſuprà albis, faſciis fuſcis: ſubtùs faſciis albis nigriſque alternis.* Fab. *Mant. inſ. tom.* 2. *p.* 77. *n°.* 705.

Hesperia R. *Icarus.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 302. *n°.* 146.

Papilio Philemon. Cram. *pl.* 22. *fig.* G. H.

Papilio Philemon. Herbst, *Pap. tab.* 318. *fig.* 5. 6.

Elle a près d'un pouce & demi d'envergure. Le dessus de ses ailes est blanc, avec cinq lignes brunes, transverses, dont une tout-à-fait terminale.

Le dessous est brun, avec quatre bandes blanches communes, dont la postérieure adossée à un rang de points noirs. Entre la première & la deuxième bande, chaque aile a en outre un point noir, qui se reproduit quelquefois en dessus, surtout dans le mâle.

De la Guyane & du Brésil.

70. Erycine Thasus.

Erycina Thasus.

Eryc. alis integerrimis, fuscis, utrinquè strigis pallidioribus margineque postico albo punctato.

Papilio Thasus. Cram. *pl.* 333. *fig.* I.

Papilio Thasus. Herbst, *Pap. tab.* 322. *fig.* 7.

Elle a environ un pouce & demi d'envergure. Ses ailes ont le dessus d'un brun-noirâtre, avec six lignes transverses plus claires, & une rangée terminale de points blancs.

Le dessous est comme le dessus, excepté que les points blancs y sont plus petits.

De Surinam.

71. Erycine Actoris.

Erycina Actoris.

Eryc. alis integerrimis, fuscis, utrinquè maculis ocellaribus albis, numerosis.

Papilio P. R. Actoris, *alis integerrimis, concoloribus, fuscis, albo punctatis.* Fab. *Mant. Inst. tom.* 2. *p.* 82. *n°.* 742.

Hesperia R. *Actoris.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 316. *n°.* 196.

Papilio Actoris. Cram. *pl.* 93. *fig.* D.

Papilio Actoris. Herbst, *Pap. tab.* 320. *fig.* 4.

Elle a environ un pouce & demi d'envergure. Ses ailes ont le dessus d'un brun-sombre, avec une multitude de petites taches blanches, bordées de noir.

Le dessous ressemble au dessus, mais le fond est plus clair, & les taches blanches sont plus grandes.

De Surinam.

72. Erycine Isala.

Erycina Isala.

Eryc. alis integris, suprà fuscis, subtùs albis, utrinquè punctis ocellaribus nigris.

Nous n'avons vu que le mâle. Il a approchant un pouce & demi d'envergure. Le dessus de ses ailes est brun, avec des points noirs, plus ou moins cerclés de ferrugineux, à la base & le long du bord postérieur. Le sommet des premières ailes est en outre ferrugineux.

Le dessous des quatre ailes est blanc, avec des points noirs correspondans à ceux du dessus & cerclés de bleuâtre. Les points de la base sont séparés de ceux du bord postérieur par deux lignes brunes, transverses & un peu flexueuses.

De l'Amérique méridionale.

73. Erycine Thersandra.

Erycina Thersandra.

Eryc. alis integris, fuscis, maris *cœruleo,* fœminæ *griseo pulverulentis: omnibus utrinquè maculis ocellaribus ferrugineis.*

Papilio Thersander. Cram. *pl.* 335. *fig.* A. B. (Le mâle.)

Papilio Thersander. Herbst, *Pap. tab.* 319. *fig.* 8. 9. (Le mâle.)

Cramer n'a connu que le mâle de cette espèce.

Elle a environ un pouce & demi d'envergure. Le dessus des ailes est brun, saupoudré de bleu dans le mâle, de gris dans la femelle, avec trois rangées transverses de taches ferrugineuses dont le milieu est noir. Les taches de la rangée postérieure sont en outre bordées de bleuâtre ou de blanchâtre à leur côté interne, & l'on voit quelques points blancs vis-à-vis du sommet des premières ailes.

Le dessous des deux sexes ressemble au dessus, mais il est plus pâle. Le corps est brun & les antennes sont annelées de blanc.

De la Guyane & du Brésil.

74. Erycine Cénéus.

Erycina Ceneus.

Eryc. alis integris, suprà nigris, undis cœruleis: subtùs cinereis, maculis albis nigro marginatis.

Papilio P. R. Ceneus, *alis integris, atris, cœruleo undatis, margine albo punctato.* Fab. *Mant. Inst. tom.* 2. *p.* 77. *n°.* 703.

Hesperia R. *Ceneus.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 302. *n°.* 144.

Papilio Ceneus. Cram. *pl.* 156. *fig.* F.

Papilio Ceneus. Herbst, *Pap. tab.* 318. *fig.* 4.

Elle a un peu plus d'un pouce d'envergure. Le dessus de ses ailes est d'un noir-brun, avec des ondes d'un bleu-luisant. Il y a en outre quelques

points blancs vis-à-vis du sommet des ailes supérieures.

Le dessous des quatre ailes est cendré, avec une multitude de taches blanches, bordées de noir. La frange est inégalement entrecoupée de blanc de part & d'autre.

De la Guyane & du Brésil.

75. Erycine Æmulius.

Erycina Æmulius.

Eryc. alis integerrimis, cinereis, fusco alboque maculatis : posticis suprà pallidis : subtùs omnibus fusco punctatis. Fab.

Hesperia R. *Æmulius.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 322. *n°.* 19.

Papilio Æmulius. Jon. *Fig. pict.* 6. *tab.* 40. *fig.* 4.

Elle est de moyenne taille. Les ailes supérieures ont le dessus cendré, avec quelques petites lignes blanches, transversales, & des taches brunes, oblongues. Leur dessous est plus obscur que le dessus, avec des taches brunes, dont quelques-unes entourées d'un anneau blanc.

Les ailes inférieures sont pâles, avec la base cendrée, & des stries blanches. Leur dessous est très-blanc, avec plusieurs points bruns à la base, & deux semblables à l'extrémité.

Des Indes.

(*Traduction de Fabricius.*)

76. Erycine Epone.

Erycina Epone.

Eryc. alis integris, fuscis, albo fulvoque punctatis : posticis utrinquè areâ disci albâ.

Elle a approchant un pouce & demi d'envergure. Le dessus des ailes est d'un brun-noirâtre, avec une multitude de points blancs épars, & quelques points fauves postérieurs. Le milieu des secondes ailes offre en outre un espace blanc, en forme de bande transverse dans la femelle, mais descendant dans le mâle jusqu'à l'angle de l'anus où il y a trois points noirs visibles de part & d'autre.

Le dessous des deux sexes est d'un brun-pâle, tacheté de blanc & d'un peu de fauve.

Du Brésil.

77. Erycine Tarquin.

Erycina Tarquinius.

Eryc. alis integerrimis, nigris : anticis maculâ oblongâ baseos sinuatâ ; posticis angulo ani flavo, nigro maculato. Fab.

Hesperia R. *Tarquinius.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 319. *n°.* 207.

Papilio Tarquinius. Jon. *Fig. pict.* 6. *tab.* 45. *fig.* 4.

Ses ailes supérieures sont noires, & elles présentent à la base une tache jaune, oblongue, trilobée en arrière, divisée en avant par une ligne noire.

Les ailes inférieures sont noires, avec l'angle anal largement jaune & marqué de cinq points noirs.

Le dessous des quatre ailes est cendré, avec une multitude de taches rouffâtres, cerclées de blanc. Outre cela, le disque des ailes supérieures est jaune & tacheté de noir.

Des Indes occidentales.

(*Traduction de Fabricius.*)

78. Erycine Penthée.

Erycina Pentheus.

Eryc. alis integris, ferrugineis, maculis nigris suprà simplicibus, subtùs ocellatis : posticis (mas) *dimidio apicali albo.*

Papilio P. R. Pentheus, *alis integris, fulvis, nigro maculatis : posticis apice albis nigro punctatis.* Fab. *Mant. Ins. tom.* 2. *p.* 82. *n°.* 734. (Le mâle.)

Hesperia R. *Pentheus.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 314. *n°.* 186. (Le mâle.)

Papilio Penthea. Cram. *pl.* 143. *fig.* E. (Le mâle.)

Papilio Penthea. Herbst, *tab.* 327. *fig.* 9. (Le mâle.)

Son envergure est d'environ un pouce & demi.

La femelle, que les auteurs n'ont point connue, est entièrement ferrugineuse en dessus, avec une multitude de petites taches noires vers la base des quatre ailes, & une suite d'anneaux d'un blanc-bleuâtre le long du bord postérieur. En dessous, l'on retrouve les mêmes caractères qu'en dessus, mais les taches noires y sont pour la plupart cerclées de blanchâtre, & tout le bord interne des secondes ailes est de cette dernière couleur.

Le mâle diffère de la femelle en ce qu'il a la moitié postérieure des secondes ailes blanche de part & d'autre, avec quelques points noirs marginaux. Son abdomen est d'ailleurs blanchâtre, tandis que celui de la femelle est ferrugineux.

De la Guyane & du Brésil.

79. Erycine Ariste.

Erycina Aristus.

Eryc. alis integris, fuscis, utrinquè cærulescenti annulatis: posticis (mas) *dimidio apicali albo.*

Papilio Ariſtus. Stoll, *Pap. Suppl. à* Cram. *pl.* 39. *fig.* 4 & 4 C. (La femelle.)

Son envergure eſt à peu près d'un pouce & demi. Le mâle a les premières ailes & la moitié antérieure des ſecondes brunes, avec des taches noires, cerclées de violet en deſſus, de bleu-pâle en deſſous. La moitié poſtérieure de ſes ſecondes ailes eſt blanche de part & d'autre, avec cinq à ſix points marginaux. Son abdomen eſt blanc.

Dans la femelle, l'abdomen eſt brun, & la moitié poſtérieure des ſecondes ailes n'eſt blanche qu'en deſſous, encore eſt-elle traverſée par une bande brune qui précède les points marginaux.

De la Guyane & du Bréſil.

80. Erycine Philoclès.

Erycina Philocles.

Eryc. alis integris, ſuprà cœruleo-nigris : anticis utrinquè ocello diſci tripupillato, poſticis dimidio apicali albo undis fuſcis.

Papilio P. R. Philocles, *alis integerrimis, ſuprà fuſcis : ſubtùs primoribus ocello, poſticis lineis tranſverſis undatis.* Linn. *Syſt. Nat.* 2. *p.* 791. *n°.* 240. — *Muſ. Lud. Ulr. p.* 321.

Clerck, *Icon. tab.* 45. *fig.* 5. 6.

Papilio D. F. Philocles, *alis integerrimis, ſuſcis : anticis ocello tripupillato, poſticis lineis tranſverſis undatis.* Fab. *Spec. Inſ. tom.* 2. *p.* 64. *n°.* 285. — *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 31. *n°.* 329.

Papilio S. *Philocles.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 215. *n°.*674.

Papilio Philocles. Cram. *pl.* 184. *fig.* D. E. F.

Papilio Philocles. Herbst, *Pap. tab.* 232. *fig.* 2. 3. 4.

Elle a environ un pouce & demi d'envergure. Le deſſus des premières ailes eſt d'un noir-bleu, avec un œil central à triple prunelle blanche, & ſéparé du ſommet par une bande tranſverſe d'un bleu-cendré.

Le deſſus des ſecondes ailes a la moitié antérieure d'un noir-bleu & ſans taches; la moitié poſtérieure blanche, avec des ondes & deux lignes marginales noires. Les deux lignes marginales ſont ordinairement plus prononcées dans la femelle que dans le mâle.

Le deſſous des deux ſexes eſt brun, avec des lignes blanchâtres, tranſverſes & ondulées. A l'œil du deſſus des premières ailes correſpond un œil tripupillé & l'on en voit un à prunelle ſimple vers la baſe des ſecondes ailes.

Quelquefois les ailes ſupérieures ont un autre œil plus petit, placé entre le premier & le bord interne.

De la Guyane & du Bréſil.

81. Erycine Créſus.

Erycina Cræſus.

Eryc. alis integris, concoloribus, cyaneis, ſtrigis margineque nigris : anticis ocello diſci tripupillato.

Papilio D. F. Cræſus, *alis integerrimis, cyaneis, ſtrigis atris, numeroſis : anticis ſuprà macula ocellari tripupillatâ.* Fab. *Gen. Inſ. Mant.* 259. — *Spec. Inſ. tom.* 2. *p.* 64. *n°.* 286. — *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 31. *n°.* 331.

Papilio S. *Cræſus.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 216. *n°.* 676.

Papilio Capanea. Cram. *pl.* 236. *fig.* D.

Papilio Capanea. Herbst, *Pap. tab.* 233. *fig.* 3. 4.

Quoique Fabricius ne rapporte ce lépidoptère à aucune figure, il n'y a pas de doute que ce ne ſoit le même que le papillon *Capanea* de Cramer & de Herbſt.

Son envergure eſt d'environ deux pouces. Le deſſus des ailes ſupérieures eſt d'un bleu-chatoyant, avec la baſe, quelques lignes tranſverſes & le bord poſtérieur, noirs. Il y a en outre ſur leur milieu un grand œil noir à triple prunelle blanche ou bleuâtre.

Le deſſus des ſecondes ailes eſt d'un bleu-chatoyant, avec pluſieurs lignes tranſverſes & le bord poſtérieur noirs.

Le deſſous des quatre ailes eſt tantôt comme le deſſus, & tantôt ſans œil central aux ſupérieures.

De Surinam.

Nota. Nous n'avons vu que le mâle.

82. Erycine Ephynès.

Erycina Ephynes.

Eryc. alis integris, ſuprà cœruleis, ſubtùs flavidis, faſciis brunneis : anticis ocello diſci tripupillato.

Papilio S. Ephynes, *alis integerrimis, cœruleis, purpureo faſciatis : anticis utrinquè ocello, inferiori tripupillato.* Fab. *Spec. Inſ. tom.* 2. *p.* 68. *n°.* 308. — *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 34. *n°.* 358. — *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 224. *n°.* 703.

Papilio Ephyne. Cram. *pl.* 39. *fig.* E. F.

Papilio Ephynè. Herbst, *Pap. tab.* 231. *fig.* 2. 3.

Nous ne connoiſſons que le mâle. Il n'a guère plus d'un pouce d'enverguré. Le deſſus de ſes ailes eſt bleu, avec quatre lignes communes d'un brun-pourpre à l'extrémité.

Le deſſous eſt jaunâtre, avec une multitude de lignes couleur de terre d'ombre. Outre cela, le milieu des premières ailes offre de part & d'autre un

grand œil noir ayant trois prunelles blanches, mais plus diſtinctes en deſſous qu'en deſſus.

De Surinam.

83. Erycine Euménus.

Erycina Eumenus.

Eryc. alis integris, dimidiato fuſcis & cœruleis, apice ſtrigis nigricantibus : anticis ocello diſci tripupillato, poſticis baſeos cæco.

Papilio S. Eumenus, *alis integerrimis, dimidiato-fuſcis : anticis utrinquè ocello tripupillato.* Fab. *Spec. Inſ. tom.* 2. *p.* 68. *n°.* 307. — *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 34. *n°.* 357. — *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 224. *n°.* 702. (Le mâle.)

Papilio Eumene. Cram. *pl.* 92. *fig.* F. G.

Papilio Eumene. Herbst, *Pap. tab.* 231. *fig.* 4. 5.

Elle a environ un pouce & demi d'envergure. Le deſſus des premières ailes eſt brun vers la côte, bleu au bord interne, avec un œil noir tripupillé de blanc ſur le milieu, & quatre lignes noirâtres tranſverſales à l'extrémité.

Le deſſus des ſecondes ailes eſt brun à la baſe, avec un œil noir ſans prunelle; enſuite bleu juſqu'au bout, avec des lignes noirâtres faiſant ſuite à celles des premières ailes.

Le deſſous des quatre ailes reſſemble au deſſus, excepté qu'il eſt un peu plus pâle, & que le bleu des ailes ſupérieures s'étend juſqu'au ſommet.

La femelle nous eſt inconnue.

Des Indes occidentales.

84. Erycine Réné.

Erycina Renatus.

Eryc. alis integris, fuſco-nigris, faſciâ communi albâ : anticis utrinquè ocello diſci tripupillato, poſticis ſubtùs baſeos cæco.

Papilio S. Renatus, *alis integerrimis, concoloribus, nigris, faſciâ communi albâ : anticis ocello tripupillato.* Fab. *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 31. *n°.* 330. — *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 216. *n°.* 675.

Papilio Roſina. Cram. *pl.* 326. *fig.* B.

Papilio Roſina. Herbst, *Pap. tab.* 232. *fig.* 6.

Nous n'avons vu que le mâle. Il a au moins un pouce & demi d'envergure. Ses quatre ailes ſont obſcures à la baſe, noires à l'extrémité, & traverſées un peu au-delà du milieu par une bande blanche commune. Entre cette bande & leur origine, les premières ailes ont un œil noir à triple prunelle blanche.

Le deſſous ne diffère du deſſus que parce que les ſecondes ailes ont près de la baſe un petit œil noir ſans prunelle.

De Surinam.

85. Erycine Oſinia.

Erycina Oſinia.

Eryc. alis integris, concoloribus, fuſcis, undiq; baſeos pallidis, tunc faſciâ communi albâ : anticis ocello diſci tripupillato.

Papilio Oſinia. Cram. *pl.* 115. *fig.* F.

Papilio Oſſinia. Herbst, *Pap.* 232. *fig.* 1.

Papilio Thymetus. Cram. *pl.* 184. *fig.* G. (Var. ?)

Papilio Thymetus. Herbst, *Pap. tab.* 232. *fig.* 5. (Var. ?)

Nous ne connoiſſons point la femelle de ce lépidoptère.

Le mâle a environ un pouce & demi d'envergure. Ses ailes ſont d'un brun-obſcur de part & d'autre, avec des ondes pâles à la baſe, & une bande blanche commune ſur le milieu. Outre cela, le diſque des ailes ſupérieures offre un œil noir à triple prunelle blanche & à iris jaunâtre.

De Surinam.

Nota. Le papillon *Thymetus* de Cramer n'en ſeroit-il pas une variété? Il ne s'en diſtingue que parce qu'il a la bande blanche plus large. On le trouve auſſi à Surinam.

86. Erycine Hyphéus.

Erycina Hypheus.

Eryc. alis integris, concoloribus, albis, faſciis tribus margineque fuſcis : anticis ocello diſci tripupillato.

Papilio S. Hypheus, *alis integerrimis, concoloribus, albis, fuſco faſciatis : anticis ocello atro, poſticis cæcis.* Fab. *Spec. Inſ. tom.* 2. *p.* 67. *n°.* 305. — *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 34. *n°.* 355. — *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 223. *n°.* 698.

Papilio Hyphea. Cram. *pl.* 92. *fig.* C.

Papilio Hyphea. Herbst, *Pap. tab.* 231. *fig.* 1.

Elle n'a guère qu'un pouce d'envergure. Toutes ſes ailes ſont blanches de part & d'autre, & elles ont entre le milieu & l'extrémité quatre bandes brunes, dont la dernière tout-à-fait terminale. Le centre des ailes ſupérieures offre en outre un œil noir à triple prunelle bleuâtre & à iris jaunâtre.

La femelle nous eſt inconnue.

Des Indes occidentales.

87. Erycine Tullius.

Erycina Tullius.

Eryc. alis integerrimis, obſcurè-cineris : an-

ticis apice fuscis, utrinquè ocello tripupillato. Fab.

Papilio D. F. *Tullius.* Fab. *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 34. *n°.* 359.

Papilio S. *Tullius.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 224. *n°.* 704.

Elle est petite. Les premières ailes, dont le dessous ressemble au dessus, sont d'un cendré-obscur, avec l'extrémité encore plus obscure & ondée de jaunâtre. Leur milieu offre un grand œil noir à triple prunelle bleuâtre.

Les secondes ailes sont obscures, avec des litures d'un fauve-jaunâtre vers la base, & des lignes brunes transversales vers le bord postérieur.

De Cayenne.

(*Traduction de Fabricius.*)

88. Erycine Odicé.

Erycina Odice.

Eryc. alis integris, cinerascentibus, strigis undatis apiceque fuscis : anticis utrinquè ocello disci tripupillato.

Elle a environ un pouce & demi d'envergure. Ses quatre ailes sont cendrées en dessus, avec une multitude de lignes brunes, transverses & ondulées. Les premières ailes, dont le sommet est largement obscur, ont sur le milieu un grand œil noir à triple prunelle blanche.

Le dessous ressemble au dessus, mais le fond est plus clair, & il y a un gros point noir vers le milieu du bord postérieur de chaque aile.

Du Brésil.

Nota. La femelle a le milieu du bord postérieur des secondes ailes un peu anguleux. Le mâle nous est inconnu.

89. Erycine Rhodia.

Erycina Rhodia.

Eryc. alis integris, supra nigricantibus apice dilutiore, subtùs cinerascentibus strigis tribus fuscis : anticis ocello disci tripupillato.

Son envergure est d'environ un pouce & demi. Le dessus des ailes est noirâtre, avec presque la moitié postérieure des premières & le bord terminal des secondes plus clairs.

Le dessous est d'un brun-cendré, avec trois lignes obscures, dont les deux antérieures ondulées, la postérieure courbe & plus large. Outre cela, le bord postérieur des quatre ailes est longé par une série de points noirâtres, & le milieu des premières offre un œil noir à triple prunelle blanche. Cet œil se voit aussi en dessus, mais il y est moins distinct, attendu l'intensité du fond.

Du Brésil.

Nota. Le milieu du bord postérieur des secondes ailes est un peu anguleux.

90. Erycine Tisis (1).

Erycina Tisis.

Eryc. alis integris, supra chalybdineis : subtùs fuscis, strigis tribus umbrinis ; anticis ocello disci tripupillato.

Papilio Titea. Stoll, *Suppl. à* Cram. *pl.* 5. *fig.* 6 & 6 G.

Nous n'avons vu que le mâle. Il a environ un pouce & demi d'envergure. Le dessus de ses ailes est entièrement d'un bleu d'acier-foncé.

Leur dessous est d'un brun-obscur, avec trois lignes communes, couleur de terre d'ombre. Ces lignes sont précédées aux premières ailes d'un œil central, noir & tripupillé de blanc.

De Surinam.

91. Erycine Ulric.

Erycina Ulricus.

Eryc. alis integris, supra cæruleis, nitidis : subtùs umbrinis, disco anticarum ocello tripupillato.

Papilio P. R. Ulricus, *alis integris, cæruleo nitidis : subtùs basi brunneis ; anticis ocello tripupillato.* Fab. *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 82. *n°.* 735. (Le mâle.)

Hesperia R. *Ulricus.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 314. *n°.* 187. (Le mâle.)

Papilio Ulrica. Cram. *pl.* 100. *fig.* E. F. (Le mâle.)

Papilio Ulricella. Herbst, *Pap. tab.* 231. *fig.* 6. 7.

Nous ne connoissons que le mâle, dont l'envergure est approchant d'un pouce & demi. Le dessus de ses ailes est d'un bleu-chatoyant, sans taches.

Le dessous est couleur de terre d'ombre, avec l'extrémité plus pâle & traversée par une bande du même ton que le reste de la surface. Il y a en outre, au centre des ailes supérieures, un œil noir à triple prunelle blanche.

De Surinam.

92. Erycine Lysidice.

Erycina Lysidice.

Eryc. alis integris, cæruleis, supra limbo, subtùs fuscis quinque atris : posticarum fasciâ tertiâ punctis tribus argenteis.

Papilio N. Lysidice, *alis integerrimis, cæruleis,*

(1) Nous n'avons point adopté le nom de Stoll, parce qu'il y a une piéride appelée *Tisea.*

ſuprà limbo, ſubtùs fuſciis atris. Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 156 *n°.* 480. (Le mâle.)

Papilio Lyſidice. Cram. *pl.* 169. *fig.* C. D.

Papilio Lyſidice. Herbst, *Pap. tab.* 324. *fig.* 4. 5.

Nous ne connoiſſons que le mâle de cette eſpèce. Il a près de deux pouces d'envergure. Le deſſus de ſes ailes eſt d'un bleu-azuré, avec les nervures des ſupérieures & le bord terminal des quatre noirs.

Le deſſous eſt à peu près du même bleu que le deſſus, avec cinq bandes communes & le bord poſtérieur noirs. La troiſième bande, à compter de la baſe, offre quatre points d'un blanc-argenté, ſavoir : un aux premières ailes, & trois aux ſecondes.

De Surinam.

93. Erycine Archimède.

Erycina Archimedes.

Eryc. alis integerrimis, nigris, diſco cæruleo : ſubtùs fuſcis, immaculatis. Fab.

Heſperia R. *Archimedes.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 320. *n°.* 210.

Papilio Archimedes. Jon. *Fig. pict.* 6. *tab.* 36. *fig.* 4.

Elle a le port du *Ptolomée*. Le deſſus de ſes quatre ailes eſt noir, avec le milieu bleu. Leur deſſous eſt d'un brun-obſcur & ſans taches.

Des Indes.

(*Traduction de Fabricius.*)

94. Erycine Virgile.

Erycina Virgilius.

Eryc. alis integerrimis, nigris, margine tenuiori cæruleo : ſubtùs griſeis, poſticis lunulis tribus albidis puncto atro. Fab.

Heſperia R. *Virgilius.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 323. *n°.* 226.

Papilio Virgilius. Jon. *Fig. pict.* 6. *tab.* 37. *fig.* 3.

Elle eſt de moyenne taille. Le deſſus de ſes quatre ailes eſt d'un noir-brun, avec le bord interne bleu, & marqué d'une tache noire aux premières, de pluſieurs points de cette couleur aux ſecondes.

Le deſſous des ailes ſupérieures eſt gris, ſans taches. Le deſſous des ailes inférieures eſt également gris, avec trois points noirs, embraſſés par une lunule blanche & ſitués vers le bord poſtérieur.

Des Indes occidentales.

(*Traduction de Fabricius.*)

95. Erycine Hiria.

Erycina Hiria.

Eryc. alis integris, ſuprà cæruleo-nigris, ſubtùs cinereſcentibus fuſcoque punctatis : omnibus utrinquè maculis tribus hyalino-albis.

Elle n'a guère qu'un pouce d'envergure. Ses ailes ont le deſſus d'un noir-bleu-luiſant, le deſſous cendré & ponctué de noir, avec la frange entrecoupée de blanc. Il y a en outre vers le milieu de chaque aile trois taches blanches, inégales & tranſparentes. Les taches des ailes ſupérieures ſont éparſes, celles des ailes inférieures ſont contiguës. Les antennes ſont noires, & annelées de blanc depuis la baſe juſqu'à la maſſue.

Nous n'avons pas vu la femelle.

Du Bréſil.

96. Erycine Miſène.

Erycina Miſenes.

Eryc. alis integris, ſuprà fuſcis, anticarum puncto coſtali albo : ſubtùs cæruleſcentibus, fuſco maculatis.

Papilio Miſenes. Cram. *pl.* 117. *fig.* D.

Papilio Miſenes. Herbst, *Pap. tab.* 320. *fig.* 3.

Elle eſt petite. Le deſſus des ailes eſt d'un brun-obſcur, avec un point blanc près de la côte des ſupérieures. Le deſſous eſt d'un bleu-pâle, avec des taches brunes.

De la Guyane.

97. Erycine Abaris.

Erycina Abaris.

Eryc. alis integris, ſubconcoloribus, fuſcis nigro punctatis, limbo poſtico rufo : anticis maculis tribus flavis.

Papilio Abaris. Cram. *pl.* 93. *fig.* C.

Papilio Abaris. Herbst, *Pap. tab.* 320. *fig.* 5.

Elle n'a guère qu'un pouce d'envergure. Le deſſus de ſes ailes eſt brun & ponctué de noir, avec le limbe poſtérieur roux. Outre cela, les premières ailes ont trois petites taches jaunes, & les points poſtérieurs des ſecondes ſont cerclés de jaunâtre.

Le deſſous reſſemble au deſſus, mais il eſt plus clair.

De la Guyane.

98. Erycine Améſis.

Erycina Ameſis.

Eryc. alis integris, ſubconcoloribus, fuſcis : anticis apice fulvo radiatis, poſticis ſubocellatis.

Papilio Ameſis. Cram. *pl.* 104. *fig.* F.

Papilio Ameſis. Herbst, *Pap. tab.* 327. *fig.* 6.

Elle

Elle a un peu plus d'un pouce d'envergure. Le deſſus de ſes ailes eſt d'un brun-noirâtre, avec des rayons fauves à l'extrémité des premières, & des anneaux de cette couleur à l'extrémité des ſecondes. Outre cela, la baſe des quatre ailes a quelques taches fauves tranſverſales.

Le deſſous diffère peu du deſſus.

Nous n'avons vu que la femelle.

De la Guyane.

99. Erycine Epulus.

Erycina Epulus.

Eryc. alis integris, fuſcis, maculis numeroſis ſuprà fulvis, ſubtùs albis.

Papilio P. R. Epulus, *alis integerrimis, fuſcis, fulvo maculatis : ſubtùs variegatis.* Fab. *Mant. Inſ. tom. 2. p. 71. n°. 680.*

Heſperia R. *Epulus.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom. 3. pars 1. p. 292. n°. 117.*

Papilio Epulus. Cram. *pl. 50. fig. C. D.*

Papilio Epulus. Herbst, *Pap. tab. 317. fig. 3. 4.*

Elle a à peine un pouce d'envergure. Le deſſus des ailes eſt d'un brun-noirâtre, avec beaucoup de taches fauves, dont les poſtérieures ocellées, & celles du diſque ayant le milieu blanchâtre, ſurtout aux ailes ſupérieures.

Le deſſous offre à peu près le même deſſin que le deſſus, mais preſque toutes les taches ſont blanches, & les ailes de devant ont la baſe rouſſâtre. La frange du bord poſtérieur eſt entrecoupée de blanchâtre.

De la Guyane & du Bréſil.

Nota. La figure de Cramer eſt groſſière & ſenſiblement trop grande.

100. Erycine Timandra.

Erycina Timandra.

Eryc. alis integris, ſuprà luteis, nigro maculatis, anticarum apice fuſco albo punctato : ſubtùs omnibus fuſcis, maculis nigris albo cinctis.

Elle n'a guère qu'un pouce d'envergure. Le deſſus des ailes eſt d'un jaune-fauve, avec une multitude de taches noires. Indépendamment de cela, le ſommet des ailes ſupérieures eſt brun, avec pluſieurs points blancs épars.

Le deſſous des quatre ailes eſt d'un brun-noirâtre, avec des points noirs cerclés de blanc. Le corps eſt jaune en deſſus, d'un brun-griſâtre en deſſous. Les antennes ſont noires & annelées de blanc.

Nous n'avons vu que la femelle.

Du Bréſil.

101. Erycine Zachéa (1).

Erycina Zachea.

Eryc. alis integerrimis, fulvis, nigro maculatis : poſticis ſubtùs fuſco alboque variis. Fab.

Heſperia R. *Zacheus.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom. 3. Suppl. p. 431. n°. 231-2.*

Elle eſt petite. Ses quatre ailes ont le deſſus fauve, avec des taches noires.

Le deſſous des ailes ſupérieures offre à la baſe une tache fauve, ſur le milieu une bande flexueuſe, & à l'extrémité des lunules, blanches. Le deſſous des ailes inférieures eſt varié de blanc & de brun.

De Cayenne.

(*Traduction de Fabricius.*)

Nota. Ne ſeroit-ce pas le mâle de l'Erycine *Timandra?*

102. Erycine Polyménus.

Erycina Polymenus.

Eryc. alis integerrimis, ferrugineo-fuſcis, nigro punctatis : ſubtùs flaveſcentibus, fuſco undatis. Fab.

Papilio. F. *Polymenus.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom. 3. pars 1. p. 54. n°. 166.*

Papilio Polymenus. Jon. *Fig. pict. 5. tab. 13. fig. 2.*

Elle eſt petite. Le corps eſt obſcur. Le deſſus de toutes les ailes eſt d'un brun-ferrugineux, avec des points & des ondes noirs. Leur deſſous eſt jaunâtre & ondé de fauve.

De Surinam.

(*Traduction de Fabricius.*)

103. Erycine Acanthus.

Erycina Acanthus.

Eryc. alis integris, ſuprà fuſcis, immaculatis : ſubtùs ferrugineis, faſcius cæruleis limboque omni luteo.

Papilio P. R. Acanthus, *alis integerrimis, fuſcis, immaculatis : ſubtùs brunneis, cæruleo faſciatis, limbo flavo.* Fab. *Mant. Inſ. tom. 2. p. 77. n°. 702.*

Heſperia R. *Acanthus.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom. 3. pars 1. p. 302. n°. 143.*

Papilio Acanthus. Cram. *pl. 380. fig. K. L.*

Papilio Acanthus. Herbst, *Pap. tab. 318. fig. 1. 2.*

Elle eſt petite. Le deſſus de ſes ailes eſt d'un brun-noirâtre, ſans taches. Leur deſſous eſt ferrugineux, avec quatre bandes bleues, communes, dont les deux intermédiaires plus courtes, l'anté-

(1) Nous avons changé la terminaiſon du nom impoſé par Fabricius, parce qu'il y a un Satyre qui s'appelle *Zacheus.*

rieure bifide & ſe réuniſſant à la poſtérieure en face du ſommet. Outre cela, le pourtour extérieur des quatre ailes eſt d'un jaune-fauve. Les antennes ſont brunes & annelées de blanc depuis leur baſe juſqu'à la maſſue. Le corps eſt de part & d'autre du même ton que les ailes.

De Surinam.

104. Erycine Gyas.

Erycina Gyas.

Eryc. alis integris, ſuprà fuſcis, immaculatis : ſubtùs rufis, ſtrigis aurato-viridibus, interruptis.

Papilio P. R. Gyas, *alis integerrimis, fuſcis : ſubtùs fulvis, ſtrigis punctatis aureis.* Fab. *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 83. *n°.* 758.

Heſperia R. *Gyas.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 324. *n°.* 230.

Papilio Gyas. Cram. *pl.* 28. *fig.* F. G.

Papilio Gyas. Herbst, *Pap. tab.* 321. *fig.* 8. 9.

Elle eſt très-petite, d'un brun-noirâtre & ſans taches en deſſus; d'un fauve-foncé en deſſous, avec pluſieurs lignes tranſverſes d'un vert-doré.

De Surinam.

105. Erycine Ampyx.

Erycina Ampyx.

Eryc. alis ſubintegris, ſuprà fuſcis, anticarum maculis duabus flavis : ſubtùs omnibus flavis, maculis ferrugineis auro pupillatis.

Papilio Ampyx. Drury, *Inſ. tom.* 3. *pl.* 9. *fig.* 2. 3.

Elle a un pouce & demi d'envergure. Le deſſus de ſes ailes eſt d'un brun-obſcur, avec deux taches ovales ſur le milieu des ſupérieures, & le bord antérieur des inférieurs, d'un jaune-paille.

Le deſſous des quatre ailes eſt d'un jaune-paille, avec des taches ferrugineuſes, dont le milieu eſt brillant & comme doré. L'empreinte de ces taches eſt un peu ſenſible en deſſus.

Du Bréſil.

106. Erycine Pyramis.

Erycina Pyramis.

Eryc. alis integerrimis, fuſcis, cœruleo micantibus, maculâ fulvâ : poſticis ſubtùs griſeis. Fab.

Papilio P. R. *Pyramis.* Fab. *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 83. *n°.* 755.

Heſperia R. *Pyramis.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 323. *n°.* 223.

Ses quatre ailes ont le deſſus brun & glacé de violet, avec une grande tache fauve ſur le milieu de chacune.

Le deſſous des ailes ſupérieures reſſemble au deſſus. Le deſſous des inférieures eſt gris, ou varié de brun & de cendré.

De Cayenne.

(*Traduction de Fabricius.*)

107. Erycine Lucanus.

Erycina Lucanus.

Eryc. alis integerrimis, nigris, diſco flavo : poſticis ſubtùs rubris, maculis quadratis fuſcis. Fab.

Heſperia R. *Lucanus.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 322. *n°.* 221.

Papilio Lucanus. Jon. *Fig. pict.* 6. *tab.* 36. *fig.* 3.

Elle eſt petite. Le deſſous des premières ailes eſt jaune, avec une tache ſur le milieu des ſupérieures, & le diſque des quatre, noirs.

Le deſſous des premières ailes eſt jaunâtre, avec des taches carrées ſur le milieu, & le bord poſtérieur, bruns. Le deſſous des ſecondes ailes eſt rouge, avec des taches brunes, carrées, éparſes.

Des Indes.

(*Traduction de Fabricius.*)

108. Erycine ? Alphonſe.

Erycina Alphonſus.

Eryc. alis integerrimis, atris : anticis maculis duabus, poſticis unicâ, baſeos flavis. Fab.

Heſperia R. *Alphonſus.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 308. *n°.* 171.

Papilio Alphonſus. Jon. *Fig. pict.* 6. *tab.* 35. *fig.* 3.

Toutes ſes ailes ſont d'un noir-foncé. Les premières ont en deſſus une ligne baſilaire & deux taches, en deſſous une grande tache baſilaire & une poſtérieure, jaunes. Les ſecondes ailes offrent à leur baſe une tache jaune, qui eſt dentée en deſſus, plus grande en deſſous.

De Surinam.

(*Traduction de Fabricius.*)

109. Erycine ? Procas.

Erycina Procas.

Eryc. alis integerrimis, concoloribus, atris, diſco maculâque anticarum flavis. Fab.

Heſperia R. *Procas.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 308. *n°.* 170.

Papilio Procas. Jon. *Fig. pict.* 6. *tab.* 35. *fig.* 1.

Ses ailes, dont le deſſous reſſemble au deſſus, ſont noires, avec le diſque jaune. Il y a en outre

une tache dentée de cette couleur au sommet des premières.

De Surinam.

(*Traduction de Fabricius.*)

110. Erycine Numitor.

Erycina Numitor.

Eryc. alis integerimis, fuscis : posticis supra disco flavo, subtùs totis flavis, immaculatis. Fab.

Hesperia R. *Numitor.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 324. *n°.* 228.

Papilio Numitor. Jon. *Fig. pict.* 6. *tab.* 40. *fig.* 2.

Elle est petite. Le dessus de ses ailes est d'un brun-obscur, sans aucune tache aux supérieures, avec un espace jaune au milieu des inférieures.

Le dessous des premières ailes est brun, avec le limbe jaune. Le dessous des secondes ailes est entièrement jaune & sans taches.

Des Indes occidentales.

(*Traduction de Fabricius.*)

111. Erycine Ædon.

Erycina Ædon.

Eryc. alis integerrimis, fuscis, fasciis plurimis maculatibus fulvis. Fab.

Papilio P. R. *Ægon.* Fab. *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 83. *n°.* 759.

Hesperia R. *Ægon.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 324. *n°.* 231.

Elle est très-petite, & elle a le dessus des quatre ailes d'un brun-obscur, avec plusieurs bandes fauves, maculaires & inégales. Le dessous de ses ailes inférieures tire sur le cendré.

De la Jamaïque.

(*Traduction de Fabricius.*)

112. Erycine Télèphe.

Erycina Telephus.

Eryc. alis integris, supra nigris, area miniaceâ : subtùs cærulescenti-albis, nigro punctatis.

Papilio P. R. Telephus, *alis integerrimis, nigris : anticis albo punctatis; posticis supra basi rufis, subtùs cæruleis nigro variis.* Fab. *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 78. *n°.* 710.

Hesperia R. *Telephus.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 304. *n°.* 153.

Papilio Telephus. Cram. *pl.* 66. *fig.* E. F.

Papilio Telephus. Herbst, *Pap. tab.* 318. *fig.* 7. 8.

Elle a un peu plus d'un pouce d'envergure. Le dessus de ses ailes supérieures est noir, avec un espace longitudinal d'un rouge-fauve au milieu du bord interne, & quelques petits points blancs au sommet.

Le dessus des ailes inférieures est d'un rouge-fauve, avec deux ou trois points & tout le pourtour noirs.

Le dessous des quatre ailes est d'un blanc-bleuâtre, avec une multitude de points & les bords obscurs. Le corps est fauve en dessus, blanc en dessous.

Nous n'avons pas vu la femelle.

De l'Amérique méridionale.

113. Erycine Lucien.

Erycina Lucianus.

Eryc. alis integris, nigro punctatis, supra rufis, subtùs cinerascenti-albis.

Hesperia R. Lucianus, *alis integerrimis, nigro punctatis, supra fulvis, subtùs cinereis.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 313. *n°.* 185.

Papilio Crispus. Cram. *pl.* 118. *fig.* D. E. (La femelle.) *fig.* F. (Le mâle.)

Papilio Crispus. Herbst, *Pap. tab.* 322. *fig.* 1. 2. 3.

L'Hesperie *Lucianus* de Fabricius nous paroît bien se rapporter au mâle du papillon *Crispus* de Cramer.

Elle a approchant un pouce d'envergure. Le dessus des ailes est d'un roux-chatoyant, avec une multitude de petites taches noires, dont les postérieures en forme de points, les autres lunulées. Ces taches se retrouvent en dessous, où le fond des ailes supérieures est cendré, & le fond des inférieures d'un blanc-bleuâtre. Le corps est fauve en dessus, blanchâtre en dessous. Les antennes sont annelées de blanc & de noir, & elles ont la massue brune.

La femelle a le sommet des ailes supérieures plus obscur & marqué de quelques points blancs en dessus.

De la Guyane & des Antilles.

114. Erycine Pharéus.

Erycina Phareus.

Eryc. alis integris, chermesinis, limbo omni nigro : anticarum anteriori supra dentes exserente, subtùs latissimo.

Papilio P. R. Phareus, *alis integerrimis, subconcoloribus, rubris, limbo nigro.* Fab. *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 79. *n°.* 722. (Le mâle.)

Hesperia R. *Phareus.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 308. *n°.* 161.

Papilio Phareus. Cram. *pl.* 170. *fig.* C. (Le mâle.)

Papilio Bomilcar. Stoll, *Pap. Suppl. à* Cram. *pl.* 39. *fig.* 3. (La femelle.)

Elle n'a guere plus d'un pouce d'envergure. Ses ailes ſont d'un rouge-carmin-luiſant, avec le limbe terminal des quatre, & la côte des ſupérieures, noirs. Le noir de la côte des ailes ſupérieures jette en deſſus trois dents inégales, & il s'étend en deſſous juſqu'au-delà du milieu de la ſurface. Les ailes inférieures ont ſouvent à leur centre une petite lunule noire. Le corps eſt rouge en deſſus, jaunâtre en deſſous. Les antennes ſont brunes & annelées de blanc.

La femelle ne diffère du mâle que parce que le noir domine davantage ſur le deſſus de ſes premières ailes. Stoll l'a repréſentée ſous le nom de *Bomilcar*. Quant au mâle, il eſt bien *tétrapode*, & non *hexapode*, comme le dit Cramer.

De la Guyane & du Bréſil.

115. Erycine Tacite.

Erycina Tacitus.

Eryc. alis integris, concoloribus, cherneſinis, limbo omni nigro : anticarum anteriori lato flavoque maculato.

Heſperia R. Tacitus, *alis integerrimis, fulvis : anticis margine exteriori atro, flavo maculato.* Fab. *Ent. Syſt. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 308. *n°.* 168.

Papilio Tacitus. Jon. *Fig. pict.* 6. *tab.* 46. *fig.* 3.

Papilio Menetes. Drury, *Inſ. tom.* 3. *pl.* 8. *fig.* 3.

Papilio Menetes. Stoll, *Pap. Suppl. à* Cram. *pl.* 3. *fig.* 4.

Nous rapportons ici le papillon *Menetes* de Drury & de Stoll, parce qu'il nous paroit offrir abſolument les mêmes caractères que le *Tacitus* de Fabricius.

Son envergure n'eſt guère que d'un pouce. Ses ailes ſupérieures ont la moitié qui avoiſine le bord interne d'un rouge-carmin, l'autre moitié noire & tachetée de jaune. Ses ailes inférieures ſont d'un rouge-carmin, avec le limbe terminal noir.

Le deſſous eſt à très-peu de choſe près comme le deſſus.

De la Guyane & du Bréſil.

116. Erycine Epalia.

Erycina Epalia.

Eryc. alis integris, concoloribus, miniaceis, limbo omni nigro.

Papilio Epaphus. Cram. *pl.* 335. *fig.* D. E.

Papilio Epaphus. Herbst, *Pap. tab.* 319. *fig.* 6. 7.

Elle n'a qu'un pouce d'envergure. Ses ailes ſont d'un fauve-ponceau de part & d'autre, avec la côte des ſupérieures, & le limbe terminal des quatre, légèrement noirs.

Cramer a figuré une variété femelle, dans laquelle le deſſous des premières ailes a plus de noir au ſommet, avec deux taches rougeâtres.

De la Guyane & du Bréſil.

117. Erycine Cingulus.

Erycina Cingulus.

Eryc. alis integerrimis, concoloribus, nigris, faſciâ rubrâ, communi, mediâ.

Papilio Cingulus. Stoll, *Pap. Suppl. à* Cram. *pl.* 13. *fig.* 4.

Elle n'a guère qu'un pouce d'envergure. Ses ailes ſont d'un noir-brun de part & d'autre, avec une bande rouge, diſcoïdale, courbe, plus large aux ſupérieures qu'aux inférieures.

De Surinam.

118. Erycine Talus.

Erycina Talus.

Eryc. alis integerrimis, cinereis, utrinquè nigro faſciatis : ſupra faſciâ ſanguineâ, communi, abbreviatâ.

Papilio P. R. Talus, *alis integerrimis, fuſco cæruleoque faſciatis : ſubtus* (ſupra) *faſciâ ſanguineâ abbreviatâ.* Fab. *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 83. *n°.* 745.

Heſperia R. *Talus.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars.* 1. *p.* 318. *n°.* 202.

Papilio Pygmæa. Cram. *pl.* 7. *fig.* C. D.

Papilio Talus. Herbst, *tab.* 320. *fig.* 10. 11.

Elle n'a guère qu'un pouce d'envergure. Ses ailes ſont cendrées & faſciées de noir de part & d'autre. Leur deſſus offre en outre une bande vermillon, commune, diſcoïdale, n'atteignant ni la côte des ſupérieures, ni l'angle anal des inférieures.

De Surinam.

Nota. Fabricius ſe trompe en diſant que la bande rouge eſt en deſſous.

119. Erycine Nicon.

Erycina Nicon.

Eryc. alis integerrimis, concoloribus, nigris, faſcius duabus abbreviatis punctiſque marginalibus flavis.

Papilio Nicias. Stoll, *Pap. Suppl. à* Cram. *pl.* 13. *fig.* 3.

Elle a approchant un pouce d'envergure. Ses ailes ſont noires de part & d'autre, avec deux bandes tranſverſes, & une rangée de petits points

marginaux, jaunes. Les deux bandes ſont courtes, & l'antérieure eſt plus large que la poſtérieure.

De Surinam.

120. Erycine Régulus.

Erycina Regulus.

Eryc. alis integerrimis, concoloribus, nigris, fuſciis duabus albis aut flaveſcentibus: poſticâ anticarum interruptâ.

Heſperia R. Regulus, *alis integerrimis, nigris, fuſciis duabus flavis: poſticâ anticarum interruptâ.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *pag.* 318. *n°.* 205.

Papilio Regulus. Jon. *Fig. pict.* 6. *tab.* 86. *fig.* 4.

Elle a environ un pouce & demi d'envergure. Toutes ſes ailes ſont noires, avec deux bandes communes, & la frange, blanches ou d'un jaune-pâle. La bande poſtérieure eſt moins large que l'autre, & outre cela fortement interrompue aux premières ailes.

Le deſſous ne diffère du deſſus que parce que les premières ailes ont l'origine de la côte blanche. Le corps eſt noir en deſſus, blanchâtre en deſſous. Les antennes ſont noires & annelées de blanc.

Du Bréſil.

121. Erycine Thucydide.

Erycina Thucydides.

Eryc. alis integerrimis, nigris, maculâ diſci fulvâ: ſubtùs cinereis, rufo undatis. Fab.

Heſperia R. *Thucydides.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 323. *n°.* 225.

Papilio Thucydides. Jon. *Fig. pict.* 6. *tab.* 6. *fig.* 4.

Elle eſt de moyenne taille. Le deſſus de ſes quatre ailes eſt noir, avec une grande tache jaune ſur le milieu. Leur deſſous eſt cendré, avec des ondes rouſſe.

Des Indes occidentales.

(*Traduction de Fabricius.*)

122. Erycine Arius.

Erycina Arius.

Eryc. alis integris, concoloribus, fuſcis, nigro maculatis: anticis ſtrigâ albâ, mediâ, abbreviatâ.

Papilio Arius. Cram. *pl.* 31. *fig.* E.

Papilio Arius. Herbst, *Pap. tab.* 322. *fig.* 4.

Elle eſt petite. Ses ailes ſont d'un brun-cendré de part & d'autre, avec une multitude de taches noires, & la frange entrecoupée de blanc. Outre cela, les premières ailes ont ſur le milieu une ligne blanche, tranſverſale & n'atteignant pas les bords.

De Surinam.

123. Erycine Sagaris.

Erycina Sagaris.

Eryc. alis integris, nigris, ſuprà fuſciâ fulvâ abbreviatâ: anticis ſubtùs margine tenuiori albido.

Papilio P. R. Sagaris, *alis integerrimis, atris, maculâ communi tranſverſali fulvâ.* Fab. *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 83. *n°.* 750.

Heſperia R. *Sagaris.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 321. *n°.* 215.

Papilio Sagaris. Cram. *pl.* 83. *fig.* D.

Papilio Sagaris. Herbst, *Pap. tab.* 321. *fig.* 2.

Séba, *Muſ.* 4. *tab.* 42. *fig.* 23. 24.

Nous ne connoiſſons que le mâle. Il n'a guère plus d'un pouce d'envergure. Le deſſus de ſes ailes eſt d'un noir-foncé, avec une bande orangée, ne montant pas au-delà du diſque des ſupérieures, mais traverſant le milieu de l'abdomen.

Le deſſous eſt moins noir que le deſſus, ſans taches, mais avec le bord interne des ailes ſupérieures blanchâtre.

De la Guyane & du Bréſil.

E. Ailes un peu oblongues, ou alongées dans le ſens du diamètre du corps.

124. Erycine ? Hélius.

Erycina Helius.

Eryc. alis integerrimis, fuſcis: poſticis margine anteriori fulvo.

Papilio P. U. Helius, *alis ſubdivaricatis, fuſcis: poſticis margine interiori* (*anteriori*) *fulvis.* Fab. *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 85. *n°.* 771.

Heſperia U. *Helius.* Fab. *Ent. Syſt. em tom.* 3. *pars* 1. *p.* 329. *n°.* 248.

Papilio Helias. Cram. *pl.* 198. *fig.* B.

Fabricius met ce lépidoptère dans la diviſion de ſes *Heſpéries urbicoles;* mais comme Cramer dit que c'eſt un *Tétrapode*, & comme il y a d'ailleurs des érycines qui ont le même port, nous la plaçons conditionnellement parmi ces dernières.

Son envergure eſt d'environ un pouce & demi. Ses ailes ſont d'un brun-noirâtre de part & d'autre, avec le bord antérieur des ſecondes largement fauve.

La femelle n'eſt point figurée, du moins à notre connoiſſance.

Des Indes occidentales.

125. Erycine Probétor.

Erycina Probetor.

Eryc. alis integris, suprà fuscis : anticis apice cinereo venosis, posticis margine anteriori sanguineis.

Papilio Probetor. Cram. *pl.* 390. *fig.* I.

Son envergure n'eſt guère que d'un pouce. Ses ailes ont le deſſus d'un brun-noirâtre, avec l'extrémité des ſupérieures veinée de cendré, & le bord antérieur des ſecondes d'un rouge-ſanguin.

Le deſſous eſt entièrement d'un brun-rougeâtre.

De Surinam.

126. Erycine Agyrtus.

Erycina Agyrtus.

Eryc. alis integerrimis, fusco-nigris : anticis utrinquè fasciâ abbreviatâ rufâ : omnibus subtùs fasciâ communi flavâ.

Papilio Agyrtus. Cram. *pl.* 183. *fig.* B. C.

Papilio Agyrtus. Herbst, *Pap. tab.* 321. *fig.* 6. 7.

Elle a près d'un pouce & demi d'envergure. Ses ailes ſont d'un noir-brun, avec une bande fauve, courte & tranſverſale, ſur le milieu des ſupérieures. Cette bande ſe reproduit en deſſous, & l'on y voit en outre une bande jaune, preſque baſilaire, & commune aux quatre ailes.

De Surinam.

127. Erycine Perditus.

Erycina Perditus.

Eryc. alis integerrimis, atris, cœruleo micantibus : singulis utrinquè fasciâ calthaceâ, transversâli, mediâ.

Hesperia R. Perditus, *alis integerrimis, atris, concoloribus, fasciâ fulvâ.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 323. *n°.* 222.

Papilio Jarbas. Drury, *Inſ. tom.* 3. *pl.* 8. *fig.* 2.

Elle a un peu plus d'un pouce & demi d'envergure. Ses ailes ſont d'un noir-foncé, avec un reflet bleu, & une bande ſouci. La bande des ſupérieures ſe dirige obliquement du milieu de la côte vers l'angle interne. La bande des inférieures va du ſommet au milieu du bord abdominal.

Le deſſous reſſemble au deſſus, mais le reflet bleu y eſt plus ſenſible.

Nous n'avons pas vu la femelle.

De la Guyane & du Bréſil.

128. Erycine Phéréclus.

Erycina Phereclus.

Eryc. alis integerrimis, cœruleo-atris : anticis utrinquè fasciâ fulvâ, margines attengente : posticis subtùs limbo immaculato.

Papilio P. R. Phereclus, *alis integerrimis, utrinquè atris : primoribus fasciâ lineari rubrâ.* Linn. *Syst. Nat.* 2. *p.* 792. *n°.* 248. — *Mus. Lud. Ulr.* 326.

Papilio P. R. Phereclus, *alis integerrimis, concoloribus, atris : anticis fasciâ lineari rubrâ.* Fab. *Syst. Ent. p.* 529. *n°.* 364. — *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 83. *n°.* 752.

Hesperia R. *Phereclus.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 321. *n°.* 217.

Clerck, *Icon. tab.* 45. *fig.* 4.

Papilio Phereclus. Cram. *pl.* 178. *fig.* D.

Papilio Phereclus. Herbst, *Pap. tab.* 321. *fig.* 5.

Elle a environ un pouce & demi d'envergure. Le deſſus des deux ſexes eſt d'un noir-bleu-chatoyant, avec une bande fauve aux ailes ſupérieures. Cette bande deſcend obliquement du milieu de la côte à l'angle anal, où elle ſe termine par un petit crochet qui regarde le corps.

Le deſſous reſſemble au deſſus; mais, dans le mâle, les quatre ailes ont des veines cendrées, & les ailes ſupérieures ont l'origine de la côte fauve & le bord du ſommet blanc. Il eſt même des individus mâles qui offrent un point fauve à l'angle anal des ſecondes ailes.

Nous avons vu une femelle qui avoit à peine un pouce d'envergure.

De la Guyane & du Bréſil.

129. Erycine Phéréphatte.

Erycina Pherephatte.

Eryc. alis integerrimis, cœruleo-atris : anticis utrinquè fasciâ fulvâ, abbreviatâ : posticis subtùs (fem.) *serie marginali punctorum albornm.*

Ce n'eſt peut-être qu'une variété du *Phéréclus.* Cependant elle a toujours la bande fauve des premières ailes plus courte; & dans la femelle, le deſſous des ſecondes ailes offre une rangée terminale de taches blanches.

Du Bréſil.

130. Erycine Electron.

Erycina Electron.

Eryc. alis integris, concoloribus, atris, puncto baseos sanguineo : anticis fasciâ abbreviatâ fulvâ aut albâ.

Hesperia R. Electron, *alis integerrimis, concoloribus, atris : fasciâ flavâ punctoque apicis* (baseos) *sanguineo.*

Papilio Melander. Cram. *pl.* 336. *fig.* A. B.

Papilio Melander. Herbst, *Pap. tab.* 323. *fig.* 3. 4.

Elle a un peu plus d'un pouce d'envergure. Les deux sexes sont d'un noir-foncé, avec un point d'un rouge-vermillon à la base de chaque aile. Les ailes supérieures ont une bande, tantôt fauve, tantôt blanche, se dirigeant obliquement du milieu de la côte à l'angle interne, mais n'atteignant pas les bords.

Le dessous ressemble au dessus, seulement les nervures sont d'un ton presque cendré.

Il est des individus, mâles ou femelles, qui ont le bord terminal des secondes ailes coloré comme la bande des ailes supérieures.

De la Guyane & du Brésil.

Nota. Dans la phrase spécifique de Fabricius, on lit : *puncloque apicis*, au lieu de *puncto baseos* qu'indique la description.

131. Erycine Ménéria (1).

Erycina Meneria.

Eryc. alis integris, nigris, fascià communi lineolâque anticarum baseos sanguineis : omnium disco supra albo punctato.

Hesperia R. Mæcenas (Dimas), *alis oblongis, concoloribus, nigris, fascià communi lineolâque anticarum sanguineis.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 306. *n°.* 160. (Var.)

Papilio Meneria. Cram. *pl.* 94. *fig.* D. E. (Le mâle.)

Papilio Micalia. Cram. *pl.* 94. *fig.* F. (Var. mâle.)

Papilio Meneria. Herbst, *Pap. tab.* 323. *fig.* 5. 6.

Papilio Micalia. Herbst, *Pap. tab.* 323. *fig.* 7.

Elle a approchant un pouce & demi d'envergure. Le dessus des ailes est noir, avec une bande postérieure & commune, plus une ligne longitudinale & interrompue à la base des supérieures, d'un rouge-vermillon. Il y a en outre sur le milieu de chaque aile des points blancs plus ou moins prononcés, & manquant même quelquefois comme dans la variété décrite par Fabricius.

Le dessous diffère du dessus, en ce qu'il jette un reflet violet & que l'on n'y voit pas de points blancs.

La femelle nous est inconnue.

De Surinam & de la Guadeloupe.

(1) Nous avons adopté le nom de Cramer, parce que le nom primitif de Fabricius & celui qu'il donne ensuite par correction sont appliqués l'un à une espèce de *Polyommate*, l'autre à un *Papillon* proprement dit.

Toutes les pattes ambulatoires et de forme semblable dans les deux sexes.

GENRE MYRINE.

CARACTÈRES DU GENRE.

Palpes très-longs, leur second article dépassant notablement le chaperon. Antennes terminées insensiblement par une massue alongée.

Le genre Myrina de Fabricius. (Pap. *Alcides*, Fab. Cram. — *Helius*, Fab. ou *Eurisus* Cram.

N. B. L'*Helius* n'est point pour nous une Myrine.

ESPÈCES.

A. Ailes supérieures entières. Ailes inférieures dentées, ayant deux queues linéaires et voisines, dont l'extérieure très-longue, l'inférieure beaucoup plus courte et placée à l'angle de l'anus.

1. Myrine Jafra.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre : dessous blanc avec deux lignes ondulées, transverses et postérieures ; cinq taches noires, saupoudrées de bleu-azuré-luisant, à l'angle anal des ailes inférieures.

B. Ailes supérieures entières. Ailes inférieures dentées, ayant une queue linéaire et assez longue, placée entre deux dents plus grandes que les autres.

2. Myrine Lisias.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre, avec une tache fauve aux supérieures : dessous des inférieures blanc, avec plusieurs taches éparses.

3. Myrine Evagoras.

Dessus des ailes d'une couleur argentée verdâtre, avec le pourtour extérieur noir : dessous d'un cendré-jaunâtre, avec des traits et une raie ondulée transverses d'un noir-brun : angle anal des ailes inférieures offrant de part et d'autre deux taches rouges.

C. Ailes entières. Les inférieures ayant à l'angle de l'anus une queue longue, oblique et linéaire.

4. Myrine Alcide.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre, avec la base saupoudrée de bleu-violet-luisant : dessous d'une couleur tannée, avec une ligne jaunâtre, transverse et centrale.

5. Myrine Atymnus.

Dessus des ailes d'un fauve-ponceau, avec l'extrémité noire : dessous d'un jaune d'ocre, avec une ligne brunâtre, transverse et commune.

A. Ailes supérieures entières. Ailes inférieures dentées, ayant deux queues linéaires & voisines, dont l'extérieure très-longue, l'intérieure beaucoup plus courte & placée à l'angle de l'anus.

1. Myrine Jafra.

Myrina Jafra.

Myr. alis suprà fuscis : subtùs albis strigâ duplici posticâ undatâ ; inferioribus maculis quinque analibus nigris nitidèque cyaneo pulverulentis.

Elle a entre un pouce & demi & deux pouces d'envergure. Le dessus des ailes est d'un brun-noirâtre, sans taches aux supérieures, avec quatre lunules blanches, dont trois consécutives à l'angle anal des inférieures. Ces dernières ailes ont en outre les queues & environ la moitié du bord postérieur frangées de blanc.

Le dessous des premières ailes est blanc, avec la côte, le limbe terminal, deux lignes transverses, postérieures & ondulées, roussâtres.

Le dessous des secondes ailes est entièrement blanc, avec deux lignes noires anguleuses, faisant suite aux lignes rousses des ailes de devant. Entre ces lignes & les queues, sont cinq taches noires saupoudrées de bleu-azuré-luisant, & dont la première longeant toute l'échancrure anale, l'avant-dernière sensiblement plus grosse que les trois autres.

La femelle nous est inconnue.

De l'île de Java.

Nota. Ce lépidoptère paroît avoir beaucoup de ressemblance avec l'Hespérie rurale *Freja* de Fabricius ; mais, si le texte de cet auteur est exact, la queue antérieure de son Hespérie est très-longue & la postérieure très-courte, tandis que c'est le contraire dans le *Jafra*. Fabricius parle d'ailleurs de lignes fauves marginales que nous n'avons point vues sur le dessous des ailes inférieures de notre Myrine.

B. Ailes supérieures entières. Ailes inférieures dentées, ayant une queue linéaire & assez longue, placée entre deux dents plus grandes que les autres.

2. Myrine Lisias.

Myrina Lisias.

Myr. alis suprà fuscis, anticarum maculâ fulvâ : posticis subtùs albis, maculis plurimis nigris sparsis.

Papilio P. R. Lisias, *alis tricaudatis : anticis fuscis maculâ fulvâ : posticis subtùs albis nigro maculatis.* Fab. *Mant. Inf. tom. 2. p. 65. n°. 615.*

Hesperia R. *Lisias.* Fab. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 261. n°. 12.*

Elle a environ un pouce & demi d'envergure. Le dessus de ses ailes est d'un brun-noirâtre, avec une grande tache fauve aux supérieures, & des taches marginales bleues aux inférieures. Les ailes inférieures ont un reflet bleu plus ou moins sensible, & leur queue est noire, avec les bords blancs.

Le dessous des premières ailes est d'un jaune-pâle, avec des lignes transverses fauves, & une ligne postérieure obscure. Le dessous des secondes ailes est blanc, avec plusieurs taches noires éparses.

De la presqu'île en deçà du Gange.

3. Myrine Evagoras.

Myrina Evagoras.

Myr. alis suprà virescenti-argenteis, margine exteriori nigro : subtùs flavescenti-cinereis, lineolis strigâque undulatâ atris : posticis utrinquè maculis duabus anguli ani rubris.

Papilio Evagoras, *alis bicaudatis, nigris, disco cyaneis nitidis : subtùs cinereis nigro fasciatis : posticis apice rubro bimaculatis.* Donow. *Gen. Illust. of Entom. part. 1. an Epitome of the Ins. of New-Holl. pl. 3. fig. 1. 2.*

Elle est à peu près de la taille de la précédente. Le dessus de ses ailes est d'une couleur argentée luisante & verdâtre, avec tout le pourtour extérieur largement noir. Il y a en outre derrière la cellule discoïdale des premières ailes un point oblong, & derrière celle des secondes une ligne transverse flexueuse, noirs. Vers l'angle anal des secondes ailes sont deux taches d'un rouge-fauve, assez grandes & séparées par un groupe d'atomes d'un bleu-pâle.

Le dessous des quatre ailes est d'un cendré-jaunâtre, avec une raie noire ondulée, partant de la côte des supérieures & allant aboutir au milieu du bord interne des inférieures, après avoir décrit un W au dessus de deux taches rouges anales qui répondent à celles de la surface opposée. Entre cette raie & la base, les ailes supérieures ont trois taches noires, transverses & consécutives, & les inférieures trois points, puis une ligne inégalement coupée en deux, pareillement noirs. Le bord postérieur est noir, & précédé dans toute sa longueur d'une double ligne roussâtre. La queue est de la couleur de ce bord, avec le bout blanc. Les antennes sont noirâtres & annelées de gris. Le corps est cendré en dessus, jaunâtre en dessous.

La femelle est d'un bleu plus pâle.

De la Nouvelle-Hollande.

C. Ailes entières. Les inférieures ayant à l'angle de l'anus une queue longue, oblique & linéaire.

4. Myrine Alcide.

Myrina Alcides.

Myr. alis suprà fuscis, basi violaceo nitidè pulverulentis : subtùs corticinis, strigâ mediâ flavescente.

Papilio P. R. Alcides, *alis caudatis, nigris cœruleo nitidis : subtùs ferrugineis strigâ flavescente.* Fab. *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 70. *n°.* 661.

Hesperia R. *Alcides.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 283. *n°.* 86.

Papilio P. U. Silenus, *alis caudatis, fuscis : subtùs brunneis, strigâ flavescente.* Fab. *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 85. *n°.* 773.

Hesperia U. *Silenus.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 330. *n°.* 253.

Papilio Alcides. Cram. *pl.* 96. *fig.* D. E.

Papilio Corax. Cram. *pl.* 379. *fig.* D. E. (Varietas an femina ?)

Papilio Corax. Herbst, *Pap. tab.* 286. *fig.* 1. 2.

Fabricius a donné cette espèce comme Hespérie rurale sous le nom d'*Alcides*, puis comme Hespérie urbicole sous celui de *Silenus.*

Elle a environ un pouce trois quarts d'envergure. Le dessus des ailes est d'un brun-noirâtre, avec des atomes d'un bleu-violet-luisant à la base des quatre, des atomes d'un bleu-cendré sur le limbe terminal des inférieures & sur leur queue. Les ailes supérieures offrent en outre à l'extrémité une bande transverse roussâtre & peu prononcée.

Le dessous est d'une couleur tannée, avec une ligne jaunâtre, transverse, centrale, courte aux ailes supérieures, & se perdant aux inférieures dans une poussière grise qui couvre la majeure partie du bord interne.

Le corps est brun, avec des poils bleuâtres sur le corselet. Les antennes sont noirâtres & annelées de blanchâtre en dessous.

Le Papillon *Corax* de Cramer paroît être la femelle ou une variété de cette espèce, car il lui ressemble tout-à-fait en dessous, & il n'en diffère en dessus que par l'absence de la bande roussâtre de l'extrémité des premières ailes, & le manque d'atomes violets à la base des secondes.

De la côte de Guinée, selon Cramer & Fabricius.

5. Myrine Atymnus.

Myrina Atymnus.

Myr. alis suprà subpapaverinis, apice nigro : subtùs ochraceis, strigâ communi fuscâ.

Papilio P. R. Atymnus, *alis caudatis, fulvis : anticis apice nigris.* Fab. *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 70. *n°.* 662.

Hesperia R. *Atymnus.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 283. *n°.* 88.

Papilio Atymnus. Cram. *pl.* 331. *fig.* D. E.

Elle a environ un pouce & demi d'envergure. Le dessus des ailes est d'un fauve-ponceau, avec une bordure noire terminale, large & arquée aux supérieures, étroite aux inférieures (du moins chez les mâles). Les ailes inférieures ont à l'extrémité du bord interne un petit groupe d'atomes bleuâtres, & le bout de leur queue est blanc.

Le dessous des quatre ailes est d'un jaune d'ocre foncé, avec une ligne brunâtre, commune, postérieure, légèrement sinuée, moins distincte aux ailes supérieures qu'aux inférieures.

Nous n'avons pas vu la femelle.

Nota. Il paroît que l'individu figuré par Cramer avoit perdu ses palpes, car ils ne sont pas du tout représentés, quoique très-longs.

Toutes les pattes propres à la marche dans les deux sexes.

GENRE POLYOMMATE.

Plébéiens ruraux. LINN.

Hespéries rurales. FAB. *Ent. Syst.*

CARACTÈRES DU GENRE.

PALPES inférieurs de longueur moyenne ou courts.

Ce genre comprend les genres ci-après de Fabricius (*Syst. Glossat.*) :

Genre THECLA. (Pap. *Betulæ*, *Pruni*, *Lynceus*, etc.)

Genre HESPERIA. (Pap. *Boeticus*, *Telicanus*, *Amyntas*, etc.)

Genre LYCÆNA. (Pap. *Gordius*, *Phlæas*, *Virgaureæ*, *Alexis*, *Adonis*, *Corydon*, etc.)

ESPÈCES.

A. Ailes supérieures ayant la côte plus ou moins arquée vers son origine. Ailes inférieures avec trois queues plus ou moins longues. (1)

1. POLYOMMATE Faunus.

Dessus des ailes d'un violet-obscur, avec l'extrémité d'un noir-mat : dessous blanc, avec une ligne fauve transverse sur le milieu, et une ligne noirâtre parallèlement au bord postérieur.

2. POLYOMMATE Hésiode.

Ailes à trois queues, d'un noir-mat, avec le milieu bleu : leur dessous blanc, avec une ligne commune verdâtre, et deux points noirs argentés à l'angle de l'anus. FAB.

3. POLYOMMATE Hélius.

Dessus des ailes bleu, avec le sommet des supérieures très-largement noir : dessous cendré, avec trois lignes brunes, transverses et continues ; celui des inférieures offrant vers l'angle anal deux yeux à iris roux. (Mâle.)

4. POLYOMMATE Moncus.

Ailes à trois queues, d'un brun-noirâtre : leur dessous très-blanc, presque fascié de noir ; celui des inférieures avec deux yeux dorés. FAB.

5. POLYOMMATE Pythagore.

Ailes d'un noir-mat, avec le disque des quatre fauve : leur dessous offrant trois bandes transverses, et une double ligne marginale, blanches ; celui des inférieures avec deux yeux argentés vers l'angle de l'anus.

6. POLYOMMATE Larydas.

Dessus des ailes d'un violet-obscur chez le mâle, *d'un bleu-blanchâtre chez la* femelle : *dessous d'un brun-obscur, avec une multitude d'anneaux blancs ; celui des inférieures offrant vers l'angle interne deux yeux argentés.*

(1) Le mode de divisions d'après la présence ou l'absence des queues n'est pas le plus naturel, mais c'est le plus commode pour la détermination, surtout quand les genres sont nombreux en espèces.

POLYOMMATE. (Insecte.)

7. Polyommate Hymen.

Ailes à trois queues, d'un brun-noirâtre : leur dessous tacheté de blanc : dessus des inférieures blanc. Fab.

8. Polyommate Amour.

Ailes à trois queues, d'un brun-noirâtre : leur dessous varié sur le milieu, et offrant à l'extrémité une ligne dorée. Fab.

9. Polyommate Agrippa.

Ailes à trois queues, bleues, avec le limbe noir : leur dessous cendré, avec une ligne blanche transverse, et deux taches anales rousses. Fab.

10. Polyommate Timon.

Ailes à trois queues, ayant la base verdâtre : leur dessous blanc ; celui des inférieures avec une bande courte d'un rouge-sanguin. Fab.

B. Ailes supérieures ayant la côte plus ou moins arquée vers son origine. Ailes inférieures avec deux queues, dont une ordinairement plus longue.

a. Bord postérieur des premières ailes un peu concave, surtout chez le mâle.

11. Polyommate Marsyas.

Dessus des ailes d'un bleu-verdâtre-luisant, avec le sommet noir : leur dessous lilas, avec des points oculaires noirs sur le disque ; celui des inférieures fascié de blanc et de bleu-verdâtre vers l'angle de l'anus.

12. Polyommate Ortygnus.

Dessus des ailes d'un bleu-verdâtre-luisant : leur dessous d'un incarnat-pâle, avec quelques points noirs sur le disque ; celui des inférieures offrant vers l'angle de l'anus une raie flexueuse et deux yeux d'un bleu-verdâtre. (Mâle ?)

13. Polyommate Rustan.

Dessus des ailes d'un bleu-pâle et luisant, avec l'extrémité d'un brun-noirâtre : leur dessous d'un incarnat-obscur, avec une double bande terminale olivâtre ; celui des inférieures avec deux points noirs à iris blanc à la base et deux à l'angle de l'anus. (Femelle.)

14. Polyommate Vénulius.

Dessus des ailes bleu : leur dessous d'un bleu-pâle, avec trois bandes noires postérieures ; celui des inférieures ayant à l'angle de l'anus un œil à iris fauve. (Mâle.)

15. Polyommate Liger.

Dessus des ailes blanc, avec le limbe postérieur noir : leur dessous d'un brun-noirâtre, avec des lignes ondulées et des croissans blancs ; celui des inférieures ayant une tache bleue sur le milieu et deux à l'angle de l'anus. (Femelle ?)

16. Polyommate Périclès.

Ailes à deux queues, noires : leur dessous d'un brun-noirâtre et ondé de blanc ; une double tache argentée à l'angle de l'anus. Fab.

17. Polyommate Endymion.

Dessus des ailes d'un bleu-verdâtre très-brillant, avec une bordure noire : dessous des inférieures avec une ligne médiaire noire et une bande ferrugineuse.

18. Polyommate Gabriel.

Dessus des ailes d'un bleu-verdâtre très-brillant, avec une bordure noire : dessous des inférieures ferrugineux vers l'extrémité, avec trois lignes transverses et une ligne marginale blanches.

POLYOMMATE. (Insecte.)

β. Milieu des ailes supérieures du mâle offrant une tache orbiculaire, plus ou moins cotonneuse, et parfois enfoncée.

19. Polyommate Ganymède.

Dessus des ailes d'un bleu-verdâtre-luisant, avec le bord noir : leur dessous moitié doré, moitié brun, avec deux lignes transverses d'un blanc-bleuâtre sur le milieu. (Mâle.)

20. Polyommate Vénus.

Dessus des ailes d'un bleu-barbeau-luisant, avec le sommet noir : leur dessous d'un vert-doré ; celui des inférieures aspergé de noir. (Mâle.)

21. Polyommate Emathéon.

Dessus des ailes d'un bleu-barbeau-luisant, avec le limbe noir : leur dessous noir et aspergé de bleu-pâle. (Mâle.)

22. Polyommate Arogéus.

Ailes d'un vert-luisant de part et d'autre : dessous des inférieures avec quatre lignes noires transversales, dont l'intérieure oblique et plus courte, la pénultième bordée de bleuâtre.

23. Polyommate Acmon.

Dessus des ailes d'un bleu-verdâtre-luisant : dessous des inférieures d'un brun-noirâtre, avec des lignes vertes transversales près de l'angle de l'anus.

24. Polyommate Polibetes.

Dessus des ailes d'un bleu-violet-luisant, avec le limbe postérieur noir : leur dessous d'un brun-incarnat ; celui des inférieures avec deux lignes ondulées bleuâtres et sept points noirs. (Mâle.)

25. Polyommate Hémon.

Ailes d'un brun-noirâtre : dessus des supérieures sans taches : dessous des quatre avec des bandes plus obscures à l'extrémité ; celui des inférieures avec quatre lignes ondulées verdâtres, dont l'antérieure plus longue et terminée près de la côte par un point oculaire.

26. Polyommate Lisus.

Dessus des ailes d'un bleu-verdâtre-luisant : leur dessous d'un vert-obscur, fascié de brun vers l'extrémité ; celui des inférieures offrant sur le milieu une ligne de points d'un blanc-bleuâtre. (Mâle.)

27. Polyommate Sinnis.

Dessus des ailes d'un bleu-d'acier-luisant, avec le limbe noir : leur dessous d'un cendré-verdâtre, avec deux lignes blanches ondulées ; celui des inférieures offrant à l'angle de l'anus une bande courte d'un vert-doré et marquée d'une tache et d'une lunule jaunes. (Mâle.)

28. Polyommate Thalès.

Ailes d'un noir-brun de part et d'autre : leur dessous ondé de bleu ; celui des supérieures grisâtre au sommet ; celui des inférieures offrant à l'angle anal une bande courte d'un vert-doré.

29. Polyommate Nautés.

Dessus des ailes d'un bleu-barbeau, avec les nervures et le limbe noirs : dessous des inférieures d'un noir-obscur, offrant sur son milieu une bandelette longitudinale jaune, et derrière cette bandelette beaucoup d'anneaux bleuâtres. (Mâle.)

30. Polyommate Elis.

Ailes d'un brun-verdâtre de part et d'autre : dessous des inférieures avec une bandelette longitudinale fauve, suivie de trois lignes transverses d'un vert-doré.

POLYOMMATE. (Insecte.)

31. Polyommate Polybe.

Dessus des ailes d'un vert-bleuâtre, avec l'extrémité d'un brun-noirâtre : leur dessous d'un jaune-verdâtre et veiné de noir, avec des taches rouges à la base.

32. Polyommate Halésus.

Ailes d'un bleu-verdâtre en dessus, avec une bordure noire ; d'un brun-noirâtre en dessous, avec l'origine de la côte rouge : angle anal des inférieures ayant des taches dorées de part et d'autre.

33. Polyommate Syncelle.

Dessus des ailes d'un bleu-violet-luisant, avec le limbe postérieur noir : leur dessous brun, celui des supérieures avec l'origine de la côte rouge, celui des inférieures avec deux lignes ondulées verdâtres et deux points anals noirs. (Mâle.)

34. Polyommate Narbal.

Dessus des ailes d'un bleu-barbeau-luisant, avec le sommet noir : leur dessous d'un brun-obscur, avec l'origine de la côte rouge ; celui des inférieures offrant une ligne blanche ondulée, et deux points noirs ocellés, dont l'un basilaire, l'autre anal. (Mâle.)

35. Polyommate Inachus.

Dessus des ailes bleu, avec le limbe noir : leur dessous d'un brun-noirâtre, avec l'origine de la côte rouge, et une ligne médiaire blanche, transversale ; ligne des secondes ailes terminée antérieurement par un point oculaire. (Mâle.)

36. Polyommate Pétus.

Ailes presqu'à trois queues, bleues, avec le limbe noir : leur dessous d'un brun-obscur, avec la base rousse et ponctuée de blanc. Fab.

37. Polyommate Céranus.

Ailes à queue, d'un bleu-pâle : leur dessous brun, avec des taches blanches à la base. Fab.

38. Polyommate Didymaon.

Ailes à trois queues, d'un brun-noirâtre : leur dessous rouge à la base, avec des points blancs ocellés. Fab.

39. Polyommate Éole.

Dessus des ailes d'un bleu-violet-luisant, avec une bordure noire : leur dessous d'un brun-noirâtre, avec trois bandes blanchâtres ; ailes supérieures avec l'origine de la côte, inférieures avec un point anal, d'un rouge-sanguin.

40. Polyommate Bathis.

Dessus du mâle *d'un bleu-luisant, dessus de la* femelle *blanc, avec l'extrémité d'un brun-noirâtre : dessous noir, avec des bandes blanches transverses ; ailes supérieures avec un point basilaire, ailes inférieures avec l'angle anal, fauves.*

41. Polyommate Phaléros.

Dessus du mâle *d'un bleu-violet-luisant, dessus de la* femelle *blanchâtre, avec l'extrémité d'un brun-noirâtre : dessous blanc, avec des bandes transverses et le bord noirs ; ailes inférieures avec deux points d'un bleu-argenté à l'angle de l'anus.*

42. Polyommate Moelibée.

Dessus des ailes d'un bleu-violet-pâle, avec l'extrémité d'un brun-noirâtre : leur dessous d'un jaune-pâle, avec cinq lignes noires transverses, dont l'intermédiaire double.

43. Polyommate Pélagon.

Dessus des ailes d'un bleu-ardoisé, avec le limbe obscur : dessous d'un brun-

incarnat-pâle, avec quatre lignes ondées plus obscures, bordées de blanc, et le limbe postérieur jaunâtre.

44. Polyommate Anacréon.

Ailes à deux queues, d'un brun-noirâtre : leur dessous ondé de blanc, et offrant vers l'extrémité une ligne fauve maculaire. Fab.

45. Polyommate Méton.

Dessus des ailes d'un blanc-bleuâtre-luisant, avec le sommet d'un noir-brun : leur dessous varié de jaunâtre, de brun et de ferrugineux; celui des inférieures avec un double point noir à la base.

46. Polyommate Auguste.

Ailes à queue, blanches, avec le limbe d'un brun-noirâtre : leur dessous varié de ferrugineux et de jaune; celui des inférieures avec deux lignes cendrées transversales. Fab.

47. Polyommate Dolilus.

Dessus des ailes d'un bleu-violet-luisant, avec le sommet noir et la frange d'un jaune-fauve : leur dessous d'un roux-obscur, avec des bandes blanches transverses; bande antérieure des secondes ailes bifide.

48. Polyommate Lausus.

Dessus du mâle *d'un bleu-barbeau-luisant; dessus de la* femelle *d'un brun-noirâtre, avec le bord interne d'un bleu-pâle : dessous d'un violet-pâle, avec trois lignes ondulées et l'angle interne de chaque aile blancs.*

49. Polyommate Sophocle.

Ailes à deux queues, noires, avec le disque bleu : leur dessous blanc, avec des lignes ondulées jaunâtres; un point fauve à l'extrémité des inférieures. Fab.

50. Polyommate Ismarus.

Dessus des ailes d'un bleu-luisant, avec le limbe noir : leur dessous d'un brun-noirâtre; celui des inférieures avec quatre lignes blanches ondulées et deux taches rouges anales.

51. Polyommate Euripide.

Ailes à deux queues, d'un noir-brun, avec le disque bleu : leur dessous d'un brun-noirâtre; celui des inférieures avec des lignes blanches anguleuses et une tache rousse oculaire. Fab.

52. Polyommate Cupentus.

Dessus des ailes d'un bleu-barbeau-luisant, avec le sommet d'un brun-noirâtre : leur dessous d'un cendré-obscur; celui des inférieures avec trois lignes blanches ondulées et un œil anal à iris fauve, ligne antérieure ayant le milieu dilaté en un anneau. (Mâle.)

53. Polyommate Sychée.

Dessus des ailes d'un bleu-barbeau-luisant, avec le sommet d'un noir-brun : leur dessous d'un cendré-incarnat; celui des inférieures avec deux lignes blanches ondulées et deux taches anales rouges, ligne postérieure se dilatant en plusieurs anneaux. (Mâle.)

54. Polyommate Stréphon.

Dessus des ailes d'un bleu-ardoisé, avec le sommet d'un brun-noirâtre : leur dessous d'un cendré-obscur; celui des inférieures avec deux lignes flexueuses de lunules blanches, et deux taches anales rouges marquées d'un point noir en arrière.

55. Polyommate Strophius.

Ailes d'un brun-noirâtre : dessous des inférieures avec une ligne flexueuse de

petits traits blancs, et deux taches anales rouges marquées d'un point noir en arrière.

56. Polyommate Sphinx.

Dessus du mâle *d'un bleu-violet-luisant, dessus de la* femelle *plus pâle, avec le sommet d'un brun-noirâtre : leur dessous d'un cendré-clair ; celui des ailes inférieures avec deux lignes blanches ondulées, bordées de brun, et deux points oculaires roux à l'angle de l'anus.*

57. Polyommate Cithonius.

Dessus des ailes d'un bleu-argenté-luisant, avec le sommet d'un brun-noirâtre : leur dessous d'un cendré-violâtre ; celui des inférieures avec des anneaux blancs sur le disque, et deux yeux à iris rouge près de l'angle de l'anus. (Mâle.)

58. Polyommate Falacer.

Ailes d'un brun-noirâtre : leur dessous avec deux traits discoïdaux et deux lignes postérieures ondulées d'un bleu-pâle : celui des inférieures ayant à l'angle interne trois lunules rousses.

59. Polyommate Isocrate.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre (un reflet bleu chez le mâle) : *dessous cendré, avec une double liture et une double ligne très-ondulée noirâtres et bordées de blanc de chaque côté ; inférieures ayant à l'angle anal deux yeux noirs, dont l'extérieur à iris fauve.*

60. Polyommate Érylus.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre (un reflet violet-changeant chez le mâle) : *dessous d'un gris-satiné, avec une double liture et une ligne ondulée roussâtres et bordée de blanc de chaque côté ; inférieures ayant à l'angle anal deux yeux noirs, dont l'extérieur à iris fauve.*

61. Polyommate Cléobis.

Dessus des ailes d'un bleu-azuré chez le mâle, *d'un bleu plus pâle chez la* femelle, *avec le sommet d'un noir-brun : dessous d'un gris-brunâtre, avec une ligne ondulée roussâtre et bordée de blanchâtre en arrière ; inférieures ayant à l'angle anal deux yeux à iris fauve.*

62. Polyommate Cippus.

Ailes à deux queues, bleues, avec le limbe d'un brun-noirâtre : dessous cendré ; celui des inférieures avec deux points noirs à l'angle interne. Fab.

63. Polyommate Lougin.

Dessus des ailes d'un bleu-barbeau-luisant chez le mâle, *d'un bleu plus pâle chez la* femelle, *avec le sommet d'un noir-brun : dessous d'un gris-satiné-blanchâtre, avec une ligne transverse et non bordée de lunules noires ; inférieures ayant à l'angle anal deux yeux à iris fauve.*

64. Polyommate Nédymond.

Dessus des ailes d'un bleu-violet-luisant, avec le limbe d'un noir-brun : dessous d'un blanc-satiné, avec une double bande terminale obscure ; inférieures ayant à l'angle anal deux yeux noirs, dont l'extérieur à iris fauve, l'intérieur à iris d'un bleu-argenté.

65. Polyommate Favonius.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre, avec des taches fauves sur le disque des supérieures et à l'extrémité des inférieures : dessous cendré, avec deux lignes blanches ondulées ; inférieures ayant une bande rousse presque marginale et l'angle de l'anus bleu.

66. Polyommate Mars.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre : leur dessous plus pâle ; celui des infé-

rieures avec deux points basilaires, et une ligne bifide, blancs : la ligne bifide embrassant une tache rousse.

67. Polyommate Ergéus.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre : leur dessous cendré ; celui des inférieures ayant une ligne ondulée d'un rouge-sanguin et bordée de blanc en arrière, puis une bande anale briquetée très-dilatée dans son milieu et marquée postérieurement de trois points noirs.

68. Polyommate Nébis.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre : leur dessous cendré et offrant derrière le milieu deux lignes ondulées transversales, dont l'antérieure formée par des taches d'un rouge-brique, la postérieure par des anneaux blancs ; deux yeux roux à l'angle interne des ailes inférieures. (La femelle.)

69. Polyommate Cléon.

Ailes à queues, d'un brun-noirâtre : leur dessous cendré, avec une ligne transverse aux supérieures, et une bande dentée aux inférieures, d'un rouge-sanguin; deux yeux roux à l'angle interne des ailes inférieures. Fab.

70. Polyommate Béon.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre, avec la base d'un bleu-pâle : leur dessous d'un cendré-luisant ; celui des inférieures avec une bande médiaire d'un rouge-sanguin et des lunules marginales noires : une ligne blanche anguleuse coupant la bande à sa partie inférieure.

71. Polyommate Cécrops.

Ailes à deux queues, noires : leur dessous avec une bande d'un rouge-sanguin. Fab.

72. Polyommate Tyrtée.

Ailes à deux queues, d'un brun-noirâtre : leur dessous avec une ligne blanche ondée, et des lunules marginales noires, dont les intermédiaires rousses. Fab.

73. Polyommate Échion.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre (bord interne d'un bleu-ardoisé-luisant chez le mâle) *: dessous blanchâtre, avec des points oculaires d'un rouge-brique sur le milieu, une ligne noirâtre ondulée et deux yeux roux à l'extrémité.*

74. Polyommate Columelle.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre, avec le bord interne d'un bleu-ardoisé-pâle : dessous brunâtre, avec une ligne flexueuse de points oculaires noirs, puis des lunules et des anneaux blancs ; angle anal des inférieures offrant deux yeux à iris roux.

75. Polyommate Mégaclès.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre, avec le bord interne d'un bleu-ardoisé : dessous des inférieures cendré à la base, blanchâtre à l'extrémité, avec trois bandes ondulées et un point central ferrugineux. (Mâle.)

76. Polyommate Mégarus.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre, avec le bord interne d'un bleu-pâle : dessous des inférieures blanchâtre, avec trois lignes flexueuses de taches brunâtres, et deux yeux à iris roux.

77. Polyommate Étolus.

Ailes à deux queues : supérieures noires : inférieures d'un bleu-pâle en dessus, blanchâtres en dessous avec un point basilaire et deux marginaux noirs. Fab.

POLYOMMATE. (Insecte.)

78. Polyommate Dindus.

Ailes à deux queues, d'un noir-brun, avec le bord interne bleu : dessous cendré, avec des taches blanches et une double tache anale rousse. Fab.

79. Polyommate Gabélus.

Dessus des ailes d'un bleu-obscur, avec le limbe d'un brun-noirâtre : dessous d'un blanc-grisâtre, avec deux lignes noires ondulées aux supérieures, et trois aux inférieures; un œil à iris roux près de l'angle interne des ailes inférieures. (Femelle.)

80. Polyommate Jébus.

Dessus des ailes d'un bleu-pâle, avec le limbe d'un brun-noirâtre : dessous brunâtre, avec le sommet des supérieures, et toute la surface des inférieures, panachés de blanchâtre; deux points noirs, dont l'intérieur oblong, à l'angle anal des ailes inférieures. (Femelle.)

81. Polyommate Mécène.

Ailes à deux queues, d'un noir-brun, avec le disque bleu : dessous nué de brun. Fab.

82. Polyommate Céthégus.

Dessus des ailes d'un bleu-luisant, avec le limbe d'un noir-brun : dessous cendré; celui des inférieures avec deux lignes ondées, et une série marginale de points, d'un brun-noirâtre; point de l'angle anal cerclé de fauve.

83. Polyommate Calus.

Dessus des ailes d'un bleu-argenté très-brillant, avec le limbe noir : dessous cendré; celui des supérieures avec une grande tache médiaire, celui des inférieures avec une ligne ondulée, d'un brun-noir.

84. Polyommate Hugon.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre, avec le disque fauve : dessous d'un brun-pâle, avec une ligne ondulée d'un rouge-brique et bordée de blanc en arrière; angle anal des inférieures offrant deux yeux à iris roux.

85. Polyommate Xénophon.

Ailes à deux queues, d'un brun-noirâtre, avec le disque jaune : leur dessous cendré, avec une ligne médiaire blanche, contiguë à une ligne obscure. Fab.

86. Polyommate Damastus.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre, avec le disque fauve : leur dessous vert; celui des inférieures avec trois lignes flexueuses, et trois yeux marginaux, noirs et bordés de blanc.

87. Polyommate Télème.

Dessus des ailes d'un bleu-barbeau-luisant : leur dessous vert; celui des inférieures avec une ligne noire marginale, dilatée près du sommet et très-anguleuse près du bord interne.

88. Polyommate Janias.

Dessus des ailes d'un bleu-verdâtre-luisant, avec le limbe noir : leur dessous vert; celui des inférieures avec une ligne ondulée et un point oculaire noirs.

89. Polyommate Hérodote.

Dessus des ailes d'un bleu-d'acier, avec le limbe noir : leur dessous vert; celui des inférieures avec une ligne transverse de points, noirs en avant, blancs en arrière.

90. Polyommate Ethémon.

Dessus des ailes noir, avec le milieu bleu : leur dessous fauve, avec une li-

gne rouge transverse sur le milieu ; celui des inférieures offrant vers l'extrémité un cordon de lunules, noires en avant, blanches en arrière. (Femelle ?)

91. Polyommate Lycabas.

Dessus des ailes bleu, avec le bord noir : leur dessous d'un brun-noirâtre, avec l'extrémité plus pâle ; angle interne des inférieures jaune et rayé de noir. (Le mâle.)

γ. Dessus des ailes supérieures du mâle n'offrant pas vers le milieu de tache orbiculaire distincte.

92. Polyommate Aunus.

Dessus des ailes d'un bleu-barbeau-luisant, avec le limbe noir : leur dessous d'un brun-noirâtre, avec deux bandes blanchâtres ; origine de la côte des supérieures et angle interne des inférieures sans taches. (Mâle.)

93. Polyommate Hyacinthe.

Ailes d'un bleu-verdâtre-luisant, avec une bordure noire en dessus ; avec trois bandes noires et une bande centrale blanche en dessous.

94. Polyommate Cyanus.

Dessus des ailes d'un bleu-barbeau-luisant, avec le limbe noir : leur dessous d'un brun-noirâtre, avec le disque blanc à partir de la base ; une rangée marginale de sept yeux d'un bleu-argenté aux inférieures. (Mâle.)

95. Polyommate Pholéus.

Dessus des ailes d'un bleu-verdâtre-luisant : leur dessous noir, avec des bandes d'un vert-doré. (Mâle.)

96. Polyommate Philanthe.

Ailes d'un brun-noirâtre : dessus des inférieures avec un point blanc au bord interne, leur dessous avec quatre bandes jaunâtres et deux lignes argentées transversales.

97. Polyommate Simæthis.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre-chatoyant : leur dessous d'un vert-jaunâtre, avec une bandelette transverse argentée ; extrémité des inférieures ferrugineuse, avec une série de points nacrés.

98. Polyommate Chrysus.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre, avec des points blancs vers l'extrémité des supérieures : dessous ferrugineux, avec des taches et des bandes d'un vert-doré et bordées de noir.

99. Polyommate Achæus.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre, avec des litures jaunes sur toutes les quatre : dessous jaune, avec une multitude de taches dorées, bordées de brun-purpurin.

100. Polyommate Valens.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre-chatoyant : dessous d'un jaune-pâle, avec des taches rouges chargées de points d'or.

101. Polyommate Vulcain.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre (un reflet violet chez le mâle*), avec des bandes fauves : dessous d'un rouge-foncé, avec des bandes jaunes bordées de noir, et des lignes intermédiaires de taches argentées.*

POLYOMMATE. (Insecte.)

102. Polyommate Orcas.

Dessus des ailes d'un bleu-verdâtre, avec le limbe noir : dessous d'un brun-ferrugineux, avec une multitude de taches argentées.

C. Bord antérieur des premières ailes plus ou moins arqué vers son origine. Bord postérieur des secondes ailes avec une seule queue extérieure, linéaire ou filiforme.

a. Bord postérieur des secondes ailes flexueux ou un peu dentelé, et ayant une queue linéaire.

103. Polyommate Périon.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre, avec des bandes fauves : dessous d'un ferrugineux-jaunâtre, avec une multitude de points oculaires dorés sur les quatre, et une ligne élevée, également dorée, sur le bord terminal des inférieures.

104. Polyommate Harpax.

Ailes à queue, fauves, tachetées de noir : leur dessous cendré, avec des points dorés. Fab.

105. Polyommate Lincus.

Ailes blanches, ayant l'extrémité d'un brun-noirâtre en dessus : leur dessous avec des bandes transverses d'un noir-brun, et le bord postérieur fauve; angle anal des inférieures noir, avec quatre points blancs.

106. Polyommate Philippe.

Ailes à queue, d'un brun-noirâtre : leur dessous blanc, avec deux lignes transverses fauves; deux points noirs presqu'oculaires à l'angle anal des inférieures. Fab.

107. Polyommate Phorbas.

Ailes à queue, d'un brun-noirâtre, avec le disque blanc : leur dessous blanc, avec des lignes cendrées transversales; deux points noirs à l'angle interne des inférieures. Fab.

108. Polyommate Jarbas.

Dessus des ailes fauve, avec le limbe d'un brun-noirâtre : dessous brunâtre, avec une double liture et une ligne ondulées blanches; angle anal des inférieures avec deux points noirs, dont l'extérieur surmonté d'une lunule fauve.

109. Polyommate Épiclès.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre (un reflet violet chez le mâle) *: supérieures avec le disque, inférieures avec des taches marginales, fauves : dessous jaune, avec une bande terminale d'un rouge-sanguin et ayant le côté interne bordé par des lunules blanches.*

110. Polyommate du Rouleau.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre : dessous d'un jaune-fauve, avec deux lignes blanches ondulées, dont une plus courte, et le bord postérieur roux.

111. Polyommate du Prunier.

Ailes d'un brun-noirâtre, avec une bande postérieure fauve, maculaire en dessus, ayant les côtés bordés en dessous par des points noirs.

112. Polyommate W-blanc.

Ailes d'un brun-noirâtre : dessous des inférieures offrant sur le milieu une ligne blanche, terminée par un W, et sur le bord postérieur une bande flexueuse rousse, bordée de noir.

113. Polyommate Lyncée.

Ailes d'un brun-noirâtre : dessous des inférieures avec des lunules marginales rousses, précédées d'une ligne transverse de petits traits blancs; trait inférieur oblique.

POLYOMMATE. (Insecte.)

114. Polyommate du Marronnier.

Ailes d'un brun-noirâtre : dessous des inférieures avec des lunules marginales d'un roux-foncé, petites et précédées d'une ligne transverse de traits blancs ; trait inférieur représentant un C renversé.

115. Polyommate de l'Acacia.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre : leur dessous d'un gris-cendré, avec une ligne blanche, transverse et interrompue ; celui des inférieures avec des lunules marginales rousses, rapprochées. (Anus de la femelle *terminé par un bourrelet de poils noirs.)*

116. Polyommate du Prunellier.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre : leur dessous cendré, avec une ligne blanche transverse et ondulée ; celui des inférieures avec des lunules fauves sur le bord postérieur, et une tache d'un bleu-argenté à l'angle de l'anus.

117. Polyommate du Chêne.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre, glacé de violet dans le mâle, *avec une tache bifide bleue à la base des ailes supérieures dans la* femelle : *dessous d'un gris-satiné, avec une ligne blanche, transverse et ondulée, puis deux taches fauves, anales.*

118. Polyommate Apidanus.

Dessus des ailes violet (une large bordure d'un brun-noirâtre dans la femelle) : *dessous d'un brun-noirâtre, varié de gris-de-perle, avec l'origine de la côte d'un rouge-sanguin ; des atomes d'un vert-doré à l'angle anal des inférieures.*

119. Polyommate Hélus.

Dessus des ailes d'un violet-velouté (une large bordure d'un brun-noirâtre dans la femelle) : *dessous d'un brun-noirâtre, réticulé de gris ; celui des supérieures avec quelques anneaux sur le disque, celui des inférieures avec des atomes à l'angle interne, d'un vert-doré.*

120. Polyommate Eumolphus.

Dessus des ailes d'un vert à reflet doré, avec une bordure noire, plus large aux inférieures : dessous d'un brun-noirâtre, avec quelques anneaux et des lignes ondées d'un cendré-pâle ; une petite bande d'un bleu-argentin à l'angle anal des inférieures.

121. Polyommate Théocrite.

Ailes à queue, d'un vert-pâle, avec la côte obscure : dessous noir, avec des lignes transverses de points jaunâtres. Fab.

β. Bord postérieur des secondes ailes entier et ayant une queue filiforme.

122. Polyommate Bœticus.

Dessus des ailes d'un violet-bleuâtre, avec le limbe d'un brun-noirâtre : leur dessous cendré, et ondé de blanc depuis la base jusqu'à l'extrémité ; celui des inférieures offrant une bande blanche continue, et deux yeux dorés à l'angle de l'anus.

123. Polyommate Élien.

Dessus des ailes d'un blanc de lait, avec le limbe postérieur d'un brun-noirâtre : leur dessous d'un brun-pâle, avec plusieurs lignes transverses et une bande bifide blanches ; angle anal des inférieures avec trois yeux argentés. (Mâle.)

124. Polyommate Célério.

Dessus des ailes d'un blanc de lait, avec le limbe postérieur d'un brun-noirâtre : leur dessous d'un cendré-pâle,

avec plusieurs lignes blanches, transverses, continues, ondulées; angle anal des inférieures avec trois yeux argentés.

125. Polyommate Elpis.

Dessus des ailes d'un bleu-azuré-luisant : leur dessous d'un cendré-foncé, avec plusieurs lignes blanches, transverses, étroites, interrompues et ondulées; angle anal des inférieures avec deux yeux argentés. (Mâle.)

126. Polyommate Hylaïs.

Dessus des ailes d'un bleu-azuré-luisant, avec le milieu blanc : leur dessous d'un brun-noirâtre, avec une large bande commune, et quelques ondes, blanches; bord terminal des inférieures avec une rangée de six yeux noirs, dont le pénultième ayant une double prunelle argentée. (Mâle ?)

127. Polyommate Platon.

Dessus des ailes d'un bleu-violet, à reflet argentin, avec le sommet des supérieures noir : leur dessous d'un brun-obscur, avec plusieurs lignes blanches, transverses et ondulées; angle anal des inférieures avec trois yeux argentés.

128. Polyommate Télicanus.

Dessus des ailes d'un violet légèrement bleuâtre, avec le limbe d'un brun-noirâtre : leur dessous cendré, et offrant des chaînettes blanches depuis la base jusqu'à l'extrémité; celui des inférieures avec une rangée transverse de lunules blanches, et deux yeux dorés à l'angle de l'anus.

129. Polyommate Lybas.

Dessus des ailes d'un violet légèrement bleuâtre (une bordure brune dans la femelle) : *leur dessous brun, avec des bandes bifides et une chaînette terminale blanches aux supérieures, avec des hiéroglyphes blancs entrelacés aux inférieures; angle anal de ces dernières ailes avec quatre yeux dorés.*

130. Polyommate Lingéus.

Dessus des ailes d'un violet légèrement bleuâtre (une bordure brune dans la femelle) : *leur dessous brun, avec des anneaux et des bandes sinuées blancs aux supérieures, avec des taches blanches difformes aux inférieures; angle anal de ces dernières ailes avec deux yeux dorés.*

131. Polyommate Éricus.

Ailes à queue, d'un bleu-pâle : leur dessous varié de blanc et de brun; angle anal des inférieures avec deux points (blancs et cerclés de noir). Fab.

132. Polyommate Démocrite.

Ailes à queue, d'un bleu très-luisant en dessus : leur dessous noir et tacheté de blanc. Fab.

133. Polyommate Émolus.

Dessus des ailes d'un violet-luisant : leur dessous d'un brun-pâle; celui des inférieures entièrement couvert de lignes blanchâtres, transverses, ondulées, interrompues, et offrant deux points oculaires noirs, dont un placé sur le bord interne, l'autre sur le bord postérieur. (Mâle.)

134. Polyommate Strabon.

Dessus des ailes d'un bleu-violet-pâle, avec le limbe brun : leur dessous cendré, ayant derrière le milieu des chaînettes blanchâtres, sur la côte des supérieures un point noir, et deux sur celle des inférieures; angle anal de ces dernières ailes avec deux yeux dorés, dont un plus petit.

POLYOMMATE. (Insecte.)

135. Polyommate Cnéjus.

Dessus des ailes d'un violet-bleuâtre, avec le limbe brun : leur dessous cendré, ayant derrière le milieu des chaînettes blanchâtres ; celui des inférieures offrant à la base quatre points noirs, et à l'angle de l'anus deux yeux dorés.

136. Polyommate Parrhasius.

Ailes à queue, bleues (brunes) : leur dessous cendré et strié de blanc ; celui des inférieures avec des (quatre) points marginaux dorés. Fab.

137. Polyommate Astéris.

Dessus des ailes d'un violet-argentin-luisant, avec le limbe brun : dessous des inférieures d'un cendré-obscur, avec six points noirs oculaires à la base, une bande blanche crénelée sur le milieu, et trois yeux argentés à l'angle de l'anus.

138. Polyommate Centaure.

Ailes à queue, d'un bleu-pâle, avec une bordure brune : leur dessous cendré, avec des taches oculaires à la base. Fab.

139. Polyommate Théophraste.

Dessus des ailes d'un violet légèrement bleuâtre, avec le limbe brun : leur dessous blanc, avec plusieurs lignes noires, transverses et maculaires ; bord postérieur des inférieures, avec cinq yeux dorés, dont l'anal double.

140. Polyommate Pline.

Ailes à queue, variées de blanc et de brun : dessous des inférieures avec un double point doré à l'angle de l'anus. Fab.

141. Polyommate Rosimon.

Ailes blanches de part et d'autre, avec des points épars et tout le pourtour noirs ; dessus des quatre d'un bleu-argenté à la base ; dessous des inférieures avec trois points du même bleu près de l'angle de l'anus.

142. Polyommate Roxus.

Dessus des ailes d'un noir-brun, avec un espace commun blanc sur le milieu : dessous blanc, avec une bande oblique à la base, et deux bandes maculaires à l'extrémité, d'un noir-brun.

143. Polyommate Hippocrate.

Ailes à queue, d'un brun-noirâtre, avec l'extrémité blanche : leur dessous blanc, avec des points noirs. Fab.

144. Polyommate Cabinus.

Dessus des ailes d'un bleu-argenté : leur dessous blanc et ondé de brunâtre ; celui des inférieures avec deux points noirs à la base et deux à l'angle de l'anus : point anal extérieur surmonté d'une lunule fauve. (Mâle.)

145. Polyommate Micyclus.

Dessus des ailes d'un violet-bleuâtre (une bordure brune chez la femelle) : *dessous d'un gris-bleuâtre, avec trois lignes roussâtres, transverses et ondulées, puis une série marginale de points noirs ; pénultième point des secondes ailes ayant une prunelle argentée.*

146. Polyommate Amyntas.

Dessus des ailes d'un bleu-violet chez le mâle, *d'un brun-noirâtre chez la* femelle : *leur dessous d'un gris-bleuâtre et ocellé de noir ; celui des inférieures offrant à l'angle anal deux lunules fauves, chargées chacune d'un simple point noir.*

POLYOMMATE. (Insecte.)

147. Polyommate Comyntas.

Dessus des ailes d'un bleu-violet chez le mâle, *d'un brun-noirâtre chez la* femelle : *leur dessous d'un gris-bleuâtre et ocellé de noir; celui des inférieures offrant à l'angle anal deux lunules fauves, chargées chacune d'un œil doré.*

148. Polyommate Lacturnus.

Dessus des ailes d'un bleu-violet-pâle, avec le limbe brun : leur dessous d'un gris-bleuâtre; celui des inférieures ocellé de noir vers la base, de brun vers l'extrémité, et offrant à l'angle anal une bande rousse, sinuée et chargée de deux yeux dorés. (Mâle.)

149. Polyommate Phidias.

Ailes à queue, d'un bleu-pâle, avec le limbe brun : leur dessous cendré, avec un point noir à l'angle anal des quatre. Fab.

150. Polyommate Bochus.

Dessus des ailes bleu, avec une bordure noire : leur dessous d'un cendré-obscur; celui des supérieures sans taches, celui des inférieures ayant l'angle anal noir et marqué de croissans argentés.

D. Ailes dentées ou entières : les inférieures ayant l'angle interne plus ou moins prolongé dans les mâles.

151. Polyommate Polyclète.

Ailes dentées, d'un bleu-barbeau dans le mâle, *d'un brun-noirâtre avec la base d'un bleu-verdâtre pâle dans la* femelle : *leur dessous d'un brun-obscur, avec des bandes d'un rouge-sanguin, bordées de noir et de vert-doré.*

152. Polyommate Narcisse.

Ailes dentées, d'un brun-noirâtre, avec le disque d'un bleu-pâle : leur dessous avec des bandes et des taches d'un rouge-sanguin et bordées d'argent. Fab.

153. Polyommate Apelle.

Ailes dentées, fauves, avec le limbe d'un brun-noirâtre : dessous des inférieures avec des bandes rousses bordées d'argent. Fab.

154. Polyommate Théro.

Ailes dentées, d'un brun-noirâtre en dessus, avec des taches fauves : dessous des inférieures d'un cendré-obscur, avec des taches linéaires d'un blanc-argentin; tache du disque crochue à chaque bout.

155. Polyommate Alphée.

Ailes dentelées, d'un noir-brun en dessus, avec une bande commune d'un fauve-luisant : dessous des inférieures d'un gris de perle, avec une bande discoïdale sinuée, et le limbe postérieur, ferrugineux.

156. Polyommate Thyra.

Ailes d'un noir-brun en dessus, avec le disque fauve : leur dessous d'un ferrugineux-rougeâtre, avec une multitude de taches noires à prunelle argentée et élevée. (Mâle.)

157. Polyommate Thysbé.

Ailes dentelées, fauves en dessus, avec des taches noires (un reflet d'un bleu-argenté à la base) : dessous des inférieures ferrugineux, panaché et strié de jaunâtre, avec des taches dorées.

158. Polyommate Hiéré.

Ailes presqu'entières, ayant le dessus d'un brun-noirâtre, fouetté de fauve et tacheté de noir (un reflet violet très-vif dans le mâle) : *dessous des inférieures cendré, ocellé de noir, avec la base bleuâtre et une bande marginale fauve.*

159. Polyommate

POLYOMMATE. (Insecte.)

159. Polyommate Gordius.

Ailes presqu'entières, fauves en dessus (un reflet violet dans le mâle*), avec des points et le limbe postérieur noirs : dessous des inférieures d'un cendré-jaunâtre, ocellé de noir, avec la base verdâtre et une bande marginale fauve.*

160. Polyommate Thersamon.

Ailes presqu'entières, fauves, avec un léger reflet violet dans le mâle*, avec des taches noires dans la* femelle *: dessus des inférieures un peu obscur vers le milieu ; leur dessous cendré, avec des points oculaires noirs et une bande marginale fauve.*

161. Polyommate Xanthé.

Ailes presqu'entières, d'un brun-chatoyant en dessus, avec des taches noires ; leur dessous d'un jaune-verdâtre-pâle, avec des points oculaires noirs : une bande marginale fauve sur les deux surfaces.

162. Polyommate Hellé.

Ailes presqu'entières, d'un brun-noirâtre en dessus, avec un reflet violet, et le disque des supérieures varié de fauve et de noir : dessous des inférieures d'un brun-tanné, avec des points oculaires noirs, une ligne anguleuse blanche et une bande marginale fauve.

163. Polyommate Chryséis.

Ailes presqu'entières, fauves en dessus, avec les bords glacés de violet et le disque biponctué dans le mâle*, avec des taches noires dans la* femelle *: dessus des inférieures d'un cendré-obscur, avec une multitude de points oculaires et une bande anale rousse.*

164. Polyommate Eurydice.

Dessus du mâle *fauve, bordé de noir et sans taches sur le disque ; dessus de la* femelle *d'un brun-noirâtre, avec des taches noires : dessous d'un cendré légèrement jaunâtre, avec une multitude de points oculaires et la base verdâtre.*

165. Polyommate Hippothoé.

Dessus des ailes fauve, avec une légère bordure et une lunule centrale noires aux quatre dans le mâle*, avec plusieurs taches aux supérieures dans la* femelle *: dessous cendré, avec la base bleuâtre, une multitude de points oculaires, et une bande marginale fauve.*

166. Polyommate de la Verge-d'or.

Dessus des ailes fauve, bordé de noir, sans taches dans le mâle*, avec plusieurs taches dans la* femelle *: dessous des inférieures d'un jaune-fauve-pâle, avec des points noirs faiblement ocellés et une ligne transverse de taches blanches.*

167. Polyommate Phlæas.

Ailes supérieures d'un fauve-cuivreux, avec des taches noires : dessus des inférieures d'un brun-noirâtre, avec une bande fauve crénelée ; leur dessous d'un cendré-brunâtre, avec des points noirâtres et une ligne flexueuse d'un rouge-brique.

168. Polyommate Hylla.

Ailes dentées, fauves, ponctuées de noir : base des inférieures d'un brun-noirâtre en dessus, blanchâtre en dessous. Fab.

169. Polyommate Saluste.

Ailes entières, fauves, variées de noir : dessous des supérieures ponctué de noir, dessous des inférieures cendré et tacheté de brun. Fab.

POLYOMMATE. (Insecte.)

170. Polyommate Évadrus.

Ailes dentelées, fauves en dessus, avec tous les bords d'un brun-noirâtre et la frange entre-coupée : dessous des inférieures d'un brun-tanné, avec des taches cendrées.

171. Polyommate Pétalus.

Ailes entières, fauves en dessus, avec des taches discoïdales et le limbe postérieur noirs : dessous des inférieures d'un gris-nébuleux, avec deux bandes transverses blanches.

172. Polyommate Orus.

Ailes entières, fauves en dessus (un léger reflet violet chez le mâle), *avec des points et le bord postérieur noirs : dessous des inférieures cendré, avec des taches oculaires peu prononcées et une rangée marginale de lunules brunâtres.*

173. Polyommate Zeuxo.

Ailes sans queue, entières, avec le disque fauve et tacheté de noir : dessous des supérieures avec des taches argentées. Linn.

174. Polyommate Ballus.

Ailes entières, d'un brun-noirâtre en dessus (un espace fauve chez la femelle) : *dessous des inférieures vert à la base, avec un œil central peu prononcé ; d'un cendré-incarnat à l'extrémité, avec une rangée de points rouges surmontés chacun d'un point blanc.*

175. Polyommate de la Ronce.

Ailes dentelées, d'un brun-noirâtre-luisant en dessus : leur dessous vert, avec un liseré ferrugineux et une rangée transversale de points blancs.

176. Polyommate Romulus.

Ailes entières, d'un brun-noirâtre : leur dessous vert ; celui des inférieures avec une tache rousse. Fab.

177. Polyommate Irus.

Ailes dentelées, d'un brun-noirâtre : dessous des inférieures ferrugineux à la base avec deux lignes ondulées plus obscures, saupoudré de gris à l'extrémité avec un point d'un brun-marron. (Mâle.)

178. Polyommate Philiasus.

Ailes un peu en queue, noires en dessus, tachetées en dessous : extrémité des inférieures offrant deux yeux en dessus et un seul en dessous. Linn.

179. Polyommate Lara.

Dessus des quatre ailes d'un brun un peu briqueté, avec un léger reflet bleuâtre à la base et deux yeux à l'angle de l'anus : leur dessous cendré, celui des supérieures avec deux yeux comme en dessus, celui des inférieures sans yeux.

180. Polyommate Syméthus.

Ailes un peu dentées, d'un brun-noirâtre en dessus, avec une tache blanche sur le milieu des quatre : dessous des inférieures d'un blanc-sali, avec des hiéroglyphes noirâtres peu prononcés.

181. Polyommate Phædrus.

Ailes entières, fauves en dessus dans le mâle, *avec le pourtour extérieur noir ; d'un brun-noirâtre dans la* femelle, *avec le disque blanc : leur dessous d'un blanc-satiné, avec une rangée marginale de petits points noirs.*

POLYOMMATE. (Insecte.)

182. Polyommate Térambus.

Ailes entières, d'un bleu-violet en dessus, avec le pourtour extérieur noir : leur dessous d'un brun-tanné-clair, avec une raie commune ferrugineuse ; celui des inférieures ayant un œil blanc à l'angle de l'anus.

183. Polyommate Pétavius.

Ailes entières, noires en dessus : supérieures avec une bande fauve, oblique : dessous des quatre fauve, aspergé de noir, et ayant sur le disque des points oculaires d'un bleu-lilas.

184. Polyommate Évandras.

Ailes entières, d'un noir-brun, ayant de part et d'autre une bande postérieure fauve : leur dessous offrant sur le disque une tache d'un bleu-lilas.

E. Ailes inférieures sans queue extérieure et sans prolongement anal (dentées parfois chez la femelle).

a. Dessous des ailes avec plus ou moins de lignes transversales, maculaires ou continues, et souvent accompagnées de points ocellés.

185. Polyommate Hubner.

Ailes entières, ayant le dessus d'un brun-noirâtre à reflet violet changeant : supérieures avec une tache d'un jaune-fauve sur le disque : dessous des quatre d'un blanc-satiné, avec une série marginale de points noirs. (Mâle.)

186. Polyommate Duponchel.

Ailes entières, d'un brun-noirâtre en dessus, avec le disque des quatre blanc : leur dessous d'un blanc-satiné, avec un trait central, deux lignes ondulées et une simple série de points marginaux, d'un brun-noirâtre.

187. Polyommate Duméuil.

Ailes entières, d'un beau blanc en dessus, avec le contour extérieur des supérieures largement brun : dessous d'un blanc-sale, offrant derrière le milieu deux lignes ondulées, et une ligne de points, brunâtres ; inférieures avec une tache marginale très-noire. (Mâle.)

188. Polyommate Héraldus.

Ailes entières, bleues en dessus, avec le limbe noir : leur dessous blanc, avec le bord postérieur ponctué de noir. Fab.

189. Polyommate Ladon.

Dessus des ailes d'un bleu-violet-pâle (extrémité des supérieures brune dans la femelle) : *dessous d'un gris-bleuâtre, offrant derrière le milieu une série flexueuse de taches noires, puis une ligne en feston et des points marginaux bruns.*

190. Polyommate Argiolus.

Ailes entières, d'un bleu-violet-pâle (extrémité des supérieures brune dans la femelle) : *dessous d'un blanc de lait, avec de simples points noirs.*

191. Polyommate Dion.

Dessus des ailes d'un violet-bleuâtre : dessous blanc, avec de simples points et des traits d'un brun-noirâtre ; angle anal des inférieures offrant deux yeux à prunelle bleue. (Mâle.)

192. Polyommate Cassius.

Dessus du mâle *d'un brun-violet-tendre, dessus de la* femelle *blanc et ayant le contour extérieur des ailes supérieures brun : dessous blanc, tacheté et fascié de noir ; angle anal des inférieures avec deux yeux argentés.*

POLYOMMATE. (Insecte.)

193. Polyommate Clyton.

Ailes entières, variées de blanc et de noir en dessus, avec un reflet bleu à la base : leur dessous blanc, avec un très-grand nombre de taches noires ; pas d'yeux à l'angle anal des inférieures.

194. Polyommate Isarchus.

Dessus des ailes d'un bleu-violet-pâle, avec une tache sur le milieu des supérieures, et une bande sur le milieu des inférieures, blanches : dessous blanc ; celui des inférieures avec deux bandes noires sinuées, et deux yeux argentés à l'angle de l'anus. (Mâle.)

195. Polyommate Lagus.

Ailes entières, d'un violet-luisant en dessus, avec le sommet noir : leur dessous cendré, avec des veines noires. (Mâle.)

196. Polyommate Érinus.

Ailes entières, d'un brun-noirâtre-chatoyant en dessus : leur dessous cendré ; celui des supérieures avec deux taches noires à l'angle interne, celui des inférieures avec des points oculaires peu prononcés à la base.

197. Polyommate Labradus.

Ailes entières, d'un bleu-violet-pâle en dessus : leur dessous cendré ; celui des inférieures avec une multitude d'anneaux blancs et la base bleuâtre. (Mâle.)

198. Polyommate Damoctès.

Ailes entières, d'un brun-noirâtre en dessus : leur dessous avec des ondes cendrées ; celui des inférieures ayant deux yeux dorés. Fab.

199. Polyommate Damæus.

Ailes entières, d'un brun-noirâtre-chatoyant en dessus : leur dessous grisâtre, avec une multitude d'anneaux bruns cerclés de blanc ; angle anal des inférieures offrant deux yeux à iris fauve. (Femelle.)

200. Polyommate Catilina.

Ailes entières, d'un brun-noirâtre à reflet bleu : leur dessous fascié de blanc ; celui des inférieures avec deux yeux bleus à l'angle de l'anus. Fab.

201. Polyommate Céraunus.

Ailes entières, d'un brun-noirâtre à reflet bleu : leur dessous cendré ; celui des inférieures avec des points noirs oculaires à la base, un œil et un point à l'extrémité. Fab.

202. Polyommate Minéréus.

Ailes entières, d'un brun-noirâtre : dessous des inférieures avec des points rouges oculaires, et un œil anal. Fab.

203. Polyommate Bazoche.

Ailes entières, d'un brun-noirâtre en dessus, avec le disque des inférieures bleu : dessous des supérieures ayant à l'extrémité une bande blanchâtre en forme de hachette, dessous des inférieures marbré. (Mâle.)

204. Polyommate Ubaldus.

Dessus des ailes d'un bleu-violet chez le mâle, *d'un brun-noirâtre chez la* femelle : *dessous cendré ; celui des inférieures offrant trois points noirs oculaires à la base, puis des anneaux et des taches carrées blancs, et un œil anal doré.*

POLYOMMATE. (Insecte.)

205. Polyommate Messapus.

Dessus des ailes violet, avec le limbe brun : leur dessous cendré et offrant depuis le milieu jusqu'à l'extrémité des anneaux blancs séparés ; celui des inférieures avec deux points noirs sur la côte, et un œil surmonté d'une lunule fauve à l'angle de l'anus. (Mâle.)

206. Polyommate Pirithoüs.

Dessus des ailes d'un violet-bleuâtre (une large bordure brune dans la femelle) : *leur dessous brun et offrant depuis la base jusqu'à l'extrémité des chaînettes blanches ; celui des inférieures avec une bande sinuée continue, et deux yeux violets à l'angle de l'anus.*

207. Polyommate Thespis.

Dessus des ailes d'un bleu-violet, avec le limbe brun et la frange panachée : leur dessous brun, avec des taches blanches en échiquier ; celui des inférieures offrant vers l'angle anal deux points dorés.

208. Polyommate Ochsenheimer.

Dessus des ailes d'un bleu-violet, avec le limbe brun : dessous des supérieures avec le disque fauve et réticulé ; dessous des inférieures brun, avec des anneaux gris, puis une bande flexueuse très-blanche et trois yeux dorés.

209. Polyommate Parsimon.

Ailes entières, d'un brun-obscur en dessus : leur dessous cendré, avec un anneau central, une double ligne arquée et deux rangées de lunules marginales, blanches ; celui des inférieures avec des points oculaires noirs à la base, et un œil argenté à l'angle de l'anus.

210. Polyommate Cisus.

Dessus des ailes d'un violet-bleuâtre, avec le limbe brun : leur dessous cendré et ocellé de noir ; celui des inférieures offrant à l'angle de l'anus une petite bande fauve marquée d'un œil doré.

211. Polyommate Évippus.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre, et glacé de violet à la base : leur dessous d'un gris-satiné, avec une série marginale de taches fauves triangulaires, chargées chacune en avant d'un point noir ocellé, et en arrière d'un trait d'un bleu-argentin.

β. Dessous des ailes avec des points ordinairement ocellés, et ayant vers l'extrémité une bande transverse blanche ou blanchâtre, suivie de taches marginales ou d'une bande fauves.

212. Polyommate Argus.

Ailes entières, d'un bleu-violet en dessus, avec une large bordure brune et une frange blanche : leur dessous d'un cendré-blanchâtre et ocellé de noir ; celui des inférieures avec une bande fauve, sinuée, et chargée d'un rang de points argentés. (Plus grand.)

213. Polyommate Ægon.

Ailes entières, d'un bleu-violet en dessus chez le mâle, *avec une large bordure brune et une frange blanche ; d'un brun-noirâtre chez la* femelle : *leur dessous d'un cendré-obscur et ocellé de noir ; celui des inférieures avec une bande fauve, sinuée, et chargée d'un rang de points argentés.* (Plus petit.)

214. Polyommate Optilète.

Ailes entières, d'un violet-argentin en dessus, avec une bordure noire et une frange blanche : leur dessous d'un cendré-clair et ocellé de noir ; celui des inférieures avec deux lunules fauves et deux points argentés à l'angle de l'anus.

POLYOMMATE. (Insecte.)

215. Polyommate de l'Orpin.

Ailes entières, d'un brun-noirâtre en dessus, avec une frange panachée, la base des quatre, et des annelets marginaux aux inférieurs, violets : dessous blanc, avec une multitude de points noirs non ocellés; celui des inférieures offrant une bande fauve flexueuse.

216. Polyommate Hylas.

Ailes entières, d'un bleu-violet-pâle en dessus (sommet des quatre brun chez la femelle), *avec une lunule centrale noire et une frange panachée : dessous d'un cendré-blanchâtre, avec une multitude de points noirs ocellés; celui des inférieures offrant une bande de cinq lunules fauves.*

217. Polyommate Orbitulus.

Ailes entières, ayant le dessus d'un cendré-argentin dans le mâle, *d'un brun-noirâtre dans la* femelle, *avec une frange blanche : leur dessous cendré, celui des supérieures avec une multitude de points ocellés, celui des inférieures avec une tache blanche en cœur sur le disque et deux lunules roussâtres à l'angle de l'anus.*

218. Polyommate Titus.

Ailes entières, d'un brun-noirâtre et sans taches en dessus : dessous des inférieures ocellé et offrant une série postérieure de taches fauves. Fab.

219. Polyommate Artaxercès.

Ailes entières, d'un brun-noirâtre : dessus des supérieures avec un point médiaire blanc : dessous des quatre avec des taches ainsi que le limbe postérieur blancs, et une série terminale de lunules rousses.

γ. Dessous des ailes avec des points ocellés; celui des inférieures offrant au-delà du milieu une tache blanche longitudinale, suivie de taches marginales fauves.

220. Polyommate Agestis.

Ailes entières, d'un brun-noirâtre-luisant en dessus : leur dessous cendré, avec une multitude de points noirs ocellés : les quatre ailes ayant de part et d'autre une bande presque terminale de taches rouges et une frange panachée.

221. Polyommate Agestor.

Ailes entières, d'un brun-noirâtre-luisant en dessus : leur dessous d'un cendré-pâle, avec une multitude de points noirs ocellés; yeux voisins de l'angle anal des inférieures argentés : les quatre ailes ayant de part et d'autre une bande presque terminale de taches fauves et une frange panachée. (Femelle.)

222. Polyommate Alexis.

Ailes entières, ayant le dessus d'un bleu-violet chez le mâle, *d'un brun-noirâtre chez la* femelle, *avec une frange blanche : leur dessous cendré, avec la base verdâtre, une multitude de points ocellés, et une bande marginale de taches fauves.*

223. Polyommate Adonis.

Ailes entières, ayant le dessus d'un bleu-azuré un peu violâtre chez le mâle, *d'un brun-noirâtre chez la* femelle, *avec une frange panachée : leur dessous brunâtre, avec la base verdâtre, une multitude de points ocellés, et une bande marginale de lunules fauves.*

224. Polyommate Dorylas.

Ailes entières, d'un bleu d'azur chez le mâle, *d'un brun-noirâtre chez la* femelle, *avec une frange blanche : leur dessous brunâtre, avec la base verdâtre, une multitude de points ocellés, une bande de taches fauves en fer de flèche, et le bord postérieur blanchâtre.*

POLYOMMATE. (Insecte.)

225. Polyommate Tithonus.

Ailes entières, ayant le dessus d'un bleu-argenté à reflet rougeâtre, avec une bordure noire crénelée et une frange blanche : leur dessous cendré, avec une multitude de points ocellés, et une bande marginale de lunules fauves. (Mâle.)

226. Polyommate Triton.

Ailes très-entières, d'un bleu-pâle en dessus : leur dessous cendré, avec une bande ferrugineuse et une multitude de points noirs. Fab.

227. Polyommate Corydon.

Ailes entières, ayant le dessus argenté et chatoyant en verdâtre, avec une bordure ocellée et une frange panachée : leur dessous cendré, avec une multitude de points oculaires; celui des inférieures verdâtre à la base, et offrant à l'extrémité une série de lunules fauves.

228. Polyommate Méléagre.

Ailes dentées, ayant le dessus d'un bleu-argenté à reflet rougeâtre, avec une bordure noire et une frange blanche : dessous du mâle *blanchâtre, dessous de la* femelle *brunâtre, avec des points noirs ocellés, et un double cordon marginal de lunules blanchâtres.*

♂. Dessous des ailes avec des points ocellés : celui des inférieures offrant des lunules marginales fauves, mais n'ayant pas de tache blanche longitudinale au-delà du milieu.

229. Polyommate Agathon.

Ailes un peu dentées, ayant le dessus d'un bleu-argenté à reflet verdâtre, avec une bordure noire et une frange blanche : leur dessous d'un cendré-pâle, avec des points ocellés; celui des inférieures verdâtre à la base, et marqué de quatre lunules fauves à l'angle de l'anus.

230. Polyommate Icarius.

Ailes entières, ayant le dessus d'un bleu-violet à reflet argentin, avec une bordure brune et une frange blanche : leur dessous cendré, avec une lunule centrale et une rangée de points ocellés; celui des inférieures offrant une bande fauve, maculaire, et suivie d'un cordon marginal de points noirs.

♀. Dessous des ailes avec des points ocellés : celui des inférieures ayant sur le milieu une bandelette longitudinale blanche ou blanchâtre.

231. Polyommate Damon.

Ailes entières, ayant le dessus d'un bleu-argenté chez le mâle, *d'un brun-noirâtre chez la* femelle : *leur dessous d'un cendré-rougeâtre, avec une rangée transverse de points ocellés; celui des inférieures divisé par une bandelette blanche allant de la base au bord postérieur.*

232. Polyommate Lefebvre.

Ailes entières : dessus du mâle *d'un bleu-argenté, avec la base des ailes supérieures garnie d'un duvet jaunâtre; dessus de la* femelle *d'un brun-noirâtre, avec le bord postérieur noir : dessous cendré ou brunâtre, avec une rangée transverse de points ocellés; celui des inférieures divisé par une bandelette longitudinale blanchatre.*

233. Polyommate Eumédon.

Ailes entières, ayant le dessus d'un brun-noirâtre-luisant : leur dessous d'un cendré-obscur, avec des points noirs oculaires et des lunules marginales roussâtres; celui des inférieures verdâtre à la base, et offrant une bandelette blanche longitudinale en forme de marteau.

POLYOMMATE. (Insecte.)

234. Polyommate Admète.

Ailes entières, ayant le dessus d'un brun-noirâtre, avec une frange blanche (des lunules marginales fauves aux inférieures chez la femelle) : *leur dessous d'un cendré-jaunâtre, avec une rangée de points oculaires sur les quatre, et une lunule centrale noire sur les supérieures.*

♀. Dessous des ailes n'offrant que des taches ocellées.

235. Polyommate Arion.

Dessus des ailes d'un bleu-argenté-obscur, avec des taches discoïdales très-noires sur les quatre, et des yeux à l'extrémité des inférieures : leur dessous cendré, avec une lunule centrale et quatre rangées de points oculaires ; celui des inférieures d'un vert-argentin à la base.

236. Polyommate Alcon.

Dessus des ailes d'un bleu-violet-obscur, avec une large bordure d'un brun-noirâtre : leur dessous cendré, avec une lunule centrale, et trois rangées de points oculaires, noires ; celui des inférieures d'un vert-argentin depuis la base jusqu'au milieu.

237. Polyommate Euphémus.

Dessus des ailes d'un bleu-violet-pâle, sans taches dans le mâle, *avec une large bordure brune et des points noirâtres sur le disque des supérieures dans la* femelle : *dessous cendré, avec une lunule centrale, et deux rangées de points oculaires, noires.*

238. Polyommate Érébus.

Dessus du mâle *d'un bleu-violâtre, avec une ligne transverse de taches et une bordure noires ; dessus de la* femelle *d'un brun-noirâtre : leur dessous brun, avec une ligne anguleuse de points oculaires noirs.*

239. Polyommate Iolas.

Dessus des ailes d'un bleu-violet-luisant, avec une frange blanche (une large bordure brune chez la femelle) : *leur dessous d'un cendré-incarnat, avec un arc central, et une rangée courbe de points oculaires, noirs ; trois lunules noires à l'angle anal des inférieures.*

240. Polyommate Lysimon.

Dessus des ailes d'un bleu-violet-luisant, avec une bordure d'un brun-noirâtre et une frange panachée : leur dessous cendré, avec des points noirs oculaires à la base ainsi que sur le milieu, et deux rangs de lunules obscures à l'extrémité.

241. Polyommate Hylax.

Ailes entières, d'un brun-noirâtre et sans taches en dessus : leur dessous cendré, avec des points noirs. Fab.

242. Polyommate Cajus.

Ailes entières, d'un brun-noirâtre, avec le disque d'un bleu-violet : leur dessous varié de blanc et de cendré, avec des points noirs oculaires. Fab.

243. Polyommate Phérétès.

Dessus du mâle *d'un bleu-violet, dessus de la* femelle *d'un brun-noirâtre, avec une frange blanche : leur dessous d'un cendré-verdâtre ; celui des ailes supérieures avec une lunule centrale et une ligne courbe de points noirs oculaires, celui des inférieures avec une double rangée de taches blanches.*

POLYOMMATE. (Insecte.)

244. Polyommate Cyllarus.

Dessus des ailes d'un bleu-violet, avec une bordure noire : leur dessous d'un cendré-clair, avec une ligne transverse de points noirs oculaires ; celui des inférieures d'un vert-argenté depuis la base jusqu'au-delà du milieu.

245. Polyommate Acis.

Dessus du mâle *d'un violet-bleuâtre, avec une bordure noire; dessus de la* femelle *d'un brun-noirâtre : leur dessous d'un cendré-obscur, avec une lunule centrale, et une rangée de points oculaires, noires.*

246. Polyommate Alsus.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre-luisant (saupoudré de bleu chez le mâle) : *leur dessous d'un cendré-bleuâtre, avec une lunule centrale, et une rangée de points oculaires, noires.*

A. Ailes supérieures ayant la côte plus ou moins arquée vers son origine. Ailes inférieures avec trois queues plus ou moins longues.

1. Polyommate Faunus.

Polyommatus Faunus.

Pol. alis suprà fusceſcenti-violaceis, apice atro : ſubtùs albis, ſtrigâ mediâ fulvâ lineâque marginali nigricante.

Papilio P. R. Faunus, *alis tricaudatis, fuſcis : ſubtùs albis, ſtrigis duabus fulvis.* Fab. *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 65. *n°.* 613.

Heſperia R. *Faunus.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 261. *n°.* 11.

Papilio Faunus. Cram. *Pap. pl.* 39. *fig.* B. C. (Le mâle.) *pl.* 96. *fig.* F. G. (La femelle.)

Papilio Faunus. Drury, *Inſ. tom.* 2. *pl.* 1. *fig.* 4. 5.

Son envergure eſt d'environ un pouce & demi. Le mâle a le deſſus des ailes d'un violet-obſcur, avec le ſommet des ſupérieures d'un noir-mat, le bord terminal des inférieures garni d'une frange blanche & ſurmonté vers l'anus de cinq points blancs. Les queues de ces dernières ailes ſont en outre totalement blanches.

Le deſſous eſt blanc, avec deux lignes tranſverſes, dont l'antérieure fauve, diſcoïdale, plus large & bordée de brun ; la poſtérieure noirâtre & ſituée à peu de diſtance du bord. Ces lignes forment aux ſecondes ailes un coude, au-deſſous duquel il y a deux taches anales noires & ſablées de bleu-verdâtre.

La femelle diffère du mâle en ce que le deſſus de ſes quatre ailes eſt largement bordé de noir-mat, & en ce que la première tache anale du deſſous des inférieures eſt bordé de rouge-ſanguin en arrière.

De Sierra-Leone.

Nota. Dans les figures de Cramer, le bord poſtérieur des premières ailes eſt trop arrondi, & la queue anale des ſecondes n'a tout au plus que le tiers de ſa longueur ; mais ce dernier défaut vient indubitablement de ce que les ſujets qui ont ſervi de modèle étoient mutilés.

2. Polyommate Héſiode.

Polyommatus Heſiodus.

Pol. alis tricaudatis, atris, diſco cæruleo : ſubtùs albis, ſtrigâ communi vireſcente punctiſque duobus anguli ani atro-argenteis. Fab.

Heſperia R. *Heſiodus.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 260. *n°.* 8.

Papilio Heſiodus. Jon. *Fig. pict.* 6. *tab.* 9. *fig.* 4.

Fabricius rapporte ce Polyommate à la femelle du *Faunus* de Cramer, mais il paroît appartenir à une autre eſpèce, à en juger du moins par la différence d'*habitat* & par la deſcription que voici.

Le deſſus des quatre ailes eſt d'un noir-mat, avec le diſque largement bleu. Les ailes inférieures ont l'angle de l'anus marqué d'un point blanc, & le bord terminal garni d'une frange blanche. Leurs trois queues ſont blanches & bordées de noir.

Le deſſous eſt blanc, avec une ligne verdâtre, tranſverſe, diſcoïdale, plus courte aux ailes inférieures, & s'y joignant à un arc qui va de l'angle externe au milieu du bord interne. L'angle anal des premières ailes offre deux points noirs & celui des ſecondes deux points argentés.

De l'Inde.

(*Traduction de Fabricius.*)

3. Polyommate Hélius.

Polyommatus Helius.

Pol. alis ſuprà cæruleis, anticarum apice latiſſimè nigro : ſubtùs cinereis, ſtrigis tribus continuis fuſcis ; poſticis ocellis duobus anguli ani iride rufâ. (Mas.)

Papilio P. R. Helius, *alis tricaudatis : anticis nigris, poſticis cæruleis : ſubtùs cinereis, ſtrigis duabus brunneis ocelliſque duobus anguli ani.* Fab. *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 65. *n°.* 608.

Heſperia R. *Helius.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 259. *n°.* 4.

Papilio Helius. Herbst, *Pap. tab.* 303. *fig.* 3. 4.

Papilio Euriſus. Cram. *pl.* 221. *fig.* D. E. (Le mâle.)

Il a approchant un pouce & demi d'envergure. Le deſſus des ailes eſt d'un bleu-luiſant, avec le ſommet des ſupérieures très-largement noir. Les ailes inférieures ont les queues noires, avec le bout blanc.

Le deſſous des quatre ailes eſt cendré, avec trois raies brunes, tranſverſes & continues. Outre cela, on voit à l'angle anal des ſecondes ailes deux yeux noirs à iris roux. L'œil intérieur eſt bordé en arrière par un croiſſant d'atomes bleuâtres.

De la côte de Guinée.

N. B. Nous n'avons vu que le mâle, encore étoit-il défectueux.

4. Polyommate Moncus.

Polyommatus Moncus.

Pol. alis tricaudatis, fuſcis : ſubtùs niveis,

nigro subfasciatis ; posticis ocellis duobus auratis. Fab.

Papilio P. R. *Moncus.* Fab. *Mant. Inf. tom.* 2. *pag.* 65. *n°.* 612.

Hesperia R. *Moncus.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *pag.* 261. *n°.* 10.

Ne connoissant point ce lépidoptère, nous sommes obligés de le donner avec le nom qui lui a été imposé par Fabricius.

Il est petit. Le dessus de ses ailes est d'un brun-noirâtre, sans aucune tache aux supérieures, avec quelques lignes blanches sur le bord terminal des inférieures. Les trois queues de ces dernières ailes sont blanches & très-courtes.

Le dessous des quatre ailes est très-blanc. Celui des supérieures a une tache centrale transverse, une bande & l'extrémité, noires. Celui des inférieures a trois points à la base, une bande interrompue sur le milieu, une liture à l'extrémité, pareillement noirs. On voit en outre vers l'angle anal deux yeux noirs, saupoudrés d'or & entourés d'un iris fauve.

De l'Afrique équinoxiale.
(*Traduction de Fabricius.*)

5. Polyommate Pythagore.

Polyommatus Pythagoras.

Pol. alis atris, singularum supra disco fulvo : subtus fasciis tribus transversis lineâque geminâ marginali albis ; posticis ocellis duobus anguli ani argentatis.

Hesperia R. Pythagoras ; *alis tricaudatis, atris, limbo flavo : subtus nigris albo variis fasciâque mediâ albâ.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 259. *n°.* 6.

Papilio Pythagoras. Jon. *Fig. pict.* 6. *tab.* 14. *fig.* 4.

Papilio Pythagoras. Donow. *of an Epitome of the Nat. Hist. Insects of India, cah.* 1. *pl.* 3. *fig.* 3.

Papilio P. R. Juba, *alis integerrimis, nigris, disco fulvo : subtus fasciâ strigisque abbreviatis albis.* Fab. *Mant. Inf. tom.* 2. *pag.* 82. *n°.* 738.

Hesperia R. *Juba.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *pag.* 314. *n°.* 190.

Les papillons *Pythagoras* & *Juba* de Fabricius, quoique placés à 184 numéros l'un de l'autre, appartiennent incontestablement à la même espèce. Le double emploi vient de ce que le *Pythagoras* a été figuré d'après un individu qui avoit ses queues, mais chez lequel les yeux du dessous des ailes inférieures étoient effacés, & de ce que le *Juba* au contraire avoit été antérieurement décrit, dans le cabinet du docteur Pflug, d'après un individu sans queue, mais qui avoit conservé les taches oculaires des secondes ailes.

Il a de treize à quatorze lignes d'envergure. Le dessous des ailes est d'un noir-brun, avec le milieu des supérieures & des inférieures fauve. Les ailes inférieures ont en outre quatre ou cinq petits anneaux fauves sur le bord terminal.

Le dessous est à peu près du même noir que le dessus, avec trois bandes transverses, & une double ligne marginale, blanches. La bande intermédiaire est beaucoup plus large que les deux autres. La bande postérieure est bifide aux premières ailes, & fortement interrompue aux secondes. Ces dernières ailes ont, vis-à-vis des queues, deux yeux très-noirs, sablés de bleu-argenté, & bordés antérieurement par un croissant fauve. L'œil anal est double. Les antennes sont noires, annelées de blanc & terminées de fauve.

De l'Afrique occidentale.

6. Polyommate Larydas.

Polyommatus Larydas.

Pol. alis supra maris *obscurè violaceis*, fœminæ *albido-cærulescentibus : subtus fuscis, annulis numerosis albis ; posticis ocellis duobus anguli ani argenteis.*

Papilio Larydas. Cram. *pl.* 282. *fig.* H.

Papilio Larydas. Herbst, *Pap. tab.* 296. *fig.* 1.

Papilio Sylvanus. Drury, *Inf. exot. tom.* 2. *pl.* 3. *fig.* 2. 3. (Var.)

Il a environ un pouce & demi d'envergure. Le dessus du mâle est entièrement d'un violet-foncé. Le dessus de la femelle, selon Cramer, est d'un bleu très-pâle & tirant sur le blanchâtre.

Le dessous des deux sexes est d'un brun-obscur, avec une multitude d'anneaux blancs, dans l'intérieur de la plupart desquels le fond devient plus intense, ce qui forme en quelque sorte des taches oculaires. Outre cela, l'angle anal des ailes inférieures offre deux yeux noirs, saupoudrés de bleu ou de vert-argenté, & entourés d'un iris roux.

Nous avons vu un mâle qui n'avoit pas d'anneaux blancs à la partie antérieure du dessous des premières ailes. Il répond à la variété que Drury a figurée sous le nom de *Sylvanus.*

De la côte occidentale d'Afrique, & principalement de Sierra-Leone.

Nota. Cramer ne représente que deux queues, mais il y en a trois chez les individus bien conservés.

7. Polyommate Hymen.

Polyommatus Hymen.

Pol. alis tricaudatis, fuscis : subtùs albo maculatis : posticis suprà albis. Fab.

Papilio P. R. *Hymen.* Fab. *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 65. *n°.* 616.

Hesperia R. *Hymen.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 262. *n°.* 13.

Les ailes supérieures ont le dessus d'un brun-noirâtre, avec une tache blanchâtre, commune aux ailes inférieures. Leur dessous est brun, avec diverses petites lignes blanches, transversales.

Les ailes inférieures ont trois queues. Leur dessus est blanc, avec une tache brune qui s'étend sur les ailes supérieures. Leur dessous est obscur, avec un grand nombre de petites lignes blanchâtres, le bord postérieur pâle & marqué d'une tache & d'une raie noires.

De Sierra-Leone.

(*Traduction de Fabricius.*)

8. Polyommate Amour.

Polyommatus Amor.

Pol. alis tricaudatis, fuscis : subtùs disco variegato strigâ posticâ aureâ. Fab.

Papilio P. R. *Amor.* Fab. *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 65. *n°.* 610.

Hesperia R. *Amor.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 260. *n°.* 7.

Papilio Amor. Herbst, *Pap. tab.* 302. *fig.* 9. 10.

Papilio Amor. Jon. *Fig. pict.* 6. *tab.* 11. *fig.* 3.

Papilio Triopas. Cram. *pl.* 320. *fig.* G. H.

Les antennes sont annelées de blanc & de noir, & elles ont le bout de la massue ferrugineux. Le corps est brun. Le dessus des ailes est d'un brun-noirâtre, avec une tache blanche transversale sur le milieu des supérieures, & une bande rousse à l'extrémité des inférieures. Ces dernières ailes ont trois queues filiformes, dont l'intermédiaire plus longue.

Le dessous des quatre ailes est jaune, varié de blanc & de noir, avec le limbe terminal brun, & chargé aux secondes ailes d'une ligne dorée.

Des Indes orientales.

(*Traduction de Fabricius.*)

9. Polyommate Agrippa.

Polyommatus Agrippa.

Pol. alis tricaudatis, cœruleis, limbo atro : subtùs cinereis, strigâ albâ maculisque duabus anguli ani. Fab.

Hesperia R. *Agrippa.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 259. *n°.* 3.

Papilio Agrippa. Jon. *Fig. pict.* 6. *tab.* 3. *fig.* 3.

Il est de moyenne taille. Le dessus des ailes est d'un bleu-luisant, avec une bordure noire, mais très-étroite aux inférieures.

Le dessous est cendré, avec une ligne blanche, transversale. Cette ligne est interrompue aux secondes ailes, lesquelles ont à l'angle de l'anus deux taches rousses à prunelle noire.

De l'Amérique.

(*Traduction de Fabricius.*)

Nota. Est-ce bien ici la place de ce lépidoptère? Ne devroit-il pas plutôt être mis dans la division des espèces à deux queues, à côté du polyommate *Sphinx?* Il arrive quelquefois que Fabricius compte la palette anale pour une queue.

10. Polyommate Timon.

Polyommatus Timon.

Pol. alis tricaudatis, basi virescentibus : subtùs albis; posticis fusciâ abbreviatâ sanguineâ. Fab.

Papilio P. R. *Timon.* Fab. *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 65. *n°.* 611.

Hesperia R. *Timon.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 260. *n°.* 9.

Les ailes supérieures ont le dessus d'un brun-noirâtre, avec la base verdâtre. Leur dessous est blanc, avec l'extrémité plus obscure.

Les ailes inférieures sont verdâtres, avec l'extrémité obscure & tachetée de blanc; elles ont trois queues, dont l'extérieure petite, obtuse, noire & ciliée de blanc; l'intermédiaire plus longue, blanche, mais ayant du noir avant le bout; l'intérieure très-longue & toute blanche. Leur dessous est blanc, avec une ligne brune, courte & transverse à la région de l'anus, & une bande sanguine sur laquelle il y a deux taches d'un noir-mat.

De l'Amérique méridionale.

(*Traduction de Fabricius.*)

Nota. Ce lépidoptère devroit peut-être aussi appartenir à la division des espèces à deux queues. Les caractères du dessous des ailes sembleroient du moins l'indiquer.

B. Ailes supérieures ayant la côte plus ou moins arquée vers son origine. Ailes inférieures avec deux queues, dont une ordinairement plus longue.

a. Bord postérieur des premières ailes un peu concave, surtout chez le mâle.

11. Polyommate Marsyas.

Polyommatus Marsyas.

Pol. alis supra virescenti-cœruleis, nitidis, apice nigro : subtùs pallidè violaceis, disco punctis ocellaribus atris; posticis ad angulum ani albo cœrulescentique fasciatis.

Papilio P. R. Marſyas, *alis bicaudatis, ſuprà cæruleis : ſubtùs cæruleſcentibus, punctis nigris.* Linn. *Syſt. nat.* 2. *pag.* 788. *n°.* 225. — *Muſ. Lud. Ulr.* 315.

Papilio P. R. *Marſyas.* Fab. *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 67. *n°.* 635.

Heſperia R. *Marſyas.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *pag.* 272. *n°.* 48.

Clerck, *Icon. tab.* 41. *fig.* 1.

Klemann, *Inſ.* 1. *tab.* 3. *fig.* 1. 2.

Edw. *Av. tab.* 81.

Seba, *Muſ.* 4. *tab.* 3. *fig.* 9. 10.

Seba, *Muſ.* 4. *tab.* 34. *fig.* 15. 16.

Papilio Marſyas. Herbst, *Pap. tab.* 296. *fig.* 1. 2.

Papilio Marſyas. Cram. *pl.* 332. *fig.* A. B. (Le mâle.)

Il a un peu plus de deux pouces d'envergure. Le deſſus des ailes eſt d'un bleu-verdâtre, changeant en violet, avec toute la côte & le ſommet des ſupérieures noirs.

Le deſſous eſt lilas ou d'un violet-pâle & luiſant, avec ſept ou huit points noirs cerclés de blanchâtre, & épars ſur le milieu de chaque aile. La région de l'angle anal des ſecondes ailes eſt en outre d'un bleu-verdâtre, avec deux bandes blanches, courtes & tranſverſes, derrière leſquelles ſont deux taches noires, dont l'extérieure plus ou moins ſenſible en deſſus. Les queues ſont noires, avec le bout blanc. Le corps a le deſſus bleu, le deſſous blanchâtre. Les antennes ſont noires & annelées de gris.

La femelle a le deſſus plus pâle, avec le ſommet des quatre ailes d'un noir-brun.

De la Guyane & du Bréſil.

Nota. Les premières ailes ont le bord poſtérieur un peu concave, ſurtout chez le mâle.

12. Polyommate Ortygnus.

Polyommatus Ortygnus.

Pol. alis ſuprà virescenti-cæruleis, nitidis : ſubtùs pallidè carneis, maculis aliquot diſci nigris; poſticis ad angulum ani ſtrigâ flexuoſâ ocelliſque duobus cæruleſcentibus. (Mas?)

Papilio Ortygnus. Cram. *pl.* 243. *fig.* B.

Papilio Ortygnus. Herbst, *Pap. tab.* 296. *fig.* 7.

Il a près d'un pouce d'envergure. Le deſſus des ailes eſt d'un bleu-verdâtre-luiſant.

Le deſſous eſt d'un incarnat-pâle, avec deux taches noires tranſverſes ſur le milieu des ailes ſupérieures; avec trois points & une ligne ondulée noirs ſur les inférieures. Ces dernières ailes ont l'extrémité un peu jaunâtre, & elles offrent vers l'angle de l'anus une petite bande flexueuſe & deux yeux d'un bleu-verdâtre.

Décrit d'après un individu qui nous a paru être un mâle.

De Surinam.

13. Polyommate Ruſtan.

Polyommatus Ruſtan.

Pol. alis ſuprà cæruleſcentibus, nitidis, apice fuſco : ſubtùs fordidè carneis, fuſciâ geminâ marginali olivaceâ; poſticis punctis duobus baſeos duobuſque anguli ani nigris albo cinctis. (Fem.)

Papilio Ruſtan. Stoll, *Suppl. à* Cram. *pl.* 38. *fig.* 1 & 1 A.

Il a environ deux pouces d'envergure. Le deſſus des ailes eſt d'un bleu-violet, pâle & luiſant, avec une bordure brune, large, ſurtout chez la femelle.

Le deſſous eſt d'un incarnat-obſcur, avec une bande brune, tranſverſe, flexueuſe, interrompue, ſur le milieu de la ſurface, & une double bande olivâtre, continue, le long du bord poſtérieur. La bande du milieu eſt bordée de blanc en arrière, & plus large aux ailes ſupérieures qu'aux inférieures. Ces dernières ailes ont de plus quatre points noirs à iris blanc, ſavoir : un près de l'origine de la côte, un plus petit vers le milieu du bord interne, deux, ſéparés par un groupe d'atomes bleus, à l'angle de l'anus. Il y a en outre des atomes ſemblables ſur la partie la plus intérieure de la bande marginale olivâtre.

Décrit d'après un individu altéré & qui nous a paru être une femelle.

De la Chine, ſelon Stoll.

Mais ne ſeroit-il pas plutôt de l'Amérique? Sa reſſemblance avec pluſieurs eſpèces de ce continent ſembleroit l'indiquer.

14. Polyommate Vénulius.

Polyommatus Venulius.

Pol. alis ſuprà cæruleis : ſubtùs cæruleſcentibus, apice fuſcis tribus nigris tranſverſis; poſticis ocello anguli ani iride fulvâ. (Mas.)

Papilio Venulius. Cram. *pl.* 245. *fig.* G.

Papilio Venulius. Herbst, *pap. tab.* 296. *fig.* 8.

Il a environ un pouce & demi d'envergure. Le deſſus des ailes eſt d'un bleu-clair & ſans éclat.

Le deſſous eſt d'un bleu-pâle, avec trois bandes noires, tranſverſes, placées vers le bord terminal, lequel eſt lui-même liſéré de noir. Les deux bandes antérieures des ſecondes ailes forment

par leur réunion un anneau alongé, & la postérieure est surmontée d'un œil noir à iris fauve & placé vis-à-vis des queues.

La femelle nous est inconnue.

De Surinam.

15. Polyommate Liger.

Polyommatus Liger.

Pol. alis suprà albis, limbo postico nigro : subtùs fuscis, strigis undulatis & lunulis albis ; posticis maculâ disci duabusque anguli ani cœruleis. (Fem. ?)

Papilio P. R. Liger, *alis bicaudatis, albis, apice nigris : subtùs fuscis, strigis lunulisque albis.* Fab. *Spec. Inf. App. n°.* 504.

Papilio P. R. *Liger.* Fab. *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 67. *n°.* 641.

Hesperia R. *Liger.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 274. *n°.* 58.

Papilio Liger. Cram. *pl.* 254. *fig.* E. F.

Papilio Liger. Herbst, *Pap. tab.* 302. *fig.* 1. 2.

L'individu d'après lequel nous donnons cette description nous a paru être une femelle.

Son envergure est à peu près d'un pouce & demi. Le dessus de ses ailes est blanc, avec le limbe postérieur largement noir.

Le dessous est d'un brun-noirâtre, avec une multitude de lignes ondulées & de croissans blancs. Les ailes inférieures offrent en sus trois groupes d'atomes bleus, savoir : un sur le disque, & deux près de l'angle de l'anus.

De Surinam, selon Cramer & Fabricius. Le premier de ces deux auteurs dit qu'on l'a trouvé aussi à Sierra-Leone en Afrique ; il faut alors qu'il l'ait confondu avec une espèce voisine ou qu'il ait eu de faux renseignemens sur l'*habitat*.

16. Polyommate Périclès.

Polyommatus Pericles.

Pol. alis bicaudatis, nigris : subtùs fuscis, albo undatis ; angulo ani maculâ duplici argenteâ. Fab.

Hesperia R. *Pericles.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *pag.* 273. *n°.* 54.

Papilio Pericles. Jon. *Fig. pict.* 6. *tab.* 18. *fig.* 3.

Le dessus des quatre ailes est d'un noir-bleu, sans taches.

Le dessous est d'un brun-noirâtre, avec des lignes blanches ondées. Les ailes inférieures ont en outre quelques points marginaux, dont les deux plus intérieurs argentés, les autres noirs.

Des Indes.

(*Traduction de Fabricius.*)

17. Polyommate Endymion.

Polyommatus Endymion.

Pol. alis suprà virescenti-cœruleis, nitidissimis, margine atro : posticis subtùs strigâ mediâ nigrâ fasciâque ferrugineâ.

Papilio P. R. Endymion, *alis bicaudatis : subtùs viridibus auro rufoque irroratis, posticis strigâ atrâ fasciâque sanguineâ.* Fab. *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 67. *n°.* 629.

Hesperia R. *Endymion.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 268. *n°.* 36.

Papilio Endymion. Herbst, *Pap. tab.* 298. *fig.* 1. 2.

Papilio regalis. Cram. *pl.* 72. *fig.* E. F. (La femelle.)

Il a environ deux pouces d'envergure. Le dessus des ailes est d'un bleu-verdâtre très-brillant, avec une bordure noire, large & sinuée dans la femelle, étroite dans le mâle. L'angle anal des secondes ailes offre en outre une tache d'un rouge-sanguin.

Le dessous des quatre ailes est pâlé de vert-doré, & traversé au milieu par une ligne noire, qui est bordée de bleu-pâle en arrière. Cette ligne est anguleuse aux secondes ailes, & elle y est suivie d'une bande ferrugineuse, dont tout le côté externe est largement saupoudré de bleuâtre. Les queues sont noires, avec le bout blanc.

De Surinam.

18. Polyommate Gabriel.

Polyommatus Gabriel.

Pol. alis suprà virescenti-cœruleis, nitidissimis, margine atro : posticis subtùs apice ferrugineis, strigis tribus lineâque marginali albis.

Papilio P. R. Gabrielis, *alis subtricaudatis, cœruleis, nitidissimis : posticis subtùs antè apicem albo fasciatis.* Fab. *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 65. *n°.* 617. (Le mâle.)

Hesperia R. *Gabrielis.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 262. *n°.* 14. (Le mâle.)

Papilio Gabrielis. Herbst, *Pap. tab.* 303. *fig.* 1. 2.

Papilio Gabriela. Cram. *pl.* 6. *fig.* C. D. (Le mâle.)

Il a environ deux pouces d'envergure. Le dessus de ses ailes est d'un bleu-verdâtre très-brillant, avec une bordure noire, large dans la femelle, très-étroite dans le mâle.

Le dessous des ailes supérieures est d'un bleu-pâle, pâlé de vert-doré, avec deux petites raies ferrugineuses, bordées de blanchâtre &

disposées transversalement en face du sommet. Le dessous des ailes inférieures a la moitié antérieure d'un vert-obscur. L'autre moitié est ferrugineuse, avec quatre lignes blanches, transverses & sinuées, dont l'extérieure marginale & plus étroite. L'angle de l'anus est en outre saupoudré de vert-doré, & l'on y voit deux taches rouges orbiculaires. Les queues sont noires, avec le bout blanc.

De l'Amérique méridionale.

β. Milieu des ailes supérieures du mâle offrant une tache orbiculaire, plus ou moins cotonneuse, & parfois enfoncée.

19. Polyommate Ganymède.

Polyommatus Ganymedes.

Pol. alis suprà virescenti-cœruleis, nitidis, margine atro: subtùs dimidiatim auratis fusco-que, strigis duabus disci cœrulescenti-albis. (Mas.)

Papilio P. R. Ganymedes, *alis bicaudatis, cœrulescentibus, limbo fusco: subtùs baji virescentibus, punctis aureis.* Fab. *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 66. *n°.* 623. (Le mâle.)

Hesperia R. *Ganymedes.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 264. *n°.* 23. (Le mâle.)

Papilio Ganymedes. Cram. *pl.* 40. *fig.* C. D. (Le mâle.)

Papilio Ganymedes. Herbst, *Pap. tab.* 298. *n^os.* 7. 8.

Nous n'avons vu que le mâle. Il n'a guère qu'un pouce & demi d'envergure. Le dessus de ses ailes est d'un bleu-verdâtre-luisant & changeant en violet, avec tout le pourtour extérieur & la tache centrale des supérieures, noirs.

Le dessous est d'un brun-noirâtre, avec la moitié antérieure sablée de vert-doré, & le milieu traversé par deux lignes d'un blanc-bleuâtre, entre lesquelles il y a une bande ferrugineuse. L'angle anal des secondes ailes offre en outre quelques points dorés.

Des Indes occidentales.

20. Polyommate Vénus.

Polyommatus Venus.

Pol. alis suprà cyaneis, nitidis, apice nigro: subtùs viridi-aureis, posticis nigro irroratis. (Mas.)

Papilio P. R. Venus, *alis bicaudatis: subtùs anticis viridibus auro irroratis; posticis aureis, viridi auroque maculatis.* Fab. *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 67. *n°.* 630. (Le mâle.)

Papilio P. R. Aëtæon, *alis tricaudatis, cœrulescentibus, apice nigris: subtùs aureis, atomis nigris.* Fab. *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 65. *n°.* 614. (La femelle?)

Hesperia R. *Venus.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 268. *n°.* 37.

Papilio Venus. Herbst, *Pap. tab.* 294. *fig.* 1. 2.

Papilio imperialis. Cram. *pl.* 76. *fig.* E. F.

Il a à peu près un pouce & demi d'envergure. Le dessus des ailes est d'un bleu-barbeau-luisant, avec le sommet & les queues noirs, & deux points ferrugineux au centre des ailes supérieures du mâle.

Le dessous est d'un vert-doré, avec environ les trois quarts antérieurs des secondes ailes aspergés de noir-obscur.

Le papillon *Aëtæon* de la Mantissa de Fabricius pourroit être la femelle, car il ne semble différer de son papillon *Venus* que parce qu'il a le dessus des ailes d'un bleu plus pâle.

De Surinam.

21. Polyommate Ematheon.

Polyommatus Ematheon.

Pol. alis suprà cyaneis, nitidis, limbo nigro: subtùs nigris, cœrulescenti irroratis. (Mas.)

Papilio P. R. Ematheon, *alis bicaudatis, cœruleo nitidis: subtùs atris, cœruleo irroratis.* Fab. *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 66. *n°.* 626.

Hesperia R. *Ematheon.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 266. *n°.* 26.

Papilio Ematheon. Cram. *pl.* 63. *fig.* F. G.

Papilio Ematheon. Herbst, *Pap. tab.* 295. *fig.* 5. 6.

Il a un peu plus d'un pouce & demi d'envergure. Le dessus des ailes est d'un bleu-barbeau-luisant, avec le pourtour extérieur noir, mais plus largement aux supérieures qu'aux inférieures.

Le dessous est noir & aspergé de bleu-pâle.

Chez le mâle, le milieu des ailes supérieures offre une grande tache noire. La femelle nous est inconnue.

De Surinam.

22. Polyommate Arogéus.

Polyommatus Arogeus.

Pol. alis utrinquè viridibus, nitidis: posticis subtùs strigis quatuor nigris, anteriori obliquâ abbreviatâque, penultimâ subcœruleo marginatâ.

Papilio Arogeus. Cram. *pl.* 333. *fig.* A. B.

Papilio Arogeus. Herbst, *Pap. tab.* 292. *fig.* 8. 9.

Il a de un pouce & demi à deux pouces d'ex-

vergure. Le deſſus des ailes eſt d'un vert-bleuâtre-luiſant, avec le ſommet des ſupérieures légèrement noirâtre. Ces ailes offrent dans le mâle un œil brun, placé vers le milieu de la côte.

Le deſſous eſt à peu près du même ton que le deſſus, & l'on voit ſur les ſecondes ailes quatre lignes noires, dont l'antérieure courte & oblique, la ſuivante ondulée, la pénultième bordée de bleuâtre, la poſtérieure plus large, & quelquefois moins prononcée que les autres. Les ailes ſupérieures ont aſſez ſouvent une ligne noire, tranſverſe & flexueuſe.

Nous avons vu une variété mâle qui avoit le deſſous des ailes d'un vert très-obſcur.

De la Guyane & du Bréſil.

23. Polyommate Acmon.

Polyommatus Acmon.

Pol. alis ſuprà viridi-cœruleis, nitidis : poſticis ſubtùs fuſcis, ad angulum ani ſtrigis viridibus.

Papilio P. R. Acmon, *alis caudatis, cœruleis : poſticis ſubtùs atris, apice ſtrigis viridi-aureis.* Fab. *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 70. *n°.* 665.

Heſperia R. *Acmon.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 284. *n°.* 93.

Papilio Acmon. Cram. *pl.* 51. *fig.* C. D.

Papilio Acmon. Herbst, *Pap. tab.* 293. *fig.* 3. 4.

Il a environ un pouce & demi d'envergure. Le mâle a le deſſus des ailes d'un bleu-ardoiſé-luiſant, avec la frange noire. Le deſſous de ſes premières ailes eſt noirâtre vers le bord antérieur, d'un bleu-verdâtre vers le bord interne. Le deſſous de ſes ſecondes ailes eſt d'un brun-noirâtre, avec quatre lignes vertes tranſverſales à la région de l'angle de l'anus, & une ligne arquée de points bleuâtres près de la baſe. Les queues ſont noires de part & d'autre, avec l'extrémité blanche.

La femelle a le deſſus des quatre ailes d'un bleu plus terne & largement bordé de brun-noirâtre. Le deſſous de ſes ailes ſupérieures eſt griſâtre près du bord interne.

Quelquefois le mâle a le ſommet des ailes ſupérieures noir en deſſus.

De Surinam.

24. Polyommate Polibetes.

Polyommatus Polibetes.

Pol. alis ſuprà violaceo-cœruleis, nitidis, limbo poſtico nigro : ſubtùs carneo-fuſcis ; poſticis ſtrigis duabus undulatis cœruleſcentibus punctiſque ſeptem nigris. (Mas.)

Papilio Polibetes. Cram. *pl.* 341. *fig.* B. C.

Papilio Polibetes. Herbst, *Pap. tab.* 287. *fig.* 3. 4.

Il a un pouce & demi d'envergure. Le deſſus des ailes eſt d'un bleu-violet-luiſant, avec le limbe poſtérieur des quatre, & un grand œil au milieu des ailes ſupérieures du mâle, noirs.

Le deſſous eſt d'un brun-incarnat, avec ſept points noirs & deux lignes flexueuſes d'un bleu-cendré aux ailes inférieures. Cinq de ces points ſont diſpoſés ſur le côté interne de la ligne antérieure, les deux autres ſont à la région de l'angle de l'anus, & il y a entr'eux un groupe d'atomes du même bleu que les deux lignes ſuſdites.

Le deſſous des ailes ſupérieures a une rangée centrale de points noirs.

La femelle nous eſt inconnue.

De la Guyane & du Bréſil.

25. Polyommate Hémon.

Polyommatus Hemon.

Pol alis fuſcis : anticis ſuprà immaculatis : ſubtùs omnibus apice obſcuriùs fuſciatis ; poſticis ſtrigis quatuor vireſcentibus undulatis, anticâ longiore punctoque ocellari antrorſum terminatâ.

Papilio P. R. Hemon, *alis bicaudatis, ſuprà fuſcis, immaculatis : poſticis ſubtùs angulo ani fuſciis tribus cœruleis.* Fab. *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 67. *n°.* 633.

Heſperia R. *Hemon.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *pag.* 270. *n°.* 42.

Papilio Hemon. Cram. *pl.* 20. *fig.* D. E.

Papilio Hemon. Herbst, *Pap. tab.* 294. *fig.* 8. 9.

Il a environ un pouce & demi d'envergure. Le deſſus des ailes eſt d'un brun-obſcur, ſans taches aux ſupérieures, avec une ligne noire, ſurmontée d'un croiſſant verdâtre, à l'angle anal des inférieures.

Le deſſous eſt un peu plus pâle que le deſſus, avec deux ou trois bandes noirâtres à l'extrémité des quatre ailes. Les ailes inférieures ont en outre quatre lignes verdâtres, ondulées, dont les trois poſtérieures courtes & placées près de l'angle de l'anus ſur les bandes ſuſdites, l'antérieure longue & terminée près de la côte par un gros point noir, qui eſt bordé de vert-blanchâtre intérieurement.

De la Guyane & du Bréſil.

26. Polyommate Liſus.

Polyommatus Liſus.

Pol. alis ſuprà viridi-cœruleis, nitidis : ſubtùs obſcurè viridibus, ad apicem fuſco faſciatis ; poſticis

posticis frigâ mediâ è punctis cœrulescenti-albis. (Mas.)

Papilio Lisus. Stoll, *Pap. Suppl. à* Cramer, *pl.* 38. *fig.* 2 & 2 B.

Il a près d'un pouce & demi d'envergure. Le dessus des ailes est d'un bleu-luisant, mais chatoyant en vert à la côte & au bord interne.

Le dessous est d'un vert-obscur, avec deux bandes postérieures & le bord terminal bruns. Le milieu des ailes inférieures est en outre traversé par une rangée de points d'un blanc-bleuâtre, derrière lesquels il y a un trait du même blanc.

Nous ne connoissons pas la femelle.

De Surinam.

27. Polyommate Sinnis.

Polyommatus Sinnis.

Pol. alis suprà chalybdineo-cœruleis, nitidis, limbo atro : subtùs virescenti-cinereis, strigis duabus undulatis albis; posticis ad angulum ani fusciâ abbreviatâ viridi-aureâ, puncto lunuláque luteis notatâ. (Mas.)

Il a près d'un pouce & demi d'envergure. Le dessus des ailes est d'un bleu-d'acier-luisant, avec le pourtour extérieur des premières & le limbe terminal des secondes d'un noir-mat.

Le dessous est d'un cendré-verdâtre, avec deux lignes transverses & ondulées d'un blanc-bleuâtre, & bordées de noir sur un de leurs côtés. Indépendamment de cela, les secondes ailes ont vers la base une petite tache de la couleur des lignes susdites, & à la région de l'angle de l'anus une bande d'un vert-doré, bande sur laquelle il y a un chevron & un point jaunes, bordés de noir en avant & en arrière.

Nous n'avons vu que le mâle.

Du Brésil.

Nota. Le préservatif ne nous a pas permis de distinguer si le dessous des ailes a du rouge à son origine.

28. Polyommate Thalès.

Polyommatus Thales.

Pol. alis utrinquè atris : subtùs cœruleo undatis; anticis apice grisescente, posticis ad angulum ani fusciâ abbreviatâ viridi-aureâ.

Hesperia R. Thales, *alis bicaudatis, atris : subtùs lunulis cœruleis; posticis fusciâ abbreviatâ submarginali aureâ.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 268. *n°.* 35.

Papilio Thales. Jon. *Fig. picl.* 6. *tab.* 14. *fig.* 1.

Papilio Thales. Donow. *of an Epit. of the Nat. Hist. Ins. of India, cah.* 7. *pl.* 1. *fig.* 4.

Il a de quatorze à quinze lignes d'envergure. Le dessus des ailes est d'un noir-brun, avec une liture bleuâtre à l'angle interne des inférieures, & quelquefois aussi vers l'extrémité des supérieures.

Le dessous est du même noir que le dessus, avec des lignes bleues, ondulées & interrompues, depuis la base jusqu'au-delà du milieu. Outre cela, le sommet des ailes supérieures est grisâtre, & les inférieures ont à la région de l'angle de l'anus une bande courte d'un vert-doré. Les queues sont noires, avec le bout blanc.

La femelle ressemble au mâle.

Du Brésil.

Nota. Fabricius ne parle pas des atomes grisâtres qui sont au sommet des ailes supérieures en dessous. Peut-être a-t-il vu des exemplaires mal conservés, car du reste sa description se rapporte bien avec la nôtre.

29. Polyommate Nautès.

Polyommatus Nautes.

Pol. alis suprà cyaneis, nervis limboque nigris : posticis subtùs atris, disco vittâ longitudinali flavâ & ponè hanc annulis numerosis cœrulescentibus. (Mas.)

Papilio Nautes. Cram. *pl.* 233. *fig.* F. G.

Papilio Nautes. Herbst, *Pap. tab.* 296. *fig.* 3. 4.

Il a un peu plus d'un pouce & demi d'envergure. Le dessus des quatre ailes est d'un bleu-barbeau, avec l'extrémité des nervures & le limbe postérieur noirs.

Le dessous des ailes supérieures est noir, avec le disque d'un bleu-pâle.

Le dessous des ailes inférieures est d'un noir-obscur, avec une bandelette longitudinale jaune, surmontée d'une lunule bleue, & suivie d'une multitude d'anneaux bleuâtres.

Décrit d'après un individu que nous soupçonnons mâle, quoique privé de corps.

De Surinam.

30. Polyommate Elis.

Polyommatus Elis.

Pol. alis utrinquè viridi-fuscis : posticis subtùs vittâ longitudinali fulvâ & ponè hanc strigis tribus inaurato-viridibus.

Papilio Elis. Cram. *pl.* 233. *fig.* D.

Papilio Elis. Herbst, *Pap. tab.* 296. *fig.* 5.

Nous donnons ce Polyommate d'après Cramer. Il a près d'un pouce & demi d'envergure. Le dessus de ses ailes est d'un brun-verdâtre chatoyant.

Le dessous est à peu près de la couleur du dessus,

avec un arc tranſverſal de trois points bleus ſur le milieu des ailes ſupérieures, & une bandelette longitudinale d'un fauve-obſcur ſur le milieu des inférieures. Cette bandelette eſt ſurmontée de deux points bleus, & ſuivie de trois lignes ondulées & tranſverſes d'un vert-doré.

De Surinam.

Nota. Ne ſeroit-ce pas la femelle du *Nautès?*

31. Polyommate Polybe.

Polyommatus Polybe.

Pol. alis ſuprà cœruleo-viridibus, apice fuſco : ſubtùs virescenti-ochreuceis, atro venoſis, baſi rubro maculatâ.

Papilio P. R. Polybe, *alis poſticis dentatis, reliquis integerrimis, fuſco-virescentibus : ſubtùs viridi-ſericeis, venis atris.* Linn. *Syſt. nat.* 2. *pag.* 787. *n°.* 218. — *Amœn. Acad.* 6. *p.* 404. *n°.* 58.

Heſperia R. Atys, *alis bicaudatis, fuſcis, diſco cœruleo : ſubtùs cinereis, fuſco venoſis, baſi maculâ fulvâ punctiſque albis.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 267. *n°.* 30.

Papilio Atys. Cram. *pl.* 259. *fig.* E. F. G. H.

Papilio Atys. Herbst, *Pap. tab.* 297. *fig.* 7-10.

Papilio Atys. Jon. *Fig. pict.* 6. *tab.* 13. *fig.* 1.

Il a près de deux pouces d'envergure. Le deſſus des ailes eſt d'un vert-bleuâtre-luiſant, avec les nervures & environ le tiers poſtérieur de la ſurface d'un noir-velouté. Le mâle a vers le milieu de la côte des premières ailes une double tache oculaire brune.

Le deſſous eſt d'un jaune-verdâtre, mais oblitéré au milieu des premières ailes, avec des veines d'un noir-mat, & trois taches baſilaires d'un rouge-cinabre. Les ſecondes ailes ont la région anale coupée tranſverſalement de noir & de vert-doré, & la palette du bord interne ſaupoudrée de bleu. Le corps eſt bleu en deſſus; il eſt noir en deſſous, avec le ventre orangé & la poitrine ponctuée de vert-doré.

De la Guyane & du Bréſil.

Nota. Linné a décrit un individu dont les queues étoient en partie caſſées & ne repréſentoient plus que des dents. Il paroît auſſi que Fabricius n'a pas vu ce Polyommate frais, puiſqu'il dit que le deſſous des ailes eſt d'un cendré-obſcur, avec les taches de la baſe fauves.

32. Polyommate Haléſus.

Polyommatus Haleſus.

Pol. alis ſuprà virescenti-cœruleis margine nigro, ſubtùs fuſcis coſtâ baſeos rubrâ : poſticis utrinquè angulo ani auro maculatis.

Papilio P. R. Haleſus, *alis bicaudatis, cœruleis margine nigro : poſticis utrinquè auro maculatis.* Fab. *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 67. *n°.* 638.

Heſperia R. *Haleſus.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 273. *n°.* 52.

Papilio Haleſus. Cram. *pl.* 98. *fig.* B. C. (Le mâle.)

Papilio Haleſus. Herbst, *Pap. tab.* 295. *fig.* 1. 2.

Il a entre un pouce & demi & deux pouces d'envergure. Le deſſus des ailes eſt d'un bleu-verdâtre changeant en violet, avec une bordure noire, aſſez large dans le mâle, ſinuée & occupant la moitié poſtérieure de la ſurface dans la femelle.

Le deſſous des quatre ailes eſt d'un brun-noirâtre, avec l'origine de la côte rouge & accompagnée de quelques points bleuâtres. L'angle anal des ailes inférieures offre pluſieurs groupes d'atomes d'un vert-doré, puis des points d'un bleu-violâtre. Le corps eſt bleu en deſſus, brun en deſſous, avec le ventre orangé.

Dans le mâle, la tache brune du milieu des premières ailes eſt marquée d'un petit croiſſant rougeâtre.

De l'Amérique ſeptentrionale, ſelon Fabricius.

33. Polyommate Syncelle.

Polyommatus Syncellus.

Pol. alis ſuprà violaceo-cœruleis, nitidis, limbo communi nigro : ſubtùs fuſcis; anticis coſtâ baſeos rubrâ, poſticis ſeſqui ſtrigâ undulatâ virescente punctiſque duobus analibus nigris. (Mas.)

Papilio Syncellus. Cram. *pl.* 334. *fig.* A. B.

Papilio Syncellus. Herbst, *Pap. tab.* 287. *fig.* 1. 2.

Papilio Bitias. Cram. *pl.* 104. *fig.* E. (Var.?)

Il a de treize à quatorze lignes d'envergure. Le deſſus de ſes ailes eſt d'un bleu-violet-luiſant, avec le limbe poſtérieur des quatre, & un petit œil au milieu des ſupérieures, noirs.

Le deſſous eſt d'un brun-noirâtre, avec l'origine de la côte des ſupérieures rouge, & deux lignes verdâtres, tranſverſes, ondulées, dont la poſtérieure plus courte, aux ailes inférieures. Ces dernières ailes ont à la région de l'angle de l'anus deux points noirs ſéparés par un groupe d'atomes verdâtres.

Le deſſous des premières ailes offre parfois une ligne ſemblable à celle des ſecondes ailes.

Le papillon *Bitias* de Cramer n'en eſt peut-être qu'une variété, car il paroît n'en différer que par l'abſence des deux points à l'angle anal des ailes inférieures en deſſous.

Nous ne connoiſſons point la femelle.
De Surinam.

34. Polyommate Narbal.

Polyommatus Narbal.

Pol. alis ſuprà cyaneis, nitidis, apice nigro : ſubtùs fuſcis ſingularum coſtâ baſeos rubrâ; poſticis ſtrigâ undulatâ albâ punctiſque duobus ocellaribus, altero baſilari, altero anali, nigris. (Mas.)

Papilio Narbal. Stoll, *Suppl. à* Cram. *pl.* 38. *fig.* 6 & 6 F.

Il a près d'un pouce & demi d'envergure. Le deſſus des quatre ailes eſt d'un bleu-barbeau-luiſant, avec le ſommet noir. Les ailes ſupérieures du mâle ont vers le milieu de la côte une tache oculaire griſâtre.

Le deſſous eſt d'un brun-obſcur, avec l'origine de la côte de toutes les ailes rouge. Les premières ailes ſont ſans taches. Les ſecondes ont une ligne blanche, tranſverſe, ondulée, interrompue, & bordée de noir à ſon côté interne; on y voit en outre deux taches ocellées noires, dont l'une vers le milieu du bord antérieur, l'autre à l'échancrure anale. Le corps eſt de part & d'autre du même ton que les ailes.

La femelle nous eſt inconnue.

De la Guyane & du Bréſil.

35. Polyommate Inachus.

Polyommatus Inachus.

Pol. alis ſuprà cæruleis, limbo nigro : ſubtùs fuſcis, coſtâ, baſeos rubrâ ſtrigâque mediâ albâ; ſtrigâ poſticarum puncto ocellari antrorsùm terminatâ. (Mas.)

Papilio Inachus. Cram. *pl.* 36. *fig.* D. I.

Papilio Inachus. Herbst, *Pap. tab.* 299. *fig.* 1. 2.

Nous ne connoiſſons ce lépidoptère que par un individu mâle & unique.

Il a environ un pouce & demi d'envergure. Le deſſus des ailes eſt d'un bleu-changeant, avec le bord poſtérieur noir.

Le deſſous eſt d'un brun-obſcur, avec l'origine de la côte rouge, & le milieu coupé obliquement par une ligne blanche ondulée. La ligne des ſecondes ailes eſt ſurmontée d'un point oculaire noir, & ſuivie de deux ou trois traits verdâtres, diſpoſés tranſverſalement vers l'angle de l'anus. La poitrine eſt en outre ponctuée de blanc-bleuâtre.

Des Indes occidentales.

36. Polyommate Pétus.

Polyommatus Petus.

Pol. alis ſuprà cæruleis, nitidis, limbo atro : ſubtùs fuſcis, baſi rufis albo punctatis.

Heſperia R. Petus, *alis ſubtricaudatis, cæruleis, limbo atro : ſubtùs fuſcis, baſi rufis albo punctatis.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 264. *n°.* 21.

Papilio P. R. *Getus.* Fab. *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 66. *n°.* 621.

Papilio Pelops. Cram. *pl.* 341. *fig.* A.

Papilio Pelopus. Herbst, *Pap. tab.* 287. *fig.* 5. 6.

Nous ne connoiſſons ce Polyommate que par la deſcription de Fabricius & par la figure de Cramer.

Il a à peu près un pouce & demi d'envergure. Le deſſus de toutes ſes ailes eſt d'un bleu-violet-luiſant, avec le limbe poſtérieur noir.

Le deſſous eſt d'un brun-obſcur, avec la baſe rouſſe & ponctuée de blanc. L'extrémité des ailes inférieures eſt en outre coupée tranſverſalement par quelques lignes verdâtres ondulées.

De Surinam.

37. Polyommate Céranus.

Polyommatus Ceranus.

Pol. alis caudatis, cæruleſcentibus : ſubtùs brunneis, baſi albo maculatis. Fab.

Heſperia R. *Ceranus.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 276. *n°.* 66.

Papilio Ceranus. Cram. *pl.* 332. *fig.* C. D.

Papilio Ceranus. Herbst, *Pap. tab.* 287. *fig.* 7. 8.

Papilio Ceranus. Jon. *Fig. pict.* 6. *tab.* 3. *fig.* 4.

Voici ce qu'en dit Fabricius : Il eſt de moyenne taille. Le deſſus de toutes ſes ailes eſt d'un bleu-pâle, avec l'extrémité d'un brun-noirâtre.

Le deſſous eſt d'un brun-foncé, avec des points blancs à la baſe. Il y a en outre quelques traits bleuâtres à l'angle anal des ailes inférieures.

De Surinam.

N. B. Ne ſeroit-ce pas la femelle ou une variété du *Pétus ?*

38. Polyommate Didymaon.

Polyommatus Didymaon.

Pol. alis tricaudatis, fuſcis : ſubtùs baſi rubris punctis ocellaribus albis. Fab.

Papilio P. R. *Didymaon.* Fab. *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 66. *n°.* 627.

Heſperia R. *Didymaon.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 266. *n°.* 27.

Papilio Didymaon. Cram. *pl.* 134. *fig.* A.

Papilio Didymaon. Herbst, *Pap. tab.* 300. *fig.* 1. 2.

Le deſſus des ailes eſt brun, avec un reflet bleu. Le deſſous eſt également brun, avec la baſe rouge & chargée de points blancs ocellés. On voit de plus à l'angle anal des ſecondes ailes une liture verdâtre, environnée de noir.

De Surinam.

N. B. Nous ſerions portés à croire, d'après l'inſpection de la figure de Cramer, que c'eſt une variété femelle du *Pétus*, mais moins grande que les individus de ſon ſexe.

39. Polyommate Eole.

Polyommatus Æolus.

Pol. alis ſuprà violaceo-cœruleis, nitidis, margine fuſco : ſubtùs fuſcis, albido trifaſciatis; anticis coſtâ baſeos, poſticis puncto anali ſanguineis.

Papilio P. R. Æolus, *alis caudatis, cyaneis : anticis maculâ nigrâ : omnibus ſubtùs faſciâ albâ nigro ſtriatâ.* Fab. *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 70. *n°.* 664. (Le mâle.)

Heſperia R. *Æolus.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 284. *n°.* 90. (Le mâle.)

Papilio Thallus. Cram. *pl.* 259. *fig.* C. D. (Le mâle.)

Papilio Thallus. Herbst, *Pap. tab.* 297. *fig.* 5. 6.

Daubenton, *Pl. enlum.* 18. *fig.* 6. 7.

Papilio P. R. Pelion, *alis ſubtricaudatis, cœruleis, auro punctatis, limbo fuſco.* Fab. *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 66. *n°.* 618. (La femelle.)

Heſperia R. *Pelion.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 263. *n°.* 17. (La femelle.)

Papilio Pelion. Cram. *pl.* 6. *fig.* E. F. (La femelle.)

Papilio Pelion. Herbst, *Pap. tab.* 294. *fig.* 6. 7.

Les Heſpéries rurales *Æolus* & *Pelion* de Fabricius ne ſont, ſuivant nous, qu'une ſeule eſpèce, dont l'*Æolus* eſt le mâle & le *Pelion* la femelle. Il nous ſemble même que Fabricius a décrit la femelle d'après la figure de Cramer.

Son envergure eſt d'environ un pouce & demi. Le deſſus du mâle eſt d'un bleu-violet-luiſant & changeant en verdâtre, avec une légère bordure aux quatre ailes, & un œil au milieu des ſupérieures, noirs.

Le deſſous eſt d'un brun-noirâtre-chatoyant, avec une bande blanche, commune, diſcoïdale, & coupée par les nervures, qui ſont du même brun que le fond. La baſe eſt en outre blanchâtre, & il y a à l'extrémité une bande également blanchâtre, plus apparente dans certains individus que dans d'autres. L'origine de la côte des premières ailes eſt d'un beau rouge-ſanguin, & les ſecondes ailes ont un point de cette couleur avant la plus courte des deux queues.

La femelle a le deſſus des ailes d'un bleu plus pâle & largement bordé de brun-noirâtre. Son deſſous offre les mêmes caractères que celui du mâle, mais le blanc eſt plus ſenſible à la baſe & à l'extrémité, du moins dans l'individu que nous avons vu.

De la Guyane.

40. Polyommate Bathis.

Polyommatus Bathis.

Pol. alis ſuprà maris *nitidè-cœruleis*, fœminæ *albis, apice fuſco : ſubtùs nigris, faſciis tranſverſis albis; anticis puncto baſeos, poſticis angulo ani fulvis.*

Papilio P. R. Bathis, *alis bicaudatis, cœruleis, ocello atro : ſubtùs fuſcis, albo faſciatis, angulo ani rufo.* Fab. *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 67. *n°.* 655. (Le mâle.)

Heſperia R. *Bathis.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 272. *n°.* 49. (Le mâle.)

Papilio Bathis. Jon. *Fig. pict.* 6. *tab.* 10. *fig.* 1.

Papilio Bathis. Herbst, *Pap. tab.* 291. *fig.* 9. 10.

Papilio Battus. Cram. *pl.* 51. *fig.* F. G. (Le mâle.)

Il a un peu plus d'un pouce d'envergure. Le deſſus du mâle eſt d'un bleu-violet-luiſant, avec le bord poſtérieur des quatre ailes d'un brun-noirâtre, l'angle anal des inférieures fauve & marqué d'une ligne blanche.

Le deſſous eſt noir, avec trois bandes blanches tranſverſes aux ailes ſupérieures, & cinq aux inférieures. Ces dernières ailes ont l'angle de l'anus fauve comme en deſſus, & il y a un point de cette couleur à la baſe des ailes de devant.

La femelle diffère du mâle en ce qu'elle a le deſſus d'un blanc-bleuâtre, avec le ſommet des premières ailes largement brun.

De Surinam.

41. Polyommate Phaléros.

Polyommatus Phaleros.

Pol. alis ſuprà maris *violaceo-cœruleis, nitidis*, fœminæ *albidis, apice fuſco : ſubtùs albis, faſciis tranſverſis margineque nigris; poſticis punctis duobus anguli ani argenteo-cœruleſcentibus.*

Papilio P. U. Phaleros, *alis caudatis, ſuprà*

nigro-cœruleis, cicatrice orbiculari concavâ. Linn. *Syst. nat.* 2. *p.* 797. *n°.* 272.

Hesperia R. Chiton, *alis tricaudatis, cœruleis, limbo fusco : subtùs flavescenti-albis, nigro fasciatis.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 262. *n°.* 16. (Le mâle.)

Papilio Chiton. Jon. *Fig. pict.* 6. *tab.* 2. *fig.* 1.

Papilio Chiton. Donow. *of an Epit. of the Nat. Hist. Insects of India, cah.* 1. *pl.* 3. *fig.* 1.

Papilio Silenus. Cram. *pl.* 282. *fig.* E. (La femelle.)

Papilio Agis. Drury, *Inf. tom.* 3. *pl.* 26. *fig.* 3. 4.

Ce lépidoptère est, selon nous, le Plébéien urbicole *Phaleros* de Linné.

Son envergure est à peu près d'un pouce & demi. Le mâle a le dessus d'un bleu-violet-luisant, avec le sommet des quatre ailes d'un brun-noirâtre, & le milieu des supérieures marqué près de la côte d'un œil brun enfoncé & ayant un iris cerné d'un gris de perle.

La femelle a le dessus d'un blanc-bleuâtre-sale, avec le sommet obscur.

Le dessous des deux sexes est blanc, avec trois bandes transverses, & le bord postérieur, noirs. Les deux bandes intérieures des secondes ailes forment un coude avant l'angle de l'anus, & cet angle offre deux points d'un bleu-argentin, placés l'un au-dessus de l'autre. Il y a en outre un peu de fauve près du bord postérieur de chaque aile.

L'individu mâle décrit par Linné avoit perdu une queue, c'est pourquoi la phrase porte tout simplement *caudatis*.

De Surinam.

42. Polyommate Mœlibée.

Polyommatus Melibœus.

Pol. alis suprà violaceo-cœruleſcentibus, apice fusco : subtùs flavescentibus, strigis quinque nigris, mediâ geminatâ.

Hesperia R. Melibœus, *alis bicaudatis, cœruleſcentibus, limbo fusco : subtùs flavescentibus, anticis fusco, posticis nigro strigosis ; angulo ani atro annulis cœruleis.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 271. *n°.* 44.

Papilio Melibœus. Jon. *Fig. pict.* 6. *tab.* 2. *fig.* 2.

Il a un peu plus d'un pouce d'envergure. Le dessus des ailes est d'un bleu-violet-pâle, avec environ la moitié postérieure des premieres ailes & le bord terminal des secondes d'un brun-noirâtre. Le bord des secondes ailes est longé par une ligne bleuâtre sinuée, & au-dessus de laquelle l'angle de l'anus offre un point jaunâtre.

Le dessous est d'un jaune-pâle, mais prenant un ton jaunâtre vers le bout, avec cinq raies noires, transverses, dont la deuxième discoïdale, divisée par un trait jaune aux premières ailes, & par une ligne blanche aux secondes. Ces dernières ailes ont près du bord interne des veines noires, dont les deux antérieures se croisant en X & aboutissant, ainsi que les suivantes, à la région anale, qui est noire & marquée de deux anneaux bleus. La queue intérieure est noire & saupoudrée de bleuâtre; la queue extérieure est courte, noirâtre en dessus, presqu'entièrement rousse en dessous.

La femelle ressemble au mâle, mais elle est d'un bleu plus terne.

Du Brésil.

43. Polyommate Pélagon.

Polyommatus Pelagon.

Pol. alis suprà ardoiſaceis, limbo fusco : subtùs carneo-fuſcescentibus : strigis quatuor obſcurioribus undatis albo marginatis limboque posticò flavido.

Papilio Pelagon. Cram. *pl.* 282. *fig.* C. D. (La femelle.)

Papilio Myrtillus. Cram. *pl.* 380. *fig.* B. C. (La femelle.)

Papilio Pelagon. Herbst, *Pap. tab.* 292. *fig.* 3. 4.

Papilio Myrtillus. Herbst, *Pap. tab.* 286. *fig.* 3. 4.

D'après Cramer, son *Pelagon* & son *Myrtillus* seroient deux espèces différentes, dont l'une ayant deux queues & se trouvant à Sierra-Leone en Afrique; l'autre, pourvue d'une seule queue & propre au territoire de Surinam. Mais si l'on examine bien ces deux lépidoptères, on reconnoîtra, malgré la grossièreté de l'enluminure, que ce sont deux femelles identiques, & que celle qui porte le nom de *Myrtillus* a perdu la plus petite de ses deux queues. Herbst a, selon sa coutume, adopté l'opinion de Cramer.

Le Pelagon n'a tout au plus que quatorze lignes d'envergure. Le dessus de ses ailes est d'un bleu-ardoisé-luisant, avec le bord postérieur obscur.

Le dessous est d'un brun-incarnat-pâle, avec quatre raies plus obscures, transverses, ondulées, bordées de blanc, & le limbe postérieur jaunâtre. L'angle interne des secondes ailes est en outre noirâtre & parsemé d'atomes bleuâtres.

Le mâle a une tache centrale brune sur le dessus des premières ailes, & la bordure de ces mêmes ailes est très-large dans la femelle.

Il habite l'Amérique équinoxiale.

44. Polyommate Anacréon.

Polyommatus Anacreon.

Pol. alis bicaudatis, fuscis : subtùs albo undatis strigâque posticâ maculari fulvâ. Fab.

Hesperia R. *Anacreon.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 268. *n°.* 34.

Papilio Anacreon. Jon. *Fig. pict.* 6. *tab.* 5. *fig.* 4.

Il est petit. Le dessus de ses ailes est d'un brun-noirâtre, sans taches.

Le dessous est un peu plus pâle que le dessus, avec plusieurs ondes blanches, & il offre vers le bord postérieur une ligne fauve, transversale, composée de cinq points aux ailes supérieures, & de trois taches rapprochées, dont l'intermédiaire pupillée de noir, aux ailes inférieures.

Des Indes.

(*Traduction de Fabricius.*)

45. Polyommate Méton.

Polyommatus Meton.

Pol. alis suprà cæruleſcenti-albis, nitidis, apice nigro : subtùs flavido, fusco ferrugineoque variegatis; posticis puncto geminò baseos nigro.

Papilio P. R. Meton, *alis bicaudatis, albis, limbo fusco : anticis maculâ ocellari aureâ.* Fab. *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 67. *n°.* 640.

Hesperia R. *Meton.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 274. *n°.* 56.

Papilio Meton. Cram. *pl.* 201. *fig.* D. E.

Papilio Meton. Herbst, *Pap. tab.* 295. *fig.* 8. 9.

Il a approchant un pouce & demi d'envergure. Le dessus des ailes est d'un blanc-violâtre-luisant, avec le sommet d'un noir-brun. Chez le mâle, le milieu des ailes supérieures offre une tache oculaire d'un jaune-doré.

Le dessous des quatre ailes est varié de jaunâtre, de brun & de ferrugineux, & l'on voit près de la base des inférieures un double point noir.

De Surinam.

46. Polyommate Auguste.

Polyommatus Augustus.

Pol. alis caudatis, albis, limbo fusco : subtùs ferrugineo flavoque variis; posticis strigis duabus cinereis. Fab.

Hesperia R. *Augustus.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 275. *n°.* 62.

Papilio Augustus. Jon. *Fig. pict.* 6. *tab.* 3. *fig.* 1.

Quoique d'après la description de Fabricius ce Polyommate semble n'avoir qu'une queue, nous le placons ici à cause de la grande affinité qu'il a avec le *Méton.*

Il est de moyenne taille. Le dessus de toutes ses ailes est blanc, avec le limbe brun, & un point anal d'un noir-mat.

Le dessous est varié de ferrugineux & de jaune. Outre cela, les ailes inférieures ont un point bafilaire noir à iris jaune, & deux lignes cendrées courbes.

De l'Amérique.

(*Traduction de Fabricius.*)

47. Polyommate Dolilus.

Polyommatus Dolilus.

Pol. alis supra violaceo-cæruleis, nitidis, apice nigro fimbriâque luteâ : subtùs fusco-ruſescentibus, fasciis transversis albis; posticarum anteriore bifidâ.

Papilio Dolylas. Cram. *pl.* 111. *fig.* B. C. (Le mâle.)

Papilio Dolylas. Herbst, *Pap. tab.* 293. *fig.* 7. 8.

Il a de dix à douze lignes d'envergure. Le dessus des ailes est d'un bleu-violet-luisant, avec le sommet d'un noir-brun, & la frange du bord postérieur fauve.

Le dessous est d'un roux-obscur, avec des bandes blanches, transverses, sinuées. Les bandes des premières ailes sont au nombre de sept, dont la quatrième beaucoup plus courte que les autres. Les bandes des secondes ailes sont au nombre de deux, dont l'antérieure bifide près de la côte, la postérieure se dilatant près du sommet & prenant une teinte grisâtre vers l'angle de l'anus.

Le mâle a sur le milieu des premières ailes une grande tache brune oculaire. La femelle paroît avoir la seconde queue très-courte, à moins qu'elle n'ait été caffée dans l'exemplaire que nous avons vu.

Du Brésil & de Surinam.

48. Polyommate Lausus.

Polyommatus Lausus.

Pol. alis supra maris *cyaneis, nitidis,* fœminæ *fuscis intùsque cæruleſcentibus : subtùs violaceo-fuſceſcentibus, singularum strigis tribus undatis angaloque ani albis.*

Papilio Lausus. Cram. *pl.* 233. *fig.* E. (Le mâle.)

Papilio Libanius. Cram. *pl.* 379. *fig.* H. I. (La femelle.)

Papilio Lausus. Herbst, *Pap. tab* 296. *fig.* 6.

Papilio Libanius. Herbst, *Pap. tab.* 288. *fig.* 3. 4.

Il n'a guère qu'un pouce d'envergure. Le dessus

du mâle eſt d'un bleu-barbeau-luiſant, avec une petite tache noire cotonneuſe au milieu des ailes ſupérieures.

Le deſſus de la femelle eſt d'un brun-noirâtre, avec le bord interne d'un bleu-pâle.

Le deſſous des deux ſexes eſt d'un brun-pâle & chatoyant en violet, avec trois lignes tranſverſes, ondulées, & l'angle anal, blancs. Le blanc de l'angle anal des ſecondes ailes eſt marqué d'une tache noire.

De Surinam.

49. Polyommate Sophocle.

Polyommatus Sophocles.

Pol. alis bicaudatis, nigris, diſco communi cœruleo : ſubtùs albis, ſtrigis undatis flaveſcentibus ; poſticis puncto apicis fulvo. Fab.

Heſperia R. *Sophocles.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1, *p.* 267. *n°.* 31.

Papilio Sophocles. Jon. *Fig. pict.* 6. *tab.* 13. *fig.* 2.

Papilio Sophocles. Donow. *of an Epitome of the Nat. Hiſt. Inſects of India, cah.* 7. *pl.* 1. *fig.* 2.

Il eſt de moyenne taille. Le deſſus des quatre ailes eſt d'un brun-noirâtre, avec le milieu bleu.

Le deſſous eſt blanc, avec quelques lignes jaunâtres tranſverſes & très-ondulées. Outre cela, les ailes inférieures ont à l'extrémité un point roux dont le milieu eſt marqué d'un trait noir.

Des Indes.

(*Traduction de Fabricius.*)

50. Polyommate Iſmarus.

Polyommatus Iſmarus.

Pol. alis ſuprà cœruleis, nitidis, limbo nigro : ſubtùs ſuſcis ; poſticis ſtrigis quatuor undulatis albis maculiſque duabus anguli ani rubris.

Papilio Iſmarus. Cram. *pl.* 176. *fig.* F. (Le mâle.)

Papilio Iſmarus. Herbst, *Pap. tab.* 295. *fig.* 7. (Le mâle.)

Papilio Phalanthus. Cram. *pl.* 333. *fig.* C. D. (La femelle ?)

Papilio Phalanthus. Herbst, *Pap. tab.* 293. *fig.* 12. (La femelle ?)

Il a un peu plus d'un pouce d'envergure. Le deſſus du mâle eſt d'un bleu-foncé-luiſant, avec le bord des quatre ailes, & une tache arrondie au milieu des ſupérieures, noirs.

Le deſſous eſt d'un brun-noirâtre, avec deux lignes blanches, tranſverſes, ondulées, aux ailes ſupérieures, & quatre aux ailes inférieures. La région anale de ces dernières ailes offre deux taches rouges, dont l'extérieure lunulée.

Le papillon *Phalanthus* de Cramer nous paroît être la femelle, car il n'en diffère que parce qu'il a le deſſus plus pâle & plus largement bordé de noir, & le deſſous marqué à l'angle anal des ſecondes ailes de trois taches rouges, dont l'intérieure plus grande.

De Surinam.

51. Polyommate Euripide.

Polyommatus Euripides.

Pol. alis bicaudatis, atris, diſco cœruleo : ſubtùs fuſcis ; poſticis ſtrigis angulatis albis maculâque ocellari ruſâ. Fab.

Heſperia R. *Euripides.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 267. *n°.* 32.

Papilio Euripides. Jon. *Fig. pict.* 6. *tab.* 13. *fig.* 4.

Il eſt de moyenne taille. Le deſſus des quatre ailes eſt d'un noir-brun, avec le milieu bleu.

Le deſſous eſt d'un brun-noirâtre, avec une ligne blanche, courte & tranſverſe, aux ailes ſupérieures ; avec deux lignes blanches, anguleuſes, & une grande tache rouſſe à prunelle noire aux ailes inférieures.

Il paroit bien voiſin de l'*Iſmarus* & du *Cupentus.*

Des Indes.

(*Traduction de Fabricius.*)

52. Polyommate Cupentus.

Polyommatus Cupentus.

Pol. alis ſuprà cyaneis, nitidis, apice fuſco : ſubtùs obſcurè cinereis ; poſticis ſtrigis tribus undulatis albis oculoque anali iride fulvâ : ſtrigâ anteriori in annulum medio dilatatâ. (Mus.)

Papilio Cupentus. Cram. *pl.* 337. *fig.* F. G.

Papilio Cupentus. Herbst, *Pap. tab.* 294. *fig.* 4. 5.

Il a près d'un pouce & demi d'envergure. Le deſſus eſt d'un bleu-barbeau-luiſant, avec le ſommet de toutes les ailes d'un brun-noirâtre, & l'œil du milieu des ſupérieures d'un brun-jaunâtre.

Le deſſous eſt d'un cendré-obſcur, avec trois lignes blanches, tranſverſes, preſque droites aux premières ailes, ondulées aux ſecondes. La ligne antérieure des ſecondes ailes a le milieu dilaté en anneau, & il y a entre les queues de ces mêmes ailes une tache fauve, chargée d'une tache noire. L'échancrure anale eſt en outre bordée de fauve.

Nous n'avons pas vu la femelle.

De Surinam.

53. Polyommate Sichée.

Polyommatus Sichæus.

Pol. alis ſuprà cyaneis, nitidis, apice atro : ſubtùs carneo-cinereis ; poſticis ſtrigis duabus undulatis albis maculiſque duabus anguli ani rubris, ſtrigâ poſteriori in annulos antrorsùm dilatatâ. (Mas.)

Papilio Sicheus. Cram. *pl.* 144. *fig.* C. D.

Papilio Sicheus. Herbst, *Pap. tab.* 290. *fig.* 2. 3.

Il a environ un pouce & demi d'envergure. Le deſſus des ailes eſt d'un bleu-barbeau-luiſant, avec la moitié poſtérieure des ſupérieures & le ſommet des inférieures d'un noir-brun.

Le deſſous des quatre ailes eſt d'un cendré-luiſant & un peu violâtre, avec deux lignes blanches, tranſverſes, ondulées, dont la poſtérieure moins diſtincte aux premières ailes. La ligne poſtérieure des ſecondes ailes ſe dilate antérieurement en anneaux chevronnés, & ces mêmes ailes ont à la région de l'anus deux taches d'un rouge-fauve, leſquelles ſont quelquefois marquées d'un point noir en arrière. La tache intérieure ſe répète en deſſus à l'échancrure du bord abdominal. Le corps eſt de la couleur des ailes, & les queues ſont noires, avec le bout blanc.

Nous n'avons vu que des mâles, Cramer a probablement repréſenté la femelle, car, dans ſa figure, le bleu du deſſus des ailes eſt plus pâle & moins étendu que chez les ſujets que nous avons décrits.

De Surinam & du Bréſil.

54. Polyommate Stréphon.

Polyommatus Strephon.

Pol. alis ardoſiaceis, apice fuſco : ſubtùs obſcurè cinereis ; poſticis ſtrigis duabus flexuoſis è lunulis albis, angulo ani maculis duabus teſtaceis punctoque nigro retrorsùm fœtis.

Papilio P. R. Strephon, *alis caudatis, fuſcis, diſco cæruleſcentibus : ſubtùs cinereis, faſciâ albâ anguloque ani ocello gemino rufo.* Fab. *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 69. *n°.* 659.

Heſperia R. *Strephon.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 281. *n°.* 81.

Papilio Cyllarus. Cram. *pl.* 27. *fig.* C. D.

Papilio Cyllariſſus. Herbst, *Pap. tab.* 291. *fig.* 3. 4.

Il a près de dix-huit lignes d'envergure. Le deſſus des ailes eſt d'un bleu-ardoiſé-luiſant, avec le ſommet & la côte d'un brun-noirâtre.

Le deſſous eſt d'un cendré-foncé & un peu chatoyant, avec deux lignes tranſverſes & flexueuſes de petites lunules blanches bordées de noirâtre.

Les ailes inférieures ont à la région de l'anus deux taches rondes briquetées, marquées d'un point noir en arrière, & ſéparées l'une de l'autre par un groupe d'atomes bleuâtres. Ces taches ſont plus grandes chez la femelle que chez le mâle.

Les lignes du deſſous des premières ailes manquent quelquefois.

De Surinam & du Bréſil. Fabricius le dit des Indes orientales, mais ne l'auroit-il pas confondu avec une eſpèce voiſine ?

55. Polyommate Strophius.

Polyommatus Strophius.

Pol. alis fuſcis : poſticis ſubtùs ſtrigâ flexuoſâ è lineolis albis, angulo ani lunulis duabus ſanguineis punctoque nigro retrorsùm fœtis.

Il a près d'un pouce & demi d'envergure. Le deſſus des ailes eſt d'un brun-noirâtre-luiſant, ſans taches.

Le deſſous eſt un peu plus clair que le deſſus, avec une ligne tranſverſe & flexueuſe de petits traits blancs bordés de brun-obſcur. Les ſecondes ailes ont à l'angle de l'anus deux lunules d'un rouge-ſanguin, marquées d'un point noir en arrière, ſéparées l'une de l'autre par des atomes cendrés, & s'alignant à un double cordon marginal de lunules blanchâtres.

Décrit d'après un individu ſans corps.

Du Bréſil.

56. Polyommate Sphinx.

Polyommatus Sphinx.

Pol. alis ſuprà maris *violaceo-cæruleis, nitidis,* fœminæ *pallidioribus, apice fuſco : ſubtùs dilutè cinereis ; poſticis ſtrigis duabus undulatis albis fuſco marginatis, punctiſque duobus anguli ani ocellaribus rufis.*

Papilio P. R. Sphinx, *alis bicaudatis, cæruleſcentibus : ſubtùs cinereis, angulo ani maculâ geminâ atrâ.* Fab. *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 67. *n°.* 654. (La femelle.)

Heſperia R. *Sphinx.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 270. *n°.* 43. (La femelle.)

Papilio Dindymus. Cram. *pl.* 46. *fig.* F. G. (Le mâle.)

Papilio Dindymus. Herbst, *Pap. tab.* 291. *fig.* 1. 2.

Il a approchant quinze lignes d'envergure. Le deſſus du mâle eſt d'un bleu-violet-luiſant, le deſſus de la femelle d'un bleu plus pâle, avec le ſommet de toutes les ailes, & ſurtout celui des ſupérieures, d'un brun-noirâtre.

Le deſſous des deux ſexes eſt d'un cendré-clair, avec deux lignes blanches, poſtérieures, ondulées,

lées, bordées de noirâtre, & ordinairement moins diſtinctes aux ailes ſupérieures qu'aux inférieures. Ces dernières ailes ont à la région de l'angle anal deux points oculaires roux à prunelle noire. Le point intérieur ſe répète quelquefois en deſſus chez la femelle.

De Surinam & du Bréſil, & non des Indes orientales, comme le dit Fabricius.

57. Polyommate Cithonius.

Polyommatus Cithonius.

Pol. alis ſuprà argenteo-cæruleis, nitidis, apice fuſco: ſubtùs violaceo-cinereis; poſticis annulis diſci albis ocelliſque duobus anguli ani iride rubrâ. (Mas.)

Il a approchant quinze lignes d'envergure. Le deſſus eſt d'un bleu-argenté-luiſant, avec le ſommet de toutes les ailes d'un brun-noirâtre, & un double œil d'un brun-marron au milieu des ailes ſupérieures.

Le deſſous eſt d'un cendré-violâtre, avec deux lignes blanches, courtes & tranſverſes ſur les premières ailes, avec des anneaux & une ligne flexueuſe de cette couleur ſur le diſque des ſecondes. La région anale de ces dernières ailes offre deux points oculaires rouges à prunelle noire.

Nous n'avons vu que le mâle.

De la Guyane.

58. Polyommate Falacer.

Polyommatus Falacer.

Pol. alis fuſcis: ſubtùs lineolâ geminâ diſci ſtrigiſque duabus apicis undulatis cæruleſcentibus; poſticis lunulis tribus anguli ani rufis.

Il a un peu plus d'un pouce d'envergure. Le deſſus des ailes eſt d'un brun-noirâtre, ſans taches dans la femelle, avec une tache blanchâtre cotonneuſe vers le milieu des ailes ſupérieures du mâle.

Le deſſous eſt à peu près de la couleur du deſſus, avec un double trait central, puis deux lignes tranſverſes & ondulées, d'un bleu-pâle & bordés de brun-foncé ſur un de leurs côtés. Les ſecondes ailes ont en outre près de l'angle de l'anus trois chevrons roux, dont l'intérieur ſéparé des deux autres par un large groupe d'atomes bleuâtres.

Des environs de Philadelphie, Amérique ſeptentrionale.

59. Polyommate Iſocrate.

Polyommatus Iſocrates.

Pol. alis ſuprà fuſcis (maris *cæruleo micantibus*): *ſubtùs cinereis, liturâ geminâ ſtrigâque duplici valdè undulatâ nigricantibus albo utrinque marginatis; poſticis ocellis duobus anguli ani nigris, exteriori iride fulvâ.*

Heſperia R. Iſocrates, *alis bicaudatis, fuſcis: ſtrigis duabus approximatis undatis obſcurioribus anguloque ani maculâ geminâ atrâ.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 266. *n°.* 29. (Mâle & femelle.)

Heſperia R. Pann, *alis caudatis, fuſcis: anticis maculâ fulvâ, poſticis atrâ ſubmarginali: ſubtùs cinereis, ocellis duobus anguli ani.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 276. *n°.* 67. (La femelle.)

Papilio Pann. Herbst, *Pap. tab.* 288. *fig.* 9. 10.

Il a de quinze à dix-huit lignes d'envergure. Le deſſus du mâle eſt d'un brun-noirâtre à reflet d'un bleu-violet, tantôt ſans taches, tantôt avec une tache fauve au milieu des ailes ſupérieures, & un œil noir à iris fauve vers l'angle anal des inférieures. L'œil de ces dernières ailes eſt accompagné d'atomes d'un bleu-cendré.

Le deſſus de la femelle eſt comme chez le mâle, mais il n'a point de reflet.

Le deſſous des quatre ailes, dans les deux ſexes, eſt cendré, avec une double liture diſcoïdale, puis une double ligne tranſverſe très-ondulée, noirâtres & bordées de blanc de chaque côté. Les ſecondes ailes ont en outre des lunules marginales blanchâtres, en alignement deſquelles ſont deux yeux noirs & un groupe d'atomes argentés. L'œil extérieur eſt cerclé de fauve, & les queues ſont noires, avec le bout blanc.

Nous avons vu pluſieurs individus des deux ſexes, mais comme ils n'étoient pas frais, il ſeroit très-poſſible que notre deſcription laiſſât quelque choſe à deſirer.

Du Bengale.

60. Polyommate Erylus.

Polyommatus Erylas.

Pol. alis ſuprà fuſcis (maris *violaceo mutabili micantibus*): *ſubtùs ferrugineo-griſeis, liturâ geminâ ſtrigâque undulatâ rufeſcentibus albo utrinquè marginatis; poſticis ocellis duobus anguli ani nigris, exteriori iride fulvâ.*

Il a de ſeize à dix-huit lignes d'envergure. Le deſſus du mâle eſt d'un brun-noirâtre, avec un reflet violet qui change de place ſelon les aſpects. Ses ailes ſupérieures ont au milieu une tache d'un noir-obſcur, & les inférieures ſont longées à l'extrémité par une ligne blanche flexueuſe qui aboutit à un petit œil anal rouſſâtre.

Le deſſus de la femelle eſt d'un brun-noirâtre un peu chatoyant, ſans taches aux ailes ſupérieures, avec cinq yeux marginaux à iris blanc aux inférieures. Ces yeux ſont ſurmontés d'un rang de trois taches blanches.

Le deſſous des quatre ailes, chez les deux ſexes, eſt d'un gris-ſatiné, avec une double liture diſcoïdale, puis une ſeule ligne ondulée, rouſſâtres & bordées de blanc de chaque côté. Vient enſuite une ligne tranſverſe obſcure, laquelle eſt partagée aux ailes inférieures par une ſérie de croiſſans blanchâtres & s'alignant à deux yeux noirs, dont l'extérieur cerclé de fauve. Ces deux yeux ſont ſéparés l'un de l'autre par un groupe d'atomes argentés. Les queues ſont noires & ciliées de blanc ſur les bords.

De Java.

61. Polyommate Cléobis.

Polyommatus Cleobis.

Pol. alis ſuprà maris *azureis*, fœminæ *pallidioribus, apice atro : ſubtùs fuſceſcenti-griſeis, ſtrigâ undulatâ rufeſcente extùs albido marginatâ ; poſticis ocellis duobus anguli ani iride fulvâ.*

Il a environ un pouce & demi d'envergure. Le deſſus des ailes eſt d'un bleu-azuré chez le mâle, d'un bleu plus pâle chez la femelle, avec le ſommet, & ſurtout celui des ſupérieures, d'un noir-brun.

Le deſſous des deux ſexes eſt d'un gris-brunâtre-luiſant, avec une ligne rouſſâtre poſtérieure, ondulée, interrompue & bordée de blanchâtre en arrière. L'angle anal des ſecondes ailes offre deux yeux noirs à iris fauve, & ſéparés l'un de l'autre par un eſpace d'un gris-cendré qui s'étend même un peu au-delà de l'œil extérieur. Outre cela, il y a ſur l'iris de l'œil intérieur un croiſſant d'atomes d'un bleu-violet.

Dans la femelle, le bord poſtérieur des ſecondes ailes eſt noirâtre en deſſus & longé par une ligne blanche légèrement flexueuſe.

Du Bengale.

62. Polyommate Cippus.

Polyommatus Cippus.

Pol. alis bicaudatis, cœruleis, limbo fuſco : ſubtùs cinereis ; poſticis punctis duobus apicis atris. Fab.

Heſperia R. *Cippus.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 5. *Suppl. p.* 429. *n°.* 43-4.

Ce lépidoptère n'eſt peut-être qu'une variété mâle de notre *Cléobis ;* mais, comme nous ne l'avons pas vu, nous traduiſons la deſcription qu'en donne Fabricius.

Il a le port du polyommate *Sphinx*. Ses antennes ſont noires. Ses ailes ont le deſſus d'un bleu-barbeau-luiſant, avec le limbe, & ſurtout celui des ſupérieures, d'un brun-noirâtre.

Le deſſous eſt d'un cendré-luiſant, avec une ligne poſtérieure plus obſcure, & deux gros points noirs à l'angle interne des inférieures. Les deux queues ſont ſétacées, noires, avec le bout blanc.

Des Indes orientales.

63. Polyommate Longin.

Polyommatus Longinus.

Pol. alis ſuprà maris *nitidè cyaneis*, fœminæ *pallidioribus, apice atro : ſubtùs ſericeo-caneſcentibus, ſtrigâ immarginatâ è lunulis nigris ; poſticis ocellis duobus anguli ani iride fulvâ.*

Heſperia R. Longinus, *alis caudatis, cyaneis, limbo atro : ſubtùs cinereis ; poſticis ſtrigâ lunulari punctiſque duobus atris.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 5. *Suppl. p.* 430. *n°.* 77-78.

Fabricius a décrit ce polyommate d'après un individu mâle qui avoit perdu une queue.

Il a approchant un pouce & demi d'envergure. Le deſſus des ailes eſt d'un bleu-barbeau-luiſant chez le mâle, d'un bleu-violet-pâle chez la femelle, avec le ſommet des ſupérieures & le bord terminal des inférieures d'un noir-brun. Dans la femelle, le bord terminal des ailes inférieures eſt en outre ſurmonté d'une ligne maculaire noirâtre.

Le deſſous des deux ſexes eſt d'un gris-ſatiné-blanchâtre, avec une ligne ondulée poſtérieure de petits arcs noirs, mais moins apparente aux ailes ſupérieures qu'aux inférieures. Ces dernières ailes ont à l'angle de l'anus deux yeux noirs à iris fauve, & ſéparés l'un de l'autre par un groupe d'atomes d'un bleu-argenté. Il arrive cependant quelquefois que l'iris eſt nul ou peu diſtinct.

Du Bengale.

64. Polyommate Nédymond.

Polyommatus Nedymond.

Pol. alis ſuprà violaceo-cœruleis, nitidis, limbo atro : ſubtùs ſericeo-albis, fuſciâ geminâ terminali fuſcâ ; poſticis ad angulum ani ocellis duobus nigris, alterius iride rufâ, alterius argenteo-cœruleâ.

Papilio Nedymond. Cram. *pl.* 299. *fig.* E. F.

Papilio Nedymond. Herbst, *Pap. tab.* 299. *fig.* 5. 6.

Il a environ un pouce & demi d'envergure. Le deſſus du mâle eſt d'un bleu-violet-luiſant, avec le limbe poſtérieur des quatre ailes d'un noir-brun, & le milieu des ſupérieures marqué d'une tache orbiculaire d'un bleu-pâle.

Le deſſus de la femelle eſt d'un noir-brun, avec des atomes d'un bleu-violet ſur le diſque des ailes ſupérieures, & vers l'extrémité des inférieures.

Le deſſous des deux ſexes eſt d'un blanc-ſatiné, avec une double bande terminale d'un brun-purpurin. Cette bande offre à la région anale des ſe-

condes ailes deux yeux noirs, dont l'extérieur à iris roux, l'intérieur à iris d'un bleu-argenté & séparé du précédent par un groupe d'atomes du même bleu. En avant de ces yeux sont trois traits noirs, dont l'intermédiaire en forme de V ou de chevron renversé. Les deux queues sont égales, noires, avec l'extrémité & les bords blancs.

Du Bengale.

Nota. La figure de Cramer est inexacte : 1°. en ce que la queue intérieure est trop large & beaucoup trop courte ; 2°. en ce que la région anale du dessous des secondes ailes est rousse, avec trois points bleus oculaires, au lieu d'être comme nous l'indiquons dans notre description.

65. Polyommate Favonius.

Polyommatus Favonius.

Pol. alis suprà fuscis, anticarum disco, posticarum apice maculis fulvis : subtùs cinereis, strigis duabus undulatis albis ; posticis fasciâ submarginali rufâ anguloque ani cœruleo.

Papilio P. Favonius, *alis subcaudatis, fuscis, fulvo maculatis : subtùs cinereis utrisque strigis duabus albis ; posticis fasciâ submarginali fulvâ angulo ani cœruleo.* Smith-Abbot, *The Nat. Hist. of the rarer insects of Georgia, vol.* 1. *p.* 27. *tab.* 14.

Il a environ un pouce & demi d'envergure. Le dessus des ailes est d'un brun-noirâtre, avec deux taches fauves orbiculaires sur le disque des supérieures, & de une à quatre à la région anale des inférieures.

Le dessous est cendré, & traversé aux quatre ailes par deux lignes blanches, ondulées, ayant un des côtés bordé de noirâtre. Outre cela, les ailes inférieures offrent avant leur bord terminal une bande fauve sinuée, & leur angle interne est bleu.

Chez la femelle, les taches anales du dessus des secondes ailes sont plus nombreuses que chez le mâle.

La chenille, selon Abbot, est cloporte, d'un vert-jaunâtre, avec une ligne dorsale & des traits latéraux obliques d'un vert plus foncé. Elle vit sur le *chêne écarlate* (*quercus rubra*).

La chrysalide est courte, obtuse, grisâtre, avec des points bruns sur le dos de l'abdomen.

Ce polyommate se trouve en Georgie dans le courant du mois de mai.

66. Polyommate Mars.

Polyommatus Mars.

Pol. alis suprà fuscis : subtùs pallidioribus ; posticis punctis duobus baseos strigâque bifidâ albis ; strigâ maculam rufam amplectente.

Papilio P. R. Mars, *alis bicaudatis fuscis : posticis maculâ rufâ, subtùs punctis duobus fasciâque obliquâ albis.* Fab. *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 66. *n°.* 624.

Hesperia R. *Mars.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 265. *n°.* 24.

Papilio P. R. Ixion, *alis caudatis fuscis : subtùs strigâ obliquâ niveâ, posticis fasciâ submarginali rufâ.* Fab. *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 71. *n°.* 671. ?

Papilio Mars. Herbst, *Pap. tab.* 289. *fig.* 1. 2.

Papilio Acis. Cram. *pl.* 175. *fig.* C. D.

Papilio Acis. Drury, *Inf. tom.* 1. *tab.* 1. *fig.* 2. 2.

Il a de quinze à dix-sept lignes d'envergure. Le dessus des ailes est d'un brun-noirâtre, avec une tache un peu plus foncée vers le milieu de la côte des supérieures, & une lunule fauve vers le milieu du bord terminal des inférieures.

Le dessous est d'un brun-cendré, avec une raie blanche, oblique, bordée de noirâtre intérieurement, courte aux premières ailes, fortement bifide aux secondes, & embrassant dans sa fissure une grande tache rousse. Les secondes ailes ont en outre deux points blancs à la base, & un point rouge à l'angle de l'anus. La frange des quatre ailes est blanche.

La femelle nous est inconnue.

Des Antilles. Cramer le dit, mais à tort, du Cap de Bonne-Espérance.

Nota. Fabricius rapporte ici le papillon *Ixion* de sa *Mantissa* ; mais on ne peut guère constater l'identité au moyen de sa phrase spécifique.

67. Polyommate Ergéus.

Polyommatus Ergeus.

Pol. alis suprà fuscis : subtùs cinereis ; posticis strigâ undulatâ sanguineâ extùs albo marginatâ, fasciâque anguli ani testaceâ medio valdè dilatatâ & posticè nigro tripunctatâ.

Il a de douze à quinze lignes d'envergure. Le dessus des ailes est d'un brun-noirâtre, avec le milieu des supérieures un peu plus foncé, & l'extrémité des inférieures chargée d'une série de petits anneaux bleuâtres, parmi lesquels il y a une tache fauve triangulaire & surmontant un point noir. Outre cela, la frange de chaque aile est blanche.

Le dessous est d'un cendré plus ou moins foncé, avec deux lignes postérieures, transverses, ondulées & bordées de blanc en dehors. Les deux lignes des premières ailes sont noirâtres. La ligne antérieure des secondes ailes est d'un rouge-sanguin : leur ligne postérieure est noire, & elle s'appuie vers l'angle de l'anus sur une bande briquetée,

flexueuſe, très-dilatée dans ſon milieu, & marquée en arrière de trois points noirs, dont l'intermédiaire ſaupoudré de gris-bleuâtre. Les queues ſont noires, avec le bout blanc.

Des Antilles.

68. Polyommate Nébis.

Polyommatus Nebis.

Pol. alis ſuprà fuſcis : ſubtùs cinereis, ponè medium ſtrigis duabus undatis, alterâ è maculis teſtaceis, alterâ ex annulis albis ; poſticis ocellis duobus anguli ani rufis. (Fœmina.)

Il a près d'un pouce & demi d'envergure. Le deſſus des ailes eſt d'un brun-noirâtre, ſans taches aux ſupérieures, avec quatre anneaux bleuâtres & un anneau intermédiaire rouſſâtre à l'extrémité des inférieures.

Le deſſous eſt cendré, & il offre au-delà du milieu deux lignes ondulées tranſverſales, dont l'antérieure formée par des taches d'un rouge-brique & bordées de blanc en arrière, la poſtérieure compoſée de petits anneaux blanchâtres & s'appuyant vers l'angle anal des ſecondes ailes ſur deux yeux roux à prunelle noire. Les quatre taches ſupérieures de la ligne rouge des ſecondes ailes ſont preſque oculaires.

Décrit d'après un individu femelle rapporté du Bréſil par feu Lalande.

69. Polyommate Cléon.

Polyommatus Cleon.

Pol. alis caudatis, fuſcis : ſubtùs cinereis, anticis ſtrigâ, poſticis faſciâ ſanguineis ; angulo ani ocello gemino rufo. Fab.

Papilio P. R. *Cleon.* Fab. *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 69. *n°.* 660.

Heſperia R. *Cleon.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 282. *n°.* 84.

Ce polyommate paroît tellement voiſin du *Nébis* que, quoique Fabricius n'indique qu'une queue, nous avons cru devoir le placer ici.

Les antennes ſont annelées de blanc & de noir, & elles ont la maſſue terminée par un point brun. Le deſſus de toutes les ailes eſt d'un brun-obſcur, avec un petit point rouge vers l'angle de l'anus.

Le deſſous eſt cendré, avec des lunules marginales plus claires. Les ailes ſupérieures ont une ligne tranſverſe d'un rouge-obſcur. Les ailes inférieures ſont traverſées obliquement par une large bande dentée d'un rouge-ſanguin, & elles ont près de l'angle de l'anus deux yeux roux à prunelle noire. Les jambes ſont ponctuées de noir.

Du Bréſil.

(*Traduction de Fabricius.*)

70. Polyommate Béon.

Polyommatus Beon.

Pol. alis ſuprà fuſcis, baſi cœruleſcente : ſubtùs cinereis, nitidis ; poſticis faſciâ mediâ ſanguineâ lunuliſque marginalibus nigris : lineâ angulatâ albâ faſciam intùs ſecante.

Papilio Beon. Cram. *pl.* 319. *fig.* B. C.

Papilio Veſulus. Cram. *pl.* 340. *fig.* I. K.

Papilio Beon. Herbst, *Pap. tab.* 290. *fig.* 4. 5.

Papilio Veſulus. Herbst, *Pap. tab.* 292. *fig.* 1. 2.

Après avoir examiné attentivement un aſſez grand nombre d'individus, nous ſommes reſtés perſuadés que le *Beon* & le *Veſulus* de Cramer appartiennent à la même eſpèce, & que les figures qui les repréſentent ſont très-groſſièrement enluminées.

L'envergure de cette eſpèce eſt de onze à treize lignes. Le deſſus des ailes eſt d'un brun-noirâtre, avec la baſe d'un bleu-pâle, qui s'étend même chez certains mâles juſqu'au bord poſtérieur des inférieures. Ce bord offre aſſez ſouvent un petit point rouge, placé à l'angle de l'anus.

Le deſſous des quatre ailes eſt d'un cendré-luiſant, avec un trait central plus ou moins diſtinct, puis une bande tranſverſe & maculaire, d'un rouge-ſanguin. La bande des premières ailes eſt courte, preſque droite & bordée en arrière par une ligne blanche. La bande des ſecondes ailes eſt bordée de même à ſa moitié ſupérieure, mais ſa moitié inférieure eſt coupée dans le ſens de ſa longueur par des chevrons blancs, dont le côté interne eſt doublé de noir. Outre cela, les ſecondes ailes ont avant le bord poſtérieur une ſérie de lunules noires, dont les deux intermédiaires ainſi que l'anale plus grandes, plus colorées, & chargées chacune d'un chevron rouge, la pénultième ſurmontant un groupe d'atomes d'un gris-bleuâtre. Les premières ailes ont l'origine de la côte plus ou moins rougeâtre.

Quelquefois, comme dans le *Veſulus* de Cramer, la bande rouge des quatre ailes eſt plus étroite, tandis qu'au contraire les trois lunules rouges de l'extrémité des inférieures ſont beaucoup plus larges & ne laiſſent qu'un point noir derrière elles. Il arrive même que ces ailes n'ont qu'une ſeule lunule rouge.

Il ſe trouve à Surinam, au Bréſil & dans pluſieurs îles adjacentes.

71. Polyommate Cécrops.

Polyommatus Cecrops.

Pol. alis bicaudatis, nigris : ſubtùs faſciâ ſanguineâ. Fab.

Hesperia R. *Cecrops.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 270. *n°.* 41.

Papilio Cecrops. Jon. *Fig. pict.* 6. *tab.* 21. *fig.* 2.

Il est probable que ce polyommate est une variété femelle, & déjà un peu ancienne de notre *Béon.* Mais, dans le doute, nous aimons mieux nous exposer à le donner deux fois que d'encourir le reproche de l'avoir réuni sans l'avoir vu.

Il est de moyenne taille. Le dessus de ses ailes est noir & sans taches.

Le dessous est d'un brun enfumé, avec une tache centrale, puis une ligne courbe & transverse, d'un rouge-sanguin aux ailes supérieures. Les ailes inférieures ont une bande rouge, contiguë à une bande bleuâtre, & suivie de lunules noires, parmi lesquelles il y a une tache marginale fauve marquée d'un point noir.

Des Indes.

(*Traduction de Fabricius.*)

72 Polyommate Tyrtée.

Polyommatus Tyrtæus.

Pol. alis bicaudatis, fuscis : posticis subtùs strigâ undatâ albâ lunulisque marginalibus nigris, intermediis rufis. Fab.

Hesperia R. *Tyrtæus.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 271. *n°.* 46.

Papilio Tyrtæus. Jon. *Fig. pict.* 6. *tab.* 11. *fig.* 1.

Il est petit. Le dessus des ailes est d'un brun-obscur, sans aucune tache aux supérieures, avec une bandelette d'un bleu-pâle aux inférieures. Cette bandelette se divise postérieurement en deux branches qui sont terminées chacune par un point noir.

Le dessous est brun, avec une ligne postérieure blanche & une autre plus obscure aux premières ailes ; avec une ligne blanche, postérieure, très-ondulée, & suivie de lunules noires aux secondes ailes. Les lunules embrassent un point de leur couleur, & les deux plus intermédiaires d'entr'elles sont lavées de roux.

De l'Inde.

(*Traduction de Fabricius.*)

Nota. Ne seroit-ce pas un *Béon* chez lequel la bande rouge auroit disparu ?

73. Polyommate Echion.

Polyommatus Echion.

Pol. alis suprà fuscis (maris *intùs ardosiaceis, nitidis*) : *posticis subtùs albidis, disco punctis ocellaribus testaceis, apice strigâ undulatâ nigricante ocelliscque duobus rufis.*

Papilio P. R. Echion, *alis bicaudatis, suprà fuscis : subtùs pallescentibus, fusciâ rufâ ocelloque terminali rubro.* Linn. *Syst. Nat.* 2. *p.* 788. *n°.* 224. (La femelle.)

Papilio P. R. *Echion.* Fab. *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 67. *n°.* 631.

Hesperia R. *Echion.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *p.* 269. *n°.* 38.

Klemann, *Inf. Suppl. à* Roesel, *tom.* 1. *tab.* 7. *fig.* 3. 4.

Papilio Echion. Esp. *Pap. tom.* 1. *tab.* 20. *fig.* 1.

Papillon Echion. Engram. *Pap. Eur. tom.* 1. *tab.* 37. *fig.* 77.

Papilio Echion. Devillers, *Ent. Linn. tom.* 2. *p.* 64. *n°.* 117.

Papilio Echion. Herbst, *Pap. tab.* 305. *fig.* 1. 2. (La femelle.)

Papilio Celmus. Herbst, *Pap. tab.* 289. *fig.* 8. 9. (Var. femelle ?)

Papilio Crolus. Herbst, *Pap. tab.* 290. *fig.* 8. 9. (Le mâle.)

Papilio Celmus. Cram. *Pap. pl.* 55. *fig.* G. H. (Var. femelle ?)

Papilio Crolus. Cram. *Pap. pl.* 333. *fig.* G. H. (Le mâle.)

La description que Linné donne de son *Echion* est tellement laconique qu'elle pourroit convenir à plusieurs autres espèces analogues ; mais, comme il cite à l'appui l'excellente figure de Klemann (*voyez* la synonymie), nous ne doutons point que ce polyommate ne soit la femelle du *Crolus* de Cramer.

L'Echion a de douze à quinze lignes d'envergure. Le dessus du mâle est d'un brun-noirâtre, avec la région du bord interne des quatre ailes, & principalement des inférieures, d'un bleu-ardoisé-luisant.

Le dessus de la femelle est tout brun.

Le dessous des premières ailes est cendré chez les deux sexes, avec une bande postérieure d'un rouge-brique, plus ou moins éclairée de blanchâtre en arrière, & suivie d'une ligne flexueuse noirâtre.

Le dessous des secondes ailes du mâle & de la femelle est blanchâtre, mais cendré aux bords antérieur & postérieur, avec une douzaine de points oculaires d'un rouge-briqueté sur le disque, & une ligne ondulée noirâtre vers l'extrémité. A la suite de cette ligne, l'angle anal offre deux yeux roussâtres à prunelle noire, & dont l'extérieur souvent plus distinct que l'intérieur.

Il paroîtroit que Fabricius a connu le mâle, puisqu'il dit que le dessus des ailes a parfois un reflet bleu.

De Surinam & du Bréſil. — Pluſieurs auteurs ont dit, d'après Fuelly, qu'il ſe trouvoit en Suiſſe; mais c'eſt une erreur.

Nota. Le papillon *Celmus* de Cramer nous ſemble être une femelle plus petite, dont le deſſous des ailes inférieures eſt moins chargé de points diſcoïdaux, comme dans les individus figurés par Eſper & par Engramelle. Sa patrie eſt la même que celle de l'*Echion*.

74. Polyommate Columelle.

Polyommatus Columella.

Pol. alis ſuprà fuſcis intùſque pallidè ardoſiaceis : ſubtùs fuſcescentibus, ſtrigâ flexuoſâ è punctis ocellaribus nigris & ponè hanc lunulis annuliſque albis; poſticis ocellis duobus anguli ani iride rufâ.

Heſperia R. Columella, *alis caudatis, fuſcescentibus : ſubtùs cinereis, poſticis ſtrigâ punctorum atrorum alborumque maculiſque duabus fulvis.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 282. *n°.* 83.

Papilio Bubaſtus. Cram. *pl.* 332 *fig.* G. H.

Papilio Bubaſtus. Herbst, *Pap. tab.* 324. *fig.* 6. 7.

Fabricius a décrit ce polyommate d'après une femelle altérée qui n'avoit qu'une queue, & Cramer l'a figuré d'après une autre femelle qui n'en avoit pas du tout; en ſorte que ce n'eſt que par des recherches opiniâtres & par la comparaiſon de pluſieurs individus des deux ſexes que nous ſommes arrivés à nous convaincre que le *Columella* du profeſſeur de Kiel & le *Bubaſtus* de l'iconographe d'Amſterdam ſe rapportoient à la même eſpèce.

Cette eſpèce n'a guère qu'un pouce d'envergure. Elle eſt d'un brun-noirâtre en deſſus, avec la région du bord interne des quatre ailes d'un bleu-ardoiſé-pâle, & l'extrémité des inférieures marquée vers l'angle interne de deux à trois points noirs oculaires. Dans le mâle où le bleu eſt plus apparent, il y a une tache obſcure près du milieu de la côte des ailes ſupérieures & un petit arc noir ſur le diſque des inférieures.

Le deſſous eſt d'un brun-cendré chez les deux ſexes, avec une rangée tranſverſe & flexueuſe de points noirs bordés de blanc en arrière, & après laquelle on voit une ſérie de lunules, puis un cordon marginal d'anneaux, blancs. Les ailes inférieures ont en outre à la baſe deux points noirs cerclés de blanc, & à l'angle de l'anus deux yeux noirs à iris roux. L'œil extérieur eſt plus gros que l'intérieur, & l'on remarque entre l'un & l'autre un petit point noir preſqu'entièrement couvert d'atomes bleuâtres.

Le deſſous des quatre ailes offre quelquefois un petit arc central noirâtre avant la rangée de points ocu'aires; nous avons même vu un individu chez lequel ces points étoient ſablés de ferrugineux.

Des îles de l'Amérique, & non du Cap de Bonne-Eſpérance, comme le dit Cramer.

75. Polyommate Mégaclès.

Polyommatus Megacles.

Pol. alis ſuprà fuſcis intùſque ardoſiaceis : poſticis ſubtùs baſi cinereis, apice albidis, faſciis tribus undulatis punctoque centrali ferrugineis. (Mas.)

Papilio Megacles. Cram. *pl.* 333. *fig.* E. F.

Papilio Megacles. Herbst, *Pap. tab.* 290. *fig.* 6. 7.

Nous n'avons vu que le mâle. Il a approchant un pouce d'envergure. Le deſſus des quatre ailes eſt d'un brun-noirâtre, avec la région du bord interne d'un bleu-ardoiſé-pâle.

Le deſſous des premières ailes eſt d'un cendré-luiſant, avec l'origine de la côte, un point central, deux lignes tranſverſes & la frange, ferrugineux. L'eſpace compris entre les deux lignes tranſverſes eſt d'une teinte blanchâtre qui va en ſe rétréciſſant juſqu'à l'angle interne de l'aile.

Le deſſous des ſecondes ailes eſt cendré vers la baſe, blanchâtre vers l'extrémité, & traverſé par trois bandes ondulées ferrugineuſes, dont la poſtérieure plus large & moins prononcée, les deux antérieures ſéparées par un point central également ferrugineux.. Outre cela, la frange eſt légèrement entrecoupée de ferrugineux. Le corps eſt bleuâtre, avec la tête rouſſe.

De Surinam & du Bréſil.

76. Polyommate Mégarus.

Polyommatus Megarus.

Pol. alis ſuprà fuſcis intùſque cœruleſcentibus : poſticis ſubtùs albidis, ſtrigis tribus flexuoſis è maculis fuſcescentibus ocelliſque duobus anguli ani iride rufâ.

Il n'a guère qu'un pouce d'envergure. Le deſſus des deux ſexes eſt d'un brun-noirâtre, avec la région du bord interne de toutes les ailes d'un bleu-violet-pâle, & marquée d'un point noir vis-à-vis des queues des inférieures. Chez le mâle, le milieu des ailes ſupérieures offre une tache d'un noir-obſcur.

Le deſſous des premières ailes eſt gris vers la baſe, blanchâtre vers l'extrémité, avec une tache centrale & deux bandes maculaires poſtérieures d'un brun-noirâtre-pâle.

Le deſſous des ſecondes ailes eſt entièrement blanchâtre, avec trois bandes maculaires flexueuſes & une liture diſcoïdale du même brun que les bandes des ailes de devant. Il y a en outre vers

l'angle de l'anus deux yeux noirs à iris roux.
Du Bréfil.

77. Polyommate Etolus.

Polyommatus Etolus.

Pol. alis bicaudatis : anticis nigris : posticis cæruleſcentibus, ſubtùs albidis puncto baſeos duobuſque apicis atris. Fab.

Papilio P. R. *Etolus.* Fab. *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 66. *n°.* 620.

Heſperia R. *Etolus.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 264. *n°.* 20.

Les ailes ſupérieures ont le deſſus noir, avec le bord interne un peu bleuâtre. Les ailes inférieures ſont d'un bleu-pâle & luiſant, avec un point noir à l'extrémité & deux longues queues blanches.

Le deſſous des ailes ſupérieures eſt d'un briqueté-obſcur, avec deux lignes tranſverſes plus obſcures. Le deſſous des ailes inférieures eſt blanchâtre, avec un point noir diſtinct à la baſe, deux lignes obſcures interrompues avant l'extrémité, & deux gros points noirs à l'angle de l'anus. Les queues ſont blanches comme du côté oppoſé, mais elles ont le milieu diviſé longitudinalement par une ligne noire. Les pattes ſont annelées de blanc & de noir.

Des Indes.

(*Traduction de Fabricius.*)

78. Polyommate Dindus.

Polyommatus Dindus.

Pol. alis bicaudatis, atris, margine tenuiori cæruleo : ſubtùs cinereis, albo maculatis maculâque duplici rufâ anguli ani. Fab.

Heſperia R. *Dindus.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 269. *n°.* 40.

Papilio Dindus, Jon. *Fig. pict.* 6. *tab.* 4. *fig.* 4.

Il eſt de moyenne taille dans cette famille. Le deſſus des ailes eſt d'un noir-brun, avec le bord interne, & principalement celui des inférieures, largement bleu & luiſant.

En deſſous, le fond eſt cendré, & les premières ailes offrent ſur leur milieu deux traits obſcurs, puis une ligne tranſverſe de taches obſcures, bordées de blanc, & enfin une ſérie tranſverſe d'anneaux blancs. Les ſecondes ailes ſont parſemées de taches blanches, & elles ont à l'angle de l'anus deux taches écarlates. (*Rouſſes* ſuivant la phraſe ſpécifique.)

De l'Inde.

(*Traduction de Fabricius.*)

Nota. Dans la deſcription de Fabricius, il faut lire *margine interiori*, au lieu de *margine anteriori.*

79. Polyommate Gabélus.

Polyommatus Gabelus.

Pol. alis ſuprà obſcurè cæruleis, limbo fuſco : ſubtùs canis, ſtrigis undulatis nigris, anticarum duabus, poſticarum tribus ; poſticis ad angulum ani ocello inde rufâ. (Fœmina.)

Il a près d'un pouce & demi d'envergure. Le deſſus des ailes eſt d'un brun-obſcur, avec une bordure brune, plus large aux ſupérieures qu'aux inférieures.

Le deſſous eſt d'un blanc-griſâtre, avec deux lignes ondulées, entièrement noires, à l'extrémité des ailes ſupérieures, & trois, dont une baſilaire, aux inférieures. Ces dernières ailes ont vers l'angle de l'anus deux points noirs, dont l'extérieur plus gros & entouré d'un iris roux.

Nous n'avons pas vu le mâle.

Du Bréfil.

80. Polyommate Jébus.

Polyommatus Jebus.

Pol. alis ſuprà cæruleſcentibus, limbo fuſco : ſubtùs fuſceſcentibus, unticarum apice, poſticarum paginâ omni albido variegatis ; poſticis punctis duobus anguli ani nigris, interiori oblongo. (Fœmina.)

Il a approchant un pouce & demi d'envergure. Le deſſus des ailes eſt d'un bleu très-pâle, avec une bordure brune plus large aux ſupérieures qu'aux inférieures.

Le deſſous eſt brunâtre, avec le ſommet des ailes ſupérieures & toute la ſurface des inférieures panachés de blanchâtre. L'angle anal des ailes inférieures offre deux points noirs, dont l'intérieur oblong & parfois bordé de fauve en arrière.

Décrit d'après des femelles.

Du Bréfil.

81. Polyommate Mécène.

Polyommatus Mœcenas.

Pol. alis bicaudatis, atris, diſco cæruleo : ſubtùs brunneo nebuloſis. Fab.

Heſperia R. *Mœcenas.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 271. *n°.* 45.

Papilio Mœcenas. Jon. *Fig. pict.* 6. *tab.* 3. *fig.* 2.

Le corps eſt grand, noir. Le deſſus des quatre ailes eſt d'un noir-brun, avec le diſque bleu.

Le deſſous eſt nué de brun, avec un trait blanc interrompu à la baſe des ailes ſupérieures,

& un petit point noir à l'angle anal des inférieures.

De la Chine.

(*Traduction de Fabricius.*)

Nota. Ce chinois-là se trouve bien dépaysé parmi les américains à deux queues, malgré la grande affinité qu'il paroît avoir avec eux.

82. Polyommate Céthégus.

Polyommatus Cethegus.

Pol. alis suprà cœruleis, nitidis, limbo atro : subtùs cinereis; posticis strigis duabus undatis serieque punctorum marginali fuscis; puncto anali iride fulvâ cincto. (Fœmina.)

Papilio Cethegus. Stoll, *Supplém. à* Cram. *pl.* 38. *fig.* 5 & 5 E.

Il n'a guère qu'un pouce d'envergure. Le dessus des ailes est d'un bleu-luisant, avec une large bordure d'un noir-brun.

Le dessous est cendré, avec deux lignes brunes, transverses & ondulées, à chaque aile. Les ailes inférieures ont en outre une série marginale de points bruns, dont le plus intérieur cerclé de fauve.

Nous n'avons vu que la femelle.

De Surinam.

83. Polyommate Calus.

Polyommatus Calus.

Pol. alis suprà argenteo-cœruleis, nitidissimis, limbo nigro : subtùs cinereis; anticis maculâ magnâ mediâ, posticis strigâ undulatâ fuscis.

Nous ne connoissons ce lépidoptère que par un individu très-ancien & mal conservé.

Il a un peu plus d'un pouce d'envergure. Le dessus des ailes est d'un bleu-argenté très-brillant, avec tout le pourtour extérieur des premières, & simplement la tranche du bord terminal des secondes, noirs.

Le dessous est cendré, avec une grande tache noire, transverse & de forme triangulaire, au milieu des premières ailes, avec une ligne noire, bordée de blanc en arrière & finissant par un W, sur le milieu des secondes. Ces dernières ailes ont l'angle anal largement noir & saupoudré de bleu-pâle. La vétusté de l'individu ne nous a pas permis de voir s'il y a d'autres caractères.

De l'Amérique.

84. Polyommate Hugon.

Polyommatus Hugon.

Pol. alis suprà fuscis, disco fulvo : subtùs fusce scentibus, strigâ undulatâ testaceâ extùs albo marginatâ; posticis ocellis duobus anguli ani iride rufâ. (Mas.)

Il est petit. Le dessus de toutes les ailes est d'un brun-noirâtre, avec le disque fauve.

Le dessous est d'un brun-pâle, avec une ligne briquetée, transverse, ondulée & bordée de blanc en arrière. Les secondes ailes ont en outre près de l'angle de l'anus deux yeux rouges à prunelle noire, & leur bord postérieur est longé par une ligne blanche très-fine.

Décrit d'après un mâle un peu altéré.

Il habite.....

85. Polyommate Xénophon.

Polyommatus Xenophon.

Pol. alis bicaudatis fuscis, disco flavo : subtùs cinereis, strigâ mediâ albâ fuscæ innatâ. Fab.

Hesperia R. *Xenophon.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 272. *n°.* 47.

Papilio Xenophon. Jon. *Fig. pict.* 6. *tab.* 15. *fig.* 4.

Fabricius le décrit ainsi : il paroît avoir de l'affinité avec le *Jarbas* (*voyez* n°. 108). Le corps est petit, brun. Le dessus des ailes est d'un brun-noirâtre, avec une grande tache jaune sur le disque.

Le dessous est cendré, avec une ligne blanche, discoïdale, ondulée, contiguë à une ligne obscure. Les ailes inférieures ont en outre une série marginale de points obscurs.

De l'Inde.

86. Polyommate Damastus.

Polyommatus Damastus.

Pol. alis suprà fuscis, disco fulvo : subtùs viridibus; posticis strigis tribus flexuosis ocelliſque tribus anguli ani nigris albo marginatis.

Papilio Damon. Cram. *pl.* 390. *fig.* C, D.

Il n'a guère qu'un pouce d'envergure. Le dessus des quatre ailes est d'un brun-noirâtre, avec le disque fauve.

Le dessous est vert, avec deux lignes noires, courbes, & bordées de blanc à l'extrémité des ailes supérieures; avec trois lignes semblables, mais flexueuses, sur la surface des ailes inférieures. L'angle anal de ces dernières ailes offre en outre une suite de trois petits yeux noirs à iris blanc.

Décrit d'après un individu unique & un peu altéré.

De la Virginie.

Nota. Nous avons changé le nom de Cramer, parce qu'il y a un autre polyommate qui porte le nom de *Damon*.

87. Polyommate

87. Polyommate Télème.

Polyommatus Telemus.

Pol. alis ſuprà cyaneis, nitidis : ſubtùs viridibus ; poſticis ſtrigâ marginali nigrâ, extùs dilatatâ, intùs valdè angulatâ.

Papilio P. R. Telemus, *alis bicaudatis, cæruleis, nitidis : poſticis ſubtùs ſtrigâ marginali angulatâ atrâ.* Fab. *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 67. *n°.* 652.

Heſperia R. *Telemus.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 269. *n°.* 39.

Papilio Telemus. Cram. *pl.* 4. *fig.* D. E.

Papilio Telemus. Herbst, *Pap. tab.* 299. *fig.* 7. 8.

Il a environ un pouce & demi d'envergure. Le deſſus des ailes eſt d'un bleu-barbeau-luiſant, & les ſupérieures offrent dans le mâle une tache brune oculaire.

Le deſſous eſt vert, ſans aucune tache aux ailes ſupérieures, avec une ligne noire à l'extrémité des inférieures. Cette ligne eſt très-anguleuſe vers l'angle de l'anus, & dilatée vers l'angle du ſommet.

La femelle nous eſt inconnue.

De l'Amérique équinoxiale.

Nota. Fabricius décrit cette eſpèce ſans parler de la couleur du deſſous des ailes, en ſorte qu'on ne pourroit jamais la reconnoître s'il ne citoit pas la figure de Cramer.

88. Polyommate Janias.

Polyommatus Janias.

Pol. alis ſuprà vireſcenti-cæruleis, nitidis, limbo atro : ſubtùs viridibus ; poſticis ſtrigâ undulatâ punctoque ocellari nigris.

Papilio P. R. Janias, *alis tricaudatis, cæruleis, limbo atro : ſubtùs viridibus.* Fab. *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 65. *n°.* 608.

Heſperia R. *Janias.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 259. *n°.* 5.

Papilio Janias. Cram. *pl.* 213. *fig.* D. E.

Papilio Haſſan. Stoll, *Suppl. à* Cram. *pl.* 38. *fig.* 4 & 4 D.

Papilio Janias. Herbst, *Pap. tab.* 302. *fig.* 3. 4.

Il a environ quinze lignes d'envergure. Le deſſus des ailes eſt d'un bleu-chatoyant en vert, avec tout le pourtour extérieur noir.

Le deſſous eſt vert, ſans taches aux ailes ſupérieures, avec une ligne ondulée & un point noirs aux inférieures. Le point eſt cerclé de fauve, & placé derrière la ligne, vis-à-vis des queues.

De Surinam.

Nota. Le point ocellé eſt quelquefois flanqué de petits traits noirs. D'autres fois, au contraire, la ligne ondulée qui le ſurmonte eſt peu diſtincte.

89. Polyommate Hérodote.

Polyommatus Herodotus.

Pol. alis ſuprà chalybdineo-cæruleis, limbo nigro : ſubtùs viridibus ; poſticis ſtrigâ è punctis intùs nigris, extùs albis.

Heſperia R. Herodotus, *alis caudatis, cæruleis : ſubtùs viridibus, ſtrigâ punctorum nigro-alborum.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *pag.* 286. *n°.* 100.

Papilio Herodotus. Jon. *Fig. pict.* 6. *tab.* 18. *fig.* 1.

Papilio Herodotus. Donow. *of. an Epitome of the Nat. Hiſt. Inſects of India, cah.* 1. *pl.* 3. *fig.* 2.

Papilio P. R. Eryx, *alis caudatis, nigris : ſubtùs viridibus ; poſticis margine ſubdentato maculatoque.* Fab. *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 70. *n°.* 663.

Heſperia R. *Eryx.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 283. *n°.* 89.

Papilio Amyntor. Cram. *pl.* 48. *fig.* E. (Le mâle.)

Papilio Menalcas. Cram. *pl.* 259. *fig.* A. B. (La femelle.)

Papilio Amyntor. Herbst, *Pap. tab.* 300. *fig.* 5. 6.

Papilio Menalcas. Herbst, *Pap. tab.* 298. *fig.* 5. 6.

Il a environ quinze lignes d'envergure. Le deſſus du mâle eſt d'un bleu d'acier luiſant, avec le bord poſtérieur noir.

Le deſſous eſt d'un vert-pré, ſans aucune tache aux ailes ſupérieures, avec une ligne tranſverſe de points oblongs, noirs en avant, blancs en arrière, aux inférieures. L'angle anal de ces dernières ailes eſt ferrugineux & précédé d'un ou de deux gros points de ſa couleur. Le corps eſt d'un bleu d'acier, avec le front d'un vert-doré.

La femelle ſe diſtingue du mâle en ce qu'elle a le deſſus d'un blanc beaucoup plus obſcur & largement bordé de brun. Elle nous paroît bien répondre à l'*Eryx* de Fabricius, quoique cet auteur le diſe de la Chine.

De Surinam.

90. Polyommate Ethémon.

Polyommatus Ethemon.

Pol. alis ſuprà nigris, diſcocæruleo : ſubtùs

fulvis, strigâ mediâ rubrâ ; posticis serie posticâ è lunulis intùs nigris, extùs albis. (Fœmina?)

Papilio Ethemon. Cram. *pl.* 48. *fig.* D.

Papilio Ethemon. Herbst, *Pap. tab.* 300. *fig.* 7. 8.

Nous ne connoissons ce polyommate que par un individu sans corps, mais qui nous paroit cependant être une femelle.

Il a environ quinze lignes d'envergure. Le dessus des ailes est noir, avec le milieu d'un bleu-foncé-luisant.

Le dessous est d'un fauve-obscur, avec une ligne commune rouge sur le milieu. Les secondes ailes ont parallèlement au bord postérieur un cordon de petites lunules, noires en avant, blanches en arrière, & surmontées chacune d'une tache cunéiforme rougeâtre.

Des Indes occidentales.

91. Polyommate Lycabas.

Polyommatus Lycabas.

Pol. alis suprà cœruleis, margine nigro : subtùs fuscis, apice pallidioribus ; posticis angulo ani flavo nigroque strigoso. (Mas.)

Papilio Lycabas. Cram. *pl.* 117. *fig.* E.

Il a de quatorze à quinze lignes d'envergure. Le dessus des ailes est d'un bleu-violet, avec les bords noirs, & une tache orbiculaire luisante au milieu des supérieures.

Le dessous est d'un brun-noirâtre, avec l'extrémité plus pâle & rayée de brunâtre transversalement. Les secondes ailes ont la région anale jaune, avec quelques lignes noires disposées dans le même sens que les raies brunes.

Nous n'avons vu que le mâle, encore étoit-il en mauvais état.

De Surinam.

γ. Dessus des ailes supérieures du mâle n'offrant point vers le milieu de tache orbiculaire distincte.

92. Polyommate Aunus.

Polyommatus Aunus.

Pol. alis suprà cyaneis, nitidis, limbo nigro : subtùs fuscis, albido bifasciatis ; anticis cosiâ baseos, posticis angulo ani immaculatis. (Mas.)

Papilio P. R. Aunus, *alis subtricaudatis, cœruleis, limbo atro : subtùs nigris, albo fasciatis.* Fab. *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 66. *n°.* 619. (Le mâle.)

Hesperia R. *Aunus* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 263. *n°.* 18. (Le mâle.)

Papilio Aunus. Cram. *pl.* 23. *fig.* E. F. (Le mâle.)

Papilio Aunus. Herbst, *Pap. tab.* 291. *fig.* 7. 8.

Il n'a guère qu'un pouce d'envergure. Le dessus des ailes est d'un bleu-barbeau-luisant, avec le limbe extérieur noir.

Le dessous est d'un brun-noirâtre, avec deux bandes blanchâtres, transverses, divisées dans le sens de leur longueur par quelques lignes noires.

La femelle nous est inconnue.

De Curaçao.

Nota. Ce polyommate se rapproche beaucoup de l'*Eole* n°. 39 ; mais il est plus petit, il n'a que deux bandes blanchâtres en dessous, la côte de ses premières ailes & l'angle anal des secondes sont sans taches. Outre cela, le milieu des ailes supérieures du mâle n'offre pas de tache cotonneuse comme dans l'*Eole*.

93. Polyommate Hyacinthe.

Polyommatus Hyacinthus.

Pol. alis viridi-cœruleis, nitidis, suprà margine nigro, subtùs fasciis tribus nigris mediâque albâ.

Papilio P. R. Hyacinthus, *alis bicaudatis, cœruleo-nitidis : posticis subtùs medio atro, fasciâ albâ.* Fab. *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 67. *n°.* 637.

Hesperia R. *Hyacinthus.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 273. *n°.* 51.

Papilio Hyacinthus. Cram. *pl.* 36. *fig.* E.

Papilio Hyacinthus. Herbst, *Pap. tab.* 299. *fig.* 3. 4.

Il a un pouce & demi d'envergure. Le dessus des ailes est d'un bleu-verdâtre-luisant, avec une bordure noire, étroite chez le mâle, large & un peu moins foncée chez la femelle.

Le dessous est de la couleur du dessus, avec trois bandes noires transverses & une bande centrale blanche. Ces bandes ne montent pas jusqu'à la côte des ailes supérieures, & la bande blanche est encore plus courte que les autres.

Des Indes occidentales.

94. Polyommate Cyanus.

Polyommatus Cyanus.

Pol. alis suprà cyaneis, nitidis, limbo nigro : subtùs fuscis, disco baseos albo ; posticis ocellis septem marginalibus argenteo-cœruleis. (Mas.)

Papilio P. R. Cyanus, *alis bicaudatis, cœruleis, nitidis : subtùs disco albo.* Fab. *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 67. *n°.* 636.

Hesperia R. *Cyanus.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 272. *n°.* 50.

Papilio Cyanus. Herbst, *Pap. tab.* 297. *n°.* 1. 2.

Papilio Cyanea. Cram. *pl.* 76. *fig.* C. D.

Il a approchant un pouce & demi d'envergure. Le deſſus du mâle eſt d'un bleu-barbeau-clair & luiſant, avec une légère bordure noire.

Le deſſous eſt d'un brun-noirâtre, avec le diſque à partir de la baſe, & une ligne marginale, blancs. La ligne marginale des premières ailes eſt double; celle des ſecondes eſt ſurmontée d'une ſérie de ſept yeux argentés à prunelle noire.

Nous n'avons point vu la femelle.

Des Indes occidentales.

95. Polyommate Pholéus.

Polyommatus Pholeus.

Pol. alis ſuprà virescenti-cæruleis, nitidis: ſubtùs nigris, inaurato-viridi faſciatis. (Mas.)

Papilio P. R. Pholeus, *alis bicaudatis, cæruleis: ſubtùs atris, viridi cæruleoque faſciatis.* Fab. *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 66. *n°.* 628.

Heſperia R. *Pholeus.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 267. *n°.* 33.

Papilio Pholeus. Cram. *pl.* 163 *fig.* D. E.

Papilio Pholeus. Herbst, *Pap. tab.* 295. *fig.* 3. 4.

Il a environ quinze lignes d'envergure. Le deſſus des ailes eſt d'un bleu-luiſant & chatoyant en vert.

Le deſſous eſt noir, avec des bandes d'un vert-doré. Les bandes des ailes ſupérieures ſont pour la plupart longitudinales & interrompues. Celles des ailes inférieures ſont tranſverſes, & les deux plus intermédiaires ſont ſéparées par quelques points de leur couleur.

Nous n'avons pas vu la femelle.

De Surinam.

96. Polyommate Philanthe.

Polyommatus Philanthe.

Pol. alis fuſcis: poſticis ſuprà puncto marginis tenuioris albo, ſubtùs faſcus quatuor flavescentibus tranſverſis ſtrigisque duabus argenteis.

Papilio Philanthus. Stoll, *Suppl. à* Cram. *pl.* 5. *fig.* 3 & 5 C.

Il n'a guère que quinze lignes d'envergure. Le deſſus des ailes eſt d'un brun-noirâtre, avec un point blanc au milieu du bord interne des inférieures, & deux points bleuâtres près de leur angle anal.

Le deſſous eſt preſque du même brun que le deſſus, avec deux bandes longitudinales jaunâtres aux inférieures. Ces dernières ailes ont en outre deux lignes argentées tranſverſales, l'une entre la deuxième & la troiſième bandes, l'autre près de l'angle de l'anus.

Décrit d'après un individu ſans corps.

De Surinam.

97. Polyommate Simæthis.

Polyommatus Simœthis.

Pol. alis ſuprà fuſcis, nitidis: ſubtùs flavo-viridibus, vittâ tranſverſâ argenteâ; poſticis apice ferrugineis ſtrigâ è punctis margaritaceis.

Papilio P. R. Simæthis, *alis caudatis, fuſcis: ſubtùs viridibus, ſtrigâ argenteâ.* Fab. *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 70. *n°.* 668.

Heſperia R. *Simœthis.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 286. *n°.* 97.

Papilio Simœthis. Drury, *Inſ. exotic. pl.* 1. *fig.* 3. 3.

Papilio Simœthis. Herbst, *Pap. tab.* 289. *fig.* 3. 4.

Il n'a guère qu'un pouce d'envergure. Le deſſus des ailes eſt d'un brun-noirâtre-chatoyant, avec la queue des inférieures ferrugineuſe & terminée de blanc.

Le deſſous eſt d'un vert-jaunâtre, avec une bande argentée, tranſverſe, étroite, bordée de ferrugineux en avant, courbe aux premières ailes, ſinuée en arrière aux ſecondes. Outre cela, les premières ailes ont l'angle interne ferrugineux, avec une ligne argentée courte & tranſverſale. Les ſecondes ailes ont toute l'extrémité ferrugineuſe, mais cependant moins foncée contre le bord interne, avec une ſérie de points nacrés.

Nous ignorons de quel ſexe eſt l'individu que nous décrivons, parce qu'il a un corps rapporté.

De Surinam & de l'île Saint-Chriſtophe.

98. Polyommate Chryſus.

Polyommatus Chryſus.

Pol. alis ſuprà fuſcis, anticarum apice albo punctato: ſubtùs ferrugineis, maculis faſciisque inaurato-viridibus nigro marginatis.

Papilio Chryſus. Cram. *pl.* 380. *fig.* D. E.

Papilio Chryſus. Herbst, *Pap. tab.* 301. *fig.* 1. 2.

Nous n'avons vu qu'un mauvais échantillon de ce polyommate.

Il a approchant un pouce & demi d'envergure. Le deſſus des ailes eſt d'un brun-noirâtre, avec trois ou quatre points blancs vers l'extrémité des ſupérieures.

Le deſſous eſt ferrugineux, avec des taches tranſverſales, puis deux bandes poſtérieures, d'un vert-doré & bordées de noir. Les ailes ſupérieures

ont des points blancs qui répondent à ceux du deſſus, & l'on en voit deux ou trois ſemblables ſur la côte des inférieures. Outre cela, les taches dorées ſont entremêlées de quelques ſtries noires.

De Surinam.

99. Polyommate Achæus.

Polyommatus Achæus.

Pol. alis ſuprà fuſcis, ſingularum litoris duabus flavis : ſubtùs flavis, maculis numeroſis aureis purpuraſcenti marginatis.

Heſperia R. Achæus, *alis ſubbicaudatis, fuſcis, maculis flavis : ſubtùs flavis auro maculatis.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 273. *n°.* 53.

Papilio Achæus. Cram. *pl.* 352. *fig.* G. H.

Papilio Achæus. Herbst, *Pap. tab.* 297. *fig.* 3. 4.

Papilio Achæus. Jon. *Fig. pict.* 6. *tab.* 4. *fig.* 1.

Il a à peu près un pouce & demi d'envergure. Le deſſus des ailes eſt d'un brun-noirâtre, avec deux taches jaunes ſur le milieu des premières, & deux ſtries tranſverſales de cette couleur ſur les ſecondes.

Le deſſous eſt jaune, avec une multitude de taches dorées, luiſantes & bordées de brun-pourpre.

Nous n'avons vu qu'un ſeul échantillon, & il nous a été impoſſible d'en déterminer le ſexe.

De Surinam.

100. Polyommate Valens.

Polyommatus Valens.

Pol. alis ſuprà fuſcis, nitidis : ſubtùs flaveſcentibus, maculis ſanguineis auro punctatis.

Papilio P. R. Valens, *alis caudatis, fuſcis : ſubtùs flaveſcentibus, maculis rubris auro fœtis.* Fab. *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 67. *n°.* 644. (Le mâle.)

Heſperia R. *Valens.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 274. *n°.* 60.

Papilio P. R. Formoſus, *alis bicaudatis, fuſcis : ſubtùs flaveſcentibus ſanguineo auroque punctatis.* Fab. *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 67. *n°.* 639. (La femelle.)

Heſperia R. *Formoſus.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 273. *n°.* 55.

Papilio Formoſus. Cram. *pl.* 118. *fig.* G.

Papilio Formoſus. Herbst, *Pap. tab.* 293. *fig.* 6.

Le *Valens* & le *Formoſus* de Fabricius forment une ſeule eſpèce, qui n'a guère qu'un pouce d'envergure.

Le deſſus des ailes eſt d'un brun-noirâtre, légèrement chatoyant en bleu.

Le deſſous eſt d'un jaune-pâle, avec de grandes taches d'un rouge-ferrugineux, & ſur leſquelles il y a pluſieurs points d'un vert-doré. Le bord terminal eſt en outre totalement longé par une ligne de la couleur de ces points.

Dans le mâle, ou le *Valens* proprement dit de Fabricius, le milieu des premières ailes offre une tache blanche, tranſparente & orbiculaire. La femelle, ou le *Formoſus*, n'a probablement point cette tache, puiſque Cramer n'en parle point.

De Surinam.

101. Polyommate Vulcain.

Polyommatus Vulcanus.

Pol. alis ſuprà fuſcis (maris *violaceo micantibus*), *fulvo faſciatis : ſubtùs ſaturato-rufis, faſciis flavis nigro marginatis ſtrigiſque intermèdiis è maculis argenteis.*

Papilio P. R. Vulcanus, *alis bicaudatis, ſuprà fuſcis, flavo maculatis : ſubtùs ſtrigis flavis, fulvis argenteiſque variegatis.* Fab. *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 66. *n°.* 622. (La femelle.)

Heſperia R. *Vulcanus.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 264. *n°.* 22. (La femelle.)

Papilio Vulcanus. Herbst, *Pap. tab.* 301. *fig.* 5. 6.

Papilio Etolus. Cram. *pl.* 208. *fig.* E. F. (La femelle.)

Heſperia R. Pindarus, *alis ſubtricaudatis, cæruleis, limbo atro : ſubtùs fuſcis, argenteo fulvoque maculatis.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 262. *n°.* 15. (Variété mâle.)

Papilio Pindarus. Jon. *Fig. pict.* 6. *tab.* 4. *fig.* 4.

Il a un peu plus d'un pouce d'envergure. Le deſſus des ailes eſt d'un brun-noirâtre, avec trois à quatre bandes fauves, courtes & tranſverſes, vis-à-vis du ſommet des ſupérieures, & une ſur le bord terminal des inférieures. Ces dernières ailes ont près de l'angle de l'anus deux petits yeux noirs à iris argenté, & leurs queues ſont noires, avec la baſe fauve & l'extrémité blanche.

Le deſſous de toutes les ailes eſt d'un roux-foncé, avec ſix bandes communes jaunes, bordées de noir, & ſéparées les unes des autres par des lignes tranſverſes de taches argentées. Aux deux petits yeux des ſecondes ailes répondent ici deux yeux parfaitement ſemblables. Les antennes ſont noires, annelées de blanc & terminées de fauve. L'abdomen a le bord des anneaux blanchâtre.

Le mâle a un reflet violet. Il offre parfois une

variété ſans bande fauve ſur le deſſus des premières ailes, & ayant le deſſous des quatre ailes d'un brun-obſcur au lieu de l'avoir d'un roux-foncé ; c'eſt cette variété que Fabricius a décrite ſous le nom de *Pindarus*.

Du Bengale & de Java.

102. Polyommate Orcas.

Polyommatus Orcas.

Pol. alis ſuprà virescenti-cæruleis, limbo nigro : ſubtùs ferrugineo-fuſcis, maculis numerosis argenteis.

Papilio Orcas. Drury, *Inſ. exot. tom.* 3. *pl.* 34. *fig.* 2. 3.

Il a environ un pouce & demi d'envergure. Le deſſus des ailes eſt d'un bleu-verdâtre, avec tout le pourtour extérieur noir. Le noir de la côte des premières ailes ſe dilate ſur le bleu de manière à y former trois taches, dont les deux antérieures en forme de points, la poſtérieure lunulée & plus grande. Les ſecondes ailes ont à l'angle de l'anus un point rouge.

Le deſſous eſt d'un brun-ferrugineux, avec des taches nacrées, éparſes, inégales, au nombre de huit ou neuf ſur les premières ailes, au nombre de onze à douze ſur les ſecondes. Au point anal de ces dernières ailes répond ici un point ſemblable. Le corps eſt brun en deſſous, avec les pattes & des lignes pectorales blanches.

Les deux individus que nous avons vus paroiſſoient être des mâles.

De Sierra-Leone, ſuivant Drury : mais eſt-ce bien là ſa patrie ?

C. Bord antérieur des premières ailes plus ou moins arqué vers ſon origine. Bord poſtérieur des ſecondes ailes avec une ſeule queue extérieure, linéaire ou filiforme.

c. Bord poſtérieur des ſecondes ailes flexueux ou un peu dentelé & ayant une queue linéaire.

103. Polyommate Périon.

Polyommatus Perion.

Pol. alis ſuprà fuſcis, fulvo faſciatis : ſubtùs flavido ferrugineis, ſingularum punctis ocellaribus numerosiſſimis poſticarumque lineâ marginali elevatâ aureis.

Papilio P. R. Perion, *alis caudatis, fulvis, ſuprà limbo faſciiſque fuſcis, ſubtùs auro punctatis.* Fab. *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 68. *n°.* 645.

Heſperia R. *Perion.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 275. *n°.* 61.

Papilio Perion. Cram. *pl.* 379. *fig.* B. C.

Papilio Perion. Herbst, *Pap. tab.* 286. *fig.* 5. 6.

Il a un peu plus d'un pouce d'envergure. Le deſſus des ailes eſt d'un brun-noirâtre, avec des bandes tranſverſales d'un fauve-luiſant.

Le deſſous eſt jaunâtre vers la baſe, ferrugineux vers l'extrémité, avec une multitude de points dorés & cerclés de noir. Les ailes inférieures ont en outre le long du bord terminal une ligne élevée de la couleur des points & bordée de noir en arrière.

L'individu que nous avons vu paroît être une femelle.

De Surinam.

104. Polyommate Harpax.

Polyommatus Harpax.

Pol. alis caudatis, fulvis, nigro maculatis : ſubtùs cinereis, punctis aureis. Fab.

Papilio P. R. *Harpax.* Fab. *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 67. *n°.* 643.

Heſperia R. *Harpax.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 274. *n°.* 59.

Fabricius le décrit ainſi : il eſt de moyenne taille. Ses antennes ſont en maſſue, noires, avec des points latéraux, & une bande plus large avant la maſſue, blancs La maſſue a la ſommité ferrugineuſe. Le deſſus des quatre ailes eſt fauve, avec des taches noires, éparſes.

Le deſſous eſt d'un cendré-obſcur, avec pluſieurs taches dorées, relevées en boſſe. La queue eſt ferrugineuſe, avec l'extrémité blanche.

De l'Amérique.

105. Polyommate Lincus.

Polyommatus Lincus.

Pol. alis albis, ſuprà apice fuſco : ſubtùs faſciis tranſverſis atris limboque fulvo ; poſticis angulo ani nigro punctis quatuor albis.

Heſperia R. Lincus, *alis caudatis, albis, apice fuſcis : ſubtùs albo atroque faſciatis, angulo ani punctis tribus albis.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3, *pars* 1. *p.* 289. *n°.* 107.

Papilio Linus. Roem. *Inſ. tab.* 19. *fig.* 10. 11.

Papilio Ætolus. Cram. *pl.* 340. *fig.* F. G. H.

Papilio Ætolus. Herbst, *Pap. tab.* 285. *fig.* 7. 8. 9.

Si ce polyommate avoit deux queues, il ſe placeroit naturellement à côté du *Bathis* (n°. 40) dont il ſe rapproche par le deſſin & par les couleurs.

Il a environ quinze lignes d'envergure. Le deſſus des ailes eſt blanc, avec l'extrémité d'un brun-noirâtre, & diviſée aux inférieures par une double raie blanche. Les ailes ſupérieures ont un point central brun, lequel eſt ſuivi, mais chez le

mâle seulement, d'une grande tache noire presque triangulaire & disposée longitudinalement.

Le dessous est d'un blanc-jaunâtre, avec cinq bandes transverses noires, & le limbe postérieur fauve. Les trois bandes intérieures des secondes ailes remontent le long du bord interne en embrassant une raie fauve, & elles forment vis-à-vis de l'angle anal un coude au-dessous duquel sont quatre points blancs. La queue est noire, avec l'extrémité blanche.

Fabricius n'a pas reconnu dans cette espèce le papillon *Ætolus* de Cramer.

De Surinam & du Brésil.

106. Polyommate Philippe.

Polyommatus Philippus.

Pol. alis caudatis, fuscis : subtùs strigis duabus fulvis punctisque duobus anguli ani atris subocellaribus. Fab.

Hesperia R. *Philippus.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 285. *n°.* 87.

Papilio Philippus. Jon. *Fig. pict.* 6. *tab.* 20. *fig.* 1.

Il est de moyenne taille. Le dessus de toutes les ailes est d'un brun-noirâtre, avec une ligne blanche transverse & deux points noirs un peu ocellés à l'extrémité des inférieures.

Le dessous est blanc, avec deux lignes fauves transverses, qui font anguleuses aux secondes ailes. Ces ailes ont à l'angle de l'anus deux points noirs à iris fauve.

De l'Inde.

(*Traduction de Fabricius.*)

107. Polyommate Phorbas.

Polyommatus Phorbas.

Pol. alis caudatis, fuscis, disco albo : subtùs albis, cinereo strigosis; punctis duobus anguli ani atris. Fab.

Hesperia R. *Phorbas.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 277 *n°.* 68.

Papilio Phorbas. Jon. *Fig. pict.* 6. *tab.* 2. *fig.* 4.

Il est de moyenne taille. Le dessus des quatre ailes est d'un brun-noirâtre, avec le disque blanc, mais un peu fait aux inférieures, lesquelles ont en outre le bord postérieur blanc & tacheté de brun.

En dessous, le fond de toutes les ailes est blanc, avec une tache cendrée transversale sur le milieu, & des lignes cendrées également transversales vers l'extrémité. A l'angle de l'anus sont deux taches d'un noir-brun.

De l'Inde.

(*Traduction de Fabricius.*)

108. Polyommate Jarbas.

Polyommatus Jarbas.

Pol. alis suprà fulvis, limbo fusco : subtùs fusco-cæsiis lineolâ geminâ strigâque undulatâ albis; posticis punctis duobus nigris, exteriori lunulæ fulvæ subjecto.

Papilio P. R. Jarbas, *alis caudatis, fulvis, limbo fusco : subtùs cinereis, strigâ albâ; posticis punctis duobus atris.* Fab. *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 68. *n°.* 648.

Hesperia R. *Jarbas.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 276. *n°.* 65.

Papilio Melampus. Cram. *pl.* 362. *fig.* G. H.

Papilio Melampus. Herbst, *Pap. tab.* 301. *fig.* 3. 4.

Papilio Jarbas. Donow. *of an Epitome of the Nat. Hist. of Insects of India, cah.* 7. *pl.* 1. *fig.* 3.

Le papillon *Jarbas* de Fabricius nous paroît bien être le même que le *Melampus* de Cramer.

Il a près d'un pouce & demi d'envergure. Le dessus des ailes est d'un fauve-ponceau, avec une bordure extérieure brune, large aux ailes de devant, très-étroite à celles de derrière.

Le dessous est d'un brun-très-pâle, avec un double trait discoïdal & une ligne postérieure ondulée d'un blanc fale & bordés intérieurement de brun un peu plus intense que le fond. A l'angle interne des secondes ailes sont deux gros points noirs, dont l'extérieur immédiatement surmonté d'une lunule fauve, & séparé de l'intérieur par un groupe d'atomes bleuâtres. Le corps est brun, mais moins foncé en dessous. La queue est noire de part & d'autre, avec le bout blanc.

Nous n'avons vu que le mâle.

Du Bengale & de l'île de Java.

109. Polyommate Epiclès.

Polyommatus Epicles.

Pol. alis suprà fuscis (maris *violaceo micantibus*) : *anticis disco, posticis maculis marginalibus fulvis : subtùs omnibus flavis, fasciâ terminali sanguineâ lunulis albis intùs marginatâ.*

Il a un peu plus d'un pouce d'envergure. Le dessus des ailes est d'un brun-noirâtre, avec une tache orbiculaire sur le milieu des supérieures, & des lunules à l'extrémité des inférieures, d'un fauve-orangé. Le mâle a un reflet violet, & la femelle offre sur le disque des secondes ailes une petite liture rouffâtre.

Le dessous des deux sexes est d'un beau jaune, avec une bande terminale d'un rouge-sanguin, laquelle est chargée à son côté interne d'une série de lunules blanches bordées de noir, & à son

côté externe d'une ligne noire entrecoupée de blanc.

De Java.

110. Polyommate du Bouleau.

Polyommatus Betulæ.

Pol. alis suprà fuscis : subtùs luteis, sesquistrigâ undulatâ albâ limboque postico rufo.

Papilio P. R. *alis subcaudatis, fuscis, primoribus maculâ reniformi fulvâ : subtùs luteis, fasciâ fulvâ.* Linn. *Syst. Nat.* 2. *p.* 787. *n°.* 220. — *Faun. Suec. edit.* 2. *p.* 282. *n°.* 1070.

Papilio P. R. Betulæ, *alis subcaudatis, fuscis : subtùs luteis ; posticis strigis duabus albis.* Fab. *Spec. Inf. tom.* 2. *p.* 118. — *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 68. *n°.* 649.

Hesperia R. *Betulæ.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 277. *n°.* 60.

Papilio Betulæ. Esp. *Pap. Eur. p.* 256. *tab.* 19. *fig.* 1.

Papilio Betulæ. Wien. *Verz. p.* 186. *fam.* O. *n°.* 2.

Papilio Betulæ. Illig. N. *Aufg. Def. tom.* 2. *p.* 278. *n°.* 2.

Roes. *Inf. tab.* 6. *fig.* 1-4.

Schæff. *Icon. tab.* 212. *fig.* 1. 2. (Fœm.) — *tab.* 275. *fig.* 1. 2. (Mas.)

Papilio Betulæ. Hufnagel, *Tabell. imp. Berl. Mag. tom.* 2. *p.* 68. *n°.* 23.

Papilio Betulæ. Bergstr. *Nomencl. tab.* 36. *fig.* 1-4. — *tab.* 70. *fig.* 3. 4.

Papilio Betulæ. Borkh. *Eur. Schmett. part.* 1. *p.* 134 & 265. *n°.* 1.

Papilio Betulæ. Borkh. *Rhein. Magaz. tom.* 1. *p.* 297. *n°.* 107.

Papilio Betulæ. Schneid. *Syst. Beschr. p.* 217. *n°.* 127.

Papilio Betulæ. Lang. *Verz.* 2. *p.* 45. *n°.* 361-364.

Papilio Betulæ. Fuessl. *Suiss. Inf. p.* 31. *n°.* 591.

Papilio Betulæ. Brahm. *Inf. Kalend. p.* 232. *n°.* 128.

Papilio Betulæ. Schwarz, *Raupenkal. p.* 32. *n°.* 177.

Papilio Betulæ. Panzer, *Faun. Germ.* 21. 20.

Papilio Betulæ. Herbst, *Pap. tab.* 307. *fig.* 13.

Papilio Betulæ. Petagna, *Inst. Ent. p.* 479. *n°.* 105.

Papilio Betulæ. Ochsenh. *Pap. Eur. tom.* 1.

Papilio Betulæ. Hubn. *Pap. tab.* 76. *fig.* 383-385.

Le Porte-queue fauve à deux bandes blanches. Geoff. *Hist. Inf. tom.* 2. *p.* 58. *n°.* 27.

Le Porte-queue à bandes fauves. Engram. *Pap. Eur. tom.* 1. *p.* 152. *pl.* 35. *fig.* 70. a-f.

Polyommate du Bouleau. Latreille, *nouv. Dict. d'Hist. nat.* 2e. *édit. tom.* 27. *p.* 483.

Polyommate du Bouleau. Godart, *Hist nat. des lépidoptères de France, tom.* 1. *p.* 181. *pl.* 9. *fig.* 1.

Polyommate du Bouleau. Godart, *Tableau méthodique des lépidoptères de France,* Diurnes, *p.* 46. *n°.* 128.

Il a près d'un pouce & demi d'envergure. Le dessus des deux sexes est d'un brun-noirâtre, avec une bande fauve réniforme sur le milieu des ailes supérieures de la femelle, & quelques taches roussâtres, plus ou moins prononcées, sur les ailes correspondantes du mâle. Les ailes inférieures ont l'angle anal & l'origine de la queue fauves.

Le dessous est d'un jaune-fauve, avec deux lignes blanches, transverses, légèrement ondulées, dont l'antérieure plus courte. Ces lignes sont bordées de noirâtre sur un de leurs côtés, & l'espace qui les sépare est d'un roux-vif ainsi que l'extrémité de chaque aile.

La chenille est verte, avec des lignes longitudinales & des traits obliques jaunes sur chaque côté du corps. Elle vit sur le *bouleau commun*, le *prunier domestique*, le *prunellier*, &c. Elle se métamorphose vers la mi-juin.

La chrysalide est lisse, brune, avec des raies un peu plus claires.

Cette espèce est commune dans les bois & dans les jardins de l'Europe, depuis la fin de juillet jusqu'à la mi-septembre.

111. Polyommate du Prunier.

Polyommatus Pruni.

Pol. alis fuscis, fasciâ posticâ fulvâ, suprà maculari, subtùs continuâ punctisque nigris intùs & extùs marginatâ.

Papilio P. R. Pruni, *alis subcaudatis, suprà fuscis : posticis subtùs fasciâ marginali fulvâ nigro punctatâ.* Linn. *Syst. Nat. tom.* 2. *p.* 788. *n°.* 221. — *Faun. Suec. édit.* 2. *p.* 283. *n°.* 1071.

Papilio P. R. *Pruni.* Fab. *Spec. Inf. tom.* 2. *p.* 118. — *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 68. *n°.* 650.

Hesperia R. *Pruni.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 277. *n°.* 70.

Papilio Pruni. Esp. *Pap. Eur. part.* 1. *tab.* 19. *fig.* 3. — *tab.* 39. *Suppl.* 15. *fig.* 1.

Papilio Pruni. Wien. *Verz. p.* 186. *fam.* O. *n°.* 4.

Roes. *Inf. part.* 1. *tab.* 7. *fig.* 1. 5.

Naturf. 6. *p.* 6. *n°.* 24.

Schæff. *Element. tab.* 94. *fig.* 5.

Papilio Pruni. Illig. N. *Aufg. Deſs. tom.* 2. *p.* 279. *n°.* 4.

Papilio Pruni. Bergstr. *Nomenkl. tab.* 36. *fig.* 5-9.

Papilio Pruni. Borkh. *Eur. Schmett. part.* 1. *p.* 135 & 264. *n°.* 2.

Papilio Pruni. Borkh. *Rhein. Magaz. tom.* 1. *p.* 297. *n°.* 106.

Papilio Pruni. Schneid. *Syſt. Beſchr. p.* 220. *n°.* 129.

Papilio Pruni. Lang. *Verz. tom.* 2. *p.* 46. *n°.* 365-368.

Papilio Pruni. Fuessl. *Suiſs. Inſ. p.* 31. *n°.* 592.

Papilio Pruni. Rossi, *Faun. Etr. tom.* 2. *p.* 154. *n°.* 1029.

Papilio Pruni. Brahm, *Inſ. Kalend. p.* 234. *n°.* 129 & 533. *n°.* 391.

Schwarz, *Raupenkal. p.* 46 & 177.

Papilio Pruni. Hubn. *Pap. tab.* 76. *fig.* 386. 387.

Papilio Prorſa. Hufnag. *Tab. im. Berl. Mag. tom.* 2. *p.* 68. *n°.* 24.

Papilio Pruni. Herbst, *Pap. tab.* 307. *fg.* 4. 5.

Papilio Pruni. Petagna, *Inſ. Ent. p.* 479. *n°.* 106.

Papilio Pruni. Ochsenh. *Pap. Eur. tom.* 1.

Le Porte-queue brun à lignes blanches. Engram. *Pap. Eur. tom.* 1. *p.* 157. *pl.* 35. *fig.* 72. c. d. & *pl.* 36. *fig.* 73. a-f.

Polyommate du Prunier. Latr. *nouv. Dict. d'Hiſt. nat.* 2e. *édit. tom.* 27. *p.* 484.

Polyommate du Prunier. God. *Hiſt. nat. des lépid. de France, tom.* 1. *p.* 184. *pl.* 9. *fig.* 2.

Polyommate du Prunier. God. *Tabl. méth. des lépid. de France*, Diurnes, *p.* 47. *n°.* 129.

Il a environ quinze lignes d'envergure. Le deſſus des deux ſexes eſt d'un brun-noirâtre, avec une bande poſtérieure de taches fauves. Cette bande manque aſſez ſouvent aux ailes ſupérieures du mâle.

Le deſſous eſt d'un brun-jaunâtre, avec une ligne blanche interrompue, placée tranſverſalement derrière le milieu, & ſuivie d'une bande fauve continue, dont les deux côtés ſont bordés par des points noirs. Les points qui bordent le côté externe de cette bande ſont lunulés; ceux qui bordent ſon côté interne ſont arrondis & ſurmontés chacun d'un petit arc blanc.

La chenille eſt verte, rayée longitudinalement & obliquement de blanchâtre, avec la tête jaune & marquée de deux points noirâtres oculaires. Son dos offre des tubercles à ſommité noire. Elle vit ſur le prunier ſauvage.

La chryſalide eſt courte, renflée en arrière, brune, avec la partie antérieure tiquetée de blanchâtre.

Ce polyommate paroît au commencement de juin. On le trouve aux environs de Paris, & particulièrement dans la forêt de Bondy, près de la manufacture de poudrette.

112. Polyommate W-blanc.

Polyommatus W-album.

Pol. alis fuſcis: poſticis ſubtùs ſtrigâ mediâ albâ in W *deſinente, faſciâque marginali ruſâ, flexuoſâ, nigro marginatâ.*

Papilio P. R. W-album, *alis bicaudatis, ſuprà fuſcis: poſticis ſubtùs* W-*albo notatis, faſciâ arcuatâ aurantiâ ſaturatiore.* Knoch, *Beytr. part.* 2. *p.* 85. *tab.* 6. *fig.* 1. 2.

Bergstr. *Nomenkl. tab.* 71. *fig.* 1. 2.

Papilio W-*album.* Devill. *Ent. Linn. tom.* 2. *p.* 85. *n°.* 173. *tab.* 4. *fig.* 12.

Papilio W-*album.* Borkh. *Eur. Schmett. part.* 2. *p.* 216. *n°.* 5. 6.

Papilio W-*album.* Borkh. *Rhein. Magaz. tom.* 1. *p.* 296. *n°.* 105.

Papilio W-*album.* Brahm, *Inſ. Kalend. p.* 372. *n°.* 249.

Papilio W-*album.* Fuessl. N. *Magaz. tom.* 1. *p.* 329.

Papilio W-*album.* Hubn. *Pap. tab.* 75. *fig.* 380. 381.

Papilio W-*album.* Ochs. *Pap. Eur. tom.* 1.

Papilio W-*album.* Herbst, *Pap. tab.* 308. *fig.* 1. 2.

Papilio W-*latinum.* Lang. *Verz.* 2. *p.* 46. *n°.* 373. 374.

Variété du Porte-queue brun à deux bandes de taches fauves. Geoff. *tom.* 2. *p.* 62. N. B.

Le Porte-queue brun à une ligne blanche. Engram. *Pap. Eur. tom.* 1. *p.* 306. *pl.* 82. — *Suppl.* 2. *pl.* 3. *fig.* 72. a. b. c. *bis.*

Polyommate W-blanc. Latr. *nouv. Diction. d'Hiſt. nat.* 2e. *édit. tom.* 27. *p.* 484.

Polyommate

Polyommate W-blanc. God. *Hiſt. natur. des pap. de France, tom.* 1. *p.* 188. *pl.* 9. *fig.* 3. & *pl.* 9 *tert. fig.* 2.

Polyommate W-blanc. God. *Tabl. méthod. des lépid. de France,* Dubnes, *p.* 47. *n°.* 130.

Il a environ quinze lignes d'envergure. Le deſſus des deux ſexes eſt d'un brun-noirâtre-chatoyant, ſans taches dans la femelle, avec un point griſâtre près du milieu de la côte des ailes ſupérieures dans le mâle.

Le deſſous eſt de la couleur du deſſus, avec une ligne blanche, tranſverſe, légèrement interrompue, poſtérieure aux premières ailes, médiaire & finiſſant par un W aux ſecondes. Le bord terminal de ces dernières ailes eſt preſqu'entièrement longé par une bande fauve, continue, flexueuſe, ayant le côté interne bordé par une ligne noire en feſton, & le côté externe par des taches noires triangulaires.

La chenille eſt verte, avec un double rang de petites pointes le long du dos, & trois taches d'un rouge-foncé à chacun des anneaux poſtérieurs du ventre. Elle vit ſur l'*orme*, & elle ſe métamorphoſe ſous l'écorce de cet arbre.

La chryſalide eſt pubeſcente, d'un brun-griſâtre, avec l'enveloppe des ailes plus foncée.

Ce polyommate habite l'Europe, & il ſe trouve le long des routes.

113. Polyommate Lyncée.

Polyommatus Lynceus.

Pol. alis fuſcis : poſticis ſubtùs lunulis marginalibus rufis, & antè has ſtrigâ è lineolis albis ; lineolâ inferiori obliquâ.

Papilio P. R. Lynceus, *alis caudatis, fuſcis, immaculatis : poſticis ſubtùs ſtrigâ lunulatâ albâ rufâque.* Fab. *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 69. *n°.* 653.

Heſperia R. *Lynceus.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 279. *n°.* 73.

Roes. *Inſ. part.* 1. *tab.* 9. *fig.* 1-3.

Naturf. *part.* 6. *p.* 6. *n°.* 24. — *part.* 10. *p.* 89.

Papilio Ilicis (fem.). Esp. *Pap. Eur. part.* 1. *tab.* 39. *Suppl.* 15. *fig.* 1.

Papilio Ilicis. Borkh. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 138 & 267. *n°.* 5. — *part.* 2. *p.* 216.

Papilio Ilicis. Borkh. *Rhein. Magaz. tom.* 1. *p.* 296. *n°.* 104.

Papilio Ilicis. Schneid. *Syſt. Beſchr. p.* 218. *n°.* 128.

Papilio Ilicis. Brahm. *Inſ. Kalend. p.* 374. *n°.* 250.

Papilio Ilicis. Schwarz, *Raupenkal. p.* 348.

Papilio Ilicis. Hubn. *Pap. tab.* 75. *fig.* 378. 379.

Papilio Cerafi. Herbst, *Pap. tab.* 307. *fig.* 8. 9.

Papilio Ilicis. Ochsen. *Pap. Eur. tom.* 1.

Le Porte-queue brun à deux bandes de taches fauves. Geoff. *Hiſt. Inſ. tom.* 2. *p.* 60. *n°.* 28.

Le Porte-queue brun à taches fauves. Engram. *Pap. d'Eur. tom.* 1. *p.* 159. *pl.* 36. *fig.* 75. a. b.

Polyommate interrompu. Latr. *nouv. Dict. d'Hiſt. nat.* 2e. *édit. tom.* 27. *p.* 485.

Polyommate Lyncée. God. *Hiſt. nat. des lépid. de France, tom.* 1. *p.* 186. *pl.* 9. *tert. fig.* 1.

Polyommate Lyncée. God. *Tabl. méthodique des lépid. de France,* Dubnes, *p.* 47. *n°.* 131.

Il a environ quinze lignes d'envergure. Le deſſus des deux ſexes eſt d'un brun-noirâtre-chatoyant, avec une tache fauve orbiculaire ſur les ailes ſupérieures de la femelle. Le mâle a auſſi quelquefois une tache ſur ces ailes, mais elle eſt plus petite & moins prononcée.

Le deſſous eſt d'un brun un peu moins foncé que le deſſus, avec un ligne blanche, poſtérieure, tranſverſe, compoſée de petits traits dont l'inférieur oblique aux ſecondes ailes. Ces ailes ont en outre une rangée marginale de cinq à ſix lunules rouſſes, bordées de noir en avant, & ſuivies d'une ligne blanche continue qui va du ſommet à l'angle de l'anus.

La chenille eſt pubeſcente, d'un vert-pâle, avec la tête & les pattes écailleuſes noires, & trois lignes jaunes longitudinales, interrompues. Elle vit ſur le *chêne* & ſur l'*orme*.

La chryſalide eſt d'un brun-jaunâtre, avec trois rangées de points obſcurs à la partie poſtérieure.

Bois de l'Europe, de la mi-juin à la mi-juillet.

114. Polyommate du Marronnier.

Polyommatus Æſculi.

Pol. alis fuſcis : poſticis ſubtùs lunulis marginalibus intenſivè rufis, minutis, & antè has ſtrigâ è lineolis albis ; lineolâ inferiori C *ſupinum referente.*

Heſperia R. Cerafi, *alis caudatis, fuſcis, immaculatis : ſubtùs ſtrigâ albâ : poſticis lunulis fulvis puncto nigro notatis.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3 *pars* 1. *p.* 299. *n°.* 74 ?

Papilio Æſculi. Hubn. *Pap. tab.* 109. *fig.* 559. 560.

Papilio Æſculi. Ochs. *Pap. Eur. tom.* 1.

Polyommate du Marronnier. God. *Hiſt. nat. des lépid. de France, tom.* 2. *p.* 162. *pl.* U. XXI. *fig.* 3. 4.

Polyommate du Marronnier. God. *Tab. méthod. des lépid. de France*, Diurnes, *p.* 48. *n°.* 152.

Il a de treize à quatorze lignes d'envergure. Le deſſus des ailes eſt d'un brun-noirâtre-chatoyant, avec un point fauve à l'angle anal des inférieures.

Le deſſous eſt d'un brun tirant ſur le cendré, avec la baſe un peu bleuâtre, & l'extrémité traverſée par une ligne flexueuſe de petits traits blancs, dont l'inférieur repréſentant un C renverſé aux ſecondes ailes. Ces mêmes ailes ont une rangée marginale de ſix petites taches d'un roux-foncé, bordées de noir antérieurement, & ſuivies d'une ligne blanche continue.

Nous n'avons pas vu la femelle.

Dans les départemens les plus méridionaux de la France, au printemps & en été.

Nota. Diſtinct du polyommate *Lyncée* : 1°. par ſa taille qui eſt plus petite; 2°. par le ton un peu griſâtre du deſſous de ſes quatre ailes, la vivacité & l'exiguité des lunules fauves des inférieures; 3°. par le C qui termine inférieurement la ligne blanche de ces dernières ailes.

115. Polyommate de l'Acacia.

Polyommatus Acaciæ.

Pol. alis ſuprà fuſcis : ſubtùs cineraſcenti-griſeis, ſtrigâ interruptâ albâ; poſticis lunulis marginalibus rufis approximatis. (Fœminæ *ano barbato nigro.*)

Papilio P. R. Acaciæ, *alis caudatis, fuſcis : ſubtùs cineraſcentibus, ſtrigâ albâ lunuliſque analibus fulvis.* Fab. *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 69. *n°.* 655.

• *Heſperia* R. *Acaciæ.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 299. *n°.* 75.

Papilio Acaciæ. Herbst, *Pap. tab.* 308. *fig.* 3. 4.

Papilio Acaciæ. Ochs. *Pap. Eur. tom.* 1.

Polyommate de l'Acacia. God. *Hiſt. nat. des lépid. de France, tom.* 2. *p.* 165. *pl.* U. XXI. *fig.* 5. 6. 7.

Polyommate de l'Acacia. God. *Tab. méthod. des lépid. de France*, Diurnes, *p.* 48. *n°.* 133.

Il a de treize à quatorze lignes d'envergure. Le deſſus des ailes eſt d'un brun-noirâtre-chatoyant, avec des taches fauves à l'angle interne des inférieures, au nombre de deux chez le mâle, & de quatre chez la femelle.

Le deſſous eſt d'un gris-cendré, avec la baſe un peu bleuâtre, & l'extrémité traverſée par une ligne flexueuſe de petits traits blancs. Les ſecondes ailes ont un cordon marginal de ſix taches fauves très-rapprochées & bordées de noir antérieurement. Les deux taches extérieures ſont plus petites & moins prononcées que les autres, la quatrième en deſcendant s'appuie ſur un point noir, la cinquième a le milieu noirâtre & ſaupoudré de blanchâtre, l'anale eſt preſque quadrangulaire. Derrière ces taches, il y a une ligne blanche continue.

La femelle a l'anus terminé par une houppe de poils très-noirs.

Du midi de la Ruſſie, de la Lozère, des Pyrénées orientales, &c.

116. Polyommate du Prunellier.

Polyommatus Spini.

Pol. alis ſuprà fuſcis : ſubtùs cinereis, ſtrigâ undulatâ albâ; poſticis lunulis marginalibus fulvis maculâque anguli ani argenteo-cœruleâ.

Papilio P. R. Spini, *alis caudatis, fuſcis : ſubtùs cinereis, lunulis marginalibus fulvis maculâque analî cœruleſcente.* Fab. *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 68. *n°.* 651.

Heſperia R. *Spini.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *p.* 278. *n°.* 71.

Papilio Spini. Wien. *Verz. p.* 186. *ſum.* O. *n°.* 5.

Papilio Spini. Illig. *N. Auſg. Deſſ. tom.* 2. *p.* 280. *n°.* 5.

Schæff. *Icon. tab.* 14. *fig.* 1. 2.

Papilio Spini. Rossi, *Faun. Etr. tom.* 2. *p.* 155. *n°.* 1030.

Papilio Spini. Petagna, *Inſtit. Ent. tom.* 1. *p.* 480. *n°.* 107.

Papilio Spini. Hubn. *Pap. tab.* 75. *fig.* 376. 377.

Papilio Spini. Ochsen. *Pap. Eur. tom.* 1.

Papilio Spini. Herbst, *Pap. tab.* 307. *fig.* 6. 7.

Papilio Lynceus. Esp. *Pap. Eur. part.* 1. *tab.* 39. *Suppl.* 15. *fig.* 3.

Papilio Lynceus. Borkh. *Pap. Eur. part.* 1. *pag.* 140 & 260. *n°.* 8. — *part.* 2. *p.* 218.

Papilio Lynceus. Schneid. *Syſt. Beſchr. p.* 222. *n°.* 131.

Naturf. 6. *p.* 6. *n°.* 24.

Porte-queue brun à taches bleues. Engram. *Pap. d'Eur. tom.* 1. *p.* 158. *pl.* 36. *fig.* 74. a. b.

Porte-queue gris-brun. Engram. *Pap. d'Eur. tom.* 1. *p.* 307. *pl.* 82. *Sup.* 2. *pl.* 3. *fig.* 74. a-d. *bis.*

Polyommate du Prunellier. Latr. *nouv. Dict. d'Hiſt. nat. édit.* 2. *tom.* 27. *p.* 483.

Polyommate du Prunellier. God. *Hiſt. nat. des lépid. de France, tom.* 2. *p.* 167. *pl.* U. XXI. *fig.* 8. 9.

Polyommate du Prunellier. GOD. *Tab. méthod. des lépid. de France*, DIURNES, *p.* 48. *n°.* 134.

Il a près d'un pouce & demi d'envergure. Le deſſus des deux ſexes eſt d'un brun-noirâtre-chatoyant, tantôt ſans taches, tantôt avec deux ou trois points fauves près de l'angle anal des ailes inférieures.

Le deſſous eſt cendré, & traverſé au-delà du milieu par une raie blanche, ondulée, interrompue par places, & formant un V très-évaſé vers le bas du bord interne des ſecondes ailes. Ces ailes ont une rangée marginale de ſept taches, dont la ſeconde, à partir de l'angle de l'anus, d'un bleu-argenté & preſque quadrangulaire, les ſix autres fauves, lunulées, inégales, & bordées de noir. Après ces taches, il y a une ligne blanche, légèrement briſée vis-à-vis de la queue, & s'effaçant à meſure qu'elle approche du ſommet de l'aile.

La chenille, ſelon Fabricius, eſt verte, avec la tête noire, & des lignes de taches jaunes le long du dos. Elle vit ſur le *prunellier*.

La chryſalide a le deſſus brun, le deſſous cendré & duveteux.

On trouve ce polyommate en juillet & en août, dans pluſieurs départemens du midi de la France, dans quelques contrées de l'Allemagne, &c.

117. POLYOMMATE du Chêne.

POLYOMMATUS Quercûs.

Pol. alis fuſcis, maris *violaceo nitentibus*, fœminæ *maculâ bifidâ baſeos anticarum cœruleâ : ſubtùs ſenceo-griſeis, ſtrigâ undulatâ albâ maculiſque duabus anguli ani fulvis.*

Papilio P. R. Quercûs, *alis ſubcaudatis, ſuprà cœruleis : ſubtùs cinereis, lineâ albâ, punctо ani gemino fulvo.* LINN. *Syſt. Nat. tom.* 1. *part.* 2. *p.* 788. *n°.* 222. — *Faun. Suec. edit.* 2. *p.* 283. *n°.* 1072. — *Muſ. Lud. Ulr. p.* 313. *n°.* 132.

Papilio P. R. Quercûs, *alis ſubcaudatis, cœruleſcentibus : ſubtùs cinereis, ſtrigâ albâ punctoque ani gemino fulvo.* FAB. *Spec. Inſ. tom.* 2. *pag.* 118. — *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 69. *n°.* 652.

Heſperia R. *Quercûs.* FAB. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 278. *n°.* 72.

ROES. *Inſ. part.* 1. *tab.* 9. *fig.* 4. 5.

SCHÆFF. *Icon. tab.* 58. *fig.* 4. 5.

NATURF. 14. *p.* 50. *tab.* 2. *fig.* 5. 6.

Papilio Quercûs. ESP. *Pap. Eur. part.* 1. *tab.* 19. *fig.* 2. a. b. c.

Papilio Quercûs. WIEN. *Verz. p.* 186. *fam.* O. *n°.* 3.

Papilio Quercûs. DEVILL. *Ent. Linn. tom.* 2. *p.* 63. *n°.* 116.

Papilio Quercûs. ILLIG. *N. Aufg. Deſs. tom.* 2. *p.* 279. *n°.* 3.

Papilio Quercûs. BERGSTR. *Nomenkl. tab.* 37. *fig.* 1-5.

Papilio Quercûs (mas). PANZER, *Faun. Germ.* 21. 21.

Papilio Quercûs. BORKH. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 136 & 265. *n°.* 3.

Papilio Quercûs. BORKH. *Rhein. Magaz. tom.* 1. *p.* 205. *n°.* 103.

Papilio Quercûs. SCHNEID. *Syſt. Beſchr. p.* 221. *n°.* 130.

Papilio Quercûs. LANG. *Verz.* 2. *p.* 47. *n°.* 375-379.

Papilio Quercûs. BRAHM. *Inſ. Kalend. part.* 1. *p.* 375. *n°.* 251.

Papilio Quercûs. SCHWARZ, *Raupenkal. p.* 47. 178. 344.

Papilio Quercûs. ROSSI, *Faun. Etr. tom.* 2. *p.* 155. *n°.* 1031.

Papilio Quercûs. FUESSL. *Suiſſ. Inſ. p.* 31. *n°.* 593.

Papilio Quercûs. PÉTAGNA, *Inſ. Ent. tom.* 1. *p.* 480. *n°.* 108.

Papilio Quercûs. HERBST, *Pap. tab.* 306. *fig.* 1-4.

Papilio Quercûs. ROEM. *Gen. Inſ. tab.* 18. *fig.* 10. (Fœmina.)

Papilio Quercûs. HUBN. *Pap. tab.* 73. *fig.* 368-370.

Papilio Quercûs. OCHSEN. *Pap. Eur. tom.* 1.

Papilio Epeus. SULZ. *Inſ. tab.* 18. *fig.* 10.

Le Porte-queue bleu à une bande blanche. GEOFF. *Hiſt. Inſ. tom.* 2. *p.* 57. *n°.* 26.

ENGRAM. *Pap. Eur. tom.* 1. *p.* 154. *pl.* 33. *fig.* 71. a. b. c. — *pl.* 71. *Suppl.* 17. *fig.* 71. d. e. (La chenille & la chryſ.) f. (Var.)

Polyommate du Chêne. LATR. *nouv. Dict. d'Hiſt. nat.* 2e. *édit. tom.* 27. *p.* 485.

Polyommate du Chêne. GOD. *Hiſt. nat. des lépid. de France, tom.* 1. *p.* 190. *pl.* 9. *ſecund. fig.* 1. *& pl.* 9. *tert. fig.* 3.

Polyommate du Chêne. GOD. *Tab. méthod. des lépid. de France*, DIURNES, *p.* 48. *n°.* 135.

Il a approchant un pouce & demi d'envergure. Le deſſus du mâle eſt d'un brun-noirâtre, & glacé de violet changeant depuis la baſe juſqu'au limbe poſtérieur des quatre ailes.

Le deſſus de la femelle eſt d'un brun-noirâtre,

avec une grande tache bleue, luisante & fortement bifide, à la base des ailes supérieures.

Le dessous des deux sexes est d'un gris-satiné, avec une ligne blanche ondulée, placée transversalement au-delà du milieu, & ayant le côté interne bordé de noirâtre. Derrière cette ligne, il y a à chaque aile une double série de petits arcs blanchâtres peu prononcés, & dont les deux inférieurs embrassant chacun une tache fauve. La tache fauve extérieure des secondes ailes a le milieu chargé d'un point noir.

Chez la femelle, la tache bleue du dessus des premières ailes est quelquefois accompagnée de deux ou trois points orangés.

La chenille est pubescente, grisâtre, avec une ligne de points dorsaux & les incisions jaunes, & la tête brune. Elle vit sur le *chêne*.

La chrysalide est brune, avec des taches plus claires.

On trouve ce polyommate dans les bois taillis, depuis la mi-juin jusqu'à la fin de juillet, & quelquefois plus tard, suivant les localités. Il est très-commun aux environs de Paris.

118. Polyommate Apidanus.

Polyommatus Apidanus.

Pol. alis suprà violaceis (fœminæ *limbo lato fusco*) : *subtùs fuscis, margaritaceo variis cosláque baseos sanguineâ ; postícis ad angulum ani atomis inaurato-viridibus.*

Papilio P. R. Apidanus, *alis caudatis, cœruleis : postícis subtùs fuscis, cœruleo variis, angulo ani maculâ geminâ auratâ.* Fab. *Mant. Ins. tom.* 2. *p.* 69. *n°.* 658.

Hesperia R. *Apidanus.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 280. *n°.* 78. (Le mâle.)

Papilio Apidanus. Cram. *pl.* 137. *fig.* F. G. (Le mâle.)

Papilio Apidanus. Herbst, *Pap. tab.* 285. *fig.* 1. 2.

Papilio Dorimond. Stoll, *Suppl. à* Cram. *pl.* 37. *fig.* 4 & 4 D. (La femelle.)

Il a près de deux pouces d'envergure. Le dessus du mâle est d'un violet-foncé & velouté, avec la gouttière des ailes inférieures d'un noir-brun.

Le dessous est d'un brun-noirâtre, avec l'origine de la côte d'un rouge-ferrugineux. Les premières ailes ont trois bandes transverses d'un gris-jaunâtre, mais la postérieure est glacée de violâtre en face du sommet. Les secondes ailes sont très-irrégulièrement variées de gris de perle, & leur région anale est parsemée d'atomes d'un vert-doré, parmi lesquels on remarque deux points noirs écartés l'un de l'autre. La queue est courte, linéaire, noire & terminée de blanc.

La femelle a le dessus d'un bleu-violet & largement bordé de brun-noirâtre.

De l'île de Java. D'après Cramer, le mâle est de Surinam ; & d'après Stoll, la femelle se trouve au Cap de Bonne-Espérance.

119. Polyommate Hélus.

Polyommatus Helus.

Pol. alis suprà holosericeo-violaceis (fœminæ *limbo lato fusco*) : *subtùs fuscis, griseo reticulatis ; anticis annulis aliquot discì, postícis atomis anguli ani inaurato-viridibus.*

Papilio Helius. Cram. *pl.* 40. *fig.* 201.

Papilio Helius. Herbst, *Pap. tab.* 303. *fig.* 3. 4.

Il a de deux pouces à deux pouces & un quart d'envergure. Le dessus du mâle est d'un violet-foncé & velouté, avec la gouttière des ailes inférieures noirâtre.

Le dessous est d'un brun-noirâtre, réticulé de gris, avec une suite de trois anneaux d'un vert-doré sur le milieu des ailes supérieures, & une petite bande d'atomes du même vert à l'angle anal des inférieures. Cette bande est terminée par un gros point noir, placé contre le bord interne de l'aile. La queue est noire, avec le bout blanc.

La femelle a le dessus des quatre ailes d'un bleu-violet-luisant, avec une large bordure d'un brun-noirâtre.

Nous avons vu un sujet qui n'avoit guère que quinze lignes d'envergure.

Décrit d'après des individus envoyés des Indes orientales par MM. Diard & Duvaucel, naturalistes voyageurs.

Nota. Cramer a figuré le mâle d'après un individu passé. Il s'est trompé en outre en disant que cette espèce se trouvoit à Surinam.

120. Polyommate Eumolphus.

Polyommatus Eumolphus.

Pol. alis suprà viridibus, auro micantibus, limbo atro, posticarum latiore : subtùs fuscis, annulis aliquot frigisque undatis cinerascentibus ; postícis fasciâ abbreviatâ anguli ani argenteo-cœruleâ.

Papilio Eumolphus. Cram. *pl.* 299. *fig.* G. H.

Papilio Eumolphus. Herbst, *Pap. tab.* 298. *fig.* 3. 4.

Il a près de deux pouces d'envergure. Le dessus des ailes est d'un vert à reflet doré, avec une bordure d'un noir-mat, moins large aux supérieures qu'aux inférieures.

Le dessous est d'un brun-obscur, avec quelques anneaux basilaires & des lignes postérieures ondulées d'un cendré-violâtre. Les secondes ailes ont

à l'angle de l'anus une petite bande d'un bleu-argenté.

Ne feroit-ce pas une variété de l'Hélus ? Il en diffère à peine par le deſſous des ailes.

Du Bengale.

121. Polyommate Théocrite.

Polyommatus Theocritus.

Pol. alis caudatis, vireſcentibus, coſtâ obſcuriore : ſubtùs nigris, flavo punctatis. Fab.

Heſperia R. *Theocritus.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 289. *n°.* 106.

Papilio Theocritus. Jon. *Fig. pict.* 6. *tab.* 6. *fig.* 3.

Il eſt de moyenne taille. Le deſſus des quatre ailes eſt d'un vert-pâle à reflet doré, avec la côte largement obſcure. Le deſſous eſt noir, avec quelques lignes tranſverſes de petits points jaunâtres.

Des Indes.

(*Traduction de Fabricius.*)

ß. Bord poſtérieur des ſecondes ailes entier & ayant une queue filiforme.

122. Polyommate Boeticus.

Polyommatus Boeticus.

Pol. alis ſuprà cæruleo-violaceis, limbo fuſco : ſubtùs cinereis, à baſi ad apicem albido undulatis ; poſticis faſciâ integrâ albâ ocelliſque duobus anguli ani auratis.

Papilio P. R. Boeticus, *alis caudatis, fuſco-cæruleſcentibus : ſubtùs cinereſcentibus albido undulatis ; angulo ani ocellis duobus.* Linn. *Syſt. Nat.* 2. *p.* 789. *n°.* 226. (La femelle.)

Papilio P. R. Boeticus, *alis caudatis, cæruleſcentibus : ſubtùs cinereis, albo undatis ; angulo ani ocello gemino aurato.* Fab. *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 69. *n°.* 657. (Le mâle.)

Heſperia R. *Boetica.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 280. *n°.* 77.

Papilio Boeticus. Esp. *Pap. tab.* 27. *Suppl.* 3. *fig.* 3. a. b. — *tab.* 91. *cent.* 41. *fig.* 3.

Papilio Boeticus. Hubn. *Pap. tab.* 74.

Papilio Boeticus. Herbst, *Pap. tab.* 305. *fig.* 3-6.

Papilio Boeticus. Borkh. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 139 & 268. *n°.* 7.

Papilio Boeticus. Schneid. *Syſt. Beſchr. p.* 223. *n°.* 132.

Papilio Boeticus. Lang. *Verz. tom.* 2. *p.* 47. *n°.* 380. 381.

Papilio Boeticus. Petagna, *Inſ. Ent. tom.* 2. *p.* 481. *n°.* 110. *tab.* 7. *fig.* 7.

Papilio Boeticus. Ochsen. *Pap. Eur. tom.* 1.

Polyommate Boeticus. Godart, *Tableau méthodique des lépidoptères de France, tom.* 2. *p.* 49. *n°.* 137.

Papilio Coluthecæ. Fuessl. *Suiſs. Inſ. p.* 31. *n°.* 594. *tab-fig.* 2. 2.

Papilio Coluthecæ. Rossi, *Faun. Etr. tom.* 2. *p.* 155. *n°.* 1032.

Le Porte-queue bleu ſtrié. Geoff. *Hiſt. Inſ. tom.* 2. *p.* 57. *n°.* 25.

Le Porte-queue bleu ſtrié. Engram. *Pap. Eur. tom.* 1. *pl.* 37. *fig.* 76. a. b. — *pl.* 71. *Suppl.* 17. *fig.* 76. c.

Polyommate ſtrié. God. *Hiſt. nat. des lépid. ou pap. de France, tom.* 1. *p.* 192. *pl.* 10. *fig.* 2. & *pl.* 9 *tert. fig.* 4.

Il a de quinze à dix-ſept lignes d'envergure. Le deſſus du mâle eſt d'un violet-bleuâtre, avec le limbe poſtérieur des quatre ailes brun, & l'angle anal des inférieures marqué de deux points noirs oculaires.

Le deſſus de la femelle eſt d'un bleu-violâtre-pâle, avec une large bordure brune, & deux points oculaires ſemblables à ceux du mâle, mais s'alignant avec trois petits cercles blanchâtres, dont les deux extérieurs toujours plus prononcés chez les individus d'Afrique que chez ceux d'Europe.

Le deſſous des deux ſexes eſt cendré, & ondé de blanchâtre depuis la baſe juſqu'à l'extrémité. Indépendamment de cela, les ſecondes ailes ſont traverſées au-delà du milieu par une bande blanche continue, & elles offrent à l'angle de l'anus deux yeux noirs à iris doré & bordé de fauve antérieurement. La queue de ces ailes a le bout & tout le bord externe blancs.

Le corps eſt de la couleur des ailes en deſſus & en deſſous. Les antennes ſont noires, annelées de blanc & terminées par un point roux.

Ce polyommate ſe trouve en Barbarie, aux îles de France, de Sainte-Hélène, de Timor, dans le midi de l'Europe, aux environs de Paris, &c. Il paroît chez nous depuis la mi-août juſqu'à la fin de ſeptembre. La femelle pond dans les fleurs du *bagnaudier commun* (*colutea arboreſcens*), &, ſelon toute apparence, dans celles de quelques légumineuſes. Elle ne conſie qu'un œuf à chaque fleur.

La chenille eſt d'un vert plus ou moins foncé, avec le dos jaſpé de rouge. Elle vit dans la ſilique où elle eſt née. Lorſqu'elle en a mangé toute la ſubſtance, elle ſe loge dans une autre ſilique, & elle a ſoin de boucher le trou par lequel elle eſt entrée. A défaut de bagnaudier, on peut lui donner

des pois verts. Elle ne reſte que dix à douze jours dans l'état de nymphe.

La chryſalide eſt jaunâtre, avec cinq rangées de points noirâtres, tant ſur le dos que ſur le ventre.

123. Polyommate Elien.

Polyommatus Ælianus.

Pol. alis ſuprà lacteis, limbo poſtico fuſco : ſubtùs fuſcescentibus, ſtrigis plurimis faſciâque bifidâ albis ; poſticis ocellis tribus anguli ani argentatis. (Mas.)

Heſperia R. Ælianus, *alis caudatis, albis : ſubtùs cinereis, albo ſtrigoſis ; angulo ani ocello atro.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 280. *n°.* 79.

Papilio Alexis. Stoll, *Suppl. à* Cram. *pl.* 38. *fig.* 3 & 3 C.

Il a de quinze à dix-ſept lignes d'envergure. Le deſſus des ailes eſt d'un blanc de lait, avec le limbe des ſupérieures noirâtre, & l'extrémité des inférieures coupée par une ſérie de points noirs plus ou moins prononcés.

Le deſſous eſt d'un brun-pâle, avec des lignes tranſverſes & une bande bifide blanches. Les lignes des ailes ſupérieures ſont au nombre de cinq, celles des inférieures au nombre de ſept. Les ailes inférieures ont en outre près de l'angle de l'anus trois yeux noirs, ſablés de bleu-argenté. L'œil extérieur eſt plus grand que les deux autres, & il a, ainſi que l'intermédiaire, un iris roux.

Nous n'avons pas vu la femelle.

De Timor. Fabricius le dit des Indes occidentales, & Stoll de Surinam.

124. Polyommate Célério.

Polyommatus Celerio.

Pol. alis ſuprà lacteis, limbo poſtico fuſco : ſubtùs cinereſcentibus, ſtrigis plurimis albis, continuis, undulatis ; poſticis ocellis duobus anguli ani argentatis.

Papilio P. R. Celerio, *alis bicaudatis, albis : ſubtùs faſciis fuſcis albiſque alternis, angulo ani ocello triplici rufo.* Fab. *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 66. *n°.* 625.

Heſperia R. *Celerio.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 265. *n°.* 25. (Le mâle.)

Papilio Celeno. Cram. *pl.* 31. *fig.* C. D. (Le mâle.)

Papilio Atratus. Cram. *pl.* 365. *fig.* A. B. (La femelle.)

Papilio Celeno. Herbst, *Pap. tab.* 291. *fig.* 5. 6.

Papilio Atratus. Herbst, *Pap. tab.* 288. *fig.* 5. 6.

Il a de quinze à dix-ſept lignes d'envergure. Le deſſus des ailes eſt d'un blanc de lait, avec le limbe poſtérieur noirâtre, & ſurmonté aux inférieures d'une rangée ſimple ou double de points également noirâtres.

Le deſſous eſt d'un cendré-pâle, avec des raies blanches, tranſverſes, continues & ondulées, au nombre de ſept, dont la ſeconde & la quatrième plus courtes, ſur les ailes ſupérieures ; au nombre de neuf, dont une quelquefois plus large, ſur les inférieures. Ces dernières ailes ont près de l'angle de l'anus deux yeux roux à prunelle noire & ſablée de bleu-argenté. L'œil intérieur eſt moitié plus petit que l'extérieur & accompagné d'un point noir qui touche le bord interne de l'aile.

Dans la femelle, le limbe des ſecondes ailes eſt précédé en deſſus d'une double ſérie de points noirs.

Des îles de Java, d'Amboine & de Timor. Cramer & Fabricius diſent, mais d'après de faux renſeignemens, qu'il eſt de Surinam.

125. Polyommate Elpis.

Polyommatus Elpis.

Pol. alis ſuprà azureis, nitidis : ſubtùs ſaturato-cinereis, ſtrigis plurimis tenuioribus albis, interruptis, undulatis ; poſticis ocellis duobus anguli ani argentatis. (Mas.)

Il a de quinze à dix-ſept lignes d'envergure. Le deſſus des ailes eſt d'un bleu-azuré-luiſant, avec la frange du bord poſtérieur noirâtre.

Le deſſous eſt d'un cendré-foncé, avec des lignes blanches, tranſverſes, étroites, interrompues & ondulées, au nombre de ſept, dont la troiſième & la quatrième plus courtes, ſur les ailes ſupérieures ; au nombre de neuf, dont l'antérieure moins longue, ſur les inférieures. Ces dernières ailes ont près de l'angle de l'anus deux yeux roux à prunelle noire & tachetée de bleu-argenté. L'œil qui avoiſine le bord interne eſt beaucoup plus petit que l'autre.

Nous n'avons point vu la femelle.

De l'île de Java.

126. Polyommate Hylaïs.

Polyommatus Hylais.

Pol. alis ſuprà azureis, nitidis, diſco albo : ſubtùs fuſcis, faſciâ latâ communi undiſque aliquot albis ; poſticis ſerie marginali ex ocellis ſex nigris, penultimo pupillâ geminâ argenteâ. (Mas ?)

Papilio Hylas. Cram. *pl.* 363. *fig.* E. F.

Il a environ un pouce & demi d'envergure. Le deſſus des ailes eſt d'un bleu-azuré-luiſant, avec une bande blanche diſcoïdale, traverſant entièrement les inférieures, & ne montant pas au-delà du milieu des ſupérieures.

Le deſſous eſt d'un brun-noirâtre, avec une bande pareille à celle du deſſus, mais plus large & ſuivie de quelques ondes blanches. Outre cela, les premières ailes ont un double trait central blanc, & les ſecondes offrent une série marginale de ſix yeux noirs à iris blanc. Ces yeux ſont pour la plupart triangulaires, & le pénultième, ou ſi l'on veut, le cinquième à compter du ſommet, a une double prunelle d'un bleu-argenté.

Décrit d'après un individu unique & ayant un corps rapporté, mais qui nous paroît être un mâle.

D'Amboine.

127. Polyommate Platon.

Polyommatus Plato.

Pol. alis ſuprà violaceo-cœruleis, argenteo micantibus, anticarum apice atro: ſubtùs fuſcis, ſtrigis plurimis undulatis albis; poſticis ocellis tribus anguli ani argentatis.

Heſperia R. Plato, *alis caudatis, cœruleis, limbo fuſco: ſubtùs cinereis, albo undatis; poſticis ocello atro pupillâ geminâ.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 288. *n°.* 103.

Papilio Plato. Jon. *Fig. pict.* 6. *tab.* 14. *fig.* 3.

Papilio Plato. Donow. *of an Epit. of the Nat. Hiſt. Inſ. of India, cah.* 7. *pl.* 3. *fig.* 2.

Il n'a guère qu'un pouce d'envergure. Le deſſus des ailes eſt d'un bleu-violet-luiſant & chatoyant en vert-argenté, avec le ſommet des ſupérieures largement noir, & le bord terminal des inférieures marqué de quelques points noirâtres.

Le deſſous eſt brun, avec des lignes blanches, tranſverſes & ondulées, au nombre de ſept, dont l'antérieure & la quatrième plus courtes, ſur les ailes ſupérieures; au nombre de neuf ſur les inférieures. Ces dernières ailes ont près de l'angle de l'anus trois yeux noirs fablés de bleu-argenté. L'œil poſtérieur eſt beaucoup plus grand que les deux autres, & il a, ainſi que l'intermédiaire, un iris rouſſâtre.

Décrit d'après un individu ſans corps.

De l'Inde, ſelon Fabricius.

128. Polyommate Télicanus.

Polyommatus Telicanus.

Pol. alis ſuprà cœruleſcenti-violaceis, limbo fuſco: ſubtùs cinereis, à baſi ad apicem catenulis albis; poſticis ſtrigâ lunularum albarum ocelliſque duobus anguli ani auratis.

Papilio Telicanus. Hubn. *Pap. tab.* 74. *fig.* 371. 372. Mas. — *tab.* 108. *fig.* 553. 554. Fœm.

Papilio Telicanus. Herbst, *Pap. tab.* 305. *fig.* 7-9.

Papilio Telicanus. Lang. *Verz. tom.* 2. *p.* 47. *n°.* 387-389.

Papilio Telicanus. Ochsen. *Pap. Eur. tom.* 1.

Papilio Boeticus. Esp. *Pap. tab.* 91. *cont.* 41. *fig.* 2.

Polyommate Télicanus. God. *Hiſt. natur. des lépid. de France, tom.* 2. *p.* 172. *pl.* V-XXII. *fig.* 3. 4.

Polyommate Télicanus. God. *Tableau méthod. des lépidoptères de France, p.* 49. *n°.* 158.

Il a de onze à treize lignes d'envergure. Le deſſus du mâle eſt d'un violet légèrement bleuâtre, avec le limbe poſtérieur d'un brun-noirâtre.

Le deſſus de la femelle eſt d'un brun-noirâtre, avec la baſe d'un bleu-violet, & le milieu plus ou moins marqueté de noir.

Le deſſous des deux ſexes eſt cendré, avec des chaînettes blanches depuis la baſe juſqu'à l'extrémité. Les ailes inférieures ont au-delà du milieu une rangée tranſverſe de lunules blanches, & à l'angle de l'anus deux yeux noirs qui ont l'iris d'un vert-doré & preſqu'entièrement bordé de roux. A ces yeux répondent en-deſſus deux points noirâtres oculaires, mais plus prononcés chez la femelle que chez le mâle.

Le corps, les antennes & la queue des ſecondes ailes ſont comme dans le *Boeticus*.

Ce polyommate ſe trouve, en juillet & en août, dans nos départemens les plus méridionaux & dans toutes les contrées adjacentes à la Méditerranée.

129. Polyommate Lybas.

Polyommatus Lybas.

Pol. alis ſuprà cœruleſcenti-violaceis (fœminæ *limbo fuſco*): *ſubtùs fuſcis, anticarum faſciis bifidis catenulâque terminali, poſticarum caruncleribus intricatis albis; poſticis ocellis quatuor anguli ani auratis.*

Il a environ un pouce d'envergure. Le deſſus du mâle eſt d'un violet-bleuâtre-pâle, avec la frange blanche & entrecoupée de brun.

Le deſſus de la femelle eſt d'un bleu-violet-changeant, avec les bords bruns, & le diſque tacheté de blanc.

Le deſſous des deux ſexes eſt brun, avec quatre bandes bifides, & une chaînette terminale, blanches aux premières ailes; avec des hiéroglyphes blancs, entrelacés, aux ſecondes. L'angle interne des ſecondes ailes offre en outre quatre yeux noirs à iris d'un vert-doré, & dont les deux intermédiaires entourés d'un cercle rouſſâtre, les deux extrêmes plus petits.

Chez la femelle, les bandes bifides du deſſous

des premières ailes sont plus larges, & les yeux des secondes se font sentir en dessus.

De Timor.

130. Polyommate Lingéus.

Polyommatus Lingeus.

Pol. alis suprà cœrulescenti-violaceis (fœminæ *limbo fusco*) : *subtùs fuscis, anticarum annulis fasciisque repandis, posticarum maculis difformibus albis; posticis ocellis duobus anguli ani auratis.*

Papilio Lingeus. Cram. *pl.* 379. *fig.* F. G.

Papilio Lingeus. Herbst, *tab.* 288. *n°.* 1. 2.

Il a environ un pouce d'envergure. Le dessus du mâle est d'un violet-bleuâtre-pâle, avec la frange blanche & entrecoupée de brun.

Le dessus de la femelle est d'un bleu-violet-changeant, avec les bords bruns, & le disque des quatre ailes marqueté de blanc, surtout quand le bleu est oblitéré.

Le dessous des deux sexes est brun, avec plusieurs anneaux blancs, & deux bandes blanches, postérieures, sinuées, aux premières ailes; avec des taches blanches, difformes, aux secondes. Il y a en outre, à l'angle interne des secondes ailes, deux yeux noirs à iris d'un vert-doré & entourés d'un cercle roussâtre. Ces yeux sont sensibles en dessus dans la femelle.

Du Cap de Bonne-Espérance.

131. Polyommate Ericus.

Polyommatus Ericus.

Pol. alis caudatis, cœrulescentibus : subtùs albo, fuscoque variis; posticis punctis duobus anguli ani (*albis nigro cinctis*). Fab.

Hesperia R. *Ericus.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 281. *n°.* 81.

Papilio Lingeus. Jon. *Fig. pict.* 6. *tab.* 18. *fig.* 4.

Fabricius rapporte ce polyommate au *Lingeus* de Cramer; mais, comme il le dit d'un autre pays, & qu'il paroît différer en dessous, du moins par le nombre & par la couleur des yeux de l'angle anal des secondes ailes, nous le donnons séparément, sauf à le retrancher s'il est en double emploi.

Le dessus des quatre ailes est d'un bleu-pâle & sans taches.

Le dessous est panaché de blanc & de brun, & il y a près de l'angle anal des secondes ailes deux points blancs entourés d'un cercle noir.

Il ne s'agit sans doute ici que du mâle ?

De l'Inde.

(*Traduction de Fabricius.*)

132. Polyommate Démocrite.

Polyommatus Democritus.

Pol. alis caudatis, cœruleis, nitidissimis : subtùs nigris, albo maculatis. Fab.

Hesperia R. *Democritus.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 285. *n°.* 94.

Les antennes & tout le corps sont noirs. Le dessus des ailes est d'un bleu très-luisant, avec un liseré noir.

Le dessous est noir, avec des points, & des petites lignes transversales, blanchâtres. Les secondes ailes ont à l'angle de l'anus deux yeux noirs à iris d'un vert-doré, & leur queue est noire avec le bout blanc.

Des Indes orientales.

(*Traduction de Fabricius.*)

133. Polyommate Emolus.

Polyommatus Emolus.

Pol. alis suprà violaceis, nitidis : subtùs fusce scentibus; posticis paginâ omni strigis albidis, undulatis, interruptis, punctisque duobus ocellaribus nigris, altero marginis interni, altero postici. (Mas.)

Il n'a guère plus d'un pouce d'envergure. Le dessus du mâle est d'un violet-foncé & luisant, avec deux petites taches noirâtres près de l'angle anal des inférieures.

Le dessous est d'un brun-pâle, avec quatre lignes blanches, transverses & ondulées, dont les deux antérieures beaucoup plus courtes, à l'extrémité des premières ailes. Les secondes ailes ont des lignes semblables sur toute la surface, & elles offrent en outre deux points noirs, dont l'un cerclé de blanc & placé sur le milieu du bord interne, l'autre situé près du bord postérieur & immédiatement surmonté d'une lunule rousse.

La femelle nous est inconnue.

Du Bengale, par feu Macé.

134. Polyommate Strabon.

Polyommatus Strabo.

Pol. alis suprà violaceo-cœrulescentibus, limbo fusco : subtùs cinereis, ponè medium catenulis albidis, punctisque costalibus anticarum unico posticarum duobus nigris; posticis sesqui ocello anguli ani aurato.

Hesperia R. Strabo, *alis caudatis, cœruleis : subtùs cinereis, albo undatis : posticis punctis duobus atris marginalibus duobusque anguli ani.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 287. *n°.* 101.

Il a de douze à quatorze lignes d'envergure. Le dessus du mâle est d'un bleu-violet-pâle, avec le limbe

limbe postérieur finement liseré de brun, & marqué à l'angle interne des secondes ailes d'un simple point noir.

Le dessous est cendré, & il offre à partir du milieu un anneau oblong, puis trois rangées transverses de chainettes blanchâtres. Les premières ailes ont un point noir vers le tiers postérieur de la côte. Les secondes ailes ont deux points semblables sur la moitié antérieure du bord d'en haut, & leur angle anal offre deux yeux noirs à iris doré & bordé de fauve en avant. L'œil extérieur est beaucoup plus gros que celui qui avoisine le bord abdominal.

La femelle a en dessus une bordure brune, médiocrement large, qui est coupée aux premières ailes par quelques traits blancs, & aux secondes par des annelets également blancs, dont le troisième ceignant un gros point noir. On remarque en outre quatre à cinq points bruns derrière le disque des secondes ailes. Le dessous est comme chez le mâle.

De l'Australasie.

135. Polyommate Cnéjus.

Polyommatus Cnejus.

Pol. alis suprà cæruleo-violaceis, limbo fusco : subtùs cinereis, ponè medium catenulis albidis ; posticis punctis quatuor baseos nigris ocellisque duobus anguli ani auratis.

Hesperia R. Cnejus, *alis caudatis, cæruleascentibus, limbo fusco : subtùs cinereis, albo undatis; posticis punctis plurimis baseos duobusque apicis atris.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *Suppl. p.* 450. *n°.* 100-101.

Il a de douze à quatorze lignes d'envergure. Le dessus du mâle est d'un violet-bleuâtre, avec le limbe postérieur brun, & précédé à l'angle anal des secondes ailes de deux points noirs qui sont souvent cerclés de fauve.

Le dessous est cendré, & il offre à partir du milieu un anneau oblong, puis trois rangées transversales de chainettes, blanchâtres. Les secondes ailes ont en outre à la base quatre points noirs ocellés, & à l'angle de l'anus deux yeux noirs à iris d'un vert-doré & bordé de fauve antérieurement.

La femelle a le dessus d'un brun-noirâtre, avec le disque d'un bleu-violâtre, & les deux petits yeux de ses ailes inférieures s'alignent avec trois anneaux blanchâtres. Elle a le dessous comme le mâle.

Des Indes orientales.

136. Polyommate Parrhasius.

Polyommatus Parrhasius.

Pol. alis caudatis, cæruleis (fuscis) : subtùs cinereis, albo strigosis ; posticis punctis marginalibus aureis. Fab.

Hesperia R. *Parrhasius.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 289. *n°.* 108.

Papilio Parrhasius. Jon. *Fig. pict.* 6. *tab.* 16. *fig.* 2.

Papilio Parrhasius. Donow. *of an Epit. of the Nat. Hist. Insects of India, cah.* 7. *pl.* 3. *fig.* 5.

Voici ce qu'en dit Fabricius : il est petit. Le dessus de ses quatre ailes est bleu, avec une bordure brune, qui est précédée aux inférieures d'un rang de points noirs ocellés.

Le dessous est cendré, avec des ondes blanches derrière le milieu. Outre cela, les ailes inférieures ont à la base trois points noirs cerclés de blanc, & à l'extrémité quatre points dorés, dont le troisième marqué de noir.

De l'Inde.

Nota. Il résulte de cette description que le *Parrhasius* ne diffère de la femelle du *Cnéjus*, qu'en ce qu'il a quatre points dorés, au lieu de deux, à l'extrémité des ailes inférieures en dessous.

137. Polyommate Astéris.

Polyommatus Asteris.

Pol. alis suprà argenteo-violaceis, nitidis, limbo fusco : posticis subtùs obscurè cinereis, punctis sex baseos ocellaribus nigris, fusciâ disci crenatâ albâ ocellisque tribus anguli ani cæruleo-argenteis.

Il a un peu plus d'un pouce & demi d'envergure. Le dessus du mâle est d'un violet-argentin-luisant, avec le limbe postérieur brun & frangé de blanc. Les ailes supérieures ont vers le milieu une lunule noirâtre, & les inférieures offrent vers l'angle de l'anus un point noir surmonté d'une lunule fauve.

Le dessous des premières est d'un cendré-clair depuis la base jusqu'au-delà du milieu, avec un anneau central blanc ; ensuite d'un cendré-obscur jusqu'au bout, avec quatre lignes blanches, transverses & ondulées.

Le dessous des secondes ailes est entièrement d'un cendré-obscur, & il présente les caractères que voici : à la base sont six points noirs cerclés de blanc & suivis d'une ligne blanche très-flexueuse ; vient ensuite une bande blanche transverse, crénelée sur chaque côté, puis une série terminale d'annelets blancs, dont les trois plus intérieurs renfermant chacun un œil noir fablé de bleu-argenté. L'œil qui fait face à la queue est surmonté, comme en dessus, d'une lunule fauve.

La femelle a le dessus plus pâle, avec la bordure plus large & marquetée de blanchâtre. Son dessous est comme chez le mâle.

Pris au Cap de Bonne-Eſpérance, près de la montagne de la Table, par M. Jules Verreaux, préparateur de zoologie au Muſéum d'Hiſtoire naturelle de Paris.

138. Polyommate Centaure.

Polyommatus Centaurus.

Pol. alis caudatis, cæruleſcentibus, limbo fuſco : ſubtùs cinereis, maculis baſeos ocellaribus. Fab.

Papilio P. R. *Centaurus.* Fab. *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 68. *n°.* 646.

Heſperia R. *Centaurus.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *pag.* 275. *n°.* 63.

Le deſſus des ailes eſt d'un bleu-pâle, avec la côte des premières, & le bord poſtérieur des quatre, d'un brun-noirâtre.

Le deſſous eſt cendré, avec quatre ou cinq taches brunes cerclées de blanc aux ailes ſupérieures, & ſix à ſept à la baſe des inférieures. Les taches des ailes ſupérieures ſont ſuivies d'une bande brune, bordée de blanc & ne deſcendant pas juſqu'au bord interne de l'aile. Les ailes inférieures ont à l'extrémité des ondes peu prononcées.

De la Nouvelle-Hollande.

(*Traduction de Fabricius.*)

139. Polyommate Théophraſte.

Polyommatus Theophraſtus.

Pol. alis ſuprà cæruleſcenti-violaceis, limbo fuſco : ſubtùs albis, ſtrigis plurimis macularibus atris ; poſticis ocellis quinque marginalibus aureis, analí didymo.

Heſperia R. Theophraſtus, *alis caudatis, fuſcoſcentibus : ſubtùs albis, nigro maculatis ; poſticis punctis quinque marginalibus aureis.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 281. *n°.* 82. (La femelle.)

Il a de dix à douze lignes d'envergure. Le deſſus du mâle eſt d'un violet légèrement bleuâtre, avec le limbe poſtérieur brun, & trois points noirs, dont un près du milieu de la côte des ailes ſupérieures, les deux autres à l'angle interne des inférieures.

Le deſſus de la femelle eſt marqueté de brun & de blanchâtre, & plus ou moins glacé de bleu-violet.

Le deſſous des deux ſexes eſt blanc, avec pluſieurs lignes noires, tranſverſes, & maculaires pour la plupart. Les ſecondes ailes offrent en outre une rangée marginale de cinq yeux dorés à iris noir. L'œil anal eſt double, & le ſuivant repréſente une lunule placée ſur un gros point noir.

Fabricius n'a point connu le mâle.

De la Barbarie. — Feu M. Olivier l'a auſſi trouvé en Egypte.

140. Polyommate Pline.

Polyommatus Plinius.

Pol. alis caudatis, albo fuſcoque variis : poſticis ſubtùs puncto gemino aureo anguli ani. Fab.

Heſperia R. *Plinius.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 284. *n°.* 92.

Papilio Plinius. Jon. *Fig. pict.* 6. *tab.* 48. *fig.* 1.

Papilio Plinius. Donow. *of an Epit. of the Nat. Hiſt. Inſ. of India, pl.* 3. *fig.* 1.

Fabricius le décrit ainſi : il eſt petit, varié de blanc & de noir. Les ailes ſupérieures ont des taches brunes, carrées.

Le deſſous des quatre ailes eſt faſcié, & celui des inférieures offre à l'angle de l'anus un double point doré.

Des Indes.

Nota. Le lépidoptère dont il eſt ici queſtion doit être une femelle voiſine de celle du *Théophraſte ;* auſſi n'en parlons-nous que pour qu'on puiſſe, s'il eſt poſſible, reconnoître l'eſpèce à laquelle il appartient.

141. Polyommate Roſimon.

Polyommatus Roſimon.

Pol. alis utrinquè albis, punctis ſparſis margineque omni nigris : omnibus ſuprà baſi, poſticis ſubtùs punctis tribus anguli ani cæruleo-argenteis.

Papilio P. R. Roſimon, *alis caudatis, albis, ſuprà limbo punctiſque diſci nigris : ſubtùs nigro punctatis ; angulo ani punctis tribus aureis.* Fab. *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 71. *n°.* 672.

Heſperia R. *Roſimon.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 288. *n°.* 104.

Papilio Roſimon. Herbst, *Pap. tab.* 287. *fig.* 5-7.

Papilio Coridon. Cram. *pl.* 340. *fig.* C. D. E.

Il a de douze à quatorze lignes d'envergure. Le deſſus des ailes eſt blanc, avec la baſe glacée de bleu-argenté, des points épars & tout le pourtour extérieur noirs. La bordure de l'extrémité des premières ailes eſt ſans taches, celle de l'extrémité des ſecondes eſt chargée d'une double ſérie de lunules blanches qui ſe regardent par leur concavité.

Le deſſous eſt blanc, avec une multitude de points, & une liture baſilaire oblique, noirs. Les points du bord poſtérieur forment deux rangées, & les trois intérieurs de la rangée externe des ſe-

condes ailes ſont ſablés de bleu-argenté. L'abdomen & les antennes ſont annelés de blanc & de noir.

La femelle reſſemble au mâle, mais elle a le deſſus des ailes plus largement bordé de noir.

De Timor.

142. Polyommate Roxus.

Polyommatus Roxus.

Pol. alis ſuprà atris, diſco communi albo: ſubtùs albis, faſciâ obliquâ baſeos duabuſque macularibus apicis atris.

Il a environ un pouce d'envergure. Le deſſus des ailes eſt d'un noir-brun, avec une bande blanche, commune, diſcoïdale, finuée en dehors, n'atteignant pas la côte des ſupérieures. La queue des inférieures eſt noire, avec le bout blanc.

Le deſſous eſt d'un blanc-jaunâtre, avec une bande oblique à la baſe, deux bandes courbes & maculaires à l'extrémité, d'un noir-brun. Le corps eſt noir, avec des anneaux blancs à l'abdomen.

Nous ne connoiſſons pas la femelle.

De Java.

143. Polyommate Hippocrate.

Polyommatus Hippocrates.

Pol. alis caudatis, fuſcis, apice albis: ſubtùs albis, nigro punctatis. Fab.

Heſperia R. *Hippocrates.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom. 3. pars 1. p. 288. n°. 105.*

Papilio Hippocrates. Jon. *Fig. pict. 6. tab. 17. fig. 1.*

Papilio Hippocrates. Donow. *of an Epit. of the Nat. Hiſt. Inſects of India, cah. 7. pl. 3. fig. 3.*

Il eſt petit. Le deſſus de ſes ailes eſt d'un brun-noirâtre, avec le ſommet des ſupérieures & le bord des inférieures blancs.

Le deſſous eſt blanchâtre, avec une rangée tranſverſe de points noirs aux ailes de devant, & des points noirs épars aux ailes de derrière.

De l'Inde.

(*Traduction de Fabricius.*)

144. Polyommate Gabinus.

Polyommatus Gabinus.

Pol. alis ſuprà argenteo-cœruleis: ſubtùs albis, fuſcescenti undatis; poſticis punctis duobus baſeos duobuſque anguli ani nigris: puncto anali externo lunulæ fulvæ ſubjecto. (Mas.)

Il n'a guère qu'un pouce d'envergure. Le deſſus des ailes eſt d'un bleu-argenté, avec le bord poſtérieur liſeré de noir & garni d'une frange entièrement blanche.

Le deſſous eſt blanc, avec des ondes brunâtres à l'extrémité des ailes ſupérieures, & ſur toute la ſurface des inférieures. Ces dernières ailes ont la baſe d'un vert-argenté-luiſant, & elles offrent quatre points noirs, dont deux à la partie antérieure de la côte, & deux à la région anale. Le point extérieur de l'angle de l'anus eſt ſurmonté d'une bande fauve.

Décrit d'après un mauvais individu mâle.

Du Bréſil?

145. Polyommate Micyclus.

Polyommatus Micyclus.

Pol. alis ſuprà cœruleo-violaceis (fœminæ *limbo fuſco*): *ſubtùs canis, ſtrigis tribus undulatis rufeſcentibus ſerieque marginali è punctis nigris; poſticarum puncto penultimo pupillâ argenteâ.*

Papilio Micyclus. Cram. *pl. 282. fig.* F. G. (La femelle.)

Il a un peu plus d'un pouce d'envergure. Le deſſus du mâle eſt d'un violet-bleuâtre, avec un liſeré obſcur.

Le deſſus de la femelle eſt d'un bleu-violâtre-pâle & largement bordé de brun, avec une rangée d'anneaux blanchâtres à l'extrémité des ailes inférieures.

Le deſſous des quatre ailes, chez les deux ſexes, eſt d'un gris-blanchâtre, avec un arc central, & deux lignes ondulées, rouſſâtres, puis une ſérie marginale de points noirs. L'avant-dernier point des ailes inférieures eſt ſablé de bleu-argenté, & il y a près de la baſe de ces mêmes ailes trois autres points noirs.

Décrit d'après des individus fatigués.

De la côte occidentale d'Afrique.

146. Polyommate Amyntas.

Polyommatus Amyntas.

Pol. alis ſuprà maris *violaceo-cœruleis,* fœminæ *fuſcis: ſubtùs canis, nigro ocellatis; poſticis lunulis duabus anguli ani fulvis puncto ſimplici ſingulatim fœtis.*

Papilio P. R. Amyntas, *alis caudatis, cyaneis, margine nigro: ſubtùs cinereis, punctis nigris, poſticiſque duobus ferrugineis anguli ani.* Fab. *Mant. Inſ. tom. 2. p. 70. n°. 666.*

Heſperia R. *Amyntas.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom. 3. pars 1. p. 285. n°. 95.*

Papilio Amyntas. Wien. *Verz. p. 185. fam. N. n°. 18.*

Papilio Amyntas. Illig. *N. Aufg. Deſſ. tom. 2. p. 274. n°. 18.*

Papilio Amyntas. Herbst, *Pap. tab.* 306. *fig.* 5-7.

Papilio Amyntas. Rossi, *Mant. tom.* 2. *p.* 12. *n°.* 353.

Papilio Amyntas. Hubn. *Pap. tab.* 65. *fig.* 322-324.

Papilio Amyntas. Ochsen. *Pap. Eur. tom.* 1. *edit.* 1.

Papilio Tiresias. Esp. *Pap. Eur. part.* 1. *tab.* 34. *Suppl.* 10. *fig.* 1. 2.

Papilio Tiresias. Naturf. 6. *p.* 23. *n°.* 10.

Papilio Tiresias. Borkh. *Pap. Eur. part.* 1. *pag.* 166 & 280. *n°.* 19. — *part.* 2. *p.* 232.

Papilio Tiresias. Borkh. *Rhein. Magaz. tom.* 1. *p.* 292. *n°.* 100.

Papilio Tiresias. Schneid. *Syst. Beschr. p.* 260. *n°.* 160.

Papilio Tiresias. Devill. *Ent. Linn. tom.* 2. *p.* 75. *n°.* 138.

Le petit Porte-queue. Engram. *Pap. d'Europe, tom.* 1. *p.* 167. *pl.* 37. *fig.* 78. a-d.

ß *Papilio Amyntas, alis caudatis*, maris *suprà cæruleis*, fœminæ *fusco-cæruleis : subtùs laeteo-canis, punctis ocellaribus nigris ; posticis maculis duabus anguli ani ferrugineis : antennis clavâ abbreviatâ, totâ nigrâ, anticè subcrenatâ.* Borkh. *Rhein. Magaz. tom.* 1. *p.* 292. *n°.* 101.

Papilio Tiresias, var. Esp. *Pap. Eur. part.* 1. *tab.* 49. *Suppl.* 25. *fig.* 2.

Papilio Tiresias. Brahm. *Inf. Kalend. p.* 386. *n°.* 264.

Papilio Tiresias. Herbst, *Pap. tab.* 306. *fig.* 8. 9. 10.

Papilio Tiresias. Hubn. *Pap. tab.* 65. *fig.* 319-321.

Le Myrmidon. Engram. *Pap. d'Europe, tom.* 1. *p.* 167. *pl.* 37. *fig.* 79. a. b. — *p.* 308. *pl.* 83. 2°. *Suppl. pl.* 4. *pl.* 79. a. b. c. d. *bis.*

Papilio Polysperchon. Bergstr. *Nomenkl. p.* 72. *tab.* 44. *fig.* 3-5.

Papilio Polysperchon. Ochsen. *tom.* 1. *edit.* 2.

Polyommate Amyntas. Latr. *nouv. Diction. d'Hist. nat. tom.* 27. *p.* 492.

Polyommate Amyntas. God. *Hist. nat. des lépid. de France, tom* 1. *p.* 194. *pl.* 9 *fecund. & pl.* 9 *tert. fig.* 5.

Polyommate Amyntas. God. *Tabl. méthod. des lépid. de France*, Diurnes, *p.* 50. *n°.* 139.

Il a environ un pouce d'envergure. Le deſſus du mâle eſt d'un bleu-violet, avec le bord poſtérieur noirâtre.

Le deſſus de la femelle eſt d'un brun-noirâtre, avec une pouſſière bleuâtre à la baſe des premières ailes, & deux petits yeux fauves à prunelle noire près de l'angle interne des ſecondes.

Le deſſous des deux ſexes eſt d'un gris-bleuâtre, avec un arc central, puis une ligne arquée de points oculaires noirs, & deux ſéries marginales de petites taches brunâtres. Les ſecondes ailes ont en outre deux petits points baſilaires noirs, & deux taches anales fauves, renfermées chacune entre deux lunules de la couleur des points.

Les antennes ſont noires, annelées de blanc, & terminées de fauve.

On trouve une variété qui paroît répondre au *Tiresias* de Hubner, au *Polysperchon* de M. Ochſenheimer, & au *Myrmidon* d'Engramelle. Elle ne diffère des individus ordinaires qu'en ce ce qu'elle eſt plus petite. Suivant Borkhauſen, elle n'auroit point de fauve à l'extrémité des antennes.

Dans les prairies & les clairières des bois de l'Europe, en juillet & en août. Il y a des années où il eſt aſſez commun aux environs de Paris.

147. Polyommate Comyntas.

Polyommatus Comyntas.

Pol. alis ſuprà maris *violaceo-cæruleis*, fœminæ *fuſcis : ſubtùs canis, nigro ocellatis ; poſticis lunulis duabus anguli ani fulvis ocello inaurato ſingulatim fœtis.*

Il ne diffère abſolument de l'*Amyntas* que parce que les deux lunules fauves du deſſous des ſecondes ailes ſont chargées chacune d'un œil noir à iris doré, au lieu d'être chargées d'un ſimple point noir.

Il ſe trouve dans l'Amérique ſeptentrionale.

Obſervation. Comment ſéparer actuellement de l'Amyntas le *Polyſperchon* de M. Ochſenheimer ? Prendra-t-on pour différence caractériſtique le manque, probablement accidentel, du point fauve qui termine les antennes ?

148. Polyommate Lacturnus.

Polyommatus Lacturnus.

Pol. alis ſuprà violaceo-cæruleſcentibus, limbo fuſco : ſubtùs canis ; poſticis ad baſin nigro, ad apicem fuſco ocellatis, faſciâ repandâ anguli ani rufâ ocellis duobus inauratis fœtâ. (Mas.)

Il n'a guère que dix lignes d'envergure. Le deſſus des ailes eſt d'un bleu-violet-pâle, avec le limbe terminal des quatre brun, & l'angle interne des inférieures marqué de deux points noirs qui ſont bordés de fauve antérieurement.

Le deſſous eſt d'un gris-blanchâtre, avec des points bruns cerclés de blanc vers l'extrémité

de toutes les ailes. Les ailes inférieures offrent en outre vers la base quatre points oculaires très-noirs, & à l'angle de l'anus une bande rousse, large, sinuée, & chargée de deux yeux noirs à iris doré.

Nous ne connoissons pas la femelle.

De Timor.

149. Polyommate Phidias.

Polyommatus Phidias.

Pol. alis caudatis, cæruleſcentibus, limbo fuſco : ſubtùs cinereis, omnibus punctò anguli ani atro. Fab.

Heſperia R. *Phidias.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 286. *n°.* 99.

Papilio Phidias. Jon. *Fig. pict.* 6. *tab.* 15. *fig.* 2.

Fabricius le décrit ainſi : il eſt un peu plus grand que le polyommate de *la Ronce*. Le deſſus des quatre ailes eſt d'un bleu-pâle, avec le bord brun & ondé de blanc, & un point noir vers l'angle interne. Le deſſous eſt cendré, avec le bord ondé & un point pareillement noir.

De l'Inde.

Nota. Comme nous n'avons point vu ce lépidoptère, nous ne le plaçons ici qu'en tâtonnant.

150. Polyommate Bochus.

Polyommatus Bochus.

Pol. alis ſuprà cæruleis, limbo nigro : ſubtùs obſcurè cinereis; anticis immaculatis, poſticis angulo ani nigro lunulis argenteis.

Papilio Bochus. Cram. *pl.* 391. *fig.* C. D.

Il a approchant quinze lignes d'envergure. Le deſſus des ailes eſt d'un bleu-violet-changeant, avec une bordure noire, plus large aux ſupérieures qu'aux inférieures.

Le deſſous eſt d'un cendré-obſcur, ſans taches aux premières ailes, avec l'angle anal des ſecondes noir & marqué de quatre petits croiſſans d'un blanc-argenté.

Décrit d'après un mauvais individu.

De l'île de Ceylan, ſelon Cramer.

Nota. La queue des ſecondes ailes eſt plus courte que dans les autres eſpèces de cette ſubdiviſion.

D. Ailes dentées ou entières : les inférieures ayant l'angle interne plus ou moins prolongé dans les mâles.

151. Polyommate Polyclète.

Polyommatus Polycletus.

Pol. alis dentatis, maris *ſuprà cyaneis*, fœminæ *fuſcis diſco baſeos viridi-cæruleſcente : ſubtùs fuſcis, fuſciis macularibus ſanguineis nigro auroque marginatis.*

Papilio P. U. *alis ſubcaudatis, viridi-fuſcis : primoribus maculâ albâ : ſubtùs argenteo punctatis.* Linn. *Syſt. Nat.* 2. *pag.* 795. *n°.* 265. — *Muſ. Lud. Ulr. pag.* 336. (La femelle.)

Papilio P. U. Polycletus, *alis ſubcaudatis, viridi-fuſcis : anticis maculâ albâ : ſubtùs maculis fulvis argenteo marginatis.* Fab. *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 89. *n°.* 808. (La femelle.)

Heſperia U. *Polycletus.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 344. *n°.* 308.

Papilio Polycletus. Clerck, *Icon. tab.* 17. *fig.* 3. 4.

Papilio Epopus. Cram. *pl.* 363. *fig.* G. H. (Le mâle.)

Papilio Polycletus. Cram. *pl.* 159. *fig.* F. G. (La femelle.)

Papilio Epopus. Herbst, *Pap. tab.* 285. *fig.* 3. 4.

Papilio Polycletus. Herbst, *Pap. tab.* 284. *fig.* 5. 6.

Linné n'a connu que la femelle de ce lépidoptère, & il l'a placée à tort dans ſa diviſion des *Plébéiens urbicoles* (nos Heſpéries).

Le Polyclète a un pouce & demi d'envergure. Le deſſus du mâle eſt d'un bleu-barbeau, avec le bord poſtérieur liſeré de noir.

Le deſſus de la femelle eſt d'un brun-noirâtre, avec la baſe d'un bleu-verdâtre-pâle qui s'étend ſur le diſque des premières ailes.

Le deſſous des deux ſexes eſt d'un brun-obſcur, avec des bandes d'un rouge-ſanguin, bordées de noir, puis de vert-doré. Les bandes des premières ailes ſont au nombre de trois, dont l'antérieure longitudinale, ſinuée, & allant de la baſe au-delà du milieu; la ſuivante tranſverſe & formée de quatre taches; la troiſième étroite, longeant tout le bord poſtérieur, & ſéparée de la précédente par une rangée tranſverſe de ſix points qui ſont noirs en avant, rouges en arrière. Les bandes des ſecondes ailes ſont au nombre de ſix, dont les cinq antérieures maculaires & tranſverſes, la poſtérieure linéaire & ſuivant les ſinuoſités du bord terminal de l'aile.

De l'île d'Amboine. — Selon Cramer, il ſe trouveroit auſſi au Bengale.

152. Polyommate Narciſſe.

Polyommatus Narciſſus.

Pol. alis dentatis, fuſcis, diſco cæruleſcente : ſubtùs fuſcis maculiſque ſanguineis argenteo marginatis. Fab.

Papilio P. R. *Narciſſus.* Fab. *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 71. *n°.* 675.

Heſperia R. *Narciſſus.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 290. *n°.* 110.

Papilio Narciſſus. Donow. *Gen. Illuſt. of Entom. part.* 1. *an Epit. of the Inſects of New Holl. pl.* 30. *fig.* 5. 6.

Ce lépidoptère paroît bien voiſin de la femelle du *Polyclète ;* mais, comme nous ne pouvons pas bien ſaiſir d'après une figure les différences qui l'en ſéparent, nous traduiſons ici Fabricius.

Les antennes ſont variées de blanc & de noir, & elles ont l'extrémité de la maſſue rouſſe. Les ailes ſupérieures ſont d'un brun-noirâtre en deſſus, avec une tache d'un bleu-luiſant qui ſe communique aux inférieures. Leur deſſous eſt brun, avec le bord extérieur jaunâtre, & deux lignes argentées allant de la baſe au milieu : derrière ces lignes, il y a un trait tranſverſal, & trois points, argentés; puis une grande tache rouſſe tranſverſe, bordée d'argent; enfin, cinq points argentés à prunelle noire.

Les ailes inférieures ſont dentées, noires, avec le diſque d'un bleu-luiſant. Leur deſſous eſt brun, avec deux taches baſilaires, dont l'antérieure oblongue, la ſuivante grande & ovale, puis deux bandes médiaires, dont la poſtérieure interrompue, rouges toutes les quatre & bordées d'argent. Indépendamment de cela, le bord terminal des ailes eſt rouge & longé par une ligne argentée.

De la Nouvelle-Hollande.

153. Polyommate Apelle.

Polyommatus Apelles.

Pol. alis dentatis, fulvis, limbo fuſco : poſticis ſubtùs faſciis rufis argenteo marginatis. Fab.

Papilio P. R. *Apelles.* Fab. *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 71. *n°.* 676.

Heſperia R. *Apelles.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 290. *n°.* 111.

Papilio Apelles. Donow. *Gen Illuſt. of Entom. part.* 1. *an. Epit. of the Inſects of New Holl. pl.* 30. *fig.* 3. 4.

Fabricius le décrit ainſi : il a de l'affinité avec le *Narciſſe*, dont il n'eſt peut-être qu'une variété de ſexe. Les antennes ſont annelées de blanc & elles ont le bout fauve. Les ailes ſupérieures ſont fauves en deſſus, avec l'extrémité d'un brun-noirâtre. Leur deſſous eſt jaunâtre, avec trois lignes argentées, allant de la baſe au milieu, à l'exception de l'antérieure qui eſt plus courte : derrière ces lignes, il y a une petite tache rouſſe, tranſverſale, & ſix points argentés, placés vers la côte. Outre cela, le bord poſtérieur eſt terminé par cinq points argentés à prunelle noire.

Les ailes inférieures ont le deſſus fauve, avec le limbe d'un brun-noirâtre. Leur deſſous eſt gris, avec quatre bandes rouſſes, un peu interrompues & bordées d'argent : la région anale offre trois taches noires, tranſverſes, & le bord poſtérieur eſt terminé par une ligne argentée.

De la Nouvelle-Hollande.

154. Polyommate Théro.

Polyommatus Thero.

Pol. alis dentatis, ſuprà nigricanti-fuſcis, fulvo-maculatis : poſticis ſubtùs nebuloſo-cinereis, maculis lineanbus nitènti-albis; maculâ diſci apicibus uncinatâ.

Papilio P. R. Thero, *alis dentatis, ſubbicaudatis, nigricantibus, maculis fulvis : ſubtùs maculis argenteis.* Linn. *Syſt. Nat.* 2. *p.* 787. *n°.* 219. — *Muſ. Lud. Ulr. p.* 328. *n°.* 146.

Papilio N. P. Eroſine, *alis dentatis, fuſcis : anticis punctis ſeptem, poſticis tribus rubris : ſubtùs anticis punctis tribus argenteis.* Fab. *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 51. *n°.* 506.

Heſperia R. *Eroſine.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 266. *n°.* 28.

Papilio P. R. *Thero.* Fab. *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 67. *n°.* 642.

Heſperia R. *Thero.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 274. *n°.* 57.

Papilio Eroſine. Herest, *Pap. tab.* 301. *fig.* 7. 8.

Papilio Salmoneus. Cram. *pl.* 341. *fig.* D. E.

Papilio Rumina. Drury, *Inſ. tom.* 1. *pl.* 2. *fig.*

Fabricius a donné ce polyommate ſous deux noms différens, & cependant Cramer avoit déja dit que le papillon *Thero* de Linnæus répondoit à celui qu'il a figuré ſous le nom de *Salmoneus.*

Il a approchant deux pouces d'envergure. Le deſſus des ailes eſt d'un brun-noirâtre, avec huit à neuf taches fauves inégales ſur le diſque des ſupérieures, & une rangée de lunules pareillement fauves avant le bord terminal des inférieures. Ce bord eſt liſeré de blanc aux petites échancrures des quatre ailes.

Le deſſous des premières ailes eſt fauve, mais bordé de cendré-obſcur, avec une dizaine de taches noires, dont quatre alignées ſous la côte, & ayant une prunelle d'un blanc-luiſant.

Le deſſous des ſecondes ailes eſt cendré, avec une dizaine de taches d'un blanc-argentin, environnées de brun-obſcur, & pour la plupart linéaires. La tache du diſque eſt plus alongée que les autres & crochue à chaque bout, caractère

qui empêchera toujours de confondre cette espèce avec ses analogues.

Chez la femelle, les lunules fauves du dessus des secondes ailes sont surmontées de deux ou trois taches de leur couleur.

Du Cap de Bonne-Espérance.

155. Polyommate Alphée.

Polyommatus Alphæus.

Pol. alis denticulatis, suprà atris, fasciâ communi fulvâ, nitidâ : posticis subtùs margaritaceis, fasciâ mediâ repandâ limboque postico ferrugineis.

Papilio P. U. Alphæus, *alis subcaudatis, atris, fasciâ sanguineâ : subtùs variegatis.* Fab. *Mant. Inf. tom. 2. p. 86. n°. 782.*

Hesperia U. *Alphæus.* Fab. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 333. n°. 265.*

Papilio Alpheus. Cram. *pl. 380. fig.* F. G.

Fabricius a fort mal-à-propos placé cette espèce dans la division de ses *Plébéiens urbicoles*, division dont se compose en grande partie notre genre *Hespérie*.

Il a pres de deux pouces d'envergure. Le dessus des ailes est d'un noir-brun, avec une bande transverse d'un fauve-ponceau-vif sur le milieu, & un petit liseré blanc aux échancrures du bord postérieur.

Le dessous des premières ailes est fauve, avec le pourtour extérieur cendré, le sommet d'un gris de perle & précédé de quelques lunules ferrugineuses avant lesquelles il y a deux taches noires & un espace blanc intermédiaire.

Le dessous des secondes ailes est d'un gris de perle, avec une bande sinuée sur le milieu, & deux lignes ondulées sur le bord postérieur, d'un ferrugineux-pourpré. La bande du milieu est un peu fablée de gris, ce qui la rend bifide à sa partie antérieure & comme moniliforme à sa partie postérieure. Le corps est noir en dessus, grisâtre en dessous. Les antennes sont noirâtres, annelées de blanc, avec la massue alongée & terminée de ferrugineux.

Nous n'avons vu que le mâle.

Du Cap de Bonne-Espérance.

156. Polyommate Thyra.

Polyommatus Thyra.

Pol. alis suprà atris, disco fulvo : subtùs testaceo-ferrugineis, maculis numerosis nigris pupillâ elevatâ argenteâ. (Mus.)

Papilio P. R. Thyra, *alis unidentatis, nigricantibus, disco fulvo : subtùs purpurascentibus, maculis argenteis.* Linn. *Syst. Nat. 2. p. 789. n°. 227. — Mus. Lud. Ulr. p. 329. n°. 147.*

Papilio P. R. Thyra, *alis integris, disco fulvo, nigro punctato : subtùs purpurascentibus, maculis argenteis.* Fab. *Mant. Inf. tom. 2. p. 82. n°. 736.*

Hesperia R. *Thyra.* Fab. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 314. n°. 188.*

Il a un peu plus d'un pouce d'envergure. Le dessus des ailes est d'un noir-brun, avec le disque d'un fauve-briqueté. Le fauve des premières ailes est comme divisé en taches; le fauve des secondes a beaucoup plus de largeur, & il est quelquefois ponctué de noir.

Le dessous des quatre ailes est ferrugineux, mais plus ou moins lavé de fauve sur le disque des supérieures, avec une multitude de taches noires ayant une prunelle argentée & élevée. Indépendamment de cela, les ailes supérieures ont l'origine de la côte d'un jaune-verdâtre qui s'étend sur la poitrine & sur les palpes. Le dessus du corps est d'un rouge-ferrugineux.

Nous n'avons pas vu de femelles.

De la côte occidentale d'Afrique.

157. Polyommate Thysbé.

Polyommatus Thysbe.

Pol. alis denticulatis, suprà fulvis, nigro maculatis (basi argenteo micantibus) : posticis subtùs ferrugineis, fluvido variegatis & striatis aureoque maculatis.

Papilio P. R. Thysbe, *alis denticulatis, subunicaudatis, fulvis, nigro maculatis : posticis, imprimis subtùs, striatis aureoque maculatis.* Linn. *Syst. Nat. 2. p. 789. n°. 228. — Mus. Lud. Ulr. p. 330. n°. 148.*

Papilio P. R. Thysbe, *alis denticulatis, subcaudatis, fulvis, nigro maculatis : posticis subtùs striatis aureoque maculatis.* Fab. *Mant. Inf. tom. 2. p. 71. n°. 677.*

Papilio P. R. Nais, *alis dentato-subcaudatis, basi argenteis aureo striatis.* Fab. *Mant. Inf. tom. 2. p. 71. n°. 678.*

Hesperia R. *Thysbe.* Fab. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 292. n°. 114.*

Hesperia R. *Nais.* Fab. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 292. n°. 115.*

Papilio Nais. Cram. *pl. 47. fig.* D. E.

Papilio Palmus. Cram. *pl. 341. fig.* F. G.

Les papillons *Nais* & *Palmus* de Cramer se rapportent sans contredit au papilion *Thysbé* de Linnæus, mais l'état des corps, dans les individus que nous avons vus, ne nous permet pas de dire si ce sont les deux sexes, ou si le *Palmus* n'est qu'une simple variété du *Nais*.

L'envergure du Thysbé est de douze à quinze

lignes. Le deſſus des ailes eſt d'un fauve-ponceau-luiſant, avec ſix à ſept taches diſcoïdales & une bordure poſtérieure noires. La bordure des premières ailes eſt crénelée; celle des ſecondes ſe compoſe de traits longitudinaux, plus prononcés vers le ſommet que vers l'angle anal. Chez les individus auxquels Cramer donne le nom de *Nais*, la baſe des quatre ailes eſt légèrement glacée de bleu-argenté; elle eſt au contraire un peu noirâtre & ſans reflet chez ceux qu'il nomme *Palmus*.

Le deſſous des premières ailes eſt fauve, avec une douzaine de points noirs épars depuis la baſe juſqu'au-delà du milieu, & des ſtries longitudinales d'un jaune-grifâtre à l'extrémité. Les quatre ou cinq points qui avoiſinent la côte ont une prunelle argentée & un peu élevée.

Le deſſous des ſecondes ailes eſt varié de ferrugineux & de jaunâtre, & il offre huit à neuf taches argentées, dont les antérieures linéaires, les autres plus larges, échancrées, & formant une bande arquée derrière le diſque. Le bord poſtérieur eſt en outre ſtrié de jaunâtre comme aux ailes de devant.

Le corps eſt noirâtre, avec des poils d'un roux-obſcur ſur le devant du corſelet & vers l'extrémité de l'abdomen. Les palpes & les antennes ſont auſſi d'un roux-obſcur.

Du Cap de Bonne-Eſpérance.

Nota. Fabricius a décrit ſon papillon *Nais* d'après la figure de Cramer, qui repréſente mal-à-propos des lignes dorées à la baſe des ailes en deſſus. Il paroît auſſi qu'il donne le *Thyſbé* de Linnæus ſans l'avoir vu.

153. Polyommate Hiéré.

Polyommatus Hiere.

Pol. alis ſubintegris, ſuprà fuſcis, fulvo virgulatis nigroque maculatis (maris *violaceo nitidiſſimis*); *poſticis ſubtùs cinereis, nigro ocellatis, baſi cæruleſcente faſciâque marginali fulvâ.*

Papilio P. R. Hiere, *alis fuſcis, nigro punctatis: ſubtùs cinereis, punctis ocellaribus numerofis.* Fab. *Mant. Inſ. tom. 2. p. 80. n°. 726.*

Heſperia R. *Hiere.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom. 3. pars 1. p. 310. n°. 177.*

Papilio Lampetie. Wien. *Verz. p. 322. fam. M. n°. 8.*

Papilio Lampetie. Illig. *N. Auſg. Deſſ. tom. 2. p. 255. n°. 3.*

Papilio Lampetie. Hubn. *tab. 71. fig. 356-359.*

Schæff. *Icon. tab. 280. fig. 1-4.*

Papilio Hipponoe. Ochsen. *Pap. Eur. tom. 1.*

Papilio Hippothoe, var. Esp. *Pap. Eur. part. 1. tab. 31. Suppl. 7. fig. 3.* (Fœm.) — *tab. 35. Suppl. 11. fig. 5.* (Mas.)

Papilio Hipponoe. Esp. *Pap. Eur. part. 1. tab. 62. cont. 12. fig. 2.* (Mas.) — *tab. 78. cont. 28. fig. 6.* (Fœm.)

Papilio Hipponoe. Bergstr. *Nomenkl. tab. 34. fig. 3. 4.* (Mas.)

Papilio Lampetie. Lang. *Verz. 2. p. 50. n°. 399-400.*

Papilio Helle. Lang. *Verz. 2. n°. 403-405.*

Papilio Helle. Borkh. *Pap. Eur. part. 1. p. 146 & 272. n°. 5.* — *part. 2. p. 221.*

Papilio Hipponoe. Borkh. *Rhein. Magaz. tom. 1. p. 270. n°. 77.*

Papilio Lampetie. Borkh. *Rhein. Magaz. tom. 1. n°. 78.*

Papilio Hipponoe. Scheid. *Syſt. Beſchr. p. 232. n°. 139.*

Papilio Alciphron. Scheid. *Syſt. Beſchr. p. 234. n°. 140.*

Papilio Alciphron. Naturf. *6. p. 11.*

Papilio Virgaureæ. Hufnag. *tab. im. Berl. Mag. tom. 2. p. 80. n°. 45.*

L'argus ſatiné. Engram. *Pap. d'Europe, tom. 1. pl. 44. fig. 92. a. b.* (Mâle.) — *pl. 72. Suppl. 18. fig. 92. f. g.* (Femelle.)

Polyommate Hière. Latr. *noup. Dict. d'Hiſt. nat. 2e. édit. tom. 27. p. 489.*

Polyommate Hiéré. God. *Hiſt. nat. des lépid. de France, tom. 2. p. 181. pl. W-XXIII. fig. 3. 4.*

Polyommate Hiéré. God. *Tab. méthod. des lépid. de France*, Diurnes, *p. 50. n°. 140.*

Il a près d'un pouce & demi d'envergure. Le deſſus du mâle eſt d'un brun-noirâtre, ſouetté de fauve & ponctué de noir, avec un reflet violet très-vif, qui abſorbe quelquefois preſque toute la couleur du fond. On voit à l'extrémité des ſecondes ailes une bandelette fauve crénelée en arrière, & la frange eſt blanche à toutes les ailes.

Le deſſus de la femelle eſt toujours ſans reflet violet aux quatre ailes, & le plus ſouvent ſans marques fauves au milieu des ſecondes; mais, en revanche, la bande crénelée de l'extrémité de ces dernières ailes eſt beaucoup plus apparente.

Le deſſous des premières ailes eſt rouſſâtre, principalement chez la femelle, avec les bords cendrés, & beaucoup de points oculaires noirs, dont les extérieurs moins gros & diſtribués ſur deux rangs le long du bord poſtérieur.

Le deſſous des ſecondes ailes eſt d'un cendré-clair

clair chez les deux sexes, avec la base bleuâtre, & une multitude de points noirs ocellés, dont les postérieurs formant deux séries marginales entre lesquelles il y a une bande de taches fauves.

Dans quelques femelles, la bande fauve du dessus des ailes inférieures est surmontée d'un cordon de petites lunules bleues.

On rencontre au contraire des mâles qui n'ont qu'un ou deux points noirs sur le dessus des ailes supérieures.

En Allemagne. Il a aussi été trouvé près de Phalsbourg par M. Pattier, pharmacien à l'hôpital militaire de cette ville, & aux environs de Dijon, par M. le docteur Lorey, ancien chirurgien-major des armées des France.

159. Polyommate Gordius.

Polyommatus Gordius.

Pol. alis subintegris, suprà fulvis (maris *violaceo nitidis*), *punctis limboque nigris : posticis subtùs luteo-cinereis, nigro ocellatis, basi virescente fuscâque marginali fulvâ.*

Papilio Gordius, *alis integerrimis, luteo-fulvis : omnibus utrinquè maculis ocellaribus nigris : posterioribus subtùs cinereis, fasciâ marginali lutea.* Schneid. *Syst. Beschr. p.* 230. *n°.* 137.

Papilio Gordius. Roem. *Gen. Inf. tab.* 18. *fig.* 7. 8.

Fuessl. *Magaz. tom.* 1. *p.* 206.

Papilio Gordius. Esp. *Pap. Eur. part.* 1. *tab.* 30. *Suppl.* 6. *fig.* 3. a. b. — *tab.* 77. *cont.* 27. *fig.* 4.

Papilio Gordius. Borkh. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 147 & 272. *n°.* 6.

Papilio Gordius. Hubn. *Pap. tab.* 69. *fig.* 343-345.

Papilio Gordius. Ochsen. *Pap. Eur. tom.* 1.

Papilio Gordius. Devill. *Ent. Linn. tom.* 2. *p.* 73. *n°.* 129.

Le grand Argus bronzé. Engram. *Pap. d'Europe, tom.* 1. *p.* 278. *pl.* 72. *Suppl.* 18. *fig.* 91. a. b. *bis.* — *p.* 281. *pl.* 73. *Suppl.* 19. *fig.* 91. c. d. *bis.*

Polyommate Gordius. Latr. *nouv. Dict. d'Hist. nat.* 2°. *édit. tom.* 27. *p.* 486.

Polyommate Gordius. God. *Hist nat. des lépid. de France, tom.* 2. *p.* 179. *pl.* W. XXIII. *fig.* 1. 2.

Polyommate Gordius. God. *Tab. méth. des lépid. de France,* Diurnes, *p.* 50. *n°.* 141.

Il a près d'un pouce & demi d'envergure. Le dessus des ailes est d'un fauve-ponceau à reflet violet dans le mâle, d'un fauve-doré sans reflet dans la femelle, avec beaucoup de points discoïdaux & le limbe postérieur noirs. Les points des premières ailes sont plus gros que ceux des secondes.

Le dessous est d'un fauve-pâle aux premières ailes, d'un cendré-jaunâtre aux secondes, avec une multitude de points noirs oculaires. Les secondes ailes ont la base verdâtre, & leur extrémité offre une bande fauve placée entre deux séries de points.

Il se trouve au mois de juillet, dans les Pyrénées, dans les Alpes, dans les parties montagneuses du midi de la France, &c.

Nota. La figure de Roemer est, comme il le dit lui-même, beaucoup trop grande. « *Magnitudine naturalem excedente depictus.* »

160. Polyommate Thersamon.

Polyommatus Thersamon.

Pol. alis subintegris, fulvis, maris *violaceo nitidulis,* fœminæ *nigro maculatis : posticis suprà disco fuscescente ; subtùs cinereis nigro ocellatis, fasciâ marginali fulvâ.*

Hesperia R. Thersamon, *alis subcaudatis, fulvis : subtùs punctis ocellaribus numerosis ; anticis fulvis, posticis cinereis.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 313. *n°.* 184.

Papilio Thersamon. Esp. *Pap. Eur. part.* 1. *tab.* 89. *cont.* 39. *fig.* 6.

Papilio Thersamon. Borkh. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 150 & 274. *n°.* 10. — *part.* 2. *p.* 225. *n°.* 11.

Papilio Thersamon. Devill. *Ent. Linn. tom.* 2. *p.* 79. *n°.* 158.

Papilio Thersamon. Ochs. *Pap. Eur. tom.* 1.

Papilio Xanthe. Hubn. *Pap. tab.* 69. *fig.* 346-348.

Polyommate Thersamon. Latr. *nouv. Dict. d'Hist. nat.* 2°. *édit. tom.* 27. *p.* 487.

Polyommate Thersamon. God. *Hist. nat. des lépid. de France, tom.* 2. *p.* 177. *pl.* V. XXII. *fig.* 7. 8.

Polyommate Thersamon. God. *Tab. méth. des lépid. de France,* Diurnes, *p.* 50. *n°.* 142.

Il a approchant quinze lignes d'envergure. Le dessus du mâle est d'un fauve-ponceau, légèrement glacé de violet, avec le bord postérieur noir & frangé de blanc. Ses premières ailes ont huit à neuf points noirâtres, mais on ne les voit qu'à certains jours. Ses secondes ailes ont le bord interne & l'extrémité obscurs, avec une bande postérieure fauve, chargée en arrière d'un rang de points noirs.

Le dessus de la femelle est d'un fauve-doré aux premières ailes, avec des points noirs très-dis-

tinctes; il eſt d'un fauve-rembruni aux ſecondes ailes, avec des points noirâtres, & une bande poſtérieure d'un fauve-doré.

Le mâtes des deux ſexes eſt d'un jaune-fauve aux premières ailes, d'un gris-cendré aux ſecondes, avec une multitude de points noirs cerclés de blanchâtre. Les unes & les autres ont en outre à l'extrémité une bande rouſſe, tranſverſale, & bordée par de ſimples points noirs.

Il habite les Alpes, l'Autriche, la Hongrie & les contrées les plus méridionales de la Ruſſie.

Nota. Fabricius, qui a décrit ce polyommate d'après des individus de la Ruſſie auſtrale, dit que la femelle a une queue alongée. Cela paroît probable, car dans la femelle du *Phlæas*, la dent qui précède extérieurement l'angle anal des ailes inférieures eſt plus prononcée chez les individus de l'Aſie mineure que chez ceux du nord de l'Europe.

161. Polyommate Xanthé.

Polyommatus Xanthe.

Pol. alis ſubintegris, ſuprà fuſcis, nitidis, nigro maculatis; ſubtùs viridi-luteſcentibus, nigro ocellatis: utrinquè ſtrigâ marginali fulvâ.

Papilio P. R. Xanthe, *alis ſubintegris, fuſcis, nigro punctatis, faſciâ marginali fulvâ: ſubtus luteſcentibus, punctis numeroſis.* Fab. *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 81. *n°.* 731.

Papilio P. R. Garbas, *alis fuſcis, nigro punctatis, margine albo: ſubtùs virеſcentibus, punctis numeroſis.* Fab. *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 81. *n°.* 732.

Heſperia R. *Xanthe.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 312. *n°.* 182.

Heſperia R. *Garbas.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 312. *n°.* 183.

Papilio Xanthe. Wien. *Verz. p.* 181. *fam.* M. *n°.* 6.

Papilio Circe. Wien. *Verz. p.* 181. *fam.* M. *n°.* 7.

Papilio Xanthe. Illig. *N. Aufg. Deſſ. tom.* 2. *p.* 257. *n°.* 6.

Papilio Circe. Illig. *N. Aufg. Deſſ. tom.* 2. *p.* 259. *n°.* 7.

Papilio Circe. Hubn. *Pap. tab.* 67. *fig.* 334-336.

Papilio Circe (mas). Muller, *Faun. Sileſiaca.*

Papilio Xanthe. Borkh. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 149 & 274. *n°.* 9. — *part.* 2. *p.* 223.

Papilio Circe. Borkh. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 148 & 273. *n°.* 8. — *part.* 2. *p.* 222.

Papilio Xanthe. Borkh. *Rhein. Magaz. tom.* 1. *p.* 280. *n°.* 2.

Papilio Circe. Borkh. *Rhein. Magaz. p.* 280. *n°.* 1.

Papilio Xanthe. Brahm. *Inſ. Kalend. p.* 504. *n°.* 365.

Papilio Circe. Brahm. *Inſ. Kalend. p.* 503. *n°.* 364.

Papilio Circe. Lang. *Verz.* 2. *p.* 51. *n°.* 410-413. — *n°.* 414-416. (Var.)

Papilio Circe. Ochsen. *Pap. Eur. tom.* 1.

Papilio Xanthe. Rossi, *Faun. Etr. tom.* 2. *p.* 157. *n°.* 1039.

Papilio Xanthe. Petagna, *Inſtit. Ent. tom.* 1. *p.* 491. *n°.* 137.

Papilio Garbas. Petagna, *Inſtit. Ent. tom.* 1. *p.* 492. *n°.* 138.

Papilio Alexis, var. 4. Scopoli, *Ent. Carn. p.* 180.

Schæff. *Icon. tab.* 272. *fig.* 1. 2.

Papilio Dorilas. Hufnag. *Tabel. im. Berl. Mag. tom.* 2. *p.* 68. *n°.* 21.

Papilio Dorilas. Naturf. 6. *p.* 6. *n°.* 21.

Papilio Phocas. Naturf. 6. *p.* 29. *n°.* 17.

Papilio Phocas. Esp. *Pap. Eur. part.* 1. *tab.* 35. *Suppl.* 11. *fig.* 1. 2. — *tab.* 63. *cont.* 13. *fig.* 6. (Var.)

L'Argus myope. Geoff. *Hiſt. Inſ. tom.* 2. *p.* 64. *n°.* 33.

L'Argus myope. Engram. *Pap. d'Europe, tom.* 1. *p.* 183. *pl.* 43. *fig.* 89. a. b. c. d. — *p.* 312. *pl.* 84. 2^e. *Suppl. fig.* 89. e. f.

Polyommate Circé. Latr. *nouv. Dict. d'Hiſt. nat.* 2^e. *édit. tom.* 27. *p.* 490.

Polyommate Xanthé. God. *Hiſt. nat. des lépid. de France, p.* 196. *pl.* 9 *ſecund. fig.* 3. & *pl.* 10 *ſecund. fig.* 1.

Polyommate Xanthé. God. *Tabl. méthod. des lépid. de France,* Diurnes, *p.* 51. *n°.* 145.

Il a de treize à quatorze lignes d'envergure. Le mâle a le deſſus des ailes d'un brun-noirâtre-chatoyant, avec des points noirs épars, une ligne marginale de taches fauves, & la frange blanche. Il a le deſſous d'un jaune-verdâtre-pâle, avec une multitude de points noirs oculaires, & une ſérie de taches fauves répondant à celle de la ſurface oppoſée.

La femelle diffère du mâle en ce qu'elle a le fond des ailes ſupérieures fauve de part & d'autre.

Il éclot en mai & en août. On le trouve dans plusieurs contrées de l'Europe, & il est très-commun aux environs de Paris.

162. Polyommate Hellé.

Polyommatus Helle.

Pol. alis subintegris, suprà fuscis, violaceo micantibus, disco anticarum fulvo nigroque vario : posticis subtùs corticinis, punctis ocellaribus nigris, strigâ angulatâ albâ fasciâque marginali rubrâ.

Hesperia R. Helle, *alis integris, obscuris, cœruleo micantibus : omnibus subtùs punctis ocellaribus numerosis.* Fab. *Mant. Ins. tom.* 2. *p.* 80. *n°.* 730.

Hesperia R. *Helle.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 312. *n°.* 181.

Papilio Helle. Wien. *Verz. p.* 181. *fam.* M. *n°.* 4

Naturf. 6. *p.* 114. *tab.* 5. *fig.* 2.

Papilio Helle. Illig. *N. Aufg. Deff. tom.* 2. *p.* 256. *n°.* 4.

Papilio Helle. Hubn. *Pap. tab.* 67. *fig.* 331-333.

Papilio Helle. Petagna, *Instit. Ent. tom.* 1. *p.* 491. *n°.* 136.

Papilio Helle. Ochsen. *Pap. Eur. tom.* 1.

Papilio Amphidamas. Esp. *Pap. Eur. part.* 1. *tab.* 58. *cont.* 8. *fig.* 4. (Mas.) — *tab.* 63. *cont.* 13. *fig.* 5. (Fœm.)

Papilio Amphidamas. Knoch, *Beytr. part.* 2. *p.* 90. *tab.* 6. *fig.* 4. 5. (Fem.)

Bergstr. *Nomenkl. tab.* 122. *fig.* 5-7.

Papilio Amphidamas. Borkh. *Pap. Europ. part.* 1. *p.* 151 & 274. *n°.* 11. — *part.* 2. *p.* 223. *n°.* 10.

Papilio Amphidamas. Borkh. *Rhein. Magaz. tom.* 1. *p.* 279. *n°.* 79.

Papilio Amphidamas. Schneid. *Syst. Beschr. p.* 257. *n°.* 145.

Papilio Xanthe. Lang. *Verz.* 2. *p.* 52. *n°.* 417-420.

Argus myope violet. Engram. *Pap. d'Europe, tom.* 1. *p.* 276. *pl.* 71. *Suppl.* 17. *fig.* 89. a. b. — *pl.* 6. *Suppl.* 3. *fig.* 89. d. e. *bis.* (Var. fem.)

Polyommate Hellé. Latr. *nouv. Dict. d'Hist. nat. 2e. édit. tom.* 27. *p.* 490.

Polyommate Hellé. God. *Hist. nat. des lépid. de France, tom.* 2. *p.* 184. *pl.* W. XXIII. *fig.* 5. 6.

Polyommate Hellé. God. *Tabl. méthod. des lépid. de France,* Diurnes, *p.* 51. *n°.* 144.

Il a de onze à douze lignes d'envergure. Le dessus du mâle est d'un brun-noirâtre, glacé de violet, avec le disque des premières ailes fauve & coupé transversalement par des points noirs. Ses secondes ailes ont avant le bord postérieur une bande fauve dont le côté externe est crénelé & longé par une ligne blanche interrompue.

Le dessus de la femelle est comme celui du mâle, mais, en place de reflet, il a des atomes bleus à la base des premières ailes, & une série de lunules de cette couleur, puis une bande fauve à l'extrémité de toutes les ailes.

Le dessous des deux sexes est d'un jaune-orangé aux premières ailes, avec de gros points noirs à iris grisâtre. Il est d'un brun-tanné aux secondes ailes, avec des points semblables, mais plus petits, & une bande terminale d'un rouge-fauve. Outre cela, l'extrémité des quatre ailes offre deux rangées transverses de lunules noires, dont les extérieures plus petites & appuyées sur un cordon de traits blanchâtres, les intérieures surmontées chacune d'un chevron blanc assez large. La frange des secondes ailes est entrecoupée de blanc & de brun, tandis que celle des premières ailes est toute blanche de part & d'autre.

On le trouve, aux mois de mai & d'août, en Allemagne & dans l'est de la France. Il se plaît dans les parties montagneuses.

163. Polyommate Chryséis.

Polyommatus Chryseis.

Pol. alis subintegris, suprà fulvis, mavis *disco bipunctato margineque violaceo micante,* fœminæ *nigro maculatis : posticis subtùs fusco-cinereis, punctis ocellaribus numerosis fasciâque anguli ani rufâ.*

Papilio P. R. Chryseis, *alis aureis, margine cœrulescente : posticis subdentatis, subtùs obscurè griseis punctis ocellaribus numerosis.* Fab. *Mant. Ins. tom.* 2. *p.* 79. *n°.* 725.

Hesperia R. *Chryseis.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 209. *n°.* 174.

Papilio Chryseis. Wien. *Verz. p.* 181. *fam.* M. *n°.* 3.

Papilio Chryseis. Illig. *N. Aufg. Deff. tom.* 2. *p.* 253. *n°.* 3.

Papilio Chryseis. Bergstr. *Nomenkl. p.* 43. *tab.* 68. *fig.* 4-5. (Mas.) *fig.* 6-8. (Fœm.)

Papilio Chryseis. Petagna, *Inst. Ent. tom.* 1. *p.* 490. *n°.* 133.

Papilio Chryseis. Lang. *Verz.* 2. *p.* 50. *n°.* 401. 402.

Papilio Chryſeis. Borkh. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 144 & 271. *n°.* 4.

Papilio Euridice. Borkh. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 143 & 270. *n°.* 3. — *part.* 2. *p.* 220.

Papilio Euridice. Borkh. *Rhein. Magaz. tom.* 1. *p.* 275. *n°.* 76.

Papilio Euridice. Schneid. *Syſt. Beſchr. p.* 231. *n°.* 138.

Papilio Hippothoe. Esp. *Pap. Eur. part.* 1. *tab.* 22. *fig.* 3. (Mas.) — *tab.* 78. *cont.* 28. *fig.* 5. (Fœm.) — *tab.* 100. *cont.* 55. *fig.* 2. (Aberratio.)

Papilio Chryſeis. Hubn. *Pap. tab.* 68. *fig.* 337. 338. — *tab.* 71. *fig.* 355.

Papilio Chryſeis. Ochsenh. *Pap. Eur. tom.* 1.

Argus ſatiné changeant, première eſpèce. Engram. *Pap. d'Europe, tom.* 1. *p.* 282. *pl.* 78. *Suppl.* 19. *fig.* 93. a-g. *bis.*

Polyommate Chryſéis. Latr. *nouv. Diction. d'Hiſt. nat.* 2e. *édit. tom.* 27. *p.* 488.

Polyommate Chryſéis. God. *Hiſt. natur. des lépid. de France, p.* 198. *pl.* 9 *ſecund. fig.* 4. & *pl.* 10 *ſecund. fig.* 2.

Polyommate Chryſéis. God. *Tabl. méthod. des lépid. de France,* Diurnes, *p.* 51. *n°.* 145.

Il a de quatorze à quinze lignes d'envergure. Le deſſus du mâle eſt d'un fauve-ponceau-vif, avec tout le pourtour noirâtre & glacé de bleu-violet. Le milieu de toutes les ailes eſt marqué d'un double point noir, & les inférieures ont ſur le brun du bord terminal une ligne fauve carrément échancrée en arrière.

La femelle a le deſſus des premières ailes d'un fauve-foncé, avec des points & les bords noirâtres. Le deſſus de ſes ſecondes ailes eſt noirâtre, avec une ligne fauve, poſtérieure, & ſemblable à celle que l'on voit ſur les ailes correſpondantes du mâle.

Le deſſous des deux ſexes eſt d'un cendré tirant ſur le brun, avec des points noirs à iris gris. Outre cela, les premières ailes ont le milieu plus ou moins fauve, & les ſecondes ſont traverſées à leur extrémité par une bande également fauve.

Il ſe trouve dans les clairières des bois en juin & en août. On l'a pris pluſieurs fois à quelques lieues de Paris.

164. Polyommate Eurydice.

Polyommatus Eurydice.

Pol. alis ſuprà maris *fulvis, diſco immaculato margineque omni nigro;* fœminæ *fuſcis, nigro maculatis: ſubtùs luteſcenti-cinereis, punctis ocellaribus numeroſis baſique vireſcente.*

Papilio Euridice, *alis fulvis, nitentibus, margine antico limboque latiori nigro, diſco immaculato: ſubtùs rufis, ocellis nigris albo annulatis.* Esp. *Pap. Eur. tab.* 116. *cont.* 71. *fig.* 6. 7.

Papilio Euridice. Hubn. *Pap. tab.* 68. *fig.* 339-342.

Papilio Eurybia. Ochsen. *Pap. Eur. tom.* 1. 2e. *edit.*

Polyommate Eurydice. Latr. *nouv. Diction. d'Hiſt. nat.* 2e. *édit. tom.* 27. *p.* 488.

Polyommate Eurydice. God. *Hiſt. nat. des lépidop. de France, tom.* 2. *p.* 175. *pl.* V. XXII. *fig.* 5. 6.

Polyommate Eurydice. God. *Tabl. méth. des lépid. de France,* Diurnes, *p.* 51. *n°.* 146.

Il a de quinze à ſeize lignes d'envergure. Le deſſus du mâle eſt d'un fauve-ponceau-vif, avec le contour extérieur des quatre ailes & le bord abdominal des ſecondes d'un brun-noirâtre. Le deſſous eſt d'un cendré-jaunâtre, avec une multitude de points noirs à iris gris, une teinte rouſſâtre au milieu des premières ailes, & une teinte verdâtre à la baſe des ſecondes.

Le deſſus de la femelle eſt d'un brun-noirâtre, avec une dizaine de points noirs ſur le diſque de chaque aile. Le deſſous eſt, à une légère nuance près, comme dans le mâle. La frange des quatre ailes eſt blanche dans les deux ſexes.

Se trouve dans les Alpes, en juillet & en août.

Nota. Fabricius rapporte ce polyommate au *Chryſeis;* cependant il y a de la différence entre l'un & l'autre, car l'*Eurydice mâle* a la bordure du deſſus moins large & ſans reflet, & le diſque ſans points noirs. L'*Eurydice femelle* n'a point de fauve en deſſus; les points oculaires du deſſous des deux ſexes ſont conſtamment plus petits, quoique d'ailleurs auſſi nombreux que chez le *Chryſeis.*

165. Polyommate Hippothoé.

Polyommatus Hippothoe.

Pol. alis ſuprà fulvis, ſingularum maris *margine tenui lunulâque centrali, anticarum* fœminæ *maculis plurimis, nigris: ſubtùs cinereis, baſi cœruleſcente, punctis ocellaribus numeroſis faſciâque marginali fulvâ.*

Papilio P. R. Hippothoe, *alis integerrimis, ſuprà fulvis, immaculatis: ſubtùs cinereſcentibus, punctis ocellaribus numeroſis.* Linn. *Syſt. Nat.* 2. *p.* 793. *n°.* 254. — *Faun. Suec. edit.* 2. *p.* 274. *n°.* 1046.

Papilio P. R. Hippothoe, *alis integris, margine albo: ſubtùs cinereis, punctis ocellaribus numeroſis.* Fab. *Spec. Inſ. tom.* 2. *p.* 126. — *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 79. *n°.* 723.

Hesperia R. *Hippothoe.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 309. *n°.* 172.

Papilio Hippothoe. Wien. *Verz. p.* 181. *fam.* M. *n°.* 2.

Papilio Hippothoe. Illig. *N. Aufg. Dess. tom.* 2. *p.* 252. *n°.* 2.

Roes. *Inf. part.* 3. *tab.* 37. *fig.* 6. 7.

Naturf. 6. *p.* 11.

Papilio Hippothoe. Bergstr. *Nomenkl. tab.* 68. *fig.* 1-3.

Papilio Hippothoe. Borkh. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 143 & 270. — *part.* 2. *p.* 220. *n°.* 2.

Papilio Hippothoe. Schneid. *Syst. Beschr. p.* 228. *n°.* 136.

Papilio Hippothoe. Lang. *Verz.* 2. *p.* 50. *n°.* 395-398.

Papilio Hippothoe. Fuessl. *Suiff. Inf. p.* 32. *n°.* 607.

Papilio Hippothoe, var. Esp. *Pap. Eur. part.* 1. *tab.* 38. *Suppl.* 15. *fig.* 1. a. b.

Papilio Hippothoe fœm., var. Knoch, *Beytr. part.* 2. *tab.* 6. *fig.* 3.

Papilio Hippothoe. Hubn. *Pap. tab.* 70. *fig.* 352-354.

Papilio Hippothoe. Ochsen. *Pap. Eur. tom.* 1.

L'Argus bronzé, var. Engram. *Pap. d'Europe, tom.* 1. *pl.* 43. *fig.* 91. c. d.

L'Argus satiné à taches noires. Engram. *Pap. d'Europe, tom.* 1. *pl.* 44. *fig.* 93. a. b. c.

Polyommate Hippothoé. Latr. *nouv. Diction. d'Hist. nat.* 2e. *édit. tom.* 27. *p.* 487.

Polyommate Hippothoé. God. *Hist. natur. des lépid. de France, tom.* 1. *p.* 200. *pl.* 9 *fecund. fig.* 5. *& pl.* 10 *fecund. fig.* 3.

Polyommate Hippothoé. God. *Tabl. méth. des lépid. de France,* Diurnes, *p.* 52. *n°.* 147.

Il a de quinze à dix-sept lignes d'envergure. Le dessus du mâle est d'un fauve-ponceau-vif, avec une petite bordure noire, entière aux premières ailes, crénelée intérieurement aux secondes. Il y a en outre une lunule noire au centre de chaque aile.

La femelle a le dessus des ailes supérieures d'un fauve-gai, avec plusieurs taches & les bords noirs. Elle a le dessus des ailes inférieures d'un brun-noirâtre, avec une bande fauve, placée avant le bord terminal & échancrée en arrière.

Le dessous des deux sexes est comme dans le *Chryseis*, mais les secondes ailes ont la base bleuâtre, & leur milieu offre un arc noir au lieu d'offrir deux points ocellés.

Se trouve en juin, dans les endroits marécageux.

166. Polyommate de la Verge-d'or.

Polyommatus Virgaureæ.

Pol. alis supra fulvis, limbo nigro, maris *immaculatis,* fœminæ *multimaculatis : posticis subtùs pallidè luteis, punctis albis, subocellaribus nigris strigâque è maculis albis.*

Papilio P. R. Virgaureæ, *alis subangulatis, fulvis margine fusco, punctis atris sparsis.* Linn. *Syst. Nat.* 2. *p.* 793. *n°.* 253.—*Faun. Suec. edit.* 2. *p.* 285. *n°.* 1079.

Papilio P. R. Virgaureæ, *alis subangulatis, fulvis margine atro : subtùs punctis nigris albisque.* Fab. *Spec. Inf. tom.* 2. *p.* 126.—*Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 79. *n°.* 724.

Hesperia R. *Virgaureæ.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 309. *n°.* 173.

Papilio Virgaureæ. Wien. *Verz. p.* 180. *fam.* M. *n°.* 1.

Schæff. *Icon. tab.* 97. *fig.* 7.

Naturf. 6. *p.* 11.

Papilio Virgaureæ. Scop. *Ent. Carn. p.* 180. *n°.* 462.

Papilio Virgaureæ. Rossi, *Faun. Etr. tom.* 2. *p.* 157. *n°.* 1038.

Papilio Virgaureæ. Petag. *Instit. Ent. tom.* 1. *p.* 490. *n°.* 132.

Papilio Virgaureæ. Esp. *Pap. Eur. part.* 1. *tab.* 22. *fig.* 2. a. b.

Papilio Virgaureæ. Bergstr. *tab.* 65. *fig.* 1-4.

Papilio Virgaureæ. Borkh. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 141 & 269. — *part.* 2. *p.* 220. *n°.* 1.

Papilio Virgaureæ. Borkh. *Rhein. Magaz. tom.* 1. *p.* 274. *n°.* 75.

Papilio Virgaureæ. Illig. *N. Aufg. Dess. tom.* 2. *p.* 250. *n°.* 1.

Papilio Virgaureæ. Schneid. *Syst. Beschr. p.* 227. *n°.* 135.

Papilio Virgaureæ. Lang. *Verz.* 2. *p.* 49. *n°.* 393. 394.

Papilio Virgaureæ. Schwarz, *Raupenkal. p.* 345.

Papilio Virgaureæ. Panz. *Faun. Germ.* 21. 22.

Papilio Virgaureæ. Hubn. *Pap. tab.* 70 *fig.* 349-351.

Papilio Virgaureæ. Devill. *Ent. Linn. tom.* 2. *p.* 71. *n°.* 126.

Papilio Virgaureæ. Ochsen. *Pap Eur. tom.* 1.

Papilio Phlæas. Fuessl. *Suiff. Inf. p.* 32. *n°.* 605.

L'Argus fatiné. Engram. *Pap. d'Europe, tom.* 1. *p.* 187. *pl.* 44. *fig.* 92. c. d. e.

Polyommate de la Verge-d'or. Latr. *nouv. Dict. d'Hiſt. nat. 2e. édit. tom.* 27. *p.* 487.

Polyommate de la Verge-d'or. God. *Hiſt. nat. des lépid. de France, tom.* 1. *p.* 202. *pl.* 9 *ſecund. fig.* 6. *& pl.* 10 *ſecund. fig.* 4.

Polyommate de la Verge-d'or. God. *Tabl. méthodique des lépidop. de France*, Diurnes, *p.* 52. *n°.* 148.

Il a de treize à quatorze lignes d'envergure. Le mâle a le deſſus des ailes d'un fauve-doré-brillant, avec une petite bordure noire, entière aux ſupérieures, crénelée intérieurement aux inférieures.

La femelle eſt fauve & ponctuée de noir en deſſus, mais le fond de ſes ailes inférieures eſt plus ou moins rembruni ſur le milieu.

Le deſſous des deux ſexes eſt d'un fauve-jaunâtre-pâle, avec une douzaine de points noirs légèrement ocellés. Les points des ſecondes ailes ſont plus petits, & immédiatement ſuivis d'une rangée tranſverſe de taches blanches.

La chenille eſt pubeſcente, d'un vert-foncé, avec une ligne jaune le long du dos, & des lignes d'un vert-pâle ſur les côtés. Sa tête & ſes pattes écailleuſes ſont noires. Elle vit ſur la *verge-d'or commune* & ſur la *patience ſauvage.*

La chryſalide eſt d'un jaune-brunâtre, avec l'enveloppe des ailes plus foncée.

Il paroît au printemps & en été. On le trouve dans pluſieurs parties de l'Europe, dans l'eſt de la France, &c.

167. Polyommate Phlæas.

Polyommatus Phlæas.

Pol. alis anticis cupreo-fulvis, nigro maculatis : poſticis ſuprà fuſcis, fuſciâ crenatâ fulvâ ; ſubtùs fuſceſcenti-cinereis, punctis nigricantibus ſtrigâque flexuoſâ teſtaceâ.

Papilio P. R Phlæas, *alis ſubangulatis, fulvis, nigro punctatis : ſubtùs albo marginatis ; poſticis caneſcentibus.* Linn. *Syſt. Nat* 2. *p.* 795. *n°.* 252. — *Faun. Suec. edit.* 2. *p.* 285. *n°.* 1078.

Papilio P. R Phlæas, *alis ſubintegris, fulvis, nigro punctatis : ſubtùs caneſcentibus.* Fab. *Spec. Inſ. tom.* 2. *p.* 126. — *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 80. *n°.* 727.

Heſperia R. *Phlæas.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 311. *n°.* 178.

Heſperia R. Eleus, *alis emarginatis, ſuſcis : anticis utrinquè diſco fulvo, nigro punctato ; poſticis faſciolâ fulvâ : ſubtùs cinereis, nigro punctatis.* Fab. *Ent. Syſt. Suppl. tom.* 5. *p.* 430. *n°.* 180-181. (Femelle.)

Papilio P. R. Timeus, *alis caudatis, fulvo fuſcoque variis : anticis ſubtùs punctis ocellaribus atris.* Fab. *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 70. *n°.* 667. (Variété femelle.)

Heſperia R. *Timeus.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 285. *n°.* 96.

Papilio Timeus. Cram. *pl.* 186. *fig.* E. F. (Var. femelle.)

Papilio Phlæas. Wien. *Verz. p.* 181. *fam.* M. *n°.* 5.

Schæff. *Icon. tab.* 143. *fig.* 3. 4.

Roes. *Inſ. part.* 3. *tab.* 45. *fig.* 5. 6.

Naturf. 6. *p.* 11. *tab.* 1. *fig.* 1.

Papilio Phlæas. Esp. *Pap. Eur. part.* 1. *tab.* 22. *fig.* 1. — *tab.* 62. *cont.* 12. *fig.* 5. — *tab.* 60. *cont.* 10. *fig.* 5.

Papilio Phlæas. Borkh. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 148 *&* 272. *n°.* 7. — *part.* 2. *p.* 222.

Papilio Phlæas. Borkh. *Rhein. Magaz. tom.* 1. *p* 279. *n°.* 80.

Papilio Phlæas. Illig. *N. Aufg. Deſſ. tom.* 2. *p.* 256. *n°.* 5.

Papilio Phlæas. Schneid. *Syſt. Beſchr. p.* 235. *n°.* 141.

Papilio Phlæas. Hufnag. *Tabell. im. Berl. Magaz. tom.* 2. *p.* 80. *n°.* 44.

Papilio Phlæas. Bergstr. *Nomenkl. tab.* 65. *fig.* 5. 6.

Papilio Phlæas. Lang. *Verz.* 2. *p.* 51. *n°.* 406-409.

Papilio Phlæas. Brahm. *Inſ. Kalend. p.* 137. *n°.* 69.

Papilio Phlæas. Schwarz, *Raupenkal. p.* 179 *&* 344.

Papilio Phlæas. Rossi, *Faun. Etr. tom.* 2. *p.* 157. *n°.* 1040.

Papilio Phlæas. Petag. *Inſtit. Ent. tom.* 1. *p.* 490. *n°.* 134.

Papilio Phlæas. Devill. *Ent. Linn. tom.* 2. *p.* 70. *n°.* 125.

Papilio Phlæas. Hubn. *Pap. tab.* 72. *fig.* 362. 363.

Papilio Phlæas. Ochsen. *Pap. Eur. tom.* 1.

Papilio Virgaureæ (ſexus alter). Scop. *Ent. Carn. p.* 181.

Papilio Virgaureæ. Fuessl. *Suiff. Inf. p.* 32. *n°.* 606.

Le bronzé. Geoff. *Hiſt. Inf. tom.* 2. *p.* 65. *n°.* 35.

L'Argus bronzé. Engram. *Pap. d'Europe, tom.* 1. *p.* 186. *pl.* 43. *fig.* 91. a. b. — *pl.* 72. *Suppl.* 18. *fig.* 91. e. g. h.

Polyommate Phlæas. Latr. *nouv Dict. d'Hiſt. nat.* 2e. *édit. p.* 489.

Polyommate Phlæas. God. *Hiſt. nat. des lépid. de France, tom.* 1. *p.* 204. *pl.* 10. *fig.* 1.

Polyommate Phlæas. God. *Tab. méthod. des lépid. de France,* Diurnes, *p.* 52. *n°.* 149.

Les heſpéries rurales *Phlæas*, *Eleus* & *Timeus* de Fabricius, ne font qu'une ſeule eſpèce, dont l'envergure eſt de douze à quatorze lignes.

Le deſſus des premières ailes, chez les deux ſexes, eſt d'un fauve-cuivreux-luiſant, avec huit gros points noirs, & la côte ainſi que le bord poſtérieur d'un brun-noirâtre. Leur deſſous eſt d'un fauve-jaunâtre, avec une douzaine de points noirs à iris blanc, & l'extrémité cendrée.

Le deſſus des ſecondes ailes eſt d'un brun-noirâtre, avec un arc central & quelques points plus foncés, puis une bande fauve poſtérieure ayant les côtés crénelés. Leur deſſous eſt d'un cendré-brunâtre, avec une quinzaine de petits points noirâtres épars, & une ligne flexueuſe briquetée répondant à la bande fauve de la ſurface oppoſée.

Quelquefois la bande fauve du deſſus des ſecondes ailes eſt ſurmontée de trois à quatre points bleuâtres comme dans le *Timeus* de Fabricius.

La chenille, ſuivant quelques auteurs, eſt d'un vert-clair, avec une ligne jaune le long du dos. Elle vit ſur la *patience des prés.*

Ce polyommate ſe trouve, au printemps & à la fin de l'été, en Europe, dans l'Aſie mineure & dans l'Amérique ſeptentrionale. Il ſe repoſe principalement ſur les fleurs de *renoncules.* Les individus du midi de l'Europe & même du centre de la France ont le deſſus des ailes ſupérieures plus rembruni; & chez leurs femelles (l'*Eleus* & le *Timeus* de Fabricius), l'échancrure du bord terminal des ailes inférieures eſt très-prononcée, ce qui forme en quelque ſorte deux petites queues. Les individus de l'Amérique ſeptentrionale reſſemblent parfaitement en deſſus à ceux des environs de Paris, mais ils ont le deſſous des ſecondes ailes d'un cendré plus clair & qui fait reſſortir davantage les points noirs.

Fabricius ſe trompe probablement en diſant que ſon *Eleus* ſe trouve à Surinam. L'individu figuré par Cramer a été pris aux environs de Smyrne.

168. Polyommate Hylla.

Polyommatus Hylla.

Pol. alis dentatis, fulvis, nigro punctatis: poſticis baſi ſuprà fuſcis, ſubtùs albidis. Fab.

Papilio N. P. *Hylla.* Fab. *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 59. *n°.* 572.

Papilio S. *Hylla.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 253. *n°.* 784.

Papilio Hyllus. Cram. *pl.* 43. *fig.* B. C.

Fabricius a pris ce lépidoptère pour une de ces argynnes qu'on nomme vulgairement *Damiers.* Quoique nous ne l'ayons pas vu, nous en parlons ici pour fixer l'attention des entomologiſtes & des amateurs.

Il ſe rapproche extrêmement du *Phlæas*, mais il eſt plus grand; ſes ailes inférieures ont le deſſous blanchâtre & beaucoup plus chargé de points noirs.

Des environs de Smyrne.

Nota. Ne ſeroit-ce pas la femelle d'une eſpèce voiſine du *Chryſeis* ou de l'Hippothoé?

169. Polyommate Saluſte.

Polyommatus Saluſtius.

Pol. alis integerrimis, fulvis, nigro variis: anticis ſubtùs nigro punctatis, poſticis cinereis fuſco maculatis. Fab.

Heſperia R. *Saluſtius.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 310. *n°.* 175.

Papilio Saluſtius. Jon. *Fig. pict.* 6. *tab.* 59. *fig.* 1.

Il a tout-à-fait le port du *Phlæas.* Le deſſus des ailes eſt fauve, avec des points & pluſieurs lignes tranſverſes noirs. Le deſſous des ailes ſupérieures eſt fauve & ponctué de noir. Le deſſous des inférieures eſt cendré & tacheté de brun.

De l'Inde.

(*Traduction de Fabricius.*)

170. Polyommate Evadrus.

Polyommatus Evadrus.

Pol. alis denticulatis, ſuprà fulvis, margine omni fuſco fimbriâque variegatis: poſticis ſubtùs corticinis, cinereo maculatis.

Heſperia U. Evadrus, *alis caudatis, fuſcis, diſco fulvo: anticis ſubtùs punctis argenteis ſubocellatis.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 343. *n°.* 306.

Papilio Pierus. Cram. *pl.* 243. *fig.* E. F.

Papilio Nycetus. Cram. *pl.* 380. *fig.* F. G. (Var.)

Papilio Pierus. Herbst, *Pap. tab.* 323. *fig.* 10. 11.

M. Latreille a reconnu le premier que le pa-

pillon urbicole *Evadrus* de Fabricius étoit un polyommate.

Il a de quinze à dix-huit lignes d'envergure. Le deſſus du mâle eſt d'un fauve-gai, avec une bordure d'un noir-brun, partant de l'origine des ailes ſupérieures, ſe rétréciſſant entre le ſommet & l'angle interne des inférieures, & offrant un entrecoupé blanc ſur la frange du bord terminal des unes & des autres.

Le deſſus de la femelle eſt d'un fauve moins gai que celui du mâle, & entièrement bordé de brun-noirâtre.

Le deſſous des premières ailes eſt fauve dans les deux ſexes, avec le pourtour extérieur d'un brun-tanné, & une douzaine de points noirs à prunelle blanche.

Le deſſous des ſecondes ailes eſt d'un brun-tanné, plus foncé chez le mâle que chez la femelle, avec des taches cendrées, dont les intermédiaires formant parfois une ſorte d'X, les poſtérieures tantôt ſéparées, tantôt réunies en une bande flexueuſe. Le corps a le deſſus jaunâtre, & le deſſous d'un brun-tanné. Les antennes ſont entièrement noirâtres.

Cette eſpèce nous a offert pluſieurs variétés.

La première a en deſſous le ſommet des ailes ſupérieures & le fond des inférieures d'une couleur pourpre ou lie de vin; du reſte elle reſſemble aux mâles ordinaires.

La ſeconde eſt, comme le mâle précédent, d'une couleur lie de vin en deſſous, mais ſes ailes inférieures offrent des litures blanches très-étroites, au lieu d'offrir des taches cendrées. Elle répond au papillon *Nycetus* de Cramer.

La troiſième, beaucoup plus extraordinaire que les deux autres, eſt une femelle. Elle a le fauve du deſſus des ſecondes ailes coupé tranſverſalement par une bande noirâtre. Le deſſous de ſes quatre ailes eſt parſemé de points & de chevrons d'un blanc-argenté, ſeulement les points de ſes ailes ſupérieures ſont un peu bordés de noir.

Du Cap de Bonne-Eſpérance.

171. Polyommate Pétalus.

Polyommatus Petalus.

Pol. alis integerrimis, ſuprà fulvis, maculis diſci lumboque poſtico nigris : poſticis ſubtùs nebuloſo-griſeis, faſciis duabus tranſverſis albis.

Papilio Petalus. Cram. *pl.* 243. *fig.* C. D.

Papilio Petalus. Herbst, *Pap. tab.* 323. *fig.* 8. 9.

Il a environ un pouce & demi d'envergure. Le deſſus des ailes eſt d'un fauve-jaunâtre, avec quelques gros points diſcoïdaux, & une bordure aſſez large, d'un noir-brun.

Le deſſous des premières ailes eſt de la couleur du deſſus, mais il a le milieu plus tacheté de noir, & la bordure eſt remplacée par des atomes noirâtres.

Le deſſous des ſecondes ailes eſt d'un gris piqué de brun, avec deux bandes blanches, tranſverſes, dont l'antérieure diſcoïdale & fortement interrompue vers le bord interne.

Décrit d'après un individu qui nous a paru être une femelle.

Du Cap de Bonne-Eſpérance.

172. Polyommate Orus.

Polyommatus Orus.

Pol. alis integris, ſuprà fulvis (maris *violaceo-nitidulis*), *punctis margineque nigris : poſticis ſubtùs cinereis, maculis ocellaribus obſoletis ſtrigâque poſticâ è lunulis fuſceſcentibus.*

Papilio Orus. Cram. *pl.* 332. *fig.* E. F.

Papilio Orus. Herbst. *Pap. tab.* 324. *fig.* 8. 9.

Papilio P. R. Arcas, *alis integerrimis, fulvis, margine punctiſque nigris : poſticis ſubtùs griſeis, immaculatis.* Fab. *Mant. Inſ. tom.* 2. *pag.* 80. *n°.* 728.

Heſperia R. *Arcas.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 311. *n°* 179.

Fabricius a pris la femelle pour le mâle. Il a vu en outre des individus dont le deſſous des ailes inférieures étoit effacé, ce qui l'a probablement empêché de reconnoître l'*Orus* de Cramer, dont la figure n'eſt pas d'ailleurs très-exacte.

Il a de dix à douze lignes d'envergure. Le deſſus des ailes eſt d'un fauve-ponceau, avec deux taches centrales, une rangée poſtérieure de points & le bord terminal noirs. La rangée de points manque aux ſecondes ailes du mâle, mais il a un léger reflet violet.

Le deſſous des premières diffère du deſſus en ce que les bords ſont cendrés, & en ce que les points noirs ſont oculaires & qu'il y en a un de plus ſur le milieu.

Le deſſous des ſecondes ailes eſt cendré, avec des taches un peu plus claires, à prunelle noirâtre, & une ſérie marginale de lunules brunâtres.

Du Cap de Bonne-Eſpérance.

173. Polyommate Zeuxo.

Polyommatus Zeuxo.

Pol. alis caudatis, integris, diſco fulvo, nigro maculato : primoribus ſubtùs argenteo maculatis. Linn.

Papilio P. R. *Zeuxo.* Linn. *Syſt. Nat.* 2. *p.* 789. *n°.* 231. — *Muſ. Lud. Ulr. p.* 331. *n°.* 149.

Papilio P. R. *Zeuxo.* Fab. *Mant. Inſ. tom.* 2. *pag.* 82. *n°.* 737.

Heſperia

Hesperia R. *Zeuxo*. Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *pag.* 314. *n°.* 189.

N'ayant pas vu ce polyommate, nous traduisons la description que Linné en donne dans son *Museum Ludovicæ Ulricæ*.

Sa taille est moitié plus petite que celle de l'*Argus* proprement dit, en sorte qu'on doit le mettre parmi les plus petits papillons. Ses premières ailes sont noires en dessus, avec le disque largement fauve; ou plutôt elles sont d'un fauve-luisant & largement bordées de noir tout autour, avec plusieurs taches noires (environ neuf), carrées & souvent adhérentes. Leur dessous est d'un cendré-pâle, mais un peu fauve sur le milieu, avec beaucoup de taches (au-delà de dix ou douze), noires, éparses, ayant, à l'exception de deux ou trois qui avoisinent le bord interne, une prunelle d'un bleu-argenté-luisant.

Le dessus des ailes inférieures est comme celui des supérieures. Leur dessous est d'un cendré-obscur & sans taches.

Du Cap de Bonne-Espérance.

174. Polyommate Ballus.

Polyommatus Ballus.

Pol. alis integris, suprà fuscis (fœminæ *areâ fulvâ*): *posticis subtùs ad basin viridibus ocello centrali obsoleto, ad apicem carneo-cinereis strigâ è punctis rubris albo innatis.*

Papilio P. R. Ballus, *alis integris, fulvis*, (fœminæ *fuscis*), *margine fusco: subtùs anticis nigro punctatis, posticis viridibus margine fusco.* Fab. *Mant. Inf. tom.* 2. *pag.* 80. *n°.* 279.

Hesperia R. *Ballus*. Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 311. *n°.* 180.

Papilio Ballus. Borkh. *Pap. Eur. part.* 2. *p.* 224. *n°.* 12.

Papilio Ballus. Hubn. *Pap. tab.* 107. *fig.* 550. (Mas.) — *tab.* 72. *fig.* 360. 361. (Fœm.)

Papilio Ballus. Petagna, *Instit. Entom. tom.* 1. *p.* 491. *n°.* 135.

Papilio Ballus. Oschen. *Pap. Eur. tom.* 1.

Polyommate Ballus. God. *Hist. nat. des lépid. de France, tom.* 2. *p.* 186. Observation.

Fabricius a connu les deux sexes de ce polyommate, mais il a pris le mâle pour la femelle, & réciproquement.

Il a environ quinze lignes d'envergure. Le dessus du mâle est d'un brun-noirâtre, avec la frange plus pâle, & deux petits points fauves à l'angle interne des ailes inférieures.

Le dessus de la femelle est du même brun que chez le mâle, avec un grand espace fauve sur le disque des ailes supérieures, & un espace semblable, mais moins large, à la région anale des inférieures.

Le dessous des premières ailes est d'un fauve plus foncé chez la femelle que chez le mâle, avec les bords bruns, la base verte, & une quinzaine de points noirs discoïdaux, ayant pour la plupart un iris blanc.

Le dessous des secondes ailes est vert, depuis la base jusqu'au-delà du milieu, avec une tache centrale obscure & en majeure partie cerclée de blanc; il est d'un cendré-incarnat vers l'extrémité, avec deux rangées courbes de points blancs, dont les antérieurs moins distincts, les postérieurs appuyés chacun sur un point rouge. Le corps est d'un brun-noirâtre, avec des poils verts sur le corselet & sur le ventre. Les antennes sont noirâtres, annelées de blanc, avec le dessus de la massue ferrugineux.

En Espagne & en Italie. M. Lefebure de Cérisy l'a pris en 1823 aux environs de Perpignan.

175. Polyommate de la Ronce.

Polyommatus Rubi.

Pol. alis denticulatis, suprà fuscis, nitidis: subtùs viridibus, margine tenui ferrugineo strigâque è punctis albis.

Papilio P. R. *alis dentato-subcaudatis, suprà fuscis, subtùs viridibus.* Linn. *Syst. Nat.* 2. *p.* 791. *n°.* 257. — *Faun. Suec. edit.* 2. *p.* 284. *n°.* 1077.

Papilio P. R. *Rubi*. Fab. *Spec. Inf. tom.* 2. *pag.* 121. — *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 71. *n°.* 670.

Hesperia R. *Rubi*. Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 287. *n°.* 102.

Papilio Rubi. Wien. *Verz. pag.* 186. *fam.* O. *n°.* 1.

Schæff. *Icon. tab.* 29. *fig.* 5. 6.

Naturf. 6. *p.* 12. *n°.* 47.

Roem. *Gen. Inf. tab.* 18. *fig.* 11. 12.

Papilio Rubi. Esp. *Pap. Eur. part.* 1. *tab.* 21. *fig.* 2. — *tab.* 98. *cont.* 53. *fig.* 1-4. (La chenille & la chrysalide.)

Papilio Rubi. Hufnag. *Tab. im. Berl. Magaz. tom.* 2. *p.* 82. *n°.* 47.

Papilio Rubi. Bergstr. *Nomenkl. tab.* 22. *fig.* 8. 9. — *tab.* 31. *fig.* 4. — *tab.* 71. *fig.* 7.

Papilio Rubi. Herbst, *tab.* 308. *fig.* 5. 6.

Papilio Rubi. Borkh. *Pap. Eur. part.* 1. *pag.* 136 & 267. *n°.* 5. — *part.* 2. *p.* 218.

Papilio Rubi. Borkh. *Rhein. Magaz. tom.* 1. *p.* 294. *n°.* 102.

Papilio Rubi. Illig. *N. Ausg. Deff. tom.* 2. *p.* 277. *n°.* 1.

Papilio Rubi. Schneid. *Syſt. Beſchr. p.* 225. *n°.* 134.

Papilio Rubi. Lang. *Verz.* 2. *p.* 47. *n°.* 382-385.

Papilio Rubi. Brahm. *Inſ. Kalend. p.* 227. *n°.* 122.

Papilio Rubi. Schwarz, *Raupenkal. p.* 17 & 49.

Papilio Rubi. Fuessl. *Suiſſ. Inſ. p.* 31. *n°.* 600.

Papilio Rubi. Rossi, *Faun. Etr. tom.* 2. *p.* 156. *n°.* 1033.

Papilio Rubi. Scriba, *Beytr.* 3. *tab.* 15. *fig.* 8-10.

Papilio Rubi. Scop. *Ent. Carn. pag.* 176. *n°.* 460.

Papilio Rubi. Petag. *Inſtit. Ent. pag.* 482. *n°.* 113.

Papilio Rubi. Huen. *Pap. tab.* 72. *fig.* 364-365.

Papilio Rubi. Ochsen. *Pap. Eur. tom.* 1.

L'Argus vert *ou* l'Argus aveugle. Geoff. *Hiſt. Inſ. tom.* 2. *p.* 64. *n°.* 34.

Argus verd. Engram. *Pap. d'Europe, tom.* 1. *p.* 185. *pl.* 43. *fig.* 90. a. b. — *pag.* 277. *pl.* 72. *Suppl.* 18. *fig.* 90. C.

Polyommate de la Ronce. Latr. *nouv. Dict. d'Hiſt. nat.* 2e. *édit. tom.* 27. *p.* 493.

Polyommate de la Ronce. God. *Hiſt. nat. des lépid. de France, tom.* 1. *p.* 206. *pl.* 10. *fig.* 3. & *pl.* 10 *fecund. fig.* 5.

Polyommate de la Ronce. God. *Tabl. méthod. des lépid. de France,* Diurnes, *p.* 52. *n°.* 150.

Il a de quatorze à quinze lignes d'envergure. Le deſſus des ailes eſt d'un brun-noirâtre-luiſant, avec la frange blanchâtre.

Le deſſous eſt vert & liſeré de ferrugineux, avec une rangée tranſverſe de points blancs derrière le milieu des quatre ailes ou des inférieures ſeulement. Ces points ſont plus ou moins bordés de brun à leur côté interne, & il arrive quelquefois qu'ils manquent totalement chez des individus d'ailleurs très-frais.

Dans le mâle, le deſſus des premières ailes offre vers le milieu de la côte une tache oblongue, cotonneuſe, un peu enfoncée, tantôt plus colorée que le fond de l'aile, tantôt blanchâtre. Nous avions cru d'abord que ce caractère étoit propre à la femelle, mais un examen plus approfondi nous a fait reconnoître le contraire.

Le polyommate de la Ronce ſe trouve dans les bois de l'Europe depuis la mi-avril juſqu'à la mi-mai. Il repoſe ſur les épines en fleurs.

La chenille eſt pubeſcente, verte, avec un rang de taches triangulaires jaunâtres ſur chacun des côtés, & une ligne blanche au-deſſus des pattes. Elle vit ſur la *ronce*, l'*eſparcette*, le *genêt*, les *cytiſes*, &c., & elle ſe tranſforme avant l'hiver. La chryſalide eſt brune, avec les ſtigmates plus clairs.

176. Polyommate Romulus.

Polyommatus Romulus.

Pol. alis integerrimis, fuſcis : ſubtùs viridibus ; poſticis maculâ rufâ. Fab.

Heſperia R. *Romulus.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 316. *n°.* 195.

Papilio Romulus. Jon. *Fig. pict.* 6. *tab.* 61. *fig.* 4.

Papilio Romulus. Donow. *of an Epit. of the Nat. Hiſt. Inſects of India, cah.* 6. *pl.* 1. *fig.* 5.

Il eſt un peu plus grand que le papillon de la *Ronce*. Le deſſus des quatre ailes eſt d'un brun-noirâtre ſans taches.

Le deſſous eſt vert, ſans aucune tache aux ailes ſupérieures, avec une ligne tranſverſe brune & une tache poſtérieure rouſſe aux inférieures.

Des Indes.

(*Traduction de Fabricius.*)

177. Polyommate Irus.

Polyommatus Irus.

Pol. alis denticulatis, fuſcis : poſticis ſubtùs baſi ferrugineis, ſtrigis duabus obſcurioribus undulatis ; apice cinereo pulverulentis puncto caſtaneo. (Mas.)

Il a environ quinze lignes d'envergure. Le deſſus du mâle eſt d'un brun-noirâtre-chatoyant, avec une petite tache blanchâtre oblongue près du milieu de la côte des ailes ſupérieures.

Le deſſous de ſes premières ailes eſt preſque de la couleur du deſſus, avec deux petites lignes ferrugineuſes, tranſverſes & ondulées, ſur le milieu de la ſurface.

Le deſſous de ſes ſecondes ailes eſt ferrugineux à la baſe, avec deux lignes flexueuſes plus foncées; il eſt ſaupoudré de gris vers l'extrémité, avec un point d'un brun-marron placé vers l'angle de l'anus.

Nous n'avons pas vu la femelle.

De l'Amérique ?

178. Polyommate Philiaſus.

Polyommatus Philiaſus.

Pol. alis ſubcaudatis, nigris, ſubtùs maculatis : poſticis poſticè ſuprà ocellis duobus, ſubtùs unico. Linn.

Papilio P. R. *Philiasus.* Linn. *Syst. Nat.* 2. *p.* 790. *n°.* 233.

Papilio P. R. *Philiasus.* Fab. *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 83. *n°.* 757.

Hesperia R. *Philiasus.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 324. *n°.* 229.

Nous n'avons pas vu ce lépidoptère, mais, à en juger par la description qu'en donne Linnæus, il paroît devoir être placé ici plutôt que dans la division suivante.

Il est plus petit que l'*Argus* (n°. 212). Le dessus des ailes est d'un brun-noirâtre. Le dessous est cendré, avec des taches noires & des taches blanchâtres. Les ailes inférieures sont un peu anguleuses vers l'angle de l'anus, & elles ont deux ou trois yeux noirs en dessus, & un seul à iris ferrugineux en dessous.

D'Alger.

179. Polyommate Lara.

Polyommatus Lara.

Pol. alis omnibus supra subtestaceo-fuscis, basi cœrulescenti nitidulis, angulo ani biocellatis : subtùs cinereis, anticis ocellis duobus ut supra, posticis cœcis.

Papilio P. R. Lara, *alis integerrimis, subtestaceis : primoribus supra uniocellatis, posticis supra biocellatis.* Linn. *Syst. Nat.* 2. *p.* 791. *n°.* 238. — *Mus. Lud. Ulr. p.* 320. *n°.* 138.

Papilio P. R. *Lara.* Fab. *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 82. *n°.* 739.

Hesperia R. *Lara.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 315. *n°.* 191.

Papilio Gorgias. Stoll, *Pap. Suppl. à* Cram. *pl.* 33. *fig.* 5 & 5 d. (Le mâle.)

Papilio Jolaus. Cram. *pl.* 270. *fig.* F. G. (La femelle.)

Le papillon *Gorgias* de Stoll, & le papillon *Jolaus* de Cramer sont bien certainement les deux sexes du *Lara* de Linné.

Il a un pouce d'envergure. Le dessus des deux sexes est d'un brun un peu briqueté, avec un léger reflet bleu à la base, & deux yeux noirs à iris blanc à l'angle anal de toutes les ailes. La frange est de plus entrecoupée de blanc.

Le dessous des premières ailes est cendré, avec deux yeux correspondans à ceux du dessus & précédés d'une ligne transverse de taches blanches qui ont le côté interne bordé de brun-noirâtre.

Le dessous des secondes ailes est d'un cendré-blanchâtre, avec deux lignes flexueuses, brunâtres. L'on n'y voit point d'yeux.

Les yeux du dessus des secondes ailes sont parfois accompagnés de petits croissans blanchâtres.

Du Cap de Bonne-Espérance.

Nota. Les figures de Stoll & de Cramer sont trop grandes.

180. Polyommate Syméthus.

Polyommatus Symethus.

Pol. alis subdentatis, supra fuscis, singularum maculâ disci albâ : posticis subtùs infuscato-albidis, caracteribus nigricantibus obsoletis.

Papilio P. R. Symethus, *alis subcaudatis, fuscis, maculâ disci albâ : anticis apice atris.* Fab. *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 69. *n°.* 656.

Hesperia R. *Symethus.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 280. *n°.* 76.

Papilio Symethus. Cram. *pl.* 149. *fig.* B. C. (Le mâle.)

Papilio Symethus. Stoll, *Pap. Suppl. à* Cram. *pl.* 37. *fig.* 3 & 3 c.

Papilio Symethus. Herbst, *Pap. tab.* 284. *fig.* 3. 4.

Fabricius le dit petit, & cependant il a au moins un pouce & demi d'envergure.

Le dessus des premières ailes est d'un noir-brun, mais un peu plus clair à la base, avec une tache blanche discoïdale, ayant la partie supérieure arrondie, & l'extrémité postérieure terminée par une pointe légèrement bifide.

Le dessus des secondes ailes est noir vers la côte, cendré vers l'extrémité, & marqué au milieu d'une liture blanche longitudinale.

Le dessous des ailes supérieures est gisâtre, avec une tache blanche, correspondant à celle du dessus, & entourée de quelques hiéroglyphes noirâtres dont les bords sont blanchâtres. Outre cela, le bord postérieur de l'aile est d'un ferrugineux-pâle & longé par une série de points noirs.

Le dessous des ailes inférieures est d'un blanc très-sale, avec des hiéroglyphes peu prononcés, & une série de points marginaux, noirâtres.

Dans la femelle, la tache blanche du dessus des premières ailes est ordinairement moins grande que dans le mâle.

Il se trouve dans l'île de Java, comme le dit Stoll. Fabricius & Cramer ont cru à tort qu'il étoit de l'Amérique.

181. Polyommate Phædrus.

Polyommatus Phædrus.

Pol. alis integris, maris *supra fulvis, margine exteriori nigro ; fœminæ fuscis, disco albo : subtùs fericeo-albis, strigâ marginali è punctis minutis nigris.*

Papilio P. R. Phædrus, *alis integerrimis,*

fulvis, margine fusco : subtùs albis, immaculatis. Fab. *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 79. *n°.* 720. (Le mâle.)

Hesperia R. *Phœdrus.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 307. *n°.* 165.

Papilio P. R. Æsopus, *alis integerrimis, suprà fuscis, maculâ albâ : subtùs albis, immaculatis.* Fab. *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 79. *n°.* 719. (La femelle.)

Hesperia R. *Æsopus.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 307. *n°.* 164.

Papilio Æsopus. Herbst, *Pap. tab.* 325. *fig.* 3. 4.

Papilio Cinyra. Cram. *pl.* 238. *fig.* C. (Le mâle.)

Papilio Thetis. Cram. *pl.* 238. *fig.* D.

Papilio Thetys. Drury, *Inf. tom.* 2. *pl.* 9. *fig.* 3. 4.

Les papillons *Phœdrus* & *Æsopus* de Fabricius ne font qu'une feule eſpèce, dont le premier eſt le mâle & le ſecond la femelle.

Il a un pouce trois quarts d'envergure. Le deſſus du mâle eſt d'un fauve-ponceau, avec une bordure noire, partant de la côte des ailes ſupérieures & ſe rétréciſſant ſur le limbe terminal des inférieures.

Le deſſus de la femelle eſt d'un brun-noirâtre, avec le diſque & la frange des quatre ailes blancs.

Le deſſous de toutes les ailes eſt d'un blanc-ſatiné dans les deux ſexes, avec une ſérie de points noirs, très-menus, le long du bord poſtérieur. Ces points ſont quelquefois précédés d'une légère ligne noirâtre, tranſverſe & ondulée.

Le corps eſt brun chez le mâle & chez la femelle, avec les deux premiers articles des palpes blancs. Les antennes ſont brunes, avec le bout de la maſſue fauve.

Du Bengale, du Coromandel, &c.

182. Polyommate Térambus.

Polyommatus Terambus.

Pol. alis integris, ſuprà violaceo-cœruleis, limbo exteriori nigro : ſubtùs dilutè corticinis, ſtrigâ communi ferrugineâ ; poſticis ocello anali albo.

Il a un pouce & demi d'envergure, & il eſt d'un bleu-violet en deſſus, avec tout le contour extérieur des premières ailes & la côte des ſecondes largement noirs. Les premières ailes ſont en outre un peu ſablées de bleu vis-à-vis du ſommet.

Le deſſous des quatre ailes eſt d'un brun-tanné-clair, avec une ligne ferrugineuſe deſcendant du ſommet des ſupérieures au milieu du bord interne des inférieures. Ces dernières ailes offrent à l'angle de l'anus un œil blanc à prunelle noire.

Décrit d'après deux individus femelles, dont l'un appartenant au Muſéum de Paris, & l'autre à M. le capitaine de Villiers.

De Java.

183. Polyommate Pétavius.

Polyommatus Petavius.

Pol. alis integris, ſuprà nigris : anticis faſciâ obliquâ fulvâ : ſubtùs omnibus fulvis, nigro irrotatis, punctis ocellaribus diſci violaceo-cœruleſcentibus.

Papilio Petavius. Cram. *pl.* 365. *fig.* C. D.

Papilio Petavius. Herbst, *Pap. tab.* 326. *fig.* 5. 6.

Il a un peu plus d'un pouce d'envergure. Le deſſus des ailes eſt noir, avec une bande fauve, oblique, à l'extrémité des ſupérieures.

Le deſſous eſt d'un jaune-fauve, aſpergé de noir, avec le diſque lavé de rougeâtre, & marqué de quelques petites taches oculaires d'un bleu-lilas.

Décrit d'après un individu unique.

De Java & d'Amboine.

184. Polyommate Evandras.

Polyommatus Evandras.

Pol. alis integerrimis, atris, utrinquè faſciâ apicali fulvâ : ſubtùs maculâ diſci violaceo-cœruleſcente.

Papilio Evander. Cram. *pl.* 331. *fig.* F. G.

Papilio Evander. Herbst, *Pap. tab.* 322. *fig.* 5. 6.

Il a un peu plus d'un pouce d'envergure. Le deſſus des ailes eſt d'un noir-brun un peu chatoyant, avec une bande fauve, poſtérieure, courbe, atteignant la côte & le bord interne. La bande des ailes ſupérieures eſt plus large & légèrement finuée en arrière.

Le deſſous reſſemble au deſſus, mais on remarque une petite tache d'un blanc-bleuâtre au milieu de chaque aile.

Décrit d'après un individu ſans corps.

Il ſe trouve ſur la côte occidentale d'Afrique.

E. Ailes inférieures ſans queue extérieure & ſans prolongement anal (dentées parfois chez la femelle).

a. Deſſous des ailes avec plus ou moins de lignes tranſverſes, maculaires ou continues, & ſouvent accompagnées de points ocellés.

185. Polyommate Hubner.

Polyommatus Hubnerii.

Pol. alis integerrimis, suprà fuscis, violaceo mutabili micantibus : anticis maculâ disci luteâ : subtùs omnibus fericeo-albis, strigâ marginali è punctis nigris. (Mas.)

Il a de treize à quatorze lignes d'envergure. Le dessus des ailes est d'un brun-noirâtre, jetant un reflet violet qui change selon les aspects, avec une tache orbiculaire d'un jaune-fauve sur le milieu des supérieures.

Le dessous est d'un blanc-satiné, avec une série de petits points noirs le long du bord postérieur. Il y a en outre, tantôt deux, tantôt trois points semblables, sur le disque des ailes inférieures. La frange des quatre ailes est blanche de part & d'autre. Les antennes sont noires, avec des anneaux & le bout blancs.

Décrit d'après des individus mâles, & dédié à M. Hubner qui a donné l'iconographie la plus complète que nous ayons jusqu'ici sur les lépidoptères d'Europe, & qui publie actuellement une belle iconographie des papillons exotiques.

Il habite l'île de Timor?

186. Polyommate Duponchel.

Polyommatus Duponchelii.

Pol. alis integerrimis, suprà fuscis, omnium disco albo : subtus fericeo-albis, lineolâ centrali, strigis duabus undulatis punctisque marginalibus in simplici serie fuscis.

Il a un peu moins d'un pouce d'envergure. Le dessus des quatre ailes est d'un brun-noirâtre, avec le disque blanc.

Le dessous est d'un blanc-satiné, avec un trait central, puis deux lignes flexueuses & une série de points lunulés, d'un brun-noirâtre. Les ailes inférieures ont en outre deux points très-noirs, dont un vers le milieu de la côte, l'autre vers le milieu du bord interne. Les antennes sont noires, avec des annelets & le bout de la massue blancs.

Chez certains individus, qui paroissent être des femelles, le dessus des secondes ailes offre à l'extrémité un cordon de petits anneaux blancs.

Dédié à M. Duponchel père, très-bon observateur, qui rendra un grand service aux entomologistes en publiant son excellente monographie du genre *Erotyle*.

Il habite l'île de Timor?

187. Polyommate Duménil.

Polyommatus Dumenilii.

Pol. alis integris, suprà niveis, anticarum margine exteriori latè fusco : subtùs albidis, pone medium strigis duabus undulatis punctiformique fuscescentibus ; posticis maculâ marginali ingerrimâ. (Mas.)

Il est petit, d'un beau blanc en dessus, avec tout le contour extérieur des premières ailes largement brun, & le bord terminal des secondes longé par une ligne noire. Les premières ailes ont vers leur milieu une grande tache noire, orbiculaire & un peu enfoncée.

Le dessous des quatre ailes est d'un blanc-sale, principalement vers la base, & il offre au-delà du milieu deux lignes brunâtres transverses, dont l'antérieure légèrement ondulée & précédée d'un arc discoïdal de sa couleur; la postérieure en feston, & embrassant une série de points marginaux également brunâtres, à l'exception toutefois de l'antépénultième des secondes ailes, lequel est très-noir & beaucoup plus gros que les autres. Ces dernières ailes offrent encore un petit point noir près du milieu de la côte.

Décrit d'après un individu mâle que nous a communiqué M. P. Duménil, peintre d'histoire naturelle, avantageusement connu par les figures de l'*Histoire des lépidoptères de France*, de l'*Histoire des coléoptères d'Europe*, &c.

Des Antilles?

188. Polyommate Héraldus.

Polyommatus Heraldus.

Pol. alis integerrimis, cæruleis, limbo atro : subtùs albis, margine atro punctato. Fab.

Papilio P. R. *Heraldus.* Fab. *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 82. *n°.* 744.

Hesperia R. *Heraldus.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 317. *n°.* 201.

Il est de moyenne taille. Les antennes sont noires & annelées de blanc. Le dessus de toutes les ailes est d'un bleu-luisant, avec les bords d'un noir-brun, & l'origine de la côte des inférieures blanche.

Le dessous est blanc, & il offre vers le bord une rangée transverse de petites lunules noires, puis une rangée de lunules plus grandes surmontant chacune un gros point pareillement noir.

Des Indes orientales.

(*Traduction de Fabricius.*)

189. Polyommate Ladon.

Polyommatus Ladon.

Pol. alis suprà violacco-cærulescentibus (*anticarum* fœminæ *apice fusco*) : *subtùs canis, pone medium strigâ flexuosâ è maculis nigris, tunc lineâ angulatâ punctisque marginalibus fuscis.*

Papilio Ladon. Cram. *pl.* 270. *fig.* D. E.

Papilio Ladon. Herbst, *Pap. fig.* 10. 11. *pl.* 324.

Il a environ un pouce d'envergure. Le deſſus du mâle eſt d'un bleu-violet-pâle, avec la frange des ailes ſupérieures entrecoupée de brun.

Le deſſus de la femelle eſt du même bleu que chez le mâle, avec une bande brune aſſez large ſur le bord poſtérieur des premières ailes, & une ſérie de points bruns ſur le bord correſpondant des ſecondes. Les premières ailes offrent en outre un arc noir ſur leur milieu.

Le deſſous des deux ſexes eſt d'un gris-bleuâtre, avec une ſérie tranſverſe & flexueuſe de taches noires derrière le milieu, puis une ligne brune en feſton, dans chacun des creux de laquelle il y a un point brun marginal. La ſérie de taches eſt précédée à chaque aile d'un croiſſant obſcur, & l'on voit à la baſe des ailes inférieures trois points oculaires très-noirs & des atomes bleus.

Du Cap de Bonne-Eſpérance.

190. Polyommate Argiolus.

Polyommatus Argiolus.

Pol. alis integerrimis, ſuprà violaceo-cæruleſcentibus (*anticarum* fœminæ *apice fuſco*): *ſubtùs lacteo-canis, punctis ſimplicibus nigris.*

Papilio P. R. Argiolus, *alis ecaudatis, ſuprà cæruleis, margine nigris: ſubtùs cæruleſcentibus, punctis nigris diſperſis.* Linn. *Syſt. Nat.* 2. *p.* 790. *n°.* 234. — *Faun. Suec. edit.* 2. *p.* 284. *n°.* 1076.

Papilio P. R. Acis, *alis integris, cæruleis: ſubtùs lætè canis, punctis oblongis nigris ſimplicibus.* Fab. *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 73. *n°.* 687.

Heſperia R. *Acis.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 295. *n°.* 124.

Papilio Argiolus. De Geer, *Mem. Inſ. part.* 1. *tab.* 4. *fig.* 9-15.

Papilio Argiolus. Scop. *Ent. Carn. pag.* 177.

Papilio Argiolus. Wien. *Verz. p.* 184. *fam.* N. *n°.* 8.

Papilio Argiolus. Naturf. 6. *p.* 7. *n°.* 30.

Papilio Argiolus. Rossi, *Faun. Etr. tom.* 2. *p.* 156. *n°.* 1036.

Papilio Argiolus. Brahm. *Inſ. Kalend. p.* 327. *n°.* 213.

Papilio Argiolus. Schwarz, *Raupenkal. p.* 178. 344. 492.

Papilio Argiolus. Herbst, *tab.* 310. *fig.* 4-6.

Papilio Argiolus. Lang. *Verz.* 2. *p.* 57. 490-494.

Papilio Argiolus. Borkh. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 173 & 282. *n°.* 8. — *part.* 2. *p.* 234.

Papilio Argiolus. Borkh. *Rhein. Magaz. tom.* 1. *p.* 285. *n°.* 91.

Papilio Argiolus. Hufnag. *Tabell. im. Berl. Mag. tom.* 2. *p.* 72. *n°.* 30.

Papilio Argiolus. Illig. *N. Aufg. Deſſ. tom.* 2. *p.* 266. *n°.* 8.

Papilio Argiolus. Oschen. *Pap. Eur. tom.* 1.

Papilio Cleobis. Esp. *Pap. Eur. part.* 1. *tab.* 40. *Suppl.* 16. *fig.* 3. — *tab.* 54. *cont.* 4. *fig.* 4. a. b.

Papilio Cleobis. Devill. *Ent. Linn. tom.* 2. *p.* 76. *n°.* 142.

Papilio Cleobis. Sulz. *Inſ. tab.* 18. *fig.* 13. 14.

Papilio Cleobis. Fuessl. *Alt. Magaz. tom.* 1. *part.* 2. *p.* 209.

Papilio Cleobis. Schneid. *Syſt. Beſchr. p.* 268. *n°.* 167.

Papilio Argiolus. Bergstr. *Nomenkl. tab.* 45. *fig.* 5-8.

Papilio Argiolus, var. Bergstr. *Nomenkl. tab.* 54. *fig.* 5. 6. (La femelle.)

Papilio Therſanon. Bergstr. *Nomenkl. tab.* 49. *fig.* 5. 6.

Papilio Argyphontes. Bergstr. *Nomenkl. tab.* 58. *fig.* 5. 6.

Papilio Argalus. Bergstr. *Nomenkl. tab.* 60. *fig.* 4. 5.

Papilio Acis. Roem. *Gen. Inſ. tab.* 18. *fig.* 13. 14.

Papilio Acis. Petagna, *Inſtit. Ent. tom.* 1. *p.* 485. *n°.* 110.

Papilio Acis. Hubn. *Pap. tab.* 57. *fig.* 272-274.

Argus bleu à bandes brunes. Engram. *Pap. d'Europe, tom.* 1. *pag.* 178. *pl.* 41. *fig.* 86. l. m. — *pl.* 58. *fig.* 80. 1.

Polyommate Acis. Lata. *nouv. Diction. d'Hiſt. nat.* 2e. *édit. tom.* 27. *p.* 500.

Polyommate Argiolus. God. *Hiſt. nat. des lépid. de France, tom.* 1. *pag.* 225. *pl* 11 *ſecund. fig.* 8. & *pl.* 11 *quart. fig.* 5.

Polyommate Argiolus. God. *Tabl. méthod. des lépid. de France*, Diurnes, *p.* 59. *n°.* 172.

Ce polyommate eſt le véritable *Argiolus* de Linné. Il a près de quinze lignes d'envergure. Le deſſus du mâle eſt d'un bleu-violet tendre, ſans taches. Le deſſus de la femelle eſt d'un bleu un peu plus pâle, avec une large bordure d'un brun-noirâtre aux premières ailes, & une ſérie de points

de cette couleur à l'extrémité des fecondes. La frange des premières ailes eſt entrecoupée de brun dans les deux ſexes.

Le deſſous des quatre ailes eſt conſtamment d'un blanc-bleuâtre, avec un arc central, & une ligne tranſverſe de ſimples points, noirs. Il y a encore d'autres points ſemblables à la baſe & à l'extrémité des fecondes ailes.

La chenille, d'après M. Ochſenheimer, eſt pubeſcente, d'un vert-jaunâtre, avec le dos plus foncé, la tête & les pattes noires. Elle vit ſur le *nerprun-bourdainier*.

La chryſalide eſt liſſe, verdâtre antérieurement, brunâtre poſtérieurement, avec une ligne dorſale noire.

Il habite l'Europe, & il paroît en mai & à la fin de juillet. On le trouve par-ci par-là dans les bois & dans les jardins, voltigeant toujours autour des arbres & des buiſſons.

191. Polyommate Dion.

Polyommatus Dion.

Pol. alis ſuprà cæruleſcenti-violaceis : ſubtùs albis, punctis ſimplicibus lineoliſque fuſcis ; poſticis ocellis duobus anguli ani pupillâ cæruleâ. (Mas.)

Il a un peu plus d'un pouce d'envergure. Le deſſus des ailes eſt d'un violet-bleuâtre, avec une légère bordure brune & une frange blanche.

Le deſſous eſt blanc, avec de ſimples points & quelques traits tranſverſaux d'un brun-noirâtre. L'angle interne des fecondes ailes offre en outre deux yeux noirs à prunelle bleue. L'œil extérieur eſt bordé en avant par une lunule fauve.

Nous ne connoiſſons point la femelle, & nous n'avons vu qu'un mâle en mauvais état.

De l'Auſtralaſie.

192. Polyommate Caſſius.

Polyommatus Caſſius.

Pol. alis ſuprà maris *violaceo-cæruleſcentibus,* fœminæ *albis anticarum limbo exteriori fuſco : ſubtùs albis nigro maculatis faſciatiſque ; poſticis ocellis duobus anguli ani argenteis.*

Papilio P. R. Caſſius, *alis integerrimis, ſuprà albis : anticis limbo fuſco ; poſticis fimbriâ punctatâ.* Fab. *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 82. *n°.* 745. (La femelle.)

Heſperia R. *Caſſius.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 316. *n°.* 197. (La femelle.)

Papilio Caſſius. Cram. *pl.* 23. *fig.* C. D. (La femelle.)

Papilio Caſſius. Herbst, *Pap. tab.* 320. *fig.* 6. 7. (La femelle.)

Il eſt petit. Le deſſus du mâle eſt d'un bleu-violet-pâle, avec la région du bord interne des fecondes ailes plus ou moins blanche.

Le deſſus de la femelle eſt blanc, avec la baſe des quatre ailes bleuâtre & tout le pourtour extérieur des ſupérieures d'un brun-noirâtre-chatoyant. Ces ailes ont en outre quelques petites taches brunes ſur le diſque, & les ailes inférieures ſont bordées par une ſérie de points noirs, renfermée entre deux lignes flexueuſes également noires.

Le deſſous des deux ſexes eſt blanc, avec une multitude de taches & de petites bandes tranſverſes noires, à la ſuite deſquelles viennent une ligne en feſton, & une rangée de points marginaux de cette couleur. Les deux points de l'angle anal des fecondes ailes ſont plus noirs que les ſuivans & couverts d'atomes argentés. Les premières ailes ont à la baſe un trait longitudinal.

De Surinam & du Bréſil.

Nota. Les auteurs n'ont connu que la femelle.

193. Polyommate Clyton.

Polyommatus Clyton.

Pol. alis integerrimis, ſuprà albo nigroque variis, baſi cæruleo micante : ſubtùs albis, maculis numeroſiſſimis ; poſticis ocellis anguli ani nullis.

Papilio Clyton. Cram. *pl.* 67. *fig.* F. G.

Il a de très-grands rapports avec le *Roſimon*, n°. 141 ; mais il eſt ſans queue, & ſes ailes n'ont point d'yeux en deſſous.

Des Indes orientales.

194. Polyommate Iſarchus.

Polyommatus Iſarchus.

Pol. alis ſuprà violaceo-cæruleſcentibus, diſco anticarum maculâ, poſticarum faſciâ albis : ſubtùs albis ; poſticis faſciis duabus repandis nigris ocelliſque duobus anguli ani argentatis. (Mas.)

Heſperia R. Iſarchus, *alis integerrimis, cæruleis : poſticis faſciâ albâ : ſubtus albo nigroque variis.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 316. *n°.* 198.

Papilio Iſarchus. Jon. *Fig. pict.* 6. *tab.* 34. *fig.* 1.

Papilio Iſarchus. Herbst, *Pap. tab.* 320. *fig.* 8. 9.

Papilio Camillus. Cram. *pl.* 300. *fig.* A. B.

Papilio Iſis. Drury, *Inſ. tom.* 2. *pl.* 3. *fig.* 4. 5.

Il a environ quinze lignes d'envergure. Le deſſus des ailes eſt d'un bleu-violet-pâle, avec une tache blanche ſur le diſque des ſupérieures, & une

bande transverse de cette couleur sur le disque des inférieures.

Le dessous des premières ailes est blanc, avec la côte, deux litures discoïdales, deux bandes postérieures sinuées, & des points marginaux, noirs. La liture antérieure est longitudinale, tandis que l'autre est disposée dans le même sens que les bandes.

Le dessous des secondes ailes est blanc, avec deux bandes noires transverses, dont l'antérieure basilaire & presqu'en forme de palme; la postérieure sinuée & suivie d'une série marginale de points noirs. Les deux points qui avoisinent l'angle de l'anus ont un iris d'un bleu-argenté.

Nous n'avons pas vu la femelle.

De Timor. Cramer le dit de Sierra-Leone, & Fabricius de l'Amérique.

195. Polyommate Lagus.

Polyommatus Lagus.

Pol. alis integris, suprà violaceis, nitidis, apice nigro: subtùs cinereis, nigro venosis. (Mas.)

Hesperia R. Lagus, *alis integerrimis, cæruleis: anticis maculâ geminâ albâ: subtùs cinereis nigro lineatis.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 306. *n°.* 159.

Papilio Lagus. Cram. *pl.* 117. *fig.* F. G.

Papilio Lagus. Herbst, *Pap. tab.* 320. *fig.* 1. 2.

Il a environ un pouce & demi d'envergure. Le dessus des ailes est d'un violet-luisant, avec le sommet noir. Dans l'individu mâle que nous décrivons, les ailes supérieures ont vers le milieu du bord terminal une double tache d'un blanc-argentin, oblongue & un peu transparente.

Le dessous est cendré, avec des lignes longitudinales, & une raie transverse, noires.

Nous n'avons pas vu la femelle.

De Surinam.

196. Polyommate Erinus.

Polyommatus Erinus.

Pol. alis integerrimis, suprà fuscis, nitidis: subtùs cinereis; anticis angulo postico maculis duabus nigris, posticis basi punctis ocellaribus obsoletis.

Hesperia R. Erinus, *alis integerrimis, fuscis: subtùs cinereis; anticis angulo postico puncto gemino nigro.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 302. *n°.* 145.

Papilio P. R. *Erinus.* Fab. *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 77. *n°.* 704.

Papilio Erinus. Donow. *Gen. Illust. of Entom. part.* 1. *an Epit. of the Insects of New Holl. pl.* 31. *fig.* 5. 6.

Il a de douze à quinze lignes d'envergure. Le dessus des ailes est d'un brun-noirâtre-chatoyant, & sans taches.

Le dessous est cendré, avec deux taches noires arrondies à l'angle interne des ailes supérieures, & des points oculaires brunâtres peu prononcés vers la base des inférieures. Les deux taches des premières ailes sont précédées d'une ligne obscure, transverse & interrompue, & l'on remarque avant le bord postérieur des secondes, du moins quelquefois, une série de points noirs très-petits.

De la Nouvelle-Hollande, environs de port Jackson.

197. Polyommate Labradus.

Polyommatus Labradus.

Pol. alis integerrimis, suprà violaceo-cæruleſcentibus: subtùs cinereis; posticis annulis numerosis albis basique cæruleſcente. (Mas.)

Il n'a guère que dix lignes d'envergure. Le dessus des ailes est d'un bleu-violet-pâle, avec le bord postérieur liseré de brun & cilié de blanc.

Le dessous est cendré, avec des anneaux blancs à l'extrémité des ailes supérieures & sur toute la surface des inférieures. Ces dernières ailes ont la base bleuâtre, mais du reste l'on n'y voit pas d'autres taches que les anneaux blancs dont nous venons de parler.

Décrit d'après un individu mâle qui n'étoit pas de la première fraîcheur.

De la Nouvelle-Hollande, environs de port Jackson.

198. Polyommate Damoetès.

Polyommatus Damoetes.

Pol. alis integerrimis, fuscis: subtùs cinereo undatis; posticis ocello gemino aurato. Fab.

Hesperia R. *Damoetes.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 303. *n°.* 148.

Papilio P. R. *Damoetes.* Fab. *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 77. *n°.* 707.

Papilio Damoetes. Donow. *Gen. Illust. of Entom. part.* 1. *an Epit. of the Insects of New Holl. pl.* 31 *fig.* 3. 4.

Il est petit. Le dessus des quatre ailes est d'un brun-noirâtre, sans taches.

Le dessous est gris, avec des ondes cendrées, & il offre vers l'angle anal des secondes ailes deux yeux noirs dont l'iris est jaune en avant, doré en arrière. L'œil intérieur est moins grand que l'extérieur.

De la Nouvelle-Hollande.

(*Traduction de Fabricius.*)

199. Polyommate

199. Polyommate Damæus.

Polyommatus Damœus.

Pol. alis integerrimis, suprà fuscis, nitidis : subtùs grisescentibus, annulis numerosis fuscis albo cinctis; posticis ocellis duobus anguli ani iride fulvâ. (Fem.)

Il est petit. Le dessus des ailes est d'un brun-noirâtre-chatoyant, sans taches aux supérieures, avec une série de petits traits bleus le long du bord terminal des inférieures.

Le dessous des quatre ailes est grisâtre, avec une multitude d'anneaux bruns cerclés de blanc. Les deux anneaux qui avoisinent l'angle anal des secondes ailes renferment chacun un œil noir à iris fauve, mais l'œil intérieur est plus petit que l'extérieur.

Nous n'avons vu que des femelles.

De Timor.

200. Polyommate Catilina.

Polyommatus Catilina.

Pol. alis integerrimis, fuscis, cæruleo nitentibus : subtùs albo fasciatis ocellisque duobus cæruleis anguli ani. Fab.

Hesperia R. *Catilina.* Fab. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 304. n°. 150.*

Papilio Archias. Cram. *pl. 181. fig. C?*

Il est petit. Les antennes sont noires, avec des anneaux & le bout de la massue blancs. Le corps est bleuâtre. Le dessus des quatre ailes est d'un brun-noirâtre à reflet bleu.

Le dessous est plus pâle que le dessus, avec plusieurs bandes blanches. L'angle interne des secondes ailes offre deux yeux, moitié bleus, moitié noirs.

Des îles de l'Amérique méridionale.

(*Traduction de Fabricius.*)

Nota. Si ce polyommate n'est pas l'*Archias* de Cramer, il paroît du moins en être très-voisin. L'Archias a l'antépénultième bande du dessous des secondes ailes bifide & beaucoup plus large que les autres. Il se trouve à Surinam.

201. Polyommate Céraunus.

Polyommatus Ceraunus.

Pol. alis integerrimis, fuscis, cæruleo micantibus : subtùs cinereis; posticis basi punctis ocellaribus atris apice ocello punctoque. Fab.

Hesperia R. *Ceraunus.* Fab. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 305. n°. 149.*

Fabricius le décrit ainsi : il est plus petit que le *Parsimon* (n°. 209), & il en diffère tout-à-fait. Le dessus des ailes est d'un brun-noirâtre à reflet bleu, avec des points noirs marginaux aux inférieures.

Le dessous est cendré, avec des ondes blanches à l'extrémité de toutes les ailes. Les ailes inférieures offrent en outre à la base des points noirs oculaires, & vers l'angle de l'anus deux autres points noirs, dont l'extérieur à iris fauve, l'intérieur se liant à une ligne marginale également noire.

Des îles de l'Amérique méridionale.

202. Polyommate Minéréus.

Polyommatus Minereus.

Pol. alis integerrimis, fuscis : posticis subtùs punctis ocellaribus rubris ocelloque anguli ani. Fab.

Hesperia R. *Minereus.* Fab. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 304. n°. 151.*

Papilio P. R. *Minereus.* Fab. *Mant. Inf. tom. 2. p. 77. n°. 708.*

Il est petit. Les antennes sont brunes, annelées de blanc, avec la sommité de la massue rousse. Le dessus des quatre ailes est d'un brun-noirâtre, avec des taches oculaires noires sur le bord terminal des inférieures.

Le dessous est cendré, avec des taches à l'extrémité des ailes supérieures, & plusieurs points rouges à iris blanc sur les inférieures. Ces dernières ailes ont vers l'angle de l'anus un œil noir cerclé de fauve.

De l'Amérique méridionale.

(*Traduction de Fabricius.*)

Nota. Si ce polyommate avoit des queues, il se placeroit entre l'*Echion* & le *Columelle*, n°s. 73 & 74.

203. Polyommate Bazoche.

Polyommatus Bazochii.

Pol. alis integerrimis, fuscis, posticarum suprà disco cæruleo : subtùs anticis fasciâ apicis securiformi albidâ, posticis marmoratis. (Mas.)

Nous ne connoissons ce polyommate bréfilien que par des individus mâles. Il a approchant un pouce d'envergure. Le dessus des ailes supérieures est d'un brun-noirâtre, avec une tache orbiculaire plus foncée vers le milieu de la surface. Le dessus des ailes inférieures est brun, avec la région du bord interne d'un bleu-violet & marquée de deux à trois points noirs près de l'angle de l'anus.

Le dessous des premières ailes est presque de la couleur du dessus, avec une bande terminale blanche, représentant à peu près une hachette. Le dessous des secondes ailes est blanchâtre, avec deux taches brunes, dont l'antérieure arrondie & placée sur le milieu de la côte, la postérieure beaucoup plus grande, avoisinant le sommet & se liant

par son côté interne à deux bandes moniliformes jaunâtres qui aboutissent au bord abdominal. La frange du bord postérieur de ces ailes est blanche de part & d'autre, tandis que celle du bord correspondant des premières ailes est brune comme le fond.

Dédié à M. de Bazoche, de Falaise, savant philologue & habile naturaliste.

204. Polyommate Ubaldus.

Polyommatus Ubaldus.

Pol. alis suprà maris *violaceo-cœruleis*, fœminæ *fuscis : subtùs cinereis ; posticis basi punctis tribus ocellaribus nigris, tunc annulis maculisque quadratis albis, ocello anguli ani aurato.*

Papilio Ubaldus. Cram. *pl.* 390. *fig.* L. M.

Papilio Ubaldus. Herbst, *Pap. tab.* 312. *fig.* 3. 4.

Il n'a guère que dix lignes d'envergure. Le dessus du mâle est d'un bleu-violet, avec le limbe postérieur brun.

Le dessus de la femelle est brun, & saupoudré de bleu vers la base. Chez l'un & l'autre sexe, la frange est blanche.

Le dessous est cendré, avec des anneaux blancs, dont l'antérieur solitaire, vers l'extrémité des premières ailes. Les secondes ailes ont vers la base trois points noirs ocellés, dont le postérieur occupant le milieu de la côte. Viennent ensuite dix à douze anneaux blancs, parmi lesquels il y a une série de taches blanches quadrangulaires, & un grand œil marginal noir, entouré d'un iris fauve & fablé de vert-doré inférieurement.

Du Coromandel, selon Cramer.

Nota. Dans le texte de Cramer, ce polyommate porte le nom d'*Ubaldus*, & dans la table celui d'*Artémidas*, mais nous avons adopté de préférence la première de ces deux dénominations.

205. Polyommate Meſſapus.

Polyommatus Meſſapus.

Pol. alis suprà violaceis, limbo fusco : subtùs cinereis, à medio ad apicem annulis disjunctis albis ; posticis punctis duobus costalibus nigris ocelloque anali lunulæ rufæ subjecto. (Mas.)

Il n'a guère que dix lignes d'envergure. Le dessus des ailes est violet, avec le limbe postérieur des quatre brun, & la région anale des inférieures marquée d'un point noir bordé de fauve en avant.

Le dessous est cendré, & il offre, à partir du milieu jusqu'au bout, des anneaux blancs, dont l'antérieur solitaire, les autres disposés sur trois rangs, & séparés les uns des autres. Outre cela, les secondes ailes ont trois points noirs, cerclés de blanc : il y en a deux sur la côte, l'autre n'est que la répétition de celui qu'on voit en dessus près de l'angle de l'anus.

Nous n'avons vu que le mâle.

Du Cap de Bonne-Espérance, par M. J. Verreaux.

206. Polyommate Pirithoüs.

Polyommatus Pirithous.

Pol. alis suprà cœruleo-violaceis (fœminæ *limbo latè fusco*) : *subtùs fuscis, à basi ad apicem catenulis albis ; posticis fasciâ continuâ repandâ ocelliſque duobus anguli ani violaceis.*

Papilio P. R. Pirithous, *alis ecaudatis, cœruleſcentibus : subtùs undiquè fusco maculatis ; ocellis posticis duobus.* Linn. *Syſt. Nat.* 2. *p.* 790. *n°.* 235.

Il n'a guère que dix lignes d'envergure. Le dessus des ailes est d'un violet-bleuâtre-luisant, sans taches dans le mâle, avec une large bordure brune dans la femelle.

Le dessous des deux sexes est d'un brun-obscur, avec des chaînettes blanches depuis la base jusqu'à l'extrémité. Avant la chaînette du bord postérieur, les secondes ailes ont une bande blanche, transverse, flexueuse, continue, & leur angle anal offre, très-près l'un de l'autre, deux grands yeux noirs fablés de violet & entourés d'un iris fauve.

De la Barbarie, par M. le professeur Desfontaines.

207. Polyommate Theſpis.

Polyommatus Theſpis.

Pol. alis suprà violaceo-cœruleis, limbo fusco fimbriâque variegatâ : subtùs fuscis, albo teſſelatis ; posticis punctis duobus anguli ani aureis.

Papilio P. R. Teſpis, *alis ecaudatis cœruleis : subtùs undiquè albo maculatis :* Linn. *Syſt. Nat.* 2. *p.* 791. *n°.* 236. — *Muſ. Lud. Ulr. p.* 318. *n°.* 136.

Il a environ un pouce d'envergure. Le dessus du mâle est d'un bleu-violet, avec la frange du bord postérieur entrecoupée de brun & de blanc.

Le dessus de la femelle est d'un bleu-violet vers la base, brun & ponctué de blanc vers l'extrémité, avec la frange comme dans le mâle.

Le dessous des deux sexes est brun, avec une multitude de taches blanches, quadrangulaires, & disposées en échiquier. Outre cela, les secondes ailes ont près de l'angle de l'anus deux petits points d'un vert-doré.

Du Cap de Bonne-Espérance.

Nota. Linné n'a connu que le mâle.

208. Polyommate Ochsenheimer.

Polyommatus Ochsenheimerii.

Pol. alis suprà violaceo-cæruleis, limbo fusco : subtùs anticis disco fulvo reticulatoque ; posticis fuscis, annulis griseis, tunc fasciâ flexuosâ niveâ ocellisque tribus aurutis.

Il a un peu plus d'un pouce d'envergure. Le dessus des quatre ailes est d'un bleu-violet, avec le bord postérieur brun & entrecoupé de blanc à la frange.

Le dessous des premières ailes est fauve, avec le pourtour extérieur obscur, quelques anneaux d'un jaune-pâle sur le disque, une ligne tortueuse blanche vis-à-vis du sommet, & une série de points noirâtres le long du bord terminal.

Le dessous des secondes ailes est d'un brun-fâle, avec des anneaux gris vers la base, une bande flexueuse très-blanche au-delà du milieu, & une rangée de cinq points noirs à l'extrémité. Les trois points qui avoisinent l'angle de l'anus sont fablés de vert-doré.

Nous avons vu trois individus, dont deux ayant la bordure brune du dessus un peu plus large ; mais il nous est impossible de dire s'ils diffèrent du troisième par le sexe, attendu qu'ils paroissent tous avoir un corps rapporté.

Dédié à M. Ochsenheimer, entomologiste viennois qui a publié sur les lépidoptères d'Europe un ouvrage justement estimé.

Des Antilles ?

209. Polyommate Parsimon.

Polyommatus Parsimon.

Pol. alis integris, suprà fuscis : subtùs cinereis, annulo centrali, strigâ geminâ arcuatâ lunulisque marginalibus in duplici serie albis ; posticis basi punctis ocellaribus nigris, angulo ani ocello argenteo.

Hesperia R. Parsimon, *alis integris, fuscis : subtùs cinereis, albo undatis ; posticis basi punctis ocellaribus nigris apiceque ocello.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 303. *n°.* 147.

Papilio P. R. *Parsimon.* Fab. *Mant. Ins. tom.* 2. *p.* 77. *n°.* 706.

Papilio Celæus. Cram. *pl.* 379. *fig.* K. K.

Fabricius n'a pas reconnu cette espèce dans Cramer.

Elle a environ dix-huit lignes d'envergure. Le dessus des ailes est d'un brun-obscur, avec la tranche du bord postérieur noire & ciliée de blanc.

Le dessous est cendré, avec un anneau central, une double ligne arquée, puis une double série de chevrons marginaux, blancs. Les ailes inférieures ont en outre à la base quatre ou cinq points noirs cerclés de blanc, & à l'angle de l'anus une lunule fauve surmontant un œil noir à prunelle d'un bleu-argenté.

La femelle a le dessous comme le mâle, mais elle s'en distingue en dessus par une tache noire au milieu des ailes supérieures, & par une lunule fauve accompagnée d'anneaux blanchâtres à l'extrémité des inférieures.

De la côte de Guinée.

Nota. Si ce lépidoptère avoit une queue, il se placeroit à côté du polyommate *Asteris* n°. 137.

210. Polyommate Ciffus.

Polyommatus Ciffus.

Pol. alis suprà cæruleo-violaceis, limbo fusco : subtùs cinerascentibus, nigro ocellatis ; posticis ad angulum ani fasciâ abbreviatâ fulvâ ocello aurato.

Ce polyommate paroîtroit devoir aller à côté du *Cnéjus* (n°. 135) ; mais comme les deux individus que nous avons vus n'ont aucun vestige de queue, nous le placons ici conditionnellement.

Il a environ quinze lignes d'envergure. Le dessus des ailes est d'un violet-bleuâtre, avec le pourtour extérieur des quatre brun, & l'angle anal des inférieures chargé de quatre taches fauves, dont une plus grande & s'appuyant sur un point noir.

Le dessous est d'un cendré-pâle, avec des points noirs ocellés, dont quelques-uns basilaires, les autres disposés au-delà du milieu en une ligne courbe & transverse, derrière laquelle sont deux séries marginales de lunules blanchâtres. La série extérieure est masquée vers l'angle de l'anus par une petite bande fauve, sinuée, & marquée en dehors d'un gros point noir sur lequel sont des atomes dorés, atomes qui, chez le mâle, longent presque tout le côté externe de cette bande.

La femelle a le dessus plus pâle & un peu plus largement bordé de brun.

Du Cap de Bonne-Espérance, par M. Jules Verreaux.

211. Polyommate Evippus.

Polyommatus Evippus.

Pol. alis suprà fuscis, basi violaceo micantibus : subtùs fericeo-griseis, strigâ marginali è maculis trigonis fulvis, intùs puncto ocellari nigro, extùs lineolâ cæruleâ fœtis.

Papilio P. R. Roboris, *alis caudatis* (*ecaudatis*), *nigro cæruleis : subtùs cinereis, serie marginali maculorum ocelliformium, introrsùm albo, extrorsùm fulvo inductis.* Esp. *Pap. Eur. tab.* 103. *cont.* 58. *fig.* 5.

Papilio Roboris. Oschen. *Pap. Eur. tom.* 1.

Papilio Evippus. Hubn. *Pap. tab.* 73. *fig.* 366. 367.

Polyommate Evippus. Latr. *nouv. Dict. d'Hist. nat.* 2e *édit. tom.* 27. *pag.* 486.

Polyommate Evippus. God. *Hist. nat. des lépid. de France, tom.* 2. *pag.* 170. *pl.* V. XXII. *fig.* 1. 2.

Polyommate Evippus. God. *Tabl. méth. des lépid. de France,* Diurnes, *pag.* 49. *n°.* 136.

Il a environ un pouce & demi d'envergure. Le mâle a le deſſus des ailes d'un brun-noirâtre, avec plus de la moitié antérieure des premières & la baſe des ſecondes glacées de violet-obſcur. Les ſecondes ailes ont vers l'angle de l'anus une rangée de trois points d'un bleu-violet-luiſant.

Le deſſus de la femelle eſt comme dans le mâle, mais le violet de ſes ailes ſupérieures eſt plus vif & moins prolongé ſur le diſque, & ſes ailes inférieures offrent ſix points bleus marginaux au lieu de trois.

Le deſſous des deux ſexes eſt d'un gris-ſatiné, avec une ſérie marginale de taches fauves triangulaires, chargées chacune en dehors d'un trait bleu, & en dedans d'un point noir qui eſt immédiatement ſurmonté d'un chevron blanc. Ces taches ſont preſque toujours plus prononcées aux ſecondes ailes qu'aux premières.

En Eſpagne, en Portugal, dans les départemens les plus méridionaux de la France. Il ſe repoſe ſur les buiſſons.

---

§. Deſſous des ailes avec des points ocellés, & ayant vers l'extrémité une bande tranſverſe blanche ou blanchâtre, ſuivie de taches marginales ou d'une bande fauves.

212. Polyommate Argus.

Polyommatus Argus.

Pol. alis integris, ſuprà violaceo-cæruleis, margine lato fuſco fimbriâ albâ : ſubtùs caneſcenti-cinereis, nigro ocellatis; poſticis fàſciâ ſinuatâ fulvâ punctis argenteis notatâ. (Major.)

Papilio P. R. Argus, *alis ecaudatis, cæruleis: poſticis ſubtùs limbo ferrugineo ocellis cæruleo-argenteis.* Linn. *Syſt. Nat.* 2. *p.* 789. *n°.* 232. — *Faun. Suec. edit.* 2. *p.* 284. *n°.* 1075. (Mas.)

Papilio Idas. Linn. *Faun. Suec. edit.* 2. *p.* 284. *n°.* 1075. (Fœm.)

Papilio P. R. Argus, *alis integris : poſticis ſubtùs limbo ferrugineo ocelliſque cæruleo-argenteis.* Fab. *Spec. Inſ. tom.* 2. *p.* 123. — *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 74. *n°.* 690. (Le mâle.)

Heſperia R. *Argus.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 296. *n°.* 128. (Le mâle.)

Heſperia R. Amphion, *alis integerrimis, cæruleis, nigro marginatis : ſubtùs cinereis, nigro ocellatis; poſticis lunulis rubris puncto nigro aureo notatis.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 301. *n°.* 139. (Le mâle.)

Papilio P. R. Acreon, *alis integerrimis, fuſcis : ſubtùs nigro ocellatis; poſticis faſciâ albâ, rubrâ ſtrigâque punctorum aureorum.* Fab. *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 76. *n°.* 699. (La femelle.)

Heſperia R. *Acreon.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 301. *n°.* 139. (La femelle.)

Papilio Argus. Wien. *Verz. p.* 184. *fam.* N. *n°.* 14.

Schæff. *Icon. tab.* 29. *fig.* 3. 4. — *tab.* 255. *fig.* 4. 5.

Papilio Argus. Rossi, *Faun. Etr. tom.* 2. *p.* 156. *n°.* 1035.

Papilio Argus. Petag. *Inſtit. Ent. tom.* 1. *p.* 485. *n°.* 122.

Papilio Argus. Herbst, *tab.* 315. *fig.* 1—3.

Papilio Argus. Esp. *Pap. Eur. part.* 1. *tab.* 20. *fig.* 3. 4. (Le mâle.)

Papilio Leodorus. Esp. *Pap. Eur. part.* 1. *tab.* 80. *cont.* 30 *fig.* 1. 2. (La femelle.)

Papilio Argus. Devill. *Ent. Linn. tom.* 2. *p.* 66. *n°.* 120.

Papilio Ledorus. Devill. *Ent. Linn. tom.* 2. *p.* 78. *n°.* 154.

Papilio Argus. Illig. N. *Auſg. Deſſ. tom.* 2. *p.* 272. *n°.* 14.

Papilio Argus. Hubn. *Pap. tab.* 64. *fig.* 316-318.

Papilio Argus. Oschen. *Pap. Eur. tom.* 1.

Papilio Argus. Scriba, *Beytr. tab.* 15. *fig.* 6. 7. (La chenille & la chryſalide.)

Papilio Argus. Borkh. *Rhein. Magaz. tom.* 1. *p.* 288. *n°.* 96.

Papilio Argus. Borkh. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 152 & 274. *n°.* 1. — *part.* 2. *p.* 224.

Papilio Aryrognomon. Borkh. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 152. *n°.* 2.

Papilio Leodorus. Borkh. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 156. *n°.* 5.

Papilio Argus. Schneid. *Syſt. Beſchr. p.* 255. *n°.* 153.

Papilio Leodorus. Schneid. *Syſt. Beſchr. p.* 253. *n°.* 155.

Papilio Leodorus. Lang. *Verz.* 2. *pag.* 154. *n°.* 448-451.

Papilio Alſus. Lang. *Verz. 2. p.* 155. *n°.* 462-465.

Papilio Leodorus. Schwarz, *Raupenkal. pag.* 191 & 350.

Papilio Argus. Bergstr. *Nomenkl. tab.* 52. *fig.* 1-4.

Papilio Argyrognomon. Bergstr. *Nomenkl. tab.* 46. *fig.* 1. 2. — *tab.* 51. *fig.* 7. 8.

Papilio Argyrocapelus. Bergstr. *Nomenkl. tab.* 46. *fig.* 3. 4.

Papilio Argyroela. Bergstr. *Nomenkl. tab.* 46. *fig.* 5. 6.

Papilio Argyrocopus. Bergstr. *Nomenkl. tab.* 46. *fig.* 7. 8.

Papilio Argyrophylax. Bergstr. *Nomenkl. tab.* 56. *fig.* 3. 4.

Papilio Argyrobius. Bergstr. *Nomenkl. tab.* 58. *fig.* 7. 8.

Bergstr. *Nomenkl. tab.* 121. *fig.* 1-3.

Polyommate Argus. Latr. *nouv. Dict. d'Hiſt. nat.* 2e. *édit. tom.* 27. *p.* 497.

Polyommate Argus. God. *Hiſt. nat. des lépid. de France, tom.* 1. *p.* 215. *pl.* 11. *fig.* 1. *& pl.* 11. *tert. fig.* 4.

Polyommate Argus. God. *Tabl. méthod. des lépid. de France,* Diurnes, *p.* 56. *n°.* 161.

Fabricius a donné le mâle de ce polyommate ſous les noms d'*Argus* & d'*Amphion*, & la femelle ſous celui d'*Acreon*.

Il a de treize à quatorze lignes d'envergure. Le deſſus du mâle eſt d'un bleu-violet, avec une bordure brune, aſſez large & garnie d'une frange blanche. La tranche de la côte eſt en outre blanchâtre.

Le deſſus de la femelle eſt d'un brun-noirâtre, fablé de bleu juſque vers l'extrémité, avec une ſérie marginale d'yeux fauves à prunelle noire, & la frange blanchâtre.

Le deſſous des quatre ailes eſt d'un cendré-clair chez le mâle, d'un cendré un peu brunâtre chez la femelle, avec la baſe bleuâtre, & deux rangées tranſverſes de points noirs oculaires, entre leſquels il y a une bande fauve, flexueuſe & ayant le côté interne bordé par un cordon de lunules noires. Les points extérieurs des ſecondes ailes ſont ſaupoudrés de bleu-argenté. Outre cela, le milieu de chaque aile offre un croiſſant noir, & celui des ailes inférieures eſt précédé de trois à quatre points baſilaires.

La chenille, ſuivant M. Ochſenheimer, eſt pubeſcente, d'un vert-obſcur, avec la tête ainſi que les pattes écailleuſes noires, & pluſieurs lignes ferrugineuſes, dont une le long du dos, les autres obliques & bordées de blanc. Elle vit ſur la fleur du *genêt* & du *ſainfoin*.

La chryſalide eſt ſvelte, verdâtre, avec le bord externe de l'enveloppe des ailes & les dernières inciſions de l'abdomen ferrugineux.

On le trouve vers la fin de juillet dans les bois & les prairies. Il eſt commun aux environs de Paris.

213. Polyommate Ægon.

Polyommatus Ægon.

Pol. alis integris, maris *ſuprà violaceo-cœruleis, margine lato fuſco fimbriâ albâ*; fœminæ *fuſcis : ſubtùs fuſco-cinereis, nigro ocellatis; poſticis fuſciâ ſinuatâ fulvâ, punctis argenteis notatâ.* (Minor.)

Papilio Ægon. Wien. *Verz. p.* 185. *ſam.* N. *n°.* 15.

Papilio Ægon. Schneid. *Syſt. Beſchr. p.* 252. *n°.* 154.

Papilio Ægon. Illig. *N. Auſg. Deſſ. tom.* 2. *p.* 272. *n°.* 15.

Papilio Ægon. Hubn. *Pap. tab.* 64. *fig.* 313-315.

Papilio Ægon. Ochsen. *Pap. Eur. tom.* 1.

Papilio Ægon, alis maris ſuprà cœruleis, fœminæ fuſcis : ſubtùs cinereis, ocellis numeroſis; poſticis fuſciâ albâ, limbo ferrugineo & ocellis cœruleo-argenteis. Borkh. *Rhein. Magaz. tom.* 1. *p.* 289. *n°.* 97.

Papilio Ægon. Borkh. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 154 & 276. — *part.* 2. *p.* 225. *n°.* 3.

Papilio Philonomus. Borkh. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 166. *n°.* 18.

Papilio Ægon. Herbst, *tab.* 315. *fig.* b-c.

Papilio Philonomus. Herbst, *tab.* 316. *fig.* 11-13.

Papilio Ægon. Schwarz, *Raupenkal. p.* 187.

Papilio Alſus. Esp. *Pap. Eur. part.* 1. *tab.* 101. *cont.* 56. *fig.* 3. 4.

Papilio Philonomus & Philonome. Bergstr. *Nomenkl. tab.* 44. *fig.* 6-8.

Papilio Agyrotoxus. Bergstr. *Nomenkl. tab.* 47. *fig.* 3. 4.

Papilio Agyra. Bergstr. *Nomenkl. tab.* 47. *fig.* 5. 6.

Papilio Argyrophalara. Bergstr. *Nomenkl. tab.* 54. *fig.* 1. 2.

Polyommate Ægon. Latr. *nouv. Dict. d'Hiſt. nat.* 2e. *édit. tom.* 27. *p.* 497.

Polyommate Ægon. God. *Hiſt. nat. des lépid. de France, tom.* 1. *p.* 217. *pl.* 11. *ſecund. fig.* 4.

Polyommate Ægon. God. *Tabl. méthod. des lépid. de France*, Diurnes, *p.* 56. *n°.* 162.

Il reſſemble extrêmement à l'*Argus*, mais il n'a guère que dix à onze lignes d'envergure; le deſſus de la femelle n'eſt ſablé de bleu qu'à la baſe & il a la frange d'un blanc très-ſale; le deſſous des deux ſexes eſt d'un cendré plus brun, avec les points oculaires plus gros, ſurtout aux ſecondes ailes.

Il paroît trois ſemaines avant l'*Argus*, & il aime particulièrement les endroits ſecs.

214. Polyommate Optilète.

Polyommatus Optilete.

Pol. alis integris, ſuprà argenteo-violaceis, margine nigro ſimbriâ albâ : ſubtùs cinereſcentibus, nigro ocellatis; poſticis lunulis duabus fulvis punctiſque duobus anguli ani argenteis.

Papilio P. R. Optilète, *alis integerrimis, cæruleſcentibus, margine nigricante : poſticis ſubtùs cinereis, punctis ocellaribus atris lunuliſque duabus fulvis.* Fab. *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 74. *n°.* 691.

Heſperia R. *Optilete.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 297. *n°.* 131.

Papilio Optilete. Knoch, *Beytr.* 1. *p.* 76. *tab.* 5. *fig.* 5. 6.

Papilio Optilete. Borkh. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 155 & 277. *n°.* 4. — *part.* 2. *p.* 225.

Papilio Optilete. Esp. *Pap. Eur. part.* 1. *tab.* 79. *cont.* 29. *fig.* 4. 5.

Papilio Optilete. Petagna, *Inſtit. Entom. tom.* 1. *p.* 486. *n°.* 123.

Papilio Optilete. Devill. *Ent. Linn. tom.* 2. *p.* 78. *n°.* 155.

Papilio Optilete. Herbst, *tab.* 316. *fig.* 8-10.

Papilio Optilete. Schneid. *Syſt. Beſchr. p.* 259. *n°.* 159.

Papilio Optilete. Hubn. *Pap. tab.* 63. *fig.* 310-312.

Papilio Optilete. Ochsen. *Pap. Eur. tom.* 1.

L'Argus bleu-turquin. Engram. *Pap. d'Europe, tom.* 1. *pl.* 84. *Suppl.* 2. *pl.* 5. *fig.* 85. a-c. *tert.*

Polyommate Optilète. Latr. *nouv. Dict. d'Hiſt. nat.* 2e. *édit. tom.* 27. *p.* 498.

Polyommate Optilète. God. *Hiſt. nat. des lépid. de France, tom.* 2. *p.* 198. *pl.* Z-XXVI. *fig.* 3. 4.

Polyommate Optilète. God. *Tabl. méthod. des lépid. de France*, Diurnes, *p.* 57. *n°.* 163.

Il a environ un pouce d'envergure. Le deſſus du mâle eſt d'un violet-argentin, avec une légère bordure noire & une frange blanche.

Le deſſus de la femelle eſt d'un brun-noirâtre, avec la baſe d'un bleu-argentin & une frange blanchâtre. Ses ailes inférieures ont à l'angle interne une tache fauve, qui ſe voit auſſi dans certains mâles.

Le deſſous des deux ſexes eſt d'un cendré-clair, avec un arc central, une rangée courbe de ſept points, puis deux ſéries marginales de lunules, noirs & bordés de blanchâtre. Il y a en outre deux ou trois points noirs ocellés à la baſe des ſecondes ailes. La première, la troiſième, & parfois la quatrième, lunules extérieures de ces ailes, à compter de l'angle de l'anus, ſont ſaupoudrées de bleu-argenté & ſurmontées chacune d'une tache fauve.

Il habite les Alpes, les Pyrénées, le nord de l'Allemagne, la Suède, la Ruſſie, & il ſe trouve à la fin de juillet & au commencement d'août.

215. Polyommate de l'Orpin.

Polyommatus Telephii.

Pol. alis integris, ſuprà fuſcis, fimbriâ variegatâ ſingularumque baſi & poſticarum annulis marginalibus molaceis : ſubtùs albis, punctis ſimplicibus numeroſis nigris; poſticis faſciâ flexuoſâ fulvâ.

Papilio Telephii, *alis integerrimis, atro cæruleis, limbo nigro : ſubtùs cinereſcentibus, maculis plurimis quadratis nigris faſciâque in inferioribus fulvâ.* Esp. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 363. *tab.* 41. *Suppl.* 17. *fig.* 2. — *tab.* 94. *cont.* 49. *fig.* 5.

Papilio Telephii. Devill. *Ent. Linn. tom.* 2. *p.* 76. *n°.* 143.

Nature. 9. *tab.* 1. *fig.* 4. 5.

Papilio Telephii. Bergstr. *Nomenkl. tab.* 56. *fig.* 5. 6. — *tab.* 60. *fig.* 1-3.

Papilio Telephii. Schwarz, *Raupenkal. p.* 349.

Papilio Telephii. Borkh. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 159 & 278. *n°.* 9. — *part.* 2. *p.* 227.

Papilio Telephii. Schneid. *Syſt. Beſchr. p.* 257. *n°.* 158.

Papilio P. R. Bathus, *alis integris, nigris, cæruleo nitidis : ſubtùs albidis, punctis atris numeroſis; poſticis faſciâ fulvâ continuâ.* Fab. *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 76. *n°.* 697.

Papilio R. Sedi, *alis caudatis (ecaudatis), cæruleis, margine albo maculato : ſubtùs albis,*

maculis quadratis nigris fasciâque rufâ. Fab. *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 70. *n°.* 669.

Hesperia R. *Battus.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 300. *n°.* 137.

Hesperia R. *Sedi.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 286. *n°.* 98.

Papilio Bathus. Petag. *Instit. Entom. tom.* 1. *p.* 488. *n°.* 129.

Papilio Sedi. Petag. *Instit. Entom. tom.* 1. *p.* 482. *n°.* 112.

Papilio Battus. Lang. *Verz.* 2. *p.* 54. *n°.* 454-457.

Papilio Battus. Herbst, *tab.* 319. *fig.* 5-7.

Papilio Battus. V. Muller, *Fauna Silesiaca.*

Papilio Battus. Wien. *Verz. p.* 186. *fam.* N. *n°.* 17.

Papilio Battus. Illig. *N. Ausg. Dess. tom.* 2. *p.* 273. *n°.* 17.

Papilio Battus. Hubn. *Pap. tab.* 66. *fig.* 328-330.

Papilio Battus. Ochsen. *Pap. Eur. tom.* 1.

Papilio Argus. Scop. *Ent. Carn. p.* 177.

L'Argus brun. Engram. *Pap. d'Europe, tom.* 1. *p.* 310. *pl.* 84. *Suppl.* 2. *pl.* 5. *fig.* 85. a. b. c. *bis.*

Polyommate Battus. Latr. *nouv. Dict. d'Hist. nat.* 2^e. *édit. tom.* 27. *p.* 498.

Polyommate de l'Orpin. God. *Hist. nat. des lépid. de France, tom.* 2. *p.* 195. *pl.* Y-XXV. *fig.* 7. 8.

Polyommate de l'Orpin. God. *Tabl. méthod. des lépid. de France,* Diurnes, *p.* 57. *n°.* 165.

Fabricius a fait de ce polyommate deux espèces distinctes, en les rapportant aux mêmes figures du Naturforscher (le naturaliste), & en décrivant la même chenille pour toutes les deux.

Il a un peu plus d'un pouce d'envergure. Le dessus des ailes est d'un brun-noirâtre-chatoyant, avec la base saupoudrée de blanc. Il y a en outre sur le limbe postérieur un cordon d'annelets blenâtres, mais manquant assez souvent aux ailes supérieures du mâle.

Le dessous des deux sexes est blanc, avec cinq lignes transverses de gros points noirs, simples, en y comprenant ceux de la frange. Les ailes inférieures ont une lunule centrale noire, & leurs deux dernières rangées de points sont séparées par une bande fauve, dont le côté externe est crénelé. Les points du milieu des premières ailes sont sensibles en dessus.

La chenille, suivant M. Ochsenheimer, est pubescente, d'un vert de mer, avec une ligne violâtre le long du dos. Elle se trouve en juillet sur l'*orpin reprise* (*sedum telephium*).

La chrysalide est courte, obtuse, verdâtre & mouchetée de brun. Elle passe l'hiver, & le papillon n'en sort qu'au mois de juin de l'année suivante. Il se tient dans les bois fourrés & il voltige toujours sur les buissons.

Il habite le midi de la France, le Piémont, l'Allemagne, la Russie. M. J. W. Dalman dit, dans l'extrait des Mémoires de l'Académie de Stockholm pour l'année 1816, qu'on l'a trouvé dans une île voisine de la capitale de la Suède.

216. Polyommate Hylas.

Polyommatus Hylas.

Pol. alis integris, suprà violaceo-cœrulescentibus (singularium fœminæ apice fusco), lunulâ mediâ nigrâ fimbriâque variegatâ: subtùs albido-cinereis, punctis ocellaribus numerosis nigris; posticis fasciâ è maculis quinque fulvis.

Papilio P. R. Hylus, *alis integris, lunulâ mediâ punctisque marginalibus nigris: subtùs cinereis; punctis ocellaribus.* Fab. *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 75. *n°.* 696.

Hesperia R. *Hylus.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 300. *n°.* 136.

Papilio Hylas. Wien. *Verz. p.* 185. *fam.* N. *n°.* 16.

Papilio Hylus. Petag. *Instit. Ent. tom.* 1. *p.* 488. *n°.* 128.

Papilio Hylas. Illig. *N. Ausg. Dess. tom.* 2. *p.* 273. *n°.* 16.

Papilio Hylas. Brahm. *Inf. Kalend. part.* 1. *p.* 242. *n°.* 137.

Papilio Hylas. Herbst, *tab.* 315. *fig.* 9-11.

Papilio Hylas. Hubn. *Pap. tab.* 66. *fig.* 325-327.

Papilio Hylas. Ochsen. *Pap. Eur. tom.* 1.

Papilio Amphion. Esp. *Pap. Eur. part.* 1. *tab.* 53. *cont.* 3. *fig.* 1. (Le mâle.)

Papilio Amphion. Devill. *Ent. Linn. tom.* 2. *p.* 77. *n°.* 148.

Papilio Hylactor. Bergstr. *Nomenkl. tab.* 47. *fig.* 7. 8.

Papilio Baton. Bergstr. *Nomenkl. tab.* 60. *fig.* 6-8.

Papilio Hylactor. Borkh. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 160 & 278. *n°.* 10.

Papilio Amphion. Borkh. *Pap. Eur. part.* 2. *p.* 227. *n°.* 11.

Papilio Amphion. Borkh. *Rhein. Magaz. tom.* 1. *p.* 289. *n°.* 98.

Papilio Amphion. Schneid. *Syſt. Beſchr. p.* 258. *n°.* 158.

Argus bleu-violet. Engram. *Pap. d'Europe, tom.* 1. *p.* 176. *pl.* 40. *fig.* 85. e. f.

Polyommate Hylas. Latr. *nouv. Dict. d'Hiſt. nat. 2e. édit. tom.* 27. *p.* 497.

Polyommate Hylas. God. *Hiſt. nat. des lépid. de France, tom.* 1. *p.* 218. *pl.* 11 *ſecund. & pl.* 11. *tert. fig.* 5.

Polyommate Hylas. God. *Tabl. méth. des lépid. de France*, Diurnes, *p.* 57. *n°.* 164.

Il a environ un pouce d'envergure. Le deſſus des ailes eſt d'un bleu-violet-pâle, avec une bordure brune, très-étroite dans le mâle, large dans la femelle, & entrecoupée de blanc à la frange. Le milieu de chaque aile eſt marqué d'un petit arc noir, & il y a à l'extrémité des inférieures une ſérie de points noirs à iris blanchâtre. Cet iris eſt quelquefois rouſſâtre dans la femelle.

Le deſſous des deux ſexes eſt d'un cendré-blanchâtre, avec une multitude de points noirs oculaires, & la baſe légèrement bleuâtre. Les deux ſéries de points poſtérieures ſont ſéparées aux ſecondes ailes par un cordon de cinq taches fauves preſque quadrangulaires.

On le trouve, au mois d'août, dans les bois de l'Europe. Il eſt aſſez commun aux environs de Paris.

217. Polyommate Orbitulus.

Polyommatus Orbitulus.

Pol. alis integris, maris *ſuprà argenteo-cineraſcentibus*, fœminæ *fuſcis, fimbriâ albâ : ſubtùs cinereis ; anticis punctis ocellaribus numeroſis, poſticis maculâ cordatâ diſci albâ lunulisque duabus anguli ani ruſeſcentibus.*

Papilio Orbitulus, *alis cyaneo-cineraſcentibus, punctò limboque nigro, fimbriâ albâ : ſubtùs cinereis, baſi vireſcente ; ſuperioribus maculis ocellaribus ſeptem, inferioribus quatuor, maculâ mediâ albâ.* Esp. *Pap. Eur. tab.* 112. *cont.* 67. *fig.* 4.

Papilio Orbitulus. De Prunner, *Lepid. Pedem. Suppl. p.* 75. *n°.* 158.

Papilio Orbitulus. Ochsen. *Pap. Eur. tom.* 1.

Papilio Meleager. Hubn. *Pap. tab.* 103. *fig.* 522-525.

Le papillon Orbitule. Latr. *nouv. Diction. d'Hiſt. nat.* 2e. *édit. tom.* 27. *p.* 499.

Polyommate Orbitulus. God. *Hiſt. nat. des lépid. de France, tom.* 2. *p.* 200. *pl.* Y-XXV. *fig.* 3-4.

Polyommate Orbitulus. God. *Tabl. méth. des lépid. de France*, Diurnes, *p.* 57. *n°.* 166.

Il a près d'un pouce d'envergure. Le deſſus des ailes eſt d'un cendré-argentin dans le mâle, avec le bord poſtérieur obſcur ; il eſt d'un brun-noirâtre dans la femelle, avec la baſe légèrement ſaupoudrée de bleuâtre. La frange eſt blanche chez les deux ſexes, & chez la femelle le milieu des quatre ailes eſt marqué d'un arc noir.

Le deſſous des premières ailes, dans le mâle comme dans la femelle, eſt d'un cendré-clair, avec beaucoup de taches noires oculaires, dont deux ſur le diſque, cinq à ſept rangées en arc au-delà du milieu, les autres moins foncées & formant deux ſéries le long du bord poſtérieur.

Le deſſous des ſecondes ailes eſt d'un cendré-obſcur, mais un peu lavé de verdâtre à la baſe, avec deux points noirs ocellés ſur le milieu de la côte, une tache blanche en forme de cœur au centre de la ſurface, & une bande tranſverſe pareillement blanche près du bord poſtérieur. La bande a le côté interne très-inégalement incifé, le côté externe bordé par une ſérie de chevrons & par une ſérie de petits points noirâtres. Le premier & le troiſième chevrons, à compter de l'angle de l'anus, embraſſent chacun une tache rouſſâtre.

On le trouve, au mois de juillet, dans les Alpes & dans les Pyrénées.

218. Polyommate Titus.

Polyommatus Titus.

Pol. alis integerrimis, fuſcis, immaculatis : poſticis ſubtùs ocellatis ſtrigâque poſticâ maculari fulvâ. Fab.

Heſperia R. *Titus.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 297. *n°.* 130.

Papilio Titus. Jon. *Fig. pict.* 6. *tab.* 44. *fig.* 2.

Fabricius le décrit ainſi : il a tout-à-fait le port de l'*Argus* & de l'*Artaxercès*. Le deſſus de ſes ailes eſt d'un brun-noirâtre ſans taches. Le deſſous eſt également brun, avec une rangée poſtérieure de petites lignes blanches & une de petites lignes noires aux ailes ſupérieures, avec un arc central & une rangée tranſverſe de points noirs à iris blanc aux inférieures. L'extrémité offre en outre une ſérie de taches rouſſes, chargées chacune d'un point noir.

De l'Ecoſſe.

219. Polyommate Artaxercès.

Polyommatus Artaxerces.

Pol. alis integris, fuſcis : anticis ſuprà punctò medio albo : ſubtùs omnibus maculis limboque albis ſtrigâque marginali è lunulis rufis.

Heſperia R. Artaxerxes, *alis integerrimis, nigris : anticis punctò medio albo, poſticis lunulis*

nulis rufis : subtùs margine albo rufo punctato. Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *pag.* 297. *n°.* 129.

Papilio Artaxerxes. Jon. *Fig. pict.* 6. *tab.* 63. *fig.* 2.

Il a près d'un pouce d'envergure. Le dessus des ailes est d'un brun-noirâtre, avec une série marginale de lunules fauves, & la frange blanchâtre. Les premières ailes ont un point blanc près du milieu de la côte, & leurs lunules fauves sont moins distinctes que celles des secondes ailes.

Le dessous est d'un brun-clair, avec des taches arrondies & une bande terminale blanches. La bande a le côté interne grossièrement denté, & elle est chargée d'un cordon de lunules fauves, bordées chacune en avant par un arc noir, & en arrière par un point également noir. Les taches blanches des premières ailes sont au nombre de six, dont l'antérieure placée solitairement au-delà du disque, les autres formant une rangée courbe près de la bande marginale. Les taches des secondes ailes sont au nombre de onze, savoir : quatre basilaires, une discoïdale ressemblant un peu à un marteau, six disposées en arc près de la bande terminale, mais de manière cependant que les deux supérieures sont isolées des inférieures.

Décrit d'après un individu femelle appartenant à M. Latreille.

Il est probable que Fabricius a vu le mâle, car le dessous de toutes les ailes est cendré dans l'individu qu'il décrit, tandis qu'il est d'un brun-clair dans le nôtre.

De l'Ecosse.

γ. Dessous des ailes avec des points ocellés. Celui des inférieures offrant au-delà du milieu une tache blanche longitudinale, suivie de taches marginales fauves.

229. Polyommate Agestis.

Polyommatus Agestis.

Pol. alis integris, suprà fuscis, nitidis : subtùs cinereis, nigro multiocellatis : omnibus utrinquè fasciâ subterminali è maculis rubris fimbriaque variegatâ.

Papilio Agestis. Wien. *Verz. p.* 184. *fam.* N. *n°.* 13.

Papilio Agestis. Illig. *N. Ausg. Dess. tom.* 2. *p.* 271. *n°.* 13.

Papilio Agestis. Hubn. *Pap. tab.* 62. *fig.* 303-306.

Papilio Agestis. Oschen. *Pap. Eur. tom.* 1.

Papilio Alexis. Scop. *Ent. Carn. p.* 179. *var.* 1.

Papilio Medon, *alis suprà fusco-nigricantibus, fasciis utrinquè maculatibus fuscis ad marginem : subtùs punctis ocellaribus numerosis.* Borkh. *Rhein. Magaz. tom.* 1. *p.* [illegible]. *n°.* 99.

Papilio Medon. Borkh. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 163. *n°.* 14. — *part.* 2. *p.* 230.

Papilio Medon. Schneid. *Syst. Beschr. p.* 247. *n°.* 149.

Papilio Medon. Herbst, *Pap. tab.* 213. *fig.* 4-7.

Papilio Medon. Hufnag. *Tabell. im. Berl. Magaz. tom.* 2. *p.* 78. *n°.* 41.

Papilio Medon. Esp. *Pap. Eur. part.* 1. *tab.* 32. *Suppl.* 8. *fig.* 1. — *tab.* 55. *cont.* 5. *fig.* 7.

Papilio Medon. Devill. *Ent. Linn. tom.* 2. *pag.* 74. *n°.* 131.

Papilio Aslarche. Bergstr. *Nomenkl. tab.* 49. *fig.* 7. 8.

Papilio Alexis. Naturf. 6. *p.* 22. *n°.* 9.

Papilio Medon. Naturf. 6. *p.* 10. *n°.* 41.

L'Argus bleu. Engram. *Pap. d'Europe, tom.* 1. *p.* 168. *pl.* 38. *fig.* 80. c. d. e. f.

Polyommate Agestis. Lata. *nouv. Dict. d'Hist. nat.* 2e. *édit. tom.* 27. *p.* 496.

Polyommate Agestis. God. *Hist. nat. des lépid. de France, tom.* 1. *p.* 213. *pl.* 10. *fig.* 4. & *pl.* 11. *tert. fig.* 3.

Polyommate Agestis. God. *Tabl. méth. des lépid. de France*; Diurnes, *p.* 53. *n°.* 151.

Il a environ un pouce d'envergure. Le dessus des deux sexes est d'un brun-noirâtre-luisant, avec une bande presque terminale de taches d'un roux-foncé, & la frange variée de blanc & de brun. Les taches rousses du dessus des secondes ailes s'appuient chacune sur un gros point noir.

Le dessous est d'un cendré légèrement brunâtre, avec une multitude de points noirs oculaires, & une bande de taches rousses répondant à celle du dessus. Les premières ailes n'ont aucun œil avant le point central. Les secondes ailes ont les deux points antérieurs de la série du milieu très-rapprochés & séparés des autres.

Ce polyommate se distingue de la femelle de l'*Alexis*, en ce que le dessus de ses ailes n'est point saupoudré de bleu à la base; en ce que la frange est variée de brun; enfin, en ce que les deux points antérieurs de la rangée du milieu de ses secondes ailes en dessous sont très-voisins l'un de l'autre.

Dans les bois & dans les prairies de l'Europe, au printemps & en été.

221. Polyommate Agestor.

Polyommatus Agestor.

Pol. alis integris, suprà fuscis, nitidis: subtùs cinerascentibus, nigro multiocellatis; posticarum ocellis marginalibus ad angulum ani argentatis: omnibus untrinque fasciâ subterminali è maculis fulvis fimbriâque variegatâ. (Fœmina.)

Sous le rapport de la couleur & du dessin, la femelle de ce polyommate ressemble à l'*Agestis*, mais elle est beaucoup plus grande; la bande fauve maculaire de l'extrémité de toutes ses ailes est moins vive & moins large; enfin, les yeux noirs marginaux qui avoisinent en dessous l'angle anal de ses ailes inférieures sont fablés de bleu-argenté.

Nous avons vu cinq femelles & pas un seul mâle.

Trouvé d'abord dans la Lozère par M. Duponchel père, puis dans les environs de Toulon par M. Alexandre Lefebvre.

222. Polyommate Alexis.

Polyommatus Alexis.

Pol. alis integris, suprà maris *violaceo-cæruleis*, fœminæ *fuscis, fimbriâ albâ: subtùs cinereis, basi virescente, punctis ocelluribus numerosis fasciâque marginali è maculis fulvis.*

Papilio Alexis. Wien. *Verz. p.* 184. *fam.* N. *n°.* 12.

Papilio Alexis. Illig. *N. Ausg. Dess. tom.* 2. *p.* 271. *n°.* 12.

Papilio Alexis. Braum. *Inf. Kalend. p.* 462. *n°.* 325.

Papilio Alexis. Borkh. *Rhein. Magaz. tom.* 1. *p.* 287. *n°.* 94.

Papilio Icarus. Borkh. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 161 & 278. *n°.* 12. — *part.* 2. *p.* 227.

Papilio Icarus. Naturf. 6. *p.* 21. *n°.* 8.

Papilio Icarus. Schwarz, *Raupenkal. p.* 186. *n°.* 173. — *p.* 347. *n°.* 363.

Roes. *Inf. part.* 3. *tab.* 37. *fig.* 3-5.

Schæff. *Icon. tab.* 158. *fig.* 6. 7. (Fœm.)

Papilio Alexis. Scop. *Ent. Carn. p.* 179. *var.* 2.

Papilio Alexis. Hubn. *Pap. tab.* 60. *fig.* 292-294.

Papilio Alexis. Ochsen. *Pap. Eur. tom.* 1.

Papilio Icarus. Herbst, *Pap. tab.* 312. *fig.* 10-12.

Papilio Alexis. Schneid. *Syst. Beschr. p.* 244. *n°.* 147.

Papilio Polyphemus. Schneid. *Syst. Beschr. p.* 250. *n°.* 156.

Papilio Thetis mas. Esp. *Pap. Eur. part.* 1. *tab.* 32. *Suppl.* 8. *fig.* 2. (Fœm.)

Papilio Icarus mas. Esp. *Pap. Eur. part.* 1. *tab.* 32. *Suppl.* 8. *fig.* 4.

Papilio Polyphemus. Esp. *Pap. Eur. part.* 1. *tab.* 50. *Suppl.* 26. *fig.* 2. 3. (Fœm.)

Papilio Polyphemus. Esp. *Pap. Eur. part.* 1. *tab.* 55. *cont.* 5. *fig.* 5. (Var. mas.)

Papilio Polyphemus. Esp. *Pap. Eur. part.* 1. *tab.* 79. *cont.* 29. *fig.* 2. (Var. fœm.)

Papilio Polyphemus. Esp. *Pap. Eur. part.* 1. *tab.* 92. *cont.* 42. *fig.* 3. (Larva.)

Papilio Thetis. Devill. *Ent. Linn. tom.* 2. *p.* 74. *n°.* 134.

Papilio Icarus. Devill. *Ent. Linn. tom.* 2. *p.* 74. *n°.* 133.

Papilio Polyphemus. Devill. *Ent. Linn. tom.* 2. *p.* 77. *n°.* 146.

Papilio Agestis. Lang. *Verz.* 2. *p.* 54. *n°.* 439-443.

Papilio Candybus. Bergstr. *Nomenkl. tab.* 48. *fig.* 1. 2. (Mas.)

Papilio Candaon. Bergstr. *Nomenkl. tab.* 49. *fig.* 3. 4. (Mas.)

Papilio Pampholyge. Bergstr. *Nomenkl. tab.* 47. *fig.* 1. 2. (Fœm.)

Papilio Candiope. Bergstr. *Nomenkl tab.* 48. *fig.* 3. 4. (Fœm.)

L'Argus bleu. Geoff. *Hist. Inf. tom.* 2. *p.* 61. *n°.* 30. (Le mâle.)

L'Argus brun. Geoff. *Hist. Inf. tom.* 2. *p.* 63. *n°.* 32. (La femelle.)

Argus bleu. Engram. *Pap. d'Europe, tom.* 1. *pl.* 38. *fig.* 80. g. h. (Le mâle.)

Argus bleu-violet. Engram. *Pap. d'Europe, tom.* 1. *pl.* 40. *fig.* 85. a. b. (La femelle.)

Polyommate Alexis. Latr. *nouv. Dict. d'Hist. nat.* 2e. *édit. tom.* 27. *p.* 495.

Polyommate Alexis. God. *Hist. nat. des lépid. de France, tom.* 1. *p.* 212. *pl.* 11. *secund. fig.* 3.

Polyommate Alexis. God. *Tabl. méthod. des lépid. de France,* Diurnes, *p.* 33. *n°.* 152.

Il a de quatorze à quinze lignes d'envergure. Le dessus du mâle est d'un bleu-violet. Le dessus de la femelle est d'un brun-noirâtre, avec la base saupoudrée de bleu, & l'extrémité longée par une

férie de taches fauves, qui s'appuient aux secondes ailes sur des points noirs oculaires. Dans l'un & dans l'autre sexe, la frange est entièrement blanche.

Le dessous des quatre ailes, chez les deux sexes, est cendré, avec la base verdâtre, une multitude de points noirs ocellés, & une bande marginale de taches fauves. Les deux points antérieurs de la rangée du milieu des secondes ailes sont notablement séparés l'un de l'autre.

La chenille est pubescente, verte, avec le dos plus foncé. Elle vit sur la *luzerne*, le *trèfle*, la *bugrane épineuse*, l'*astragale à feuilles de réglisse*, &c.

La chrysalide est d'un gris-brun, avec le bord postérieur de l'enveloppe des ailes plus obscur.

Commun dans presque toute l'Europe, au printemps & en été.

223. Polyommate Adonis.

Polyommatus Adonis.

Pol. alis integris, suprà maris *rubescenti-azureis*, fœminæ *fuscis, fimbriâ variegatâ : subtùs fusco-cinereis, basi virescente, punctis ocellaribus numerosis fasciâque marginali è lunulis fulvis.*

Papilio P. R. Adonis, *alis integris, cœruleis, strigâ marginali atrâ : subtùs cinereis, punctis ocellaribus numerosis; posticis maculâ centrali albâ.* Fab. *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 75. *n°.* 694.

Hesperia R. *Adonis.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 299. *n°.* 134.

Papilio Adonis. Wien. *Verz. p.* 184. *fam.* N. *n°.* 11.

Schæff. *Icon. tab.* 98. *fig.* 3. 4.

Papilio Adonis. Lang. *Verz.* 2. *p.* 53. *n°.* 425-429.

Papilio Adonis. Rossi, *Faun. Etr. tom.* 2. *p.* 156. *n°.* 1053.

Papilio Adonis. Petagna, *Instit. Ent. tom.* 1. *p.* 487. *n°.* 126.

Papilio Adonis. Illig. *N. Aufg. Dess. tom.* 2. *p.* 270. *n°.* 11.

Papilio Adonis. Ochsen. *Pap. Eur. tom.* 1.

Papilio Adonis. Hubn. *Pap. tab.* 61. *fig.* 298-300.

Papilio Ceronus. Hubn. *Pap. tab.* 61. *fig.* 295-297.

Papilio Adonis. Herbst, *Pap. tab.* 312. *fig.* 7-9.

Papilio Ceronus. Herbst, *Pap. tab.* 314. *fig.* 7-9.

Papilio Adonis. Borkh. *Rhein. Magaz. tom.* 1. *p.* 286. *n°.* 93.

Papilio Bellargus. Borkh. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 157 & 277. *n°.* 6. — *part.* 2. *p.* 226.

Papilio Thetis. Borkh. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 162 & 279. *n°.* 13. — *part.* 2. *p.* 228. *fig.* 6-8.

Papilio Thetis. Schneid. *Syst. Beschr. p.* 239. *n°.* 144.

Papilio Bellargus. Schneid. *Syst. Beschr. p.* 245. *n°.* 148.

Papilio Bellargus. Schnarz, *Raupenkal. p.* 347. *n°.* 364.

Papilio Bellargus. V. Muller, *Faun. Silesiaca.*

Papilio Thetis. Naturf. 6. *p.* 24. *n°.* 11.

Papilio Bellargus. Naturf. 6. *p.* 25. *n°.* 12.

Papilio Oceanus. Bergstr. *Nomenkl. tab.* 53. *fig.* 3. 4.

Papilio Bellargus. Bergstr. *Nomenkl. tab.* 53. *fig.* 5. 6.

Papilio Salacia. Bergstr. *Nomenkl. tab.* 50. *fig.* 1. 2.

Papilio Venilia. Bergstr. *Nomenkl. tab.* 50. *fig.* 3. 4.

Papilio Bellargus. Esp. *Pap. Eur. part.* 1. *tab.* 52. *Suppl.* 8. *fig.* 3. — *tab.* 55. *cont.* 5. *fig.* 2. 3. 6. (Mas.) *fig.* 4. (Fœm.)

Papilio Ceronus. Esp. *Pap. Eur. part.* 1. *tab.* 90. *cont.* 40. *fig.* 2. — *tab.* 102. *cont.* 57. *fig.* 1.

Papilio Bellargus. Devill. *Ent. Linn. tom.* 2. *p.* 74. *n°.* 132.

Papilio Ceronus. Devill. *Ent. Linn. tom.* 2. *p.* 79. *n°.* 159.

Argus bleu-céleste. Engram. *Pap. d'Europe, tom.* 1. *p.* 173. *pl.* 39. *fig.* a-f.

Polyommate Adonis. Latr. *nouv. Dict. d'Hist. nat.* 2e. *édit. p.* 495.

Polyommate Adonis. God. *Hist. nat. des lépid. de France, tom.* 1. *p.* 210. *pl.* 11 *fecund. & pl.* 11 *tert. fig.* 2.

Polyommate Adonis. God. *Tabl. méthod. des lépid. de France*, Diurnes, *p.* 54. *n°.* 153.

Il a de quatorze à quinze lignes d'envergure. Le dessus du mâle est d'un bleu-d'azur tirant un peu sur le violet. Le dessus de la femelle est d'un brun-noirâtre, avec la base saupoudrée de bleu, & l'extrémité longée par une série de taches fauves qui s'appuient aux secondes ailes sur des points noirs oculaires. Dans l'un & l'autre sexe, la frange est entrecoupée de blanc & de noir.

Le deſſous des deux ſexes eſt brunâtre, mais plus foncé aux ſecondes ailes qu'aux premières, avec la baſe verdâtre, une multitude de points noirs ocellés, & une bande marginale de lunules fauves. Le deuxième point poſtérieur de la rangée du milieu des ſecondes ailes eſt beaucoup plus en avant que les autres, & les lunules fauves ſont bordées de noir & de blanc à leur côté interne.

La femelle de l'*Adonis* ne ſe diſtingué en deſſus de celle de l'*Alexis* que par l'entrecoupé de la frange.

La chenille eſt pubeſcente, verte ou brunâtre, avec une ligne dorſale plus foncée & compriſe entre deux rangs de taches fauves triangulaires. Elle vit principalement ſur le *genêt herbacé*, dont elle ne mange que la fleur.

La chryſalide eſt d'un gris-verdâtre.

Dans les prairies & les clairières des bois de l'Europe, au printemps & en été.

224. Polyommate Dorylas.

Polyommatus Dorylas.

Pol. alis integris, ſuprà maris *azureis*, fœminæ *fuſcis, fimbriâ albâ : ſubtùs fuſceſcentibus, baſi vireſcente, punctis ocellaribus numeroſis, fuſciâ è maculis ſagittatis fulvis margineque poſtico albicante.*

Papilio P. R. Dorylas, *alis integris, cœruleis (fuſcis) : ſubtùs cinereis; anticis puncto medio ſtrigâque poſticâ punctorum ocellatorum.* Fab. *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 75. *n°.* 696.

Heſperia R. *Dorylas.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 299. *p.* 135.

Papilio Dorylas. Wien. *Verz. p.* 322. *fam.* N. *n°.* 19.

Papilio Dorylas. Rossi, *Faun. Etr. Mant. tom.* 2. *p.* 12. *n°.* 355.

Papilio Dorylas. Petag. *Inſtit. Entom. tom.* 1. *p.* 488. *n°.* 127.

Schæff. *Icon. tab.* 214. *fig.* 1. 2. (Mas.)

Papilio Dorylas. Illig. *N. Aufg. Deſſ. tom.* 2. *p.* 270. *n°.* 11. 12.

Papilio Dorylas. Ochsenh. *Pap. Eur. tom.* 1.

Papilio Dorylas. Hubn. *tab.* 60. *fig.* 289-291.

Papilio Dorylas. Herbst, *Pap. tab.* 314. *fig.* 1-3.

Papilio Dorylas. Borkh. *Rhein. Magaz. tom.* 1. *p.* 288. *n°.* 95.

Papilio Hylas. Borkh. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 157 & 277. *n°.* 7. — *part.* 2. *p.* 226.

Papilio Hylas. Schneid. *Syſt. Beſchr. p.* 241. *n°.* 145.

Papilio Hylas. Lang. *Verz.* 2. *p.* 53. *n°.* 430-433.

Papilio Argeſter. Bergstr. *Nomenkl. tab.* 58. *fig.* 3. 4. (Mas.)

Papilio Argeſter alter. Bergstr. *Nomenkl. tab.* 61. *fig.* 1. 2. (Mas.) *fig.* 3. 4. (Fœm.)

Papilio Hylas. Esp. *Pap. Eur. part.* 1. *tab.* 45. *Suppl.* 21. *fig.* 3. (Mas.)

Papilio Thetis. Esp. *Pap. Eur. part.* 1. *tab.* 32. *Suppl.* 9. *fig.* 3. (Fœm.) — *tab.* 55. *cont.* 5. *fig.* 1. (Fœm.)

Papilio Hylas. Devill. *Ent. Linn. tom.* 2. *p.* 76. *n°.* 145.

L'Azuré. Engram. *Pap. d'Europe, tom.* 1. *p.* 309. *pl.* 83. *Suppl.* 2. *pl.* 4. *fig.* 82. a. b. c. d. *bis.*

Polyommate Dorylas. Latr. *Nouv. Diction. d'Hiſt. nat.* 2e. *édit. tom.* 27. *p.* 494.

Polyommate Dorylas. God. *Hiſt. nat. des lépid. de France, tom.* 2. *p.* 193 & 194. Observation.

Polyommate Dorylas. God. *Tab. méthod. des lépid. de France,* Diurnes, *p.* 54. *n°.* 154.

Il a de quatorze à quinze lignes d'envergure. Le deſſus du mâle eſt d'un bleu-d'azur, ſans mélange de violet, avec le bord poſtérieur plus largement liſeré de noir que chez l'*Adonis*. Le deſſus de la femelle eſt d'un brun-noirâtre, avec la baſe ſaupoudrée de bleu, & l'extrémité rongée par une ſérie de lunules fauves. Dans l'un & l'autre ſexe, la frange eſt toute blanche.

Le deſſous du mâle comme de la femelle eſt brunâtre, avec la baſe verdâtre, une multitude de points noirs ocellés, une bande de taches fauves en fer de flèche, & le bord poſtérieur blanchâtre. Les premières ailes n'ont aucune tache, du moins ordinairement, entre la baſe & le point central. Le pénultième & l'antépénultième points de la rangée du milieu des ſecondes ailes ſont plus en avant que les autres, & les taches fauves de ces mêmes ailes ne ſont point bordées à leur côté interne.

En Allemagne, en Italie. — M. Alexandre Lefebvre l'a pris, au mois de juin, dans les environs de Barège.

225. Polyommate Tithonus.

Polyommatus Tithonus.

Pol. alis integris, ſuprà argenteo-cœruleis, rubido nitidulis, margine crenato nigro fimbriâ albâ : ſubtùs cinereis, punctis ocellaribus numeroſis fuſciâque marginali è lunulis fulvis. (Mas.)

Papilio Tithonus. Hubn. *Pap. tab.* 108. *fig.* 553. 556.

Papilio Eros. Ochsenh. *Pap. Eur. tom.* 1. *edit.* 2.

Polyommate Tithonus. Godart, *Hist. nat. des lépid. de France*, *tom.* 2. *p.* 193 & 194. Observation.

Polyommate Tithonus. God. *Tabl. méthod. des lépid. de France*, Diurnes, *p.* 54. *n°.* 155.

Il n'a guère qu'un pouce d'envergure. Le dessus des ailes est d'un bleu-argenté chatoyant en rougeâtre, avec une bordure crénelée, ainsi que l'extrémité des nervures, noires, & la frange toute blanche.

Le dessous est cendré, avec une multitude de points noirs oculaires, & une bande marginale de lunules fauves. La tache centrale des premières ailes est précédée de deux points noirs placés l'un au-dessus de l'autre. Les points de la rangée du milieu des secondes ailes sont tous disposés sur une ligne courbe.

La femelle nous est inconnue.

Dans les montagnes alpines, en juin.

226. Polyommate Triton.

Polyommatus Triton.

Pol. alis integerrimis, cæruleſcentibus, ſubtùs ſtrigâ ferrugineâ punctiſque numeroſis nigris. Fab.

Papilio P. R. *Triton.* Fab. *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 74. *n°.* 692.

Heſperia R. *Triton.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 298 *n°.* 132.

N'ayant pas vu ce lépidoptère, nous le donnons d'après Fabricius, qui, selon toute apparence, n'a décrit que le mâle.

Il est de moyenne taille, d'un bleu-pâle en dessus, avec un petit liseré noir.

Le dessous de ses quatre ailes est cendré : celui des supérieures offre plusieurs points noirs faiblement ocellés, dont l'antérieur central, les autres situés à l'extrémité, & précédés d'un rang de taches ferrugineuses. Le dessous de ses ailes inférieures a une multitude de points noirs, & une bande postérieure ferrugineuse.

De la Russie méridionale.

Nota. Si par hasard ce polyommate n'avoit pas de tache blanche longitudinale sur le dessous des secondes ailes, il faudroit le mettre dans la subdivision suivante, à côté de l'*Icarius*.

227. Polyommate Corydon.

Polyommatus Corydon.

Pol. alis integris, ſuprà vireſcenti-argenteis, margine ocellato fimbriâque variegatâ : ſubtùs cinereis, punctis ocellaribus numeroſis ; poſticis baſi vireſcente ſerieque marginali è lunulis fulvis.

Papilio P. R. Corydon, *alis integris, cæruleo-argenteis, margine nigro : ſubtùs cinereis, punctis ocellaribus ; poſticis maculâ centrali albâ.* Fab. *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 74. *n°.* 693.

Heſperia R. *Corydon.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 298. *n°.* 133.

Papilio Corydon. Vien. *Verz. p.* 184. *fam.* N. *n°.* 10.

Klemann, *Beytr. tab.* 14. *fig.* 3. 4.

Schæff. *Icon. tab.* 98. *fig.* 5. (Mas.) — *tab.* 276. *fig.* 1. 2. (Fœm.)

Naturf. 3. *p.* 19. *n°.* 11.

Papilio Corydon. Borkh. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 156 & 277. *n°.* 8. — *part.* 2. *p.* 227.

Papilio Corydon. Borkh. *Rhein. Magaz. tom.* 1. *p.* 266. *n°.* 92.

Papilio Corydon. Rossi, *Faun. Etr. Mant. tom.* 2. *p.* 12. *n°.* 334.

Papilio Corydon. Scop. *Ent. Carn. p.* 179.

Papilio Corydon. Petag. *Inſtit. Ent. tom.* 1. *p.* 487. *n°.* 125.

Papilio Corydon. Illig. *N. Aufg. Deſſ. tom.* 2. *p.* 269. *n°.* 10.

Papilio Corydon. Bergstr. *Nomenkl. tab.* 49. *fig.* 1. 2. (Mas.)

Papilio Corydonis. Bergstr. *Nomenkl. tab.* 59. *fig.* 5-8. (Fœm.)

Papilio Corydon. Hubn. *Pap. tab.* 59. *fig.* 286-288.

Papilio Corydon. Ochsen. *Pap. Eur. tom.* 1.

Papilio Corydon. Schneid. *Syſt. Beſchr. p.* 242. *n°.* 146.

Papilio Typhis. Schneid. *Syſt. Beſchr. p.* 251. *n°.* 157.

Papilio Corydon. Lang. *Verz. 2. p.* 53. *n°.* 434-438.

Papilio Corydon. Herbst, *tab.* 313. *fig.* 1-3.

Papilio Corydon. Esp. *Pap. Eur. part.* 1. *tab.* 33. *fig.* 4. (Mas.) — *tab.* 79. *cont.* 29. *fig.* 1. (Fœm.)

Papilio Tiphys. Esp. *Pap. Eur. part.* 1. *tab.* 51. *fig.* 4.

Papilio Corydon. Devill. *Ent. Linn. tom.* 2. *p.* 75. *n°.* 136.

L'Argus bleu, variété 1. Geoff. *Hiſt. Inſ. tom.* 2. *p.* 62.

Argus bleu-nacré. Engram. *Pap. d'Europe*, *tom.* 1. *p.* 174. *pl.* 39. *fig.* 83. a-d. (Le mâle.)

Argus bleu-nacré. Engram. *Pap. d'Europe*,

tom. 1. *p.* 276. *pl.* 71. *Suppl.* 17. *fig.* 83. e. (La femelle.)

Polyommate Corydon. Latr. *nouv. Dict. d'Hist. nat.* 2^e. *édit. tom.* 27. *p.* 494.

Polyommate Corydon. God. *Hist. nat. des lépid. de France, tom.* 1. *p.* 208. *pl.* 11 *fecund. & pl.* 11 *tert. fig.* 1.

Polyommate Corydon. God. *Tabl. méth. des lépid. de France*, Diurnes, *p.* 54. *n°.* 156.

Il a de quinze à seize lignes d'envergure. Le dessus du mâle est d'un bleu-argenté chatoyant en verdâtre, avec une ligne noire marginale, immédiatement surmontée d'un rang de points noirâtres à iris blanchâtre.

Le dessus de la femelle est tantôt brun & plus ou moins saupoudré de bleu; tantôt comme chez le mâle, avec la bordure plus large & l'iris des points ocellés des secondes ailes lavé de fauve du côté qui regarde le corps. Dans l'un & dans l'autre sexe, la frange est entrecoupée de blanc & de noir.

Le dessous est cendré chez le mâle & chez la femelle, avec une multitude de points noirs oculaires, dont trois ou quatre alignés transversalement avant la tache centrale des premières ailes. Les secondes ailes ont la base verdâtre, & leur extrémité offre une série de sept à huit lunules fauves ayant le côté interne bordé par un chevron noir.

On le trouve dans les bois, les prairies & les jardins de l'Europe, à la fin de juillet & dans le courant d'août.

228. Polyommate Méléagre.

Polyommatus Meleager.

Pol. alis dentatis, supra argenteo-cæruleis, rubido nitidulis, margine nigro fimbriâ albâ : subtùs maris albidis, fœminæ fuscescentibus, punctis ocellaribus nigris lunulisque marginalibus in duplici série albidis.

Papilio P. R. Meleager, *alis dentatis, cæruleis, limbo nigro : subtùs canis, punctis ocellaribus nigris.* Fab. *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 71. *n°.* 679.

Hesperia R. *Meleager.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 292. *n°.* 116.

Papilio Meleager. Esp. *Pap. Eur. part.* 1. *tab.* 45. *Suppl.* 21. *fig.* 2. — *tab.* 62. *cont.* 12. *fig.* 1.

Papilio Meleager. Panzer, *Faun. Germ.* 1. 5.

Papilio Meleager. Scheid. *Syst. Beschr. p.* 265. *n°.* 164.

Papilio Meleager. Herbst, *tab.* 311. *fig.* 1-3.

Papilio Meleager. Devill. *Ent. Linn. tom.* 2. *p.* 76. *n°.* 144.

Papilio Meleager. Bergstr. *Nomenkl. tab.* 55. *fig.* 3. 4.

Papilio Daphnis. Bergstr. *Nomenkl. tab.* 58. *fig.* 1. 2.

Papilio Meleager. Borkh. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 171 & 282. *n°.* 5. — *part.* 2. *p.* 234.

Papilio Daphnis. Borkh. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 171 & 282. *n°.* 4. — *part.* 2. *p.* 234.

Papilio Endemyon. Lang. *Verz.* 2. *p.* 56. *n°.* 480-482.

Papilio Endymion. Wien. *Verz. p.* 182. *fam.* N. *n°.* 1.

Papilio Daphnis. Wien. *Verz. p.* 182 *fam.* N. *n°.* 2.

Papilio Endymion. Illig. *N. Aufs. Dess. tom.* 2. *p.* 262. *n°.* 1.

Papilio Daphnis. Illig. *N. Aufs. Dess. tom.* 2. *p.* 262. *n°.* 2.

Papilio Daphnis. Hubn. *Pap. tab.* 58. *fig.* 280-282.

Papilio Daphnis. Ochsen. *Pap. Eur. tom.* 1.

Argus bleu découpé. Engram. *Pap. d'Europe, tom.* 1. *p.* 172. *pl.* 38. *fig.* 81. a. b.

Argus bleu-pâle. Engram. *Pap. d'Europe, tom.* 1. *p.* 175. *pl.* 40. *fig.* 84. a. b.

Polyommate Méléagre. Latr. *nouv. Dict. d'Hist. nat.* 2^e. *édit. tom.* 27. *p.* 493.

Polyommate Méléagre. God. *Hist. nat. des lépid. de France, tom.* 2. *p.* 187. *pl.* X-XXIV. *fig.* 1-4.

Polyommate Méléagre. God. *Tabl. méthod. des lépid. de France*, Diurnes, *p.* 55. *n°.* 157.

Il a près d'un pouce & demi d'envergure. Le dessus du mâle est d'un bleu-argenté chatoyant en rougeâtre, avec le bord postérieur liseré de noir & garni d'une frange blanche. Le dessous est blanchâtre, avec une ligne courbe de points noirs ocellés, après laquelle il y a deux séries transverses de lunules obscures, dont les extérieures plus petites & moins distinctes. Le milieu des premières ailes est marqué d'un arc noir, & la base des secondes est bleuâtre, avec trois points ocellés précédant ceux dont nous avons parlé.

Le dessus de la femelle est plus brillant que celui du mâle, avec tout le pourtour extérieur ainsi que l'extrémité des nervures largement noirs, & la frange d'un blanc-sale. Le noir du bord est chargé de deux séries de chevrons blanchâtres, plus grossiers aux premières ailes qu'aux secondes, & il y a sur chacune des quatre ailes un trait noir vaguement entouré de blanc. Le dessous offre les mêmes caractères que chez le mâle,

mais le fond eſt brunâtre, & les lunules obſcures de l'extrémité ſont ſurmontées de chevrons blanchâtres, dont l'anal embraſſant une petite tache rouſſâtre aux ailes inférieures. Ces dernières ailes n'ont pas de bleu à la baſe, & l'on voit ſur leur milieu deux taches blanches, dont l'une preſqu'en forme de cœur, l'autre longitudinale & coupant la ligne de points oculaires.

Les mâles ſont d'ordinaire plus grands que les femelles.

Il ſe trouve aux mois de juillet & d'août, dans la Lozère, les Cévennes, en Italie, en Allemagne, &c.

Nota. Le Méléagre n'appartient à cette ſubdiviſion que par la femelle, car le deſſous des ailes inférieures du mâle n'offre pas de tache blanche longitudinale au-delà du milieu.

♂. Deſſous des ailes avec des points ocellés; celui des inférieures offrant des lunules marginales fauves, mais n'ayant pas de tache blanche longitudinale au-delà du milieu.

229. Polyommate Agathon.

Polyommatus Agathon.

Pol. alis ſubdentatis, ſuprà argenteo-cæruleis, irideſcenti nitidulis, margine nigro fimbriâ albâ: ſubtùs cinereo-fuſcentibus, punctis ocellaribus; poſticis baſi irideſcente lunuliſque quatuor analibus fulvis. (Mas.)

Polyommate Agathon. God. *Tabl. méthod. des Lépid. de France*, Dubnes, *p.* 55. *n°.* 158.

Il a près d'un pouce & demi d'envergure. Le deſſus des ailes eſt d'un bleu-argenté chatoyant en verdâtre, avec l'extrémité des nervures ainſi que le bord poſtérieur noirs, & la frange blanche.

Le deſſous eſt d'un cendré-pâle, avec la baſe verdâtre, une lunule centrale, puis une rangée de points oculaires noirs aux premières ailes, trois rangées de points oculaires & un arc central aux ſecondes. La rangée de points des premières ailes eſt ſuivie d'un double cordon marginal de lunules obſcures, dont les poſtérieures plus grandes & plus apparentes. Les points du bord terminal des ſecondes ailes ſont ſurmontés d'une ſérie de petits chevrons noirâtres, dont les quatre plus intérieurs embraſſant chacun une lunule fauve.

Trouvé, au mois d'août, dans la vallée de Barège par M. Alexandre Lefebvre de Paris.

Nota. Si la femelle, que nous ne connoiſſons pas, avoit une tache blanche longitudinale ſur le deſſous des ſecondes ailes, il faudroit mettre ce polyommate dans la ſubdiviſion précédente, après le *Méléagre*.

230. Polyommate Icarius.

Polyommatus Icarius.

Pol. alis integris, ſuprà violaceo-cæruleis, argenteo nitidulis, margine fuſco fimbriâ albâ: ſubtùs cinereis, lunulâ centrali ſtrigâque punctorum ocellatorum; poſticis faſciâ maculari fulvâ & ponè hanc ſerie è punctis marginalibus nigris.

Papilio Icarius, *alis ſuprà azureis, margine nigro fimbriis albis: ſubtùs cinereis, utrìſque puncto ſerieque arcuatâ ex ocellis quinque; inferioribus maculis marginalibus fulvis.* Esp. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 35. *tab.* 99. *cont.* 54. *fig.* 4.

Papilio Icarius, *alis integris, argenteo-cæruleis, nigro marginatis: ſubtùs cinereis, ſerie arcuatâ punctorum ocellarium.* Ochsen. *Pap. Eur. edit.* 2. *tom.* 1. *part.* 2. *p.* 37. *n°.* 16.

Zephyrus Icarius. J. W. Dalman, *Ext. des Mém. de l'Acad. de Stockholm* (année 1816), *n°.* 19. *du genre* Zephyrus.

Papilio Amandus. Hubn. *Pap. tab.* 59. *fig.* 283-285.

Il a de quinze à ſeize lignes d'envergure. Le deſſus du mâle eſt d'un bleu-violet-argentin, avec une bordure indéterminée d'un brun-noirâtre & une frange blanche.

Le deſſus de la femelle eſt d'un brun-noirâtre, avec la baſe d'un bleu plus ou moins gai. Ses ailes inférieures ont une rangée marginale de points noirs, qui ſont parfois cerclés de fauve.

Le deſſous des deux ſexes eſt cendré, avec une lunule centrale & une ligne courbe de cinq points noirs ocellés à toutes les ailes. Les ſecondes ailes ont une ſérie marginale de ſept autres points noirs ocellés, au-deſſus de laquelle il y a une bande de lunules fauves, dont les trois anales ordinairement plus prononcées.

Le mâle offre parfois une variété chez laquelle la bordure du deſſus des ſecondes ailes eſt ſurmontée d'un cordon de points noirs. Cette variété eſt, ſuivant M. Dalman, le véritable *Icarius* de M. Ochſenheimer.

Il ſe trouve, en juillet, dans les prairies du nord de l'Europe.

Nota. La bande maculaire fauve du deſſous des ailes inférieures n'eſt point, comme chez l'*Alexis*, & autres eſpèces analogues, précédée d'une tache longitudinale blanche.

♀. Deſſous des ailes avec des points ocellés: celui des inférieures ayant ſur ſon milieu une bandelette longitudinale blanche ou blanchâtre.

231. Polyommate Damon.

Polyommatus Damon.

Pol. alis integris, maris *suprà argenteo-cæruleis*, fœminæ *fuscis : subtùs rubido-cinereis, strigâ punctorum ocellatorum ; posticis vittâ albâ à basi ad marginem posticum ductâ.*

Papilio P. R. Damon, *alis integerrimis, cæruleis : subtùs fusco-cinereis, punctis numerosis ; posticis vittâ albâ.* Fab. *Mant. Inf. tom. 2. p. 72. n°. 684.*

Hesperia R. *Damon.* Fab. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 293. n°. 121.*

Papilio Damon. Wien. *Verz. p. 182. fam.* N. *n°. 6.*

Papilio Damon. Illig. *N. Ausg. Deff. tom. 2. p. 265. n°. 6.*

Papilio Damon. Roem. *Gen. Inf. tab. 18. fig. 9.*

Papilio Damon. Bergstr. *Nomenkl. tab. 55. fig. 7. 8. — tab. 56. fig. 1. 2.* (Fœm.)

Naturf. *3. p. 20.*

Scriba, *Beytr. 3. p. 230. tab. 15. fig. 1-5.* (La chenille & la chrysalide.)

Papilio Damon. Hubn. *Pap. tab. 57. fig. 275-277.*

Papilio Damon. Ochsen. *Pap. Eur. tom. 1.*

Papilio Damon. Petagna, *Instit. Entom. tom. 1. p. 483. n°. 117.*

Papilio Damon. Herbst, *tab. 310. fig. 7-9.*

Papilio Damon. Borkh. *Rhein. Magaz. tom. 1. p. 283. n°. 87.*

Papilio Biton. Borkh. *Pap. Eur. part. 1. p. 172 & 282. n°. 6. — part. 2. p. 234.*

Papilio Biton. Schneid. *Syst. Beschr. p. 266. n°. 165.*

Papilio Biton. Fuessl. *Alt. Magaz. tom. 1. part. 2. p. 208.*

Papilio Biton. Sulz. *Inf. p. 146. tab. 18. fig. 9.*

Papilio Biton. Esp. *Pap. Eur. part. 1. tab. 33. Suppl. 9. fig. 5.* (Mas.) — *tab. 62. cont. 12. fig. 4.* (Fœm.)

Papilio Biton. Devill. *Ent. Linn. tom. 2. p. 75. n°. 137.*

Argus bleu, à bandes brunes, lignes blanches. Engram. *Pap. d'Europe, tom. 1. p. 180. pl. 42. fig. 87. a-d.*

Polyommate Damon. Latr. *nouv. Dict. d'Hist. nat. 2e. édit. tom. 27. p. 500.*

Polyommate Damon. God. *Hist. nat. des lépid. de France, tom. 2. p. 190. pl. X-XXIV. fig. 5. 6.*

Polyommate Damon. God. *Tabl. méthod. des lépid. de France,* Dijbnes, *p. 55. n°. 159.*

Il a de quinze à seize lignes d'envergure. Le dessus du mâle est d'un bleu-argenté, avec l'extrémité des nervures & une bordure d'un brun-noirâtre. La bordure va toujours en se rétréciſſant depuis le sommet des premières ailes jusqu'à l'angle anal des secondes.

Le dessus de la femelle est d'un brun-noirâtre-luisant, avec la frange moins blanche que chez le mâle.

Le dessous est d'un cendré-rougeâtre, moins foncé dans le mâle que dans la femelle, avec une rangée courbe de points noirs à iris blanc, & beaucoup plus gros aux ailes supérieures qu'aux inférieures. Le milieu des ailes supérieures offre une lunule noire qui est bordée de blanc comme les points. Le milieu des ailes inférieures est divisé par une ligne blanche, qui va de la base au bord postérieur. Cette ligne manque quelquefois. Les antennes sont noires, annelées de blanc, avec le dessous de la maſſue ferrugineux.

La chenille, d'après M. Ochsenheimer, est pubescente, d'un vert-jaunâtre, avec une ligne d'un vert-foncé le long du dos, & une ligne du même ton, mais bordée de blanc, le long de chaque côté. Il y a en outre avant les pattes une ligne longitudinale très-fine, qui est rouge dans certains individus, d'un jaune-paille dans d'autres.

La chrysalide est très-obtuse & d'un jaune d'ocre.

Il se trouve, au mois de juillet, en Allemagne, dans la Lozère, les Cévennes, les Pyrénées, &c.

232. Polyommate Lefebvre.

Polyommatus Lefebvrii.

Pol. alis integris, maris *suprà cæruleo-argenteis anticarum basi tomentosâ flavidâ*, fœminæ *fuscis limbo nigro : subtùs cinereis aut fusce-scentibus ; strigâ punctorum ocellatorum ; posticis vittâ longitudinali albicante.*

Comme ce polyommate paroît être absolument nouveau, nous nous faisons un devoir de le dédier à l'amateur qui nous l'a communiqué le premier.

Il a le port & la taille du *Damon*. Le dessus du mâle est d'une couleur argentée-bleuâtre, avec le bord postérieur des quatre ailes uniformément liseré de noir & garni d'une frange blanchâtre. Ses premières ailes ont en outre à la base un duvet d'un jaune-sale, & vers le milieu un petit arc noir.

Le dessus de la femelle est d'un brun-noirâtre-luisant, avec un liseré & une frange comme dans le mâle. On remarque aussi une tache noire au milieu de ses ailes supérieures.

Le dessous de toutes les ailes est cendré chez le

le mâle, brunâtre chez la femelle, avec une rangée courbe de points noirs à iris blanc. Les points des premières ailes sont plus gros & précédés d'une lunule centrale de leur couleur. Les points des secondes ailes sont le plus souvent accompagnés d'une bandelette longitudinale blanchâtre, & celui qui avoisine le milieu du bord interne est double. Les antennes sont comme celles du *Damon*.

Trouvé récemment aux environs de Toulon par M. Alexandre Lefebvre de Paris, & dans les Bouches-du-Rhône par M. Boyer de Fons-Colombe, savant naturaliste de la ville d'Aix.

233. Polyommate Eumédon.

Polyommatus Eumedon.

Pol. alis integris, suprà fuscis, nitidis : subtùs obscurè cinereis, punctis ocellaribus nigris lunulisque limbi rufescentibus ; posticis basi virescente vittâque malleiformi albâ.

Papilio Eumedon, *alis ecaudatis, suprà fuscis fimbriâ albâ* (fœminæ *maculis marginalibus fulvis*) : *subtùs cinereis ; superioribus ocello medio majori fasciâque ocellari arcuatâ, inferioribus radio albo & fasciâ ocellari rectangulatâ.* Esp. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 16. *tab.* 52. *fig.* 2. 3. — *tab.* 80. *cont.* 30. *fig.* 3. (Var.)

Papilio Eumedon. Lang. *Verz.* 2. *p.* 54. *n°.* 444-447.

Bergstr. *Nomenkl. tab.* 125. *fig.* 5-7.

Papilio Eumedon. Devill. *Ent. Linn. tom.* 2. *p.* 77. *n°.* 147.

Papilio Eumedon. Hubn. *Pap. tab.* 62. *fig.* 301. 302.

Papilio Eumedon. Herbst, *Pap. tab.* 313. *fig.* 8. 9.

Papilio Eumedon. Ochsen. *Pap. Eur. tom.* 1.

Papilio Eumedon. Borkh. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 164 & 279. *n°.* 15. — *part.* 2. *p.* 251.

Papilio Chiron. Borkh. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 160 & 260. *n°.* 16.

Papilio Eumedon. Schneid. *Syst. Beschr. p.* 249. *n°.* 151.

Papilio Cleon. Schneid. *Syst. Beschr. p.* 249. *n°.* 152.

Papilio Chiron. Naturf. 6. *p.* 27. *n°.* 15.

Eumédon. Engram. *Pap. d'Europe, tom.* 1. *p.* 275. *pl.* 71. *Suppl.* 17. *fig.* 80. a. b. c. *bis.*

Polyommate Eumédon. Latr. *nouv. Diction. d'Hist. nat.* 2^e. *édit. tom.* 27. *p.* 496.

Polyommate Eumédon. God. *Hist. nat. des Lép. Nat. Inf. Tome* IX.

lépid. de France, tom. 2. *p.* 192. *pl.* X-XV. *fig.* 1. 2.

Polyommate Eumédon. God. *Tabl. méthod. des lépidop. de France,* Diurnes, *p.* 56. *n°.* 160.

Il a de quatorze à quinze lignes d'envergure. Le dessus des deux sexes est d'un brun-noirâtre-luisant, avec la frange blanchâtre. Le mâle est sans taches, mais la femelle a quelques lunules fauves près de l'angle interne des secondes ailes.

Le dessous est d'un cendré-obscur, avec une lunule centrale, & une ligne arquée de points oculaires, noirs. On remarque encore une série de points semblables le long du bord postérieur, mais elle est beaucoup moins apparente, surtout aux premières ailes, & celle des secondes ailes est surmontée d'un cordon de lunules roussâtres, bordées chacune antérieurement par un chevron obscur. Outre cela, les secondes ailes ont la base d'un vert-argentin, & elles offrent une raie blanche formant le marteau à son origine & descendant du disque au bord postérieur.

Il habite le Piémont, l'Allemagne, le midi de la France, &c., & il paroît au mois de juin.

234. Polyommate Admète.

Polyommatus Admetus.

Pol. alis integris, suprà fuscis fimbriâ albidâ (*posticarum* fœminæ *limbo lunulis fuscis*) : *subtùs flavido-cinereis, omnium fimbriâ e punctis ocellaribus anticarumque lunulâ centrali nigris.*

Papilio Admetus, *alis integris, fuscis nigro marginatis* (*posticis* fœminæ *maculis marginalibus rufis*) : *subtùs cinerascentibus, punctis ocellaribus nigris maculisque marginalibus obliteratis flavis.* Ochsen. *Pap. Eur. tom.* 1.

Papilio Admetus. Esp. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 148. *tab.* 82. *cont.* 32. *fig.* 2. 3.

Papilio Admetus. Borkh. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 167. *n°.* 20.

Papilio Admetus. Schneid. *Syst. Beschr. p.* 248. *n°.* 150.

Papilio Admetus. Devill. *Ent. Linn. tom.* 2. *p.* 79. *n°.* 155.

Papilio Admetus. Hubn. *Pap. tab.* 65. *fig.* 305-309.

L'Argus capucin. Engram. *Pap. Eur. tom.* 1. *p.* 327. *pl.* 6. *Suppl.* 3. *fig.* 80. a. d. *quart.*

Polyommate Admetus. Lata. *nouv. Diction. d'Hist. nat.* 2^e. *édit. tom.* 27. *p.* 497.

Il a de quinze à seize lignes d'envergure. Le dessus des deux sexes est d'un brun-noirâtre-luisant, avec le bord postérieur noir & garni d'une frange blanchâtre. Le mâle est sans taches, mais

la femelle a un point noir au milieu de chaque aile, & l'extrémité de ſes ailes inférieures offre une ſérie de lunules fauves plus ou moins apparentes.

Le deſſous des quatre ailes eſt d'un cendré-jaunâtre, avec une rangée flexueuſe de points noirs à iris blanchâtre, & des veſtiges de taches marginales rouſſâtres. Les points des ailes ſupérieures ſont beaucoup plus gros que ceux des inférieures, & précédés d'une lunule centrale noire, ayant auſſi le contour blanchâtre.

Il habite la Hongrie. M. Alexandre Lefebvre l'a pris récemment aux environs de Toulon, & ſuivant Devillers, il ſe trouve auſſi près de Lyon.

Nota. Ce polyommate doit être plutôt ici que dans la ſubdiviſion ſuivante, car, comme l'a remarqué Eſper, on aperçoit à certains jours un ſentiment de bandelette blanche ſur le deſſous des ſecondes ailes.

ζ. Deſſous des ailes n'offrant que des taches ocellées.

235. Polyommate Arion.

Polyommatus Arion.

Pol. alis ſuprà obſcurè argenteo-cæruleis, omnium diſco maculis atris poſticarumque limbo ocellato : ſubtùs cinereis, lunulâ centrali ſtrigiſque quatuor è punctis ocellatis; poſticis baſi argenteo-vireſcentibus.

Papilio P. R. Arion, *alis ecaudatis, ſuprà fuſcis, diſco cæruleo maculis atris : ſubtùs canis punctis ocellaribus.* Linn. *Syſt. Nat.* 2. *p.* 789. *n°.* 230. — *Faun. Suec. edit.* 2. *p.* 283. *n°.* 1075.

Papilio P. R. *Arion.* Fab. *Spec. Inſ. tom.* 2. *p.* 122. — *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 71. *n°.* 681.

Heſperia R. *Arion.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 293. *n°.* 118.

Papilio Arion. Wien. *Verz. p.* 182. *fam.* N. *n°.* 3.

Roes. *Inſ. part.* 3. *tab.* 45. *fig.* 3. 4.

Schæff. *Icon. tab.* 98. *fig.* 6.

Naturf. 6. *p.* 7. *n°.* 28.

Papilio Arion. Esp. *Pap. Eur. part.* 1. *tab.* 20. *fig.* 2. — *tab.* 59. *cont.* 9. *fig.* 2. (Var.)

Papilio Arion. Fuessl. *Suiſſ. Inſ. pag.* 31. *n°.* 596.

Papilio Arion. Scop. *Ent. Carn. p.* 177.

Papilio Arion. Petag. *Inſtit. Ent. tom.* 1. *p.* 483. *n°.* 115.

Papilio Arion. Devill. *Ent. Linn. tom.* 2. *p.* 65. *n°.* 119.

Papilio Arion. Herbst, *tab.* 308. *fig.* 7. 8.

Papilio Arion. Lang. *Verz.* 2. *p.* 55. *n°.* 466-471.

Papilio Arion. Illig. *N. Aufg. Deſſ. tom.* 2. *p.* 263. *n°.* 3.

Papilio Arion. Scheid. *Syſt. Beſchr. p.* 261. *n°.* 161.

Papilio Arion. Hufnag. *Tabell. im. Berl. Magaz. tom.* 2. *p.* 70. *n°.* 28.

Papilio Arion. Borkh. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 167 & 280. *n°.* 1. — *part.* 2. *p.* 232.

Papilio Arion. Borkh. *Rhein. Magaz. tom.* 1. *p.* 281. *n°.* 83.

Papilio Arion. Bergstr. *Nomenkl. tab.* 24. *fig.* 5. 6. — *tab.* 51. *fig.* 5. 6.

Papilio Telejus. Bergstr. *Nomenkl. tab.* 43. *fig.* 4.

Papilio Telegonus. Bergstr. *Nomenkl. tab.* 44. *fig.* 2.

Papilio Arion. Hubn. *Pap. tab.* 54. *fig.* 254-256.

Papilio Arion. Oschen. *Pap. Eur. tom.* 1.

Suite de l'Argus bleu, à bandes brunes. Engram. *Pap. d'Europe, tom.* 1. *p.* 78. *pl.* 41. *fig.* 86. d-f.

Polyommate Arion. Latr. *nouv. Dict. d'Hiſt. nat.* 2e. *édit. tom.* 27. *p.* 499.

Polyommate Arion. God. *Hiſt. nat. des lépid. de France, tom.* 1. *p.* 219. *pl.* 11. *fig.* 2. & *pl.* 11 *quart. fig.* 1.

Polyommate Arion. God. *Tabl. méthod. des lépid. de France,* Diurnes, *p.* 58. *n°.* 168.

Il a près d'un pouce & demi d'envergure. Le deſſus des deux ſexes eſt d'un bleu-argenté-obſcur, bordé de brun, avec des taches noires diſcoïdales aux ailes ſupérieures du mâle, & aux quatre ailes de la femelle. La bordure des ailes inférieures eſt en outre ſurmontée d'une ſérie de points noirs à iris blanchâtre.

Le deſſous eſt cendré, avec quatre rangées de points oculaires & une lunule centrale noires, & un entrecoupé brun ſur la frange. La baſe des ſecondes ailes eſt d'un vert-argentin ſur lequel on remarque un point noir, ſolitaire.

Chez la femelle, les taches noires diſcoïdales du deſſus des premières ailes ſont beaucoup plus groſſes que chez le mâle.

Il ſe trouve, en juillet, dans beaucoup de contrées de l'Europe. Il aime les lieux ſecs & couverts de bruyères. Nous l'avons pris ſouvent aux environs de Paris, & particulièrement aux bois de Verrières & de Ville-d'Avray.

236. Polyommate Alcon.

Polyommatus Alcon.

Pol. alis ſuprà obſcurè violaceo-cœruleis, limbo lato fuſco : ſubtùs cinereis, lunulâ mediâ ſtrigiſque tribus è punctis ocellaribus nigris ; poſticis à baſi ad diſcum argenteo-vireſcentibus.

Papilio P. R. Alcon, mas, *alis integerrimis, cœruleis, margine fuſco : ſubtùs fuſco-cinereis, punctis numeroſis ocellaribus.* Fab. *Mant. Inſ. tom. 2. p. 72. n°.* 683.

Heſperia R. *Alcon*, mas. Fab. *Ent. Syſt. em. tom. 3. pars 1. p.* 293. *n°.* 120.

Papilio Alcon. Wien. *Verz. p.* 182. *fam.* N. *n°.* 4.

Papilio Alcon. Illig. *N. Aufg. Deſſ. tom.* 2. *p.* 263. *n°.* 4.

Papilio Alcon. Lang. *Verz. 2. p.* 55. *n°.* 472-475.

Papilio Alcon. Petagn. *Inſtit. Entom. tom.* 1. *p.* 483. *n°.* 116.

Papilio Alcon. Herbst, *tab.* 311. *fig.* 6-8.

Papilio Alcon. Hubn. *Pap. tab.* 55. *fig.* 263-265.

Papilio Alcon. Ochsen. *Pap. Eur. tom.* 1.

Zephyrus Alcon, div. 3. (Cyanires). *n°.* 4. J. W. Dalman, *Extrait des Mémoires de l'Académie de Stockholm, année* 1816.

Papilio Alcon. Borkh. *Rhein. Magaz. tom.* 1. *p.* 282. *n°.* 84.

Papilio Diomedes. Borkh. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 169 & 281. *n°.* 3. — *part.* 2. *p.* 283.

Papilio Arcas. Esp. *Pap. Eur. part.* 1. *tab.* 34. *Suppl.* 10. *fig.* 4. 5.

Papilio Arcas. Schneid. *Syſt. Beſchr. p.* 262. *n°.* 162.

Papilio Arcas. Devill. *Ent. Linn. tom.* 2. *p.* 75. *n°.* 140.

Papilio Arcas. Bergstr. *Nomenkl. tab.* 51. *fig.* 3. 4. — *tab.* 57. *fig.* 7. 8.

Papilio Telejus. Bergstr. *Nomenkl. tab* 43. *fig.* 6.

Papilio Mamers. Bergstr. *Nomenkl. tab.* 59. *fig.* 1. 2.

Suite de l'Argus bleu, à bandes brunes. Engram. *Pap. d'Europe, tom.* 1. *pl.* 41. *fig.* 86. I. K.

Le Protée. Engram. *Pap. d'Europe, pl.* 83. *Suppl.* 2. *pl.* 4. *fig.* 80. a. b. c. d. *tert.*

Latr. *nouv. Dict. d'Hiſt. nat.* 2°. *édit. tom.* 27. *p.* 500.

Polyommate Alcon. God. *Hiſt. nat. des lépid. de France, tom.* 2. *p.* 205. *pl.* Z-XXVI. *fig.* 1. 2.

Polyommate Alcon. God. *Tabl. méthod. des lépid. de France*, Diurnes, *p.* 58. *n°.* 169.

Il a preſque dix-huit lignes d'envergure. Le deſſus du mâle eſt d'un bleu-violet-obſcur, avec une bordure brune aſſez large aux quatre ailes, & un arc noir au centre des ſupérieures.

Le deſſus de la femelle eſt d'un brun-noirâtre, avec la baſe un peu bleuâtre. La frange eſt entrecoupée de blanc & de brun chez les deux ſexes.

Le deſſous de toutes les ailes, dans le mâle & dans la femelle, eſt cendré, avec une lunule centrale, puis trois rangées de points oculaires, noires. Les points de la rangée antérieure ſont plus ronds & un peu plus gros que ceux des deux rangées poſtérieures. Indépendammeut de cela, les ailes inférieures ont la baſe d'un blanc-verdâtre qui s'étend juſqu'au diſque, & ſur lequel ſont trois autres points noirs ocellés.

Se trouve, au mois de juillet, aux environs de Lyon & en Allemagne.

237. Polyommate Euphémus.

Polyommatus Euphemus.

Pol. alis ſuprà violaceo-cœruleſcentibus, maris *immaculatis*, fœminæ *limbo lato fuſco anticarumque diſco punctis nigricantibus : ſubtùs cinereis, lunulâ mediâ ſtrigiſque duabus è punctis ocellaribus nigris.*

Papilio P. R. Argiades, *alis integerrimis, cœruleis, margine nigricante : ſubtùs fuſco-cinereis, lunulâ mediâ ſtrigiſque duabus punctorum ocellatorum.* Fab. *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 76. *n°.* 698.

Heſperia R. *Argiades.* Fab. *Ent. Syſt. e m tom.* 3. *pars* 1. *p.* 300. *n°.* 138.

Heſperia R. Alcon, fœm. Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 293. *n°.* 120.

Papilio P. R. *Argiades.* Petag. *Inſtit. Entom. tom.* 1. *p.* 489. *n°.* 130.

Papilio Diomedes. Naturf. 6. *p.* 26. *n°.* 14.

Papilio Diomedes. Borkh. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 169 & 281. *n°.* 3. — *part.* 2. *p.* 233.

Papilio Arctophylax. Bergstr. *Nomenkl. tab.* 51. *fig.* 1. 2.

Papilio Arctophonus. Bergstr. *Nomenkl. tab.* 53. *fig.* 7. 8. *tab.* 59. *fig.* 3. 4.

Papilio Euphemus. Herbst, *tab.* 309. *fig.* 1-3.

Papilio Euphemus. Hubn. *Pap. tab.* 54. *fig.* 257-259.

Papilio Euphemus. Ochsen. *Pap. Eur. tom.* 1.

Polyommate Euphémus. Latr. *nouv. Dict. d'Hist. nat.* 2e. *édit. tom.* 27. *p.* 499.

Polyommate Euphémus. God. *Hist. nat. des lépid. de France, tom.* 1. *p.* 221. *pl.* 11 *fecund. fig.* 6. *& pl.* 11 *quart. fig.* 2.

Polyommate Euphémus. God. *Tabl. méthod. des lépid. de France,* Diurnes, *p.* 58. *n°.* 170.

Suivant nous, l'*Argiades* de Fabricius & son *Alcon* femelle doivent être rapportés à l'*Euphémus*, le premier comme mâle & le second comme femelle, attendu qu'ils en ont absolument tous les caractères.

L'Euphémus a de seize à dix-huit lignes d'envergure. Le dessus du mâle est d'un bleu-violet-pâle, avec le bord postérieur liseré de noirâtre & entièrement cilié de blanc.

Le dessus de la femelle est à peu près du même bleu que chez le mâle, avec une large bordure brune aux quatre ailes, & quelques points noirâtres sur le disque des supérieures.

Le dessous des deux sexes est cendré, avec une lunule centrale, & deux rangées courbes de points oculaires, noires. Les secondes ailes ont deux autres points & un tant soit peu de vert à la base.

Il habite les clairières un peu humides des bois. Nous l'avons trouvé aux environs de Paris, & particulièrement à Saint-Germain-en-Laye.

238. Polyommate Erèbus.

Polyommatus Erebus.

Pol. alis maris *supra violaceo-cæruleis strigâ maculari margineque nigris*, fœminæ *fuscis : subtùs fuscis, strigâ angulatâ è punctis ocellaribus nigris.*

Papilio Erebus, *alis integerrimis, supra cæruleis* (fœminæ *fuscis*) *fimbriâ fasciâque arcuatâ è punctis cuneiformibus nigris : subtùs brunneis ordine oculorum septem ungulari.* Esp. *Pap. Eur. part.* 1. *tab.* 101. *cont.* 56. *fig.* 1. 2.

Papilio Erebus, *alis integerrimis, fuscis : subtùs pallidoribus, anticis ocellis sex, posticis septem ordine angulari dispositis.* Knoch, *Beytr.* 2. *p.* 93. *tab.* 6. *fig.* 6. 7.

Papilio P. R. Erebus, *alis integerrimis, fuscis : omnibus subtùs strigâ punctorum ocellatorum.* Fab. *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 72. *n°.* 682.

Hesperia R. *Erebus.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 295. *n°.* 119.

Papilio Erebus. Schneid. *Syst. Beschr. p.* 264. *n°.* 165.

Papilio Erebus. Lang. *Verz.* 2. *p.* 56. *n°.* 476-479.

Papilio Erebus. Hubn. *Pap. tab.* 55. *fig.* 260-262.

Papilio Erebus, *alis integris, fuscis* (*disco maris cæruleo*) : *subtùs fuscis strigâ punctorum ocellatorum.* Ochsen. *Pap. Eur. tom.* 1.

Papilio Arcas. Borkh. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 169 & 281. — *part.* 2. *p.* 255.

Papilio Arcas. Borkh. *Rhein. Magaz. tom.* 1. *p.* 282. *n°.* 85.

Papilio Arcas. Naturf. 6. *p.* 25. *n°.* 13.

Papilio Nausithous. Bergstr. *Nomenkl. tab.* 43. *fig.* 1-3.

Argus bleu à bandes brunes. Engram. *Pap. d'Europe, tom.* 1. *p.* 177. *pl.* 40. *fig.* 86. a. b. c.

Polyommate Erèbe. Latr. *nouv. Dict. d'Hist. nat.* 2e. *édit. tom.* 27. *p.* 500.

Il a environ dix-huit lignes d'envergure. Le dessus du mâle est d'un bleu-violâtre, avec les nervures, une rangée transverse de taches triangulaires & une large bordure, noires.

Le dessus de la femelle est d'un brun-noirâtre, avec la frange un peu plus claire.

Le dessous des deux sexes est d'un brun moins foncé que le dessus de la femelle, avec une ligne anguleuse de points noirs foiblement ocellés.

Engramelle a pris la femelle pour le mâle, & celui-ci pour une variété de la femelle.

Il se trouve en Allemagne, & principalement aux environs de Leipsick, dans les mois de juillet & d'août.

239. Polyommate Iolas.

Polyommatus Iolas.

Pol. alis supra violaceo-cæruleis, nitidis, fimbriâ albâ (fœminæ *margine lato fusco*) : *subtùs carneo-cinereis, arcu medio strigâque incurvâ è punctis ocellaribus; posticis lunulis tribus anguli ani nigris.*

Lycæna Iolas, *alis integris, cæruleis,* mari *immaculatis,* fœminæ *fuscis disco cæruleo : subtùs cinereis, lunulâ mediâ strigâque punctorum nigrorum ocellarium.* Ochsen. *Pap. Eur. tom.* 4. *p.* 144. *n°.* 3.

Ce polyommate est jusqu'ici le plus grand que nous ayons en Europe. Il a de vingt à vingt-deux lignes d'envergure. Le dessus des ailes est d'un bleu-violet-luisant, avec un simple liseré noir dans le mâle, avec toute la côte & l'extrémité largement bordées de brun-noirâtre dans la femelle. Les deux sexes ont la frange entièrement blanche, &, chez la femelle, la bordure des secondes ailes se termine à l'angle anal par trois taches noires un peu ocellées.

Le dessous des quatre ailes, dans l'un & dans l'autre sexe, est d'un cendré légèrement incarnat, avec un arc central, & une rangée courbe de

points oculaires, noirs. Les secondes ailes ont en outre la base un peu verdâtre, avec deux points semblables à ceux dont il vient d'être question, & leur angle anal offre trois lunules noires bordées de blanchâtre & s'alignant avec d'autres lunules foiblement obscures qui se continuent sur le bord postérieur des premières ailes.

Le corps est bleuâtre en dessus, cendré en dessous. Les antennes sont noires, annelées de blanc, &, ce qui est assez remarquable, c'est qu'elles ont aussi l'extrémité blanche.

Découvert il y a quelques années près de Bude en Hongrie, & décrit d'après les deux sexes qui nous ont été envoyés par M. Franck, savant amateur de Strasbourg. M. Latreille possède un mâle pris en Dalmatie par M. le baron Dejean, & M. Duponchel a vu à Rome dans la collection de M. le pharmacien Rolli des individus trouvés aux environs de cette ville.

240. Polyommate Lysimon.

Polyommatus Lysimon.

Pol. alis supra violaceo-cæruleis, nitidis, limbo fusco fimbriâque variegatâ : subtùs cinereis, basi & disco punctis ocellaribus nigris, apice lunulis fuscis in duplici serie.

Papilio Lysimon, *alis integerrimis, fuscis, disco* (maris) *cæruleo : subtùs cinereis, punctis ocellaribus numerosis.* Ochsen. *Pap. Eur. tom.* 1.

Papilio Lysimon. Hubn. *Pap. tab.* 103. *fig.* 334. 335. (Mas.)

Papilio Lysimon. Illig. *Magaz. tom.* 3. *p.* 197.

Papilio P. R. Oitis, *alis integerrimis, fuscis, basi cæruleis : subtùs cinereis ; anticis puncto medio strigâque, posticis punctis numerosis ocellatis.* Fab. *Mant. Ins. tom.* 2. *p.* 73. *n°.* 689. An fœmina ?

Hesperia R. *Oitis.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 296. *n°.* 127. An fœmina ?

Il a environ dix pouces d'envergure. Le dessus du mâle est d'un bleu-violet-luisant, avec une bordure assez large d'un brun-noirâtre, & la frange variée de blanc & de brun.

Le dessus de la femelle est d'un brun-noirâtre, avec la base d'un bleu-violet-luisant, & la frange comme chez le mâle.

Le dessous des quatre ailes est cendré dans les deux sexes, avec des points noirs à la base ainsi qu'au-delà du milieu, & deux séries marginales de lunules obscures, bordées de blanc comme les points. Il y a en outre au centre de chaque aile une lunule semblable, qui se fait plus ou moins sentir en dessus. Les points basilaires sont au nombre de deux aux ailes supérieures, au nombre de quatre ou de cinq aux inférieures. Les points ultramédiaires forment une rangée courbe, mais dans la rangée des secondes ailes, les trois points antérieurs sont plus éloignés l'un de l'autre que les quatre suivans. Pour ne point donner prise aux *faiseurs d'espèces*, il est peut-être nécessaire de dire que les lunules de la série intérieure des quatre ailes sont plus chevronnées que celles de la série extérieure, & que dans cette dernière série les trois lunules anales des secondes ailes sont ordinairement plus colorées que les autres.

Il se trouve au Bengale, à l'Ile-de-France, en Egypte & dans la péninsule espagnole.

Nota. Le papillon *Oitis* de Fabricius ressemble en dessus à la femelle du *Lysimon*, mais il paroît en différer en dessous par l'absence des points basilaires & des lunules marginales des ailes supérieures. Ces caractères n'étoient-ils pas effacés dans l'individu chimois décrit par Fabricius? Nous avons vu des *Lysimons* où ils étoient déjà presque nuls.

241. Polyommate Hylax.

Polyommatus Hylax.

Pol. alis integerrimis, supra fuscis, immaculatis : subtùs cinereis nigro punctatis. Fab.

Papilio P. R. *Hylax.* Fab. *Mant. Ins. tom.* 2. *p.* 77. *n°.* 709.

Hesperia R. *Hylax.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 304. *n°.* 152.

Papilio Hylax. Donow. *of an Epit. of the Nat. Hist. Ins. of India, cah.* 6. *pl.* 1. *fig.* 2.

Il est très-petit. Les antennes sont annelées de blanc & de brun. Les ailes sont arrondies, brunes & sans taches en dessus. Elles sont cendrées en dessous, avec des points noirs & des arcs postérieurs obscurs.

Des Indes orientales.

(*Traduction de Fabricius.*)

Nota. Ce polyommate n'est peut-être qu'une femelle plus petite du *Lysimon*, & chez laquelle le bleu de la base du dessus des ailes a disparu. Mais on est forcé de rester dans le doute d'après la description vague de Fabricius. Comment en effet savoir si les points du dessous sont ocellés ou simples, & si les lunules marginales forment deux rangs ou un seul ?

242. Polyommate Cajus.

Polyommatus Cajus.

Pol. alis integerrimis, fuscis, disco cæruleo-cente : subtùs cinereo alboque varius, punctis ocellaribus fuscis. Fab.

Hesperia R. *Cajus.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 296. *n°.* 126.

Papilio Lajus. Cram. *pl.* 319. *fig.* D. E.

Fabricius le décrit ainſi : il eſt petit. Le deſſus des ailes eſt d'un brun-noirâtre, avec le diſque des quatre d'un bleu-violet-pâle, & le limbe poſtérieur des inférieures chargé d'un rang de points noirs un peu ocellés.

Le deſſous eſt cendré, varié de blanc, avec des points noirs oculaires, bien diſtincts.

Des Indes orientales.

Nota. A en juger par la figure de Cramer, à laquelle Fabricius renvoie, le deſſous de ce polyommate diffère principalement du deſſous de notre *Lyſimon*, en ce que ſes premières ailes ſont ſans points à la baſe; en ce que les deux points antérieurs de la rangée ultramédiaire des ſecondes ſont adhérens, tandis que les deux qui viennent enſuite ſont groupés en arrière des autres, ſur un eſpace plus obſcur que le reſte de la ſurface.

243. Polyommate Phérétès.

Polyommatus Pheretes.

Pol. alis maris *ſuprà violaceo-cœruleis*, fœminæ *fuſcis, fimbriâ albâ : ſubtùs vireſcenti-cinereis; anticis lunulâ centrali ſtrigâque incurvâ è punctis ocellaribus nigris; poſticis maculis albis in ſerie duplici.*

Papilio Pheretes. Ochsen. *Pap. Eur. tom.* 1.

Papilio Atys. Hubn. *Pap. tab.* 97. *fig.* 495. 496. (Le mâle.) — *tab.* 107. *fig.* 548. 549. (La femelle.)

Polyommate Atys. Latr. *nouv. Dict. d'Hiſt. nat. 2e. édit. tom.* 27. *p.* 498.

Polyommate Phérétès. God. *Hiſt. nat. des lépid. de France, tom.* 2. *p.* 202. *pl.* Y-XXV. *fig.* 5. 6.

Polyommate Phérétès. God. *Tabl. méthod. des lépid. de France*, Diurnes, *p.* 58. *n°.* 167.

Il a approchant un pouce d'envergure. Le deſſus du mâle eſt d'un bleu-violet, avec un liſeré noir au bord poſtérieur.

Le deſſus de la femelle eſt d'un brun-noirâtre, avec la baſe ſaupoudrée de bleu. Dans l'un & dans l'autre ſexe, la frange eſt toute blanche.

Le deſſous des premières ailes, chez le mâle comme chez la femelle, eſt d'un cendré-clair, lavé de verdâtre le long de la côte, avec une ligne centrale, puis une ligne courbe de points oculaires, noires. Les points manquent quelquefois en totalité ou en partie, même dans les individus les mieux conſervés.

Le deſſous des ſecondes ailes eſt d'un cendré un peu obſcur, avec la baſe bleuâtre, & huit à neuf taches blanches orbiculaires & inégales. Ces taches forment deux ſéries tranſverſales, dont l'antérieure ſur le milieu de la ſurface, l'autre à égale diſtance de la précédente & du bord terminal.

Il ſe trouve dans les Alpes.

244. Polyommate Cyllarus.

Polyommatus Cyllarus.

Pol. alis ſuprà violaceo-cœruleis, margine nigro : ſubtùs dilutè cinereis, ſtrigâ è punctis ocellaribus nigris; poſticis à baſi ultrà medium argenteo-vireſcentibus.

Papilio P. R. Cyllarus, *alis integris, cœruleis, margine nigro : ſubtùs fuſco cinereis, ſtrigâ punctorum ocellatorum; poſticis baſi cœruleis.* Fab. *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 72. *n°.* 685.

Heſperia R. *Cyllarus.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 294. *n°.* 122.

Papilio Cyllarus. Esp. *Pap. Eur. part.* 1. *tab.* 33. *Suppl.* 9. *fig.* 1. 2.

Papilio Cyllarus. Rossi, *Mant. tom.* 2. *p.* 12. *n°.* 356.

Papilio Cyllarus. Petag. *Inſtit. Entom. tom.* 1. *p.* 484. *n°.* 118.

Papilio Cyllarus. Devill. *Ent. Linn. tom.* 2. *p.* 74. *n°.* 135.

Papilio Cyllarus. Naturf. 6. *p.* 20. *n°.* 7.

Papilio Cyllarus. Schneid. *Syſt. Beſchr. p.* 267. *n°.* 166.

Papilio Cyllarus. Lang. *Verz.* 2. *p.* 56. *n°.* 483-485.

Papilio Cyllarus. Brahm. *Inſ. Kalend. p.* 297. *n°.* 187.

Papilio Cyllarus. Schwarz, *Raupenkal. pag.* 628 & 747.

Papilio Cyllarus. Borkh. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 176 & 283. *n°.* 9. — *part.* 2. *p.* 234.

Papilio Dymus. Borkh. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 177. *n°.* 10.

Papilio Damoetas. Borkh. *Rhein. Magaz. tom.* 1. *p.* 283. *n°.* 88.

Papilio Dymus. Borkh. *Rhein. Magaz. tom.* 1. *p.* 284. *n°.* 89.

Papilio Cyllarus. Herbst, *tab.* 309. *fig.* 7-9.

Papilio Dymus. Herbst, *tab.* 309. *fig.* 10. 11.

Papilio Cyllarus. Bergstr. *Nomenkl. tab.* 55. *fig.* 1. 2.

Papilio Bronte. Bergstr. *Nomenkl. tab.* 56. *fig.* 7. 8.

Papilio Phobos. Bergstr. *Nomenkl. tab.* 54. *fig.* 7. 8.

Papilio Dimus. Bergstr. *Nomenkl. tab.* 43. *fig.* 7. 8.

Papilio Damoctas. Wien. *Verz. p.* 183. *ſum.* N. *n°.* 7.

Papilio Damoetas. Illig. *N. Aufg. Deſſ. tom. 2. p. 265. n°. 7.*

Papilio Damoetas. Hubn. *Pap. tab. 56. fig. 266-268.*

Papilio Damoetas. Ochsen. *Pap. Eur. tom. 1.*

Papilio Alexis. Poda, *Muſ. Græc. pag. 77. n°. 47.*

Suite de l'Argus bleu. Engram. *Pap. d'Europe, tom. 1. p. 178. pl. 41. fig. 86. fig. o.*

Polyommate Cyllare. Latr. *nouv. Dict. d'Hiſt. nat. 2°. édit. tom. 27. p. 501.*

Polyommate Cyllarus. God. *Hiſt. natur. des lépid. de France, tom. 1. pag. 222. pl. 11. & pl. 11 quart. fig. 3.*

Polyommate Cyllarus. God. *Tabl. méthod. des lépid. de France,* Diurnes, *p. 59. n°. 171.*

Il a à peu près quinze lignes d'envergure. Le deſſus des deux ſexes eſt d'un bleu-violet, avec une bordure noire, très-étroite dans le mâle, avec le ſommet des quatre ailes d'un brun-noirâtre dans la femelle.

Le deſſous eſt d'un cendré-clair, avec une rangée courbe de points noirs ocellés. Les points des ailes ſupérieures ſont plus gros & précédés d'un arc central noir. La baſe des ailes inférieures eſt d'un vert-argenté qui s'étend juſqu'au-delà du milieu, & elle offre un point noir placé près de la côte.

La chenille, ſelon M. Ochſenheîmer, eſt pubeſcente, d'un vert-jaunâtre, avec une ligne rougeâtre le long du dos, & des traits obliques d'un vert-obſcur ſur chaque côté. Sa tête & ſes pattes écailleuſes ſont noires; ſes pattes membraneuſes ſont d'un vert plus foncé que le corps. Elle paſſe l'hiver, & elle vit ſur pluſieurs *aſtragales*, ſur le *mélilot*, le *genêt herbacé*.

La chryſalide eſt brunâtre.

On trouve ce papillon, vers la fin de juin, dans les bois & les prairies de l'Europe. Il habite les environs de Paris.

245. Polyommate Acis.

Polyommatus Acis.

Pol. alis maris *ſuprà cœruleſcenti-violaceis margine nigro*, fœminæ *fuſcis: ſubtùs obſcurè cinereis, lunulâ mediâ ſtrigâque è punctis ocellaribus nigris.*

Papilio P. R. Argiolus, *alis ecaudatis (integris), ſuprà cæruleis, margine nigris: ſubtùs fuſco-cinereis, ſtrigâ punctorum ocellatorum.* Fab. *Mant. Inſ. tom. 2. p. 73. n°. 686.*

Heſperia R. *Argiolus.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom. 3. pars 1. p. 295. n°. 123.*

Papilio Argiolus. Esp. *Pap. Eur. tab. 21. fig. 1. a. b.*

Papilio Argiolus. Devill. *Ent. Linn. tom. 2. p. 67. n°. 12.*

Papilio Argiolus. Petag. *Inſtit. Entom. tom. 1. p. 484 n°. 119.*

Papilio Argiolus. Fuessl. *Suiſſ. Inſ. pag. 31. n°. 598.*

Roes. *Inſ. part. 3. tab. 37. fig. 4.*

Schæff. *Icon. tab. 185. fig. 1. 2.*

Papilio Argiolus. Hubn. *Pap. tab. 56. fig. 269-271.*

Papilio Argiolus. Schneid. *Syſt. Beſchr. p. 269. n°. 168.*

Papilio Bizas. Bergstr. *Nomenkl. tab. 48. fig. 5. 6.* (Le mâle.)

Papilio Bize. Bergstr. *Nomenkl. tab. 48. fig. 7. 8.* (La femelle.)

Papilio Argopoeus. Bergstr. *Nomenkl. tab. 52. fig. 7. 8.*

Papilio Bizenus. Bergstr. *Nomenkl. tab. 57. fig. 1. 2.*

Papilio Bizene. Bergstr. *Nomenkl. tab. 57. fig. 3. 4.*

Papilio Damoetas. Bergstr. *Nomenkl. tab. 57. fig. 5. 6.*

Papilio Argopoei. Bergstr. *Nomenkl. tab. 61. fig. 5. 6.*

Papilio Acis. Lang. *Verz. 2. p. 56. n°. 486-489.*

Papilio Acis. Wien. *Verz. p. 182. ſum.* N. *n°. 5.*

Papilio Acis. Illig. *N. Aufg. Deſſ. tom. 2. p. 264. n°. 5.*

Papilio Acis. Herbst, *tab. 310. fig. 1-3.*

Papilio Acis. Borkh. *Rhein. Magaz. tom. 1. p. 283. n°. 86.*

Papilio Acis. Ochsen. *Pap. Eur. tom. 1.*

Papilio Semiargus. Borkh. *Pap. Eur. part. 1. p. 172 & 282. n°. 7. — part. 2. p. 234.*

Papilio Semiargus. Nature. *6. p. 20. n°. 6.*

Le Demi-Argus. Geoff. *Hiſt. Inſ. tom. 2. p. 63. n°. 31.*

Le Demi-Argus. Engram. *Pap. d'Europe, tom. 1. p. 181. pl. 42. fig. 88. a-d.*

Polyommate Demi-Argus. Latr. *nouv. Dict. d'Hiſt. nat. 2°. édit. tom. 27. p. 501.*

Polyommate Acis. God. *Hiſt. nat. des lépid. de France, tom. 1. p. 224. pl. 11 ſecund. fig. 7. & pl. 11 quart. fig. 4.*

Polyommate Acis. God. *Tabl. méthod. des lépid. de France*, Dubnes, *p.* 59. *n°.* 173.

Il a environ un pouce d'envergure. Le deſſus du mâle eſt d'un violet-bleuâtre, avec une légère bordure noire & la frange blanche.

Le deſſus de la femelle eſt d'un brun-noirâtre, avec la baſe faiblement ſaupoudrée de bleu & la frange grisâtre.

Le deſſous des deux ſexes eſt d'un cendré-obſcur, avec une lunule centrale, & une rangée de points oculaires, noirs. La baſe des ſecondes ailes eſt en outre un peu bleuâtre & marquée d'un point oculaire.

On le trouve en juillet & en août, dans les prairies & dans les bois de l'Europe. Il eſt très-commun aux environs de Paris.

246. Polyommate Alſus.

Polyommatus Alſus.

Pol. alis ſupra ſuſcis, nitidis, (mavis *cæruleo pulverulentis*) *; fabiis cærulescendi cinereis, lunulâ mediâ ſtrigâque è punctis ocellaribus nigris.*

Papilio P. R. Alſus, *alis integerrimis, ſuſcis, immaculatis : fabiis cinereis, ſtrigæ punctorum ocellatorum.* Fab. *Mant. Inſ. tom. 2. p. 70. n°.* 688.

Heſperia R. *Alſus.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. 295. *n°.* 125.

Papilio Alſus. Wien. *Verz. p.* 184. *fam.* N. *n°.* 9.

Papilio Alſus. Brahm. *Inſ. Kalend. part.* 1. *p.* 510. *n°.* 196.

Papilio Alſus. Lang. *Verz. 2. p.* 58. *n°.* 495-496.

Papilio Alſus. Illig. *N. Aufg. Deſſ. tom.* 2. *p.* 260. *n°.* 9.

Papilio Alſus. Herbst, *Pap. tab.* 311. *fig.* 3.

Papilio Alſus. Esper. *Icon. t.ib.* 165. *fig.* 1. 2.

Papilio Alſus. Petag. *Inſtit. Latom. tom.* 1. *p.* 421. *n°.* 121.

Papilio Alſus. Ochsen. *Pap. Eur. tom.* 1.

Papilio Alſus. Hubn. *Pap. tab.* 58. *fig.* 278. 279.

Papilio Minimus. Esp. *Pap. Eur. part.* 1. *Suppl.* 10. *fig.* 3.

Papilio Argus minutus. Esp. *tab.* 106. *cont.* 61. *fig.* 8.

Papilio Minimus. Devill. *Ent. Linn. tom.* 2. *p.* 75. *n°.* 159.

Papilio Minimus. Fuessl. *Suiſſ. Inſ. p.* 31. *n°.* 509.

Papilio Minimus. Schneid. *Syſt. Beſchr. p.* 270. *n°.* 169.

Papilio Alſus. Borkh. *Rhein. Magaz. tom.* 1. *p.* 265. *n°.* 90.

Papilio Pſeudolus. Borkh. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 177 & 284. — *part.* 2. *p.* 255. *n°.* 11.

Papilio Pſeudolus. Bergstr. *Nomenkl. tab.* 30. *fig.* 5. 6.

Le Demi-Argus, var. Engram. *Pap. d'Europe, tom.* 1. *p.* 181. *pl.* 42. *fig.* 83. e. f.

Polyommate Alſus. Latr. *nouv. Dict. d'Hiſt. nat. 2e. édit. tom.* 27. *p.* 501.

Polyommate Alſus. God. *Hiſt. nat. des lépid. de France, tom.* 2. *p.* 206. *pl. Z-XXVI. fig.* 5. 6.

Polyommate Alſus. God. *Tabl. méthod. des lépid. de France*, Dubnes, *p.* 60. *n°.* 174.

C'eſt le plus petit des polyommates de l'Europe. Le deſſus des ailes eſt d'un brun-noirâtre-chatoyant, ſans taches dans la femelle, avec des atomes bleus très-clair-ſemés dans le mâle.

Le deſſous eſt d'un cendré-bleuâtre, avec une lunule centrale, & une rangée de points oculaires, noirs. Les ſecondes ailes offrent à la baſe deux autres points ſemblables, & l'on aperçoit quelquefois à leur extrémité des veſtiges de taches obſcures. La frange en dentelle par une ligne brune paraît y être tracée au bord de chaque aile.

L'*Argus minutus* d'Esper paroît n'en être qu'une variété.

Un mai & en juillet, dans pluſieurs parties de la France.

GENRE BARBICORNE.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes sétacées, plumeuses. Palpes s'élevant à peine au-delà du chaperon. Ailes inférieures ayant la cellule discoïdale ouverte, le bord interne concave et replié.

Nota. Ce nouveau genre, distinct de tous les précédens, et rapproché des *Uranies* par ses antennes sétacées, fait le passage de la tribu des Papillonides à celle des Hespérides.

ESPÈCE.

Ailes supérieures alongées. Les inférieures terminées en dehors par une queue assez longue et légèrement en spatule.

1. Barbicorne Basilis.

Ailes entières, semblables de part et d'autre, noires : supérieures avec deux bandes, inférieures avec une seule et un point, fauves.

1. BARBICORNE Basilis.

BARBICORNIS Basilis.

Barb. alis integris, concoloribus, nigris : anticis fasciis duabus, posticis unicâ punctoque fulvis.

Il a un peu plus d'un pouce & demi d'envergure. Ses ailes sont noires de part & d'autre, avec deux bandes fauves obliques aux premières, & une bande longitudinale de cette couleur près du bord interne des secondes. Ces dernières ailes ont en outre un point fauve à l'origine de la queue. Le corps & les antennes sont noirs.
Du Brésil.

TRIBU SECONDE (1).

HESPÉRIDES. *Hesperides.*

Six pieds ambulatoires dans tous. Côté interne des ailes inférieures toujours plissé. Jambes postérieures ayant deux paires d'ergots (ou d'épines), l'une, ou l'ordinaire, au bout, & l'autre près du milieu de leur côté interne; extrémité de la masse des antennes presque toujours très-crochue ou arquée. (Ailes inférieures souvent presque horizontales dans le repos, les supérieures seules élevées; cellule discoïdale des inférieures ouverte.)

Après avoir d'abord suivi Linné à l'égard de son genre *Papilio*, Fabricius se détermina, dans son *Entomologie systématique*, à en séparer, sous le nom générique d'*Hesperia*, les espèces de sa dernière division, les plébéiens, & de même que dans la méthode de son maître, ces hespéries furent partagées en ruricoles & en urbicoles. J'ai formé avec les premières les genres Erycine & Polyommate. Celui d'Hespérie n'a plus compris que les secondes ou les urbicoles. Outre que les chenilles des Hespéries diffèrent de celles des autres diurnes par leurs habitudes, ces lépidoptères sont les seuls qui, ainsi que les crépusculaires & les nocturnes, aient deux paires d'épines ou d'ergots à leurs jambes postérieures. Déjà encore, dans un certain nombre d'espèces, le port d'ailes n'est plus le même que celui des autres diurnes; les inférieures, dans le repos, sont presque horizontales, & forment avec les supérieures, qui sont relevées, sans être cependant tout-à-fait perpendiculaires, un angle plus ou moins ouvert.

Linnæus, faisant allusion à des espèces de bombyx, a quelquefois signalé ce port par les expressions d'*ailes renversées* ou *débordantes*, mais le plus souvent par celles d'*ailes divariquées* ou *divergentes*. Tels sont aussi les termes dont s'est servi Fabricius dans les mêmes circonstances. Geoffroy a distingué ces lépidoptères sous la dénomination d'*estropiés*; celle d'*ailes en chevron* ou *chevronnées* me paroîtroit plus convenable. Les supérieures au moins étant toujours élevées au-dessus du plan de position, & les inférieures n'ayant point, près de l'origine de leur bord extérieur, de frein ou de crochet, les hespéries ne peuvent être confondues avec les castnies, dont elles se rapprochent le plus, ni avec les sphinx & autres lépidoptères crépusculaires; mais les uranies de Fabricius leur ressemblent sous ce rapport, ainsi qu'à l'égard du nombre des ergots des jambes postérieures. Ces deux genres doivent donc être réunis dans une coupe particulière & faisant le passage des diurnes aux crépusculaires : c'est ma tribu des hespérides. La nature semble nous préparer à ces changemens, par la modification de formes qu'elle a fait subir aux chenilles & aux chrysalides des polyommates.

Les auteurs du Catalogue systématique des lépidoptères des environs de Vienne ont eu néanmoins une opinion bien opposée, quant au rapprochement de ces genres, puisqu'ils ouvrent la famille des lépidoptères diurnes par nos hespéries, nos parnassiens, les thais, &c., & qu'ils la terminent par nos polyommates & un genre de névroptères (ascalaphe) qui, d'après de fausses apparences, leur avoit paru appartenir à cet ordre d'insectes. Les uranies & les hespéries ayant six pieds ambulatoires & les ailes inférieures plissées à leur côté interne, ainsi que nos papillons proprement dits, il est certain qu'en prenant ces considérations pour fondement de la distribution des lépidoptères diurnes, ces trois genres devroient venir de file, & les caractères naturels exigeroient que l'on passât des papillons aux parnassiens, aux thais, aux piérides & aux coliades. Dès-lors, les polyommates devroient être reportés à l'autre extrémité des diurnes hexapodes. Les érycines, qui ont tant d'affinité avec les polyommates, hieroient ces hexapodes avec les tétrapodes, en commençant par les libythées, les satyres, les brassolides, les morpho, &c.; par la continuation de cette série de rapports, on arriveroit aux héliconies & aux danaïdes, qui deviendroient alors les premiers genres de la tribu des papillonides. Cet ordre ne contrarieroit nullement les rapports que l'on peut déduire de la comparaison des chenilles & des chrysalides; mais il n'en seroit pas ainsi de ceux que nous fournit l'examen de la cellule discoïdale des ailes inférieures, & dont M. Godart, par d'heureuses combinaisons, a si avantageusement profité dans la quatorzième livraison de son *Histoire naturelle des lépidoptères de France*. Notre distribution des genres de la famille des diurnes y est présentée avec les perfectionnemens que nous avons jugés nécessaires, & auxquels il a lui-même contribué par d'intéressantes observations. Mais, comme nous n'avons point la présomption de

(1) Afin d'accélérer la publication de ce demi-volume, je me suis chargé de la rédaction de cette tribu des lépidoptères diurnes; j'en excepte seulement le genre *Uranie* & les *Hespéries d'Europe*. LATREILLE.

croire que cette méthode soit absolument conforme à l'ordre naturel, nous en avons exposé ici une nouvelle, & uniquement établie sur l'étude de l'insecte parfait.

L'uranie *Leilus* est la seule espèce de ce genre dont on ait observé les métamorphoses; encore même, ce que mademoiselle Mérian nous en a appris, est-il très-incomplet. Mais celles de plusieurs hespéries, tant indigènes qu'exotiques (*voyez* Stoll, *Suppl. aux papillons exotiques* de Cramer, & l'*Histoire naturelle des lépidoptères de la Géorgie* par Smith, d'après les dessins & les notes d'Abbot), nous sont bien connues, & l'on ne peut douter que leurs chenilles ne soient des rouleuses ou plieuses de feuilles, habitude exclusivement propre à ce genre de lépidoptères diurnes. Aussi les auteurs du Catalogue systématique des lépidoptères des environs de Vienne en Autriche caractérisent-ils la division du genre Papillon, comprenant les hespéries, & qui, dans leur méthode, est la première, par les expressions suivantes : *larvæ torticiformes*, chenilles semblables à celles des pyrales, ou phalènes *tortrices* de Linné.

Fabricius, dans un nouveau travail sur les lépidoptères, a partagé son genre primitif d'hespérie en plusieurs autres, & celui qu'il désigne ainsi se compose de diverses espèces de polyommates (*Faunus*, *Vulcanus*, *Marsyas*, *Boeticus*, &c.). Ceux qu'il nomme *Thymele*, *Helias* & *Pamphila*, embrassent nos hespéries proprement dites. Malgré tous nos efforts pour améliorer cette coupe, nous n'avons pas encore trouvé le moyen d'en réduire l'étendue & de simplifier son étude, par l'adoption de ces genres & l'introduction de quelques autres. Il nous faut des caractères exacts, faciles & naturels, & malheureusement cet auteur, trop superficiel dans ses observations & trop systématique, ne peut être ici d'aucun secours pour nous. C'est aux naturalistes des contrées équatoriales de l'Amérique, ou à ceux qui y feront un long séjour, qu'il est peut-être exclusivement réservé de nous donner, par des recherches suivies sur les métamorphoses des hespéries, une classification naturelle & rigoureuse de cette division de lépidoptères.

Dans la méthode de M. Duméril, nos érycines & nos polyommates composent son genre *Hespérie*, & celui que nous appelons ainsi, répond à son genre *Hétéroptère*.

La tribu des hespérides est formée, comme nous l'avons dit plus haut, des genres Uranie & Hespérie.

Un lépidoptère qui m'a été envoyé du Brésil par M. Langsdorff, & offrant les antennes & les ailes inférieures des castnies, mais dont les palpes extérieurs sont tout-à-fait semblables à ceux des uranies, paroîtroit lier ces deux genres.

GENRE URANIE.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes d'abord filiformes, ensuite grêles et sétacées. Palpes inférieurs alongés, grêles, ayant le second article très-comprimé, le dernier beaucoup plus mince, presque cylindrique et nu.

G. Urania. Fab. (*Syst. Glossat.*) des Chevaliers grecs, des Nymphales et des Noctuelles. Fab. (*Ent. Syst.*)

ESPÈCES.

A. Bord postérieur des premières ailes presqu'entier. Bord analogue des secondes avec six dents, dont les trois intérieures en forme de queues.

1. Uranie Rhiphéus.

Ailes noires : supérieures offrant de part et d'autre des lignes transverses et une bande médiaire d'un vert-doré ; inférieures avec un espace anal d'un rouge-cuivreux glacé de violet et tacheté de noir.

B. bord postérieur des premières ailes entier. Bord analogue des secondes brièvement denté et ayant avant l'angle de l'anus une longue queue lancéolée.

2. Uranie Sloane.

Ailes noires : supérieures offrant de part et d'autre des lignes transverses et une bande d'une vert-doré : dessus des inférieures avec une bande en scie d'un rouge-cuivreux.

3. Uranie Léilus.

Ailes noires, semblables de part et d'autre, avec des lignes transverses et une bande d'un vert-soyeux : bande des inférieures en scie.

C. Bord postérieur des premières ailes entier. Bord analogue des secondes denté et ayant avant l'angle de l'anus une queue plus ou moins longue, arquée et obtuse.

4. Uranie Oronte.

Ailes d'un vert-noir : leur dessus avec deux bandes, leur dessous avec pareil nombre de bandes et la base, d'un vert-doré.

5 Uranie Patrocle.

Dessus des ailes d'un brun-chatoyant ; dessous gris et ondé de noirâtre : les deux surfaces offrant sur le milieu une bande blanche, commune.

D. Ailes supérieures entières. Ailes inférieures dentées et ayant avant l'angle de l'anus une large queue en spatule, sur laquelle il y a trois yeux.

6. Uranie Lunus.

Dessus des ailes brun, réticulé et ondé de fauve : dessous d'un jaune d'ocre pâle, avec deux bandes brunes.

7. Uranie Empédocle.

Ailes brunes, ayant le dessus réticulé et ondé de gris : les deux surfaces des quatre avec une bande médiaire et le bord postérieur blanchâtres.

A. Bord postérieur des premières ailes presque entier. Bord analogue des secondes avec six dents, dont les trois intérieures en forme de queues.

1. Uranie Rhiphéus.

Urania Rhipheus.

Uran. alis nigris : anticis utrinquè lineolis transversis fasciâque mediâ aureo-viridibus ; posticis areâ anali cupreâ violaceo micante nigroque maculatâ.

Papilio E. A. Rhipheus, *alis sex dentato-caudatis, nigris, viridi fasciatis : posticis subtùs maculâ ani ferrugineâ nigro punctatâ.* Fab. *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 6. *n°.* 43. — *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 21. *n°.* 62.

Papilio Rhipheus. Cram. *pl.* 385. *fig.* A. B.

Papilio Rhipheus. Drury, *Inf. tom.* 2. *pl.* 23. *fig.* 1. 2. (Sans queues.)

Papilio Rhipheus. Esp. *Pap. exot. tab.* 21. *fig.* 1. — *fig.* 2. (D'après Drury.)

Le Page de Chandernagor, *vulgairement.*

Uranie Prométhée. Drapiez, *Dict. class. d'Hist. nat.* 3e. *livraison, pl.* 8. *fig.* 1. 2.

Elle a de trois pouces & demi à quatre pouces d'envergure. Le dessus de ses ailes est noir, avec une multitude de petites lignes transverses & une large bande discoïdale d'un vert-doré-brillant aux supérieures ; avec une bande médiaire & une bande terminale du même vert aux inférieures. La bande des premières ailes est profondément bifide vers la côte, & les lignes qui la séparent de la base n'atteignent pas le milieu de la surface. Les deux bandes des secondes ailes sont sinuées, & elles se perdent vers l'angle de l'anus dans un espace d'un rouge-cuivreux qui jette un reflet violet vif, & sur lequel il y a quatre ou cinq taches noires.

Le dessous des ailes supérieures ressemble au dessus, mais les lignes vertes y sont plus larges.

Le dessous des ailes inférieures est d'un vert-doré à la base ainsi qu'à l'extrémité, avec des mouchetures noires ; il est traversé au milieu par une bande d'un rouge-cuivreux-chatoyant, bande qui offre une douzaine de taches noires orbiculaires, & qui se dilate à mesure qu'elle approche de la région de l'angle de l'anus. Les échancrures & les queues de ces ailes sont garnies de cils blancs de part & d'autre. Le corps est noir, avec des atomes d'un vert-doré sur l'abdomen, & des poils d'un jaune-fauve sur la poitrine ainsi que sur les cuisses. Les antennes sont entièrement noires.

Il est des individus qui ont une petite ligne verte dans la fissure de la bande des ailes supérieures. Il en est d'autres chez lesquels la branche extérieure de cette bande est séparée en dessus, tandis qu'elle est adhérente en dessous. Ces variations existent dans les deux sexes.

Cette espèce est de Madagascar & non du Bengale ; ainsi c'est d'après de faux renseignemens qu'on lui a donné le nom vulgaire de *Page de Chandernagor.* Selon M. Bory de Saint-Vincent, elle se trouveroit aussi à Sainte-Hélène.

B. Bord postérieur des premières ailes entier. Bord analogue des secondes brièvement denté & ayant avant l'angle de l'anus une longue queue lancéolée.

2. Uranie Sloane.

Urania Sloanus.

Uran. alis nigris : anticis utrinquè lineis transversis fasciâque aureo-viridibus : posticis suprà fasciâ ferratâ cupreo-rubrâ.

Papilio Sloanus, Cram. *pl.* 85. *fig.* E. F.

Papilio Sloaneus. Herbst, *Pap. tab.* 51. *fig.* 3. 4.

Sloane, *Jamaic. Hist.* 2. *tab.* 259. *fig.* 11. 12.

Cette uranie porte le nom de Sloane, célèbre médecin anglais, connu des naturalistes par son *Histoire de la Jamaïque.*

Elle a entre deux pouces & demi & trois pouces d'envergure. Ses ailes sont noires. Les supérieures ont de part & d'autre six à sept lignes transverses d'un vert-doré-brillant, entre lesquelles il y a une bande bifide ou trifide du même vert.

Le dessus des ailes inférieures est traversé dans son milieu par une bande d'un rouge-cuivreux-luisant. Le dessous est d'un vert-doré, avec des mouchetures noires sur la côte & vers l'extrémité. Les queues sont noires, ce qui distingue encore cette espèce de l'uranie *Leilus.*

De la Jamaïque.

3. Uranie Léilus.

Urania Leilus.

Uran. alis nigris, concoloribus, lineis transversis fasciâque fusceo-viridibus : fasciâ posticarum ferratâ.

Papilio E. A. Leilus, *alis caudatis, concoloribus, nigris, fasciâ lineisque viridibus, nitentibus, numerosis.* Linn. *Syst. Nat.* 2. *pag.* 750. *n°.* 31. — *Mus. Lud. Ulr.* 206.

Papilio E. A. *Leilus.* Fab. *Spec. Inf. tom.* 2. *p.* 12. *n°.* 48. — *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 7. *n°.* 54. — *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 21. *n°.* 63.

Papilio Leilus. Clerck, *Icon. tab.* 27. *fig.* 1.

Papilio Leilus. Cram. *pl.* 85. *fig.* C. D.

Merian, *Surin. Inf. tab.* 29.

Kleman, *Beytr.* 1. *tab.* 2. *fig.* 1.

Knorr, *Delic. tab.* C. *fig.* 1.

Seba, *Muſ.* 4. *tab.* 36. *fig.* 1. 2. 3. 4.

Papilio Leilus. Herbst, *Pap. tab.* 50. *fig.* 2. 3.

Papilio Leilus. Esp. *Pap. exot. tab.* 53. *fig.* 2.

Le Page de Cayenne. Daubenton, *pl. enlum.* 71. *fig.* 1.

Elle a de trois pouces & demi à quatre pouces d'envergure. Ses ailes ſont noires de part & d'autre, avec huit à neuf lignes tranſverſes & une bande d'un vert-ſoyeux. La bande des premières ailes eſt trifide ou quadrifide à ſon extrémité ſupérieure. La bande des ſecondes ailes a le côté externe denté en ſcie, & le côté interne plus ou moins déchiqueté. Ces dernières ailes ont la frange du bord poſtérieur & la queue blanches, mais la queue a le milieu longé par une ligne noire. Le corps eſt rayé de vert, & beaucoup plus gros dans les femelles que dans les mâles.

De Cayenne & de Surinam.

C. Bord poſtérieur des premières ailes entier. Bord analogue des ſecondes denté & ayant avant l'angle de l'anus une queue plus ou moins longue, arquée & obtuſe.

4. Uranie Orontе.

Urania Orontes.

Uran. alis atro-viridibus : ſuprà faſciis duabus, ſubtùs baſi faſciiſque totidem inaurato-vireſcentibus.

Papilio E. A. Orontes, *alis caudatis, nigris, albido-viréſcente faſciatis : caudis albis diſtantibus.* Linn. *Syſt. Nat.* 2. *p.* 750. *n°.* 27. — *Amœn. acad. tom.* 6. *p.* 402. *n°.* 51.

Papilio E. A. *Orontes.* Fab. *Spec. Inſ. tom.* 2. *p.* 20. *n°.* 80. — *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 10. *n°.* 91.

Papilio N. *Orontes.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 69. *n°.* 214.

Papilio Orontes. Clerck, *Icon. tab.* 26 *fig.* 1.

Papilio Orontes. Cram. *pl.* 83. *fig.* A. B.

Papilio Orontes. Herbst, *Pap. tab.* 47. *fig.* 1. 2.

Seba, *Muſ.* 4. *tab.* 16. *fig.* 1. 2. — *tab.* 47. *fig.* 7. 8.

Papilio Orontes. Esp. *Pap. exot. tab.* 30. *fig.* 1. 2.

Elle a de quatre pouces à quatre pouces & demi d'envergure. Le deſſus des ailes eſt d'un vert-bouteille foncé, avec deux bandes courbes & tranſverſes d'un vert-doré pâle. La bande poſtérieure eſt plus courte aux premières ailes, & maculaire aux ſecondes. Ces dernières ailes ont les échancrures & la queue ciliées de blanc.

Le deſſous diffère du deſſus en ce que la moitié antérieure de la ſurface eſt d'un vert-doré pâle, comme les deux bandes. Le corps eſt d'un vert-obſcur en deſſus, avec un collier blanc très-étroit. Il eſt d'un vert-blanchâtre en deſſous, avec une bande longitudinale orangée ſur le milieu du ventre. Les antennes ſont noires.

Dans les femelles, l'abdomen eſt très-gros, & l'on voit quelquefois des mâles qui ont la bande poſtérieure du deſſus des premières ailes preſque nulle.

Des îles de Java & d'Amboine.

5. Uranie Patrocle.

Urania Patroclus.

Uran. alis ſuprà fuſcis, nitidis ; ſubtùs griſeis, fuſco undatis : utrinquè faſciâ communi mediâ albâ.

Papilio E. A. Patroclus, *alis caudatis, concolenbus, fuſcis, faſciâ lineari albâ apicibuſque albis.* Linn. *Syſt. Nat.* 2. *p.* 749. *n°.* 24. — *Muſ. Ulr.* 204.

Papilio E. A. *Patroclus.* Fab. *Spec. Inſ. tom.* 2. *p.* 13. *n°.* 53. — *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 7. *n°.* 59.

Noctua Patroclus. Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 2. *p.* 8. *n°.* 2.

Papilio Patroclus. Clerck, *Icon. tab.* 37. *fig.* 1.

Papilio Patroclus. Cram. *pl.* 109. *fig.* A. B. — *pl.* 198. *fig.* A.

Papilio Patroclus. Herbst, *Pap. tab.* 34. *fig.* 2. 3. — *tab.* 55. *fig.* 1.

Seba, *Muſ.* 4. *tab.* 47. *fig.* 15. 16.

Papilio Patroclus. Drury, *Inſ. tom.* 1. *tab.* 7. *fig.* 1. — *tab.* 8. *fig.* 1.

La Chauve-ſouris. Daubenton, *pl. enlum.* 17.

Elle a de cinq à ſix pouces d'envergure. Le deſſus des ailes eſt d'un brun-chatoyant, avec une bande blanche, tranſverſe, médiaire & preſque droite. Le premières ailes ont la côte entrecoupée de blanchâtre. Les ſecondes, dont l'extrémité eſt grifâtre & ondée de noirâtre, ont les dents du bord poſtérieur & le bout de la queue blancs.

Le deſſous des quatre ailes eſt gris & finement ondé de noirâtre, avec une bande blanche, répondant à celle du deſſus, & largement bordée de brun. Le corps eſt brun en deſſus, blanchâtre en deſſous. Les antennes ſont obſcures.

Chez la femelle, la bande blanche des ailes eſt moins étroite que chez le mâle. Celui-ci a la dent qui précède la queue plus longue que les autres.

Elle ſe trouve en Chine, dans les îles de Java & d'Amboine.

D. Ailes supérieures entières. Ailes inférieures dentées & ayant avant l'angle de l'anus une large queue en spatule, sur laquelle il y a trois yeux.

6. URANIE Lunus.

URANIA Lunus.

Uran. alis suprà fuscis, fulvo reticulatis & undatis : subtùs lutescentibus, fasciis duabus fuscis.

Phalæna Attacus Lunus, *seticornis, spirilinguis : alis caudatis, fusco luteoque undulatis, ocellis caudalibus subternis.* LINN. *Syst. Nat.* 2. *p.* 810. *n°.* 6. — *Mus. Lud. Ulr.* 371.

Ph. Lunus. CLERCK, *Icon. Ltab.* 52. *fig.* 3. 4.

Papilio Lunus. CRAM. *pl.* 200. *fig.* A. B. C.

Papilio Lunus. HERBST, *Pap. tab.* 53. *fig.* 1. 2. 3.

Papilio E. A. Ægisthus, *alis caudatis, fusco luteoque undulatis, ocellis caudalibus subternis.* FAB. *Spec. Inf. tom.* 2. *p.* 20. *n°.* 82. — *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 10. *n°.* 95.

Papilio N. *Ægistus.* FAB. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 69. *n°.* 215.

Elle a environ trois pouces & demi d'envergure. Le dessus des ailes est d'un brun-enfumé, avec une multitude de lignes fauves, ondulées & transversales. Les premières ailes ont en outre les nervures fauves depuis la base jusqu'au-delà du milieu, ce qui les fait paroître réticulées à leur moitié antérieure. Les secondes ailes ont l'angle anal rosé, & leurs yeux sont noirs, fablés de bleu & cerclés de fauve. L'œil antérieur est placé à la naissance du bord interne de la queue, le second sur le milieu de ce même bord, & le postérieur au milieu de la spatule. De l'œil intermédiaire part une ligne noire, courbe, qui passe au-dessous de l'œil postérieur sur un fond jaunâtre, & va se perdre sur le bord interne de la queue.

Le dessous des quatre ailes est d'un jaune d'ocre pâle, & traversé entre le milieu & l'extrémité par deux bandes brunes, sinuées, dont la postérieure plus large & couvrant presque toute la queue. Le corps a le dessus brun & rayé de fauve; il a le dessous entièrement jaune. Les antennes sont brunâtres.

La femelle ressemble au mâle, mais elle a le corps plus gros.

De Surinam & du Brésil.

7. URANIE Empédocle.

URANIA Empedocles.

Uran. alis fuscis, suprà griseo reticulatis & undatis : omnibus utrinquè fasciâ mediâ transversâ margineque postico albidis.

Papilio Empedocles. CRAM. *pl.* 99. *fig.* A. B.

Papilio Empedocles. HERBST, *Pap. tab.* 53. *fig.* 4. 5.

Elle a de grands rapports avec la précédente, néanmoins elle s'en distingue par plusieurs caractères. D'abord elle est brune de part & d'autre, avec deux bandes blanchâtres, dont l'antérieure médiaire, la postérieure terminale. En second lieu, les lignes ondulées du dessus de ses ailes sont grises, & celles qui séparent les deux bandes des inférieures ont une teinte rougeâtre; enfin, le bout de la queue est blanc au lieu d'être jaune.

De Surinam.

HESPÉRIE. *Hesperia.* Genre d'insectes de l'ordre des lépidoptères, famille des diurnes, tribu des hespérides, & distingué de celui d'uranie, autre & premier genre de la même tribu, par les caractères suivans : antennes terminées en masse. Palpes extérieurs (labiaux ou inférieurs) courts, larges & très-garnis d'écailles.

Ces lépidoptères ont généralement le corps court & gros; la tête large; les antennes écartées à leur insertion & terminées brusquement en une masse plus ou moins ovale ou oblongue, finissant en pointe, & tantôt arquée, tantôt subitement courbée ou crochue; les palpes extérieurs ou labiaux larges, très-fournis d'écailles, de trois articles, dont le dernier très-petit, comparativement au second; les ailes fortes, & dont les inférieures toujours plissées au côté interne & souvent parallèles au plan de position dans le repos; l'abdomen court, presque conique, ou conico-cylindrique; toutes les pattes propres à la locomotion; les jambes postérieures armées de quatre ergots & les tarses terminés par deux crochets petits, simples & très-arqués. Leurs couleurs sont généralement obscures ou peu éclatantes. Leur vol est saccadé.

Leurs chenilles ressemblent à celles de divers lépidoptères nocturnes. Elles sont alongées, plus grêles aux deux extrémités, ou du moins antérieurement, presque nues, peu variées en couleurs, avec la tête grosse & souvent marquée de deux taches arrondies, imitant des yeux. Elles vivent entre des feuilles qu'elles roulent & qu'elles fixent avec de la soie. C'est là qu'elles se métamorphosent en une chrysalide unie ou sans éminences angulaires, & dont l'extrémité antérieure est plus ou moins avancée en une pointe simple.

Si les figures de Stoll, relatives aux métamorphoses de quelques espèces de Surinam, sont exactes, leurs chrysalides seroient fixées à la manière de celles des papillonides hexapodes, c'est-à-dire, par la queue, & par un lien de soie passant au-dessus du corps & lui formant une ceinture. Quelques espèces donnent deux fois dans la même année. Ces insectes fréquentent plus généralement les bois & les lieux très-garnis de graminées; quelques-uns se plaisent dans ceux qui

ſont humides ou aquatiques. L'Amérique équinoxiale en fournit le plus grand nombre d'eſpèces.

Dans l'article précédent, celui d'heſpérides, nous avons expoſé l'hiſtoire de ce genre. Les proportions des deux derniers articles des palpes extérieurs, la forme de la maſſue des antennes & celle des ailes inférieures, ainſi que leur poſition, donnent le moyen de le diviſer. (*Voyez* mon *Genera Cruſt. & Inſect. tom.* 4, *p.* 208; l'article Heſpérie du *nouv. Dict. d'Hiſt. nat.* 2e. *édit.*, & la 14e. livraiſon des *Papillons diurnes de France* de M. Godart.) Mais ces caractères ſe nuancent tellement, qu'il eſt bien difficile de fixer rigoureuſement les limites de ces coupes. Il eſt certain que beaucoup d'eſpèces ont un port d'ailes particulier & que nous avons déſigné (voyez *Heſpérides*) par les mots d'*ailes en chevron* (les *eſtropiés* de Geoffroy); mais nous nous ſommes aſſurés que beaucoup d'eſpèces exotiques ont, dans le repos, les quatre ailes élevées perpendiculairement, de même que les autres diurnes. Dans le premier cas, le bord extérieur des inférieures eſt proportionnellement plus dilaté & plus arqué à ſa baſe. Il ne nous a pas encore été poſſible d'étudier, ſous ce point de vue, chaque eſpèce. Il nous a donc fallu, dans un travail auſſi général, renoncer à l'emploi de ce caractère. Celui que peut nous fournir la ſaillie plus ou moins avancée de l'angle anal des mêmes ailes, eſt, dans bien des circonſtances, & ſurtout lorſque ces ailes n'ont pas été étendues avec beaucoup de ſoin, très-équivoque. Comme cependant l'on ne peut arriver à la détermination des eſpèces ſans former dans ce genre des diviſions & ſubdiviſions nombreuſes, nous en avons établi pluſieurs. Toutefois nous ne garantirons point l'homogénéité, ni l'exactitude de ces groupes. Le peu de temps que nous avons eu pour rédiger cet article ne nous a point permis de donner la dernière main à notre travail. Mais ſi nous avons erré dans le placement de quelques eſpèces, on ſera ſûr de les trouver dans les diviſions les plus voiſines de celle à laquelle elles doivent appartenir. Nos caractères ſpécifiques ſont même très-ſouvent indépendans de ceux des diviſions, ou peuvent ſeuls ſuffire. Nous euſſions déſiré de pouvoir citer les figures d'Hubner, relatives aux heſpéries exotiques. Son ouvrage ſur les lépidoptères étrangers n'exiſtant dans aucune bibliothèque de Paris, cela nous a été impoſſible. Nous avons cherché à y ſuppléer, ſoit avec l'ouvrage de Cramer, trop négligé par Fabricius, & par ceux de Donovan, qui, étant maintenant poſſeſſeur des deſſins inédits de Jones, que le naturaliſte précédent a très-ſouvent cités, en a reproduit pluſieurs.

GENRE HESPÉRIE.

HESPERIA, Latr., Cuv., Lam., Walck., God. — *PAPILIO* (*Pleb. urbic.*), Linn., Geoff., Scop., Schæff., Den., Schiff., Esp., Borkh., Cram., Engram., Oliv., Vill., Ross., Panz., Prun., Hubn., Ochsenh. — *ERYNNIS*, Schr. — *THYMELE*, *HELIAS*, *PAMPHILA*, Fab. — *HETEROPTERUS*, Duméril.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes très-écartées à leur base, courtes, terminées brusquement en une massue arquée ou crochue.

Une trompe roulée en spirale.

Palpes inférieurs ou labiaux courts, de trois articles, dont le second grand, large, très-garni d'écailles, et dont le troisième très-petit.

Six pieds ambulatoires; les deux jambes postérieures ayant deux paires d'ergots, l'une ordinaire et terminale, l'autre située plus haut, au côté interne.

Ailes inférieures sans crochet à leur base, plissées au côté interne, horizontales dans plusieurs, lorsque l'insecte est en repos.

Chenille à seize pattes, ordinairement nue, alongée, presque fusiforme, à tête grosse, et vivant entre des feuilles qu'elle roule et fixe avec de la soie.

Chrysalide renfermée dans ce rouleau, unie, avec l'extrémité antérieure entière ou sans échancrure à sa pointe.

ESPÈCES.

I. *Angle anal des ailes inférieures prolongé en une queue presque linéaire.*

1. *Bord postérieur des ailes inférieures entier.*

A. *Une bande blanche ou jaunâtre aux ailes inférieures, soit interne, soit marginale.*

1. Hespérie Eudoxe.

Ailes d'un noirâtre-foncé; une bande transverse sur les supérieures et bord postérieur des inférieures, blancs, une bande jaunâtre sous celles-ci.

2. Hespérie Métophis.

Ailes noirâtres en dessus, d'un ferrugineux-obscur en dessous; limbe postérieur, bord interne et une raie sur le milieu des postérieures, gris: cinq taches transparentes formant une série sur les supérieures.

3. Hespérie Cœlus.

Ailes noires en dessus, noirâtres en dessous; des taches vitrées aux antérieures: une bande transverse d'un blanc de neige sur le milieu du dessous des secondes.

4. Hespérie Orion.

Ailes d'un noirâtre-foncé; les postérieures ayant leur limbe extérieur et la queue blancs.

HESPÉRIE. (Insecte.)

B. *Point de bande blanche ou jaunâtre, soit interne, soit marginale, aux ailes inférieures.*

5. Hespérie Euryclès.

Ailes noirâtres; dessous des postérieures à trois bandes noires, celle de la base courte ou remplacée par une tache.

2. *Bord postérieur des ailes inférieures denté ou sinué.*

6. Hespérie Catillus.

Noirâtre; une tache apicale sur le dessous des ailes antérieures et une bande maculaire et arquée sur les postérieures, d'un noirâtre-brun : espaces adjacens gris.

7. Hespérie Protée.

Noirâtre; dessous des postérieures plus clair, avec trois bandes et une tache vers la base, noirâtres.

II. *Ailes inférieures, sans queue ou à angle anal prolongé au plus en manière de dent.*

1. *Ailes supérieures peu ou point arquées à la côte : leur sommet peu ou point prolongé, ne formant ni de crochet, ni de faulx.*

A. *Bord postérieur des ailes inférieures soit prolongé à l'angle anal ou plus extérieurement en manière de dent ou de très-petite queue, soit offrant avant cet angle un sinus ou une échancrure.*

a. *Ailes des deux sexes semblables ou sans différences notables.*

* *Une portion de la tête, l'anus ou l'angle anal (souvent aussi le collier) rouges ou orangés.*

† *Bord postérieur des ailes inférieures droit et très-entier.*

— *Antennes courbées brusquement à leur extrémité et terminées en une pointe fine, très-aiguë.*

8. Hespérie Arinus.

Ailes très-noires; une tache sur le milieu des supérieures, le bord postérieur des inférieures d'un blanc de neige.

9. Hespérie Cléanthe.

Très-noire, avec la tête et l'anus d'un rouge de sang; dessus des ailes d'un bleu tirant sur le noir-foncé; trois taches et un point vitré, sur le disque des supérieures; bord postérieur des inférieures blanc, avec l'extrémité interne sanguine.

10. Hespérie Polybie.

Ailes d'un noir-foncé; une tache fauve aux antérieures; angle anal des secondes jaune.

11. Hespérie Lycagus.

Ailes d'un bleu-verdâtre, sans taches.

— — *Antennes presque graduellement arquées à leur extrémité et terminées par une petite massue oblongue, insensiblement amincie vers sa pointe ou obtuse.*

12. Hespérie Jupiter.

Ailes d'un noir-foncé tirant sur le vert, d'un verdâtre-doré en dessus, avec des veines et le bord postérieur noirs, sur leur dessous.

13. Hespérie Zéleucus.

Ailes très-noires, sans taches, avec le bord postérieur blanc.

14. Hespérie Mœnade.

Ailes d'un noir-foncé tirant sur le bleu; bord postérieur et base des inférieures blancs.

15. Hespérie Phidias.

Ailes d'un noir-foncé tirant sur le bleu; limbe postérieur des inférieures rouge ou jaunâtre, bordé de blanc en dehors.

HESPÉRIE. (Insecte.)

16. Hespérie Amiatus.

Ailes très-noires, avec le bord postérieur jaune.

17. Hespérie Xantippe.

Très-noire; des bandes jaunes sur les ailes.

†† *Bord postérieur des ailes inférieures sinueux, à frange entrecoupée et paroissant dentelée.*

18. Hespérie versicolore.

Très-noire; des bandes bleues sur l'abdomen et sur les ailes, une bande rouge et deux taches jaunes sur les ailes supérieures.

19. Hespérie Assaricus.

Ailes très-noires; les supérieures tachetées de jaune et de blanc, le disque des inférieures jaune, avec des points noirs.

** *Point simultanément de teinte rouge ou orangée à la tête et à l'anus, ou à la tête et à l'angle anal des ailes inférieures.*

† *Bord postérieur des ailes inférieures sensiblement denté ou anguleux.*

— *Ailes inférieures sans taches vitrées ou n'en ayant qu'une au plus et difcoïdale.*

20. Hespérie Iphinous.

Très-noire; ailes antérieures avec une bande et deux taches jaunes, dessous des postérieures et des lignes sur l'abdomen d'un blanc-bleuâtre.

21. Hespérie Polyzone.

Très-noire, avec des bandes bleues et blanches; ailes antérieures ayant des taches vitrées et des bandes transverses à la base; extrémité des antennes arquée graduellement.

22. Hespérie Gnetus.

Très-noire; extrémité des antennes brusquement arquée; ailes postérieures fasciées de bleu, les antérieures ayant des taches vitrées et des rayons bleus à leur base.

23. Hespérie Salus.

Ailes fauves, avec des bandes noires; des taches sur les antérieures et centre des postérieures vitrés.

24. Hespérie Saint-Hilaire.

Ailes fauves en dessus, noires en dessous; des taches vitrées, bordées de noir, sur les antérieures: les postérieures ayant à l'angle interne un prolongement tronqué, ponctuées de noir en dessus, et fasciées de jaunâtre en dessous.

25. Hespérie Éacus.

Ailes d'un noirâtre tirant sur le jaune, avec des points obscurs; des taches d'un blanc-transparent sur les antérieures.

— — *Les quatre ailes parsemées de plusieurs taches vitrées.*

26. Hespérie Momus.

Ailes noires; les antérieures presqu'entièrement striées de lignes transparentes.

27. Hespérie Erythus.

Ailes mélangées de noir et de brun-noirâtre, avec des taches transparentes, les unes presque carrées, ou presque triangulaires, les autres en forme de points.

28. Hespérie Cramer.

Ailes d'un ferrugineux-obscur, avec des taches vitrées, bordées de noir: une bande formée de taches bleuâtres et terminée postérieurement par une ligne noire, ondulée, sur leur dessous.

HESPÉRIE. (Insecte.)

†† *Bord postérieur des ailes inférieures entier.*

— Dessus du corps et origine supérieure des ailes verts ou d'un vert-bleuâtre : dessus de ces ailes noir ou noirâtre, celui des inférieures sans taches.

29. Hespérie Creteus.

Ailes noires et sans taches en dessus, noirâtres en dessous, avec deux bandes transverses plus obscures : limbe postérieur ordinairement plus clair.

30. Hespérie Parménide.

Noirâtre ; dessus des ailes sans taches : une grande tache blanche et interne sur le dessous des antérieures, celui des postérieures sans bandes.

31. Hespérie du Roucou.

Noirâtre, sans taches en dessus ; une bande blanche sur le dessous des ailes postérieures.

32. Hespérie Acastus.

Dessus des ailes d'un noir-bleu ; les supérieures ayant une bande d'un blanc-transparent, avec le sommet sans taches : dessous des inférieures d'un noirâtre-vert, avec le limbe postérieur cendré ou plus clair.

33. Hespérie Mercatus.

Dessus des ailes noir ; les supérieures ayant une bande et une ligne de points près du sommet d'un blanc-transparent, base du dessous des inférieures blanche.

34. Hespérie Ausone.

Ailes noirâtres ; les supérieures ayant une bande et une ligne de points, avant le sommet, d'un jaunâtre-transparent : dessus des inférieures, à l'exception du limbe, vert.

35. Hespérie Savigny.

Dessus des ailes antérieures noir, avec des taches et trois points blancs et transparens ; les ailes postérieures noirâtres en dessus, brunes en dessous, avec un point noir à la base, et trois bandes obscures, transverses.

— — Dessus du corps et origine supérieure des ailes jaunâtres ; dessus des ailes noirâtre : des taches jaunâtres, transparentes et pour la plupart disposées en une ligne transverse, aux supérieures ; dessous des inférieures ayant soit des taches discoïdales d'un blanc-argenté (quelquefois effacées), soit une bande ou une raie (commune quelquefois aux deux surfaces) parcourant toute sa longueur ou toute sa largeur, tantôt de cette couleur, tantôt blanche ou jaunâtre : ces ailes ordinairement sans taches vitrées.

φ. Dent extérieure de la troncature oblique du prolongement anal des ailes inférieures très-saillante.

36. Hespérie Schœnherr.

Ailes noirâtres ; limbe postérieur et supérieur des inférieures et dessous de leur angle anal noirs ; les supérieures ayant une bande vitrée et une tache blanche près du sommet : une bande d'un jaune-pâle, large et transverse, sur les deux faces des postérieures.

37. Hespérie Mercure.

Ailes postérieures ayant en dessous deux taches transverses d'un noirâtre très-foncé, avec l'espace intermédiaire d'un gris de perle luisant : limbe postérieur cendré en dehors, noirâtre intérieurement ; abdomen annelé de blanc.

38. Hespérie Tityre.

Dessous des ailes postérieures d'un brun-foncé, avec une tache angulaire ou une bande transverse d'un blanc-argenté, au milieu.

HESPÉRIE. (Insecte.)

φ φ. Dent extérieure de la troncature oblique du prolongement anal des ailes inférieures soit point ou très-petit saillante, soit obtuse ou arrondie.

39. Hespérie Epitus.

Ailes noirâtres en dessus, d'un fauve-obscur en dessous; des taches d'un jaunâtre-transparent et dont les trois intérieures disposées en triangle, aux supérieures : une bande transverse argentée sur le dessous des inférieures.

40. Hespérie Ericus.

Ailes noirâtres ; trois petits points vitrés aux supérieures, une tache jaunâtre et postérieure sur le dessous des inférieures.

41. Hespérie Chromus.

Noirâtre, plus pâle en dessous ; une ligne blanche, transverse, et une tache anale et noirâtre sur le dessous des ailes inférieures.

— — — Dessus du corps et base supérieure des ailes point garnis d'un duvet soyeux vert ou d'un vert-bleuâtre ; dessous des inférieures n'offrant point, du moins dans les espèces où ces parties sont jaunâtres, de taches discoïdales argentées, ni une bande longitudinale ou transverse, soit pareillement argentée, soit blanche ou jaunâtre.

φ. Des taches vitrées et dont plusieurs bordées de noir ou de noirâtre, en forme de petits yeux, sur les quatre ailes.

42. Hespérie Polygius.

D'un noirâtre-roussâtre ; une bande vitrée et maculaire au milieu des ailes antérieures.

43. Hespérie Salatis.

Dessus des ailes d'un roussâtre-obscur ; toutes les taches vitrées en forme de points.

44. Hespérie Ramusis.

Ailes d'un noirâtre-brun, avec des taches et des points d'un blanc-transparent.

φ φ. Des taches transparentes sur les quatre ailes, sans cercle brun ou noirâtre autour; dessus des ailes inférieures d'un brun ou d'un noir uniforme, soit avec un ou plusieurs points, soit avec de petites taches, transparens.

45. Hespérie Chemuis.

Corps brun ; ailes noirâtres, bordées postérieurement de jaune; les postérieures de la même couleur des deux côtés, avec trois taches carrées, transparentes.

46. Hespérie Ethlius.

Ailes noirâtres en dessus, jaunâtres en dessous, à l'exception du disque des antérieures; quatre taches et trois points près du sommet, transparens, sur celles-ci : quatre taches jaunâtres, formant une série transverse, sur les inférieures.

47. Hespérie Antonin.

Ailes antérieures et dessus des postérieures noirâtres ; côte des premières jaunâtre en dessous; les secondes ayant deux points jaunâtres : leur dessous d'un brun-rouge, avec la base d'un gris-jaune.

48. Hespérie Dalman.

Dessus des ailes noirâtre ; une tache apicale, triangulaire, d'un noirâtre-foncé, bordée de jaune aux supérieures ; les inférieures ayant en dessus une ligne transverse de quatre points jaunâtres : leur dessous noirâtre, avec une bande jaunâtre ponctuée de noirâtre et une tache d'un noir-foncé presqu'oculaire.

49. Hespérie Basoches.

Dessus des ailes d'un noir-brun ; leur dessous, le disque des premières excepté,

HESPÉRIE. (Insecte.)

d'un brun-cendré; trois taches d'un blanc-transparent sur le disque des quatre; une tache apicale d'un blanc de neige sur le dessus des premières : trois points noirs en dessous, près de leur sommet.

50. Hespérie Fischer.

Ailes noires; sept taches aux supérieures et trois aux inférieures, d'un blanc-transparent.

51. Hespérie Lesueur.

Ailes d'un noirâtre-foncé; avec des taches et des points d'un blanc-transparent; cinq points sur les inférieures, dont un discoïdal, et les quatre autres situés en dessous et formant une ligne transverse.

52. Hespérie Bonfils.

Ailes noirâtres en dessus, d'un fauve-noirâtre en dessous, avec le limbe postérieur plus clair; une bande sur les supérieures et des points disposés en une série transverse sur le milieu des inférieures, blancs et transparens : frange postérieure des quatre ailes entrecoupé de noir et de blanc.

φ φ φ. Des taches ou des points transparens aux ailes supérieures au plus.

53. Hespérie Thrax.

Ailes noirâtres, moins foncées en dessous; trois taches d'un jaunâtre-transparent, et disposées en triangle aux supérieures : l'inférieure des antérieures en carré-long.

54. Hespérie Ennius.

Ailes antérieures noirâtres, avec des taches d'un jaunâtre-transparent; dessus des secondes jaune, avec une bande marginale très-noire et arquée : leur dessous noirâtre, avec le disque blanc.

55. Hespérie Phocas.

D'un jaunâtre-foncé ou roussâtre; des taches d'un jaunâtre-transparent aux ailes supérieures : les trois antérieures plus grandes, échancrées postérieurement, cinq à six autres points près du sommet; ailes inférieures jaunâtres, avec des bandes ou des lignes de points jaunâtres et transverses; antennes terminées brusquement en crochet.

56. Hespérie Avitus.

D'un jaunâtre-obscur; des taches d'un jaunâtre-transparent aux ailes supérieures : les deux antérieures plus grandes, presque carrées : deux ou trois autres en forme de points, près du sommet; des points noirâtres, disposés en lignes transverses, sur les inférieures; massue des antennes arquée graduellement.

57. Hespérie Rhétus.

D'un fauve-jaunâtre, avec des ondes noirâtres sur les ailes; bord externe des supérieures très-replié : celui des inférieures d'un noir-bleu.

58. Hespérie Crinisus.

Ailes noirâtres, avec la base roussâtre en dessus et d'un jaunâtre-gris en dessous; disque du dessous des inférieures roussâtre, avec des bandes noirâtres : le plus souvent de petites taches transparentes aux ailes supérieures.

59. Hespérie Lycidas.

Ailes antérieures et dessus des secondes d'un noirâtre-clair; des taches d'un jaunâtre-transparent sur le disque de celles-ci; les autres d'un noirâtre-nébuleux à leur base, blanchâtres extérieurement : frange de toutes entrecoupée de blanc et de noirâtre.

HESPÉRIE. (Insecte.)

60. Hespérie Lucas.

Ailes noirâtres ; quatre à cinq taches d'un jaune-transparent sur le disque des premières, les secondes sans taches.

61. Hespérie Mathias.

Ailes noirâtres en dessus, d'un noirâtre-jaunâtre en dessous ; des taches et des points d'un blanc-transparent aux supérieures : une ligne arquée de points blancs sur les inférieures ou du moins sur leur dessous.

62. Hespérie Gremius.

Ailes noirâtres en dessus, d'un cendré-obscur en dessous ; des taches et des points d'un blanc-transparent aux supérieures, quatre à cinq points d'un noir-foncé et bordés de blanc sur le disque du dessous des inférieures.

63. Hespérie Néron.

D'un noirâtre-foncé, un peu luisant ; une raie transverse de points blancs des deux côtés des ailes supérieures et sur le dessous des inférieures.

64. Hespérie Jacchus.

Ailes noirâtres ; des taches jaunes et transparentes aux supérieures ; les postérieures ayant en dessus une tache discoïdale et composée, jaune, et en dessous six points blancs.

65. Hespérie Flaccus.

Noirâtre ; des points transparens aux ailes supérieures, un point et une bande blancs aux inférieures.

66. Hespérie Marc.

Dessus des ailes noir ; des taches d'un blanc-transparent aux supérieures ; les inférieures ayant au milieu de leur face supérieure une bande maculaire d'un blanc-bleuâtre : leur dessous d'un brun-clair, avec le côté extérieur et une bande longitudinale interne, d'un jaune-pâle.

67. Hespérie Lucrèce.

Ailes antérieures et dessus des secondes noirâtres ; celles-ci ayant en dessus une série transverse de points jaunâtres : leur dessous gris, mélangé de noirâtre, avec une tache triangulaire et interne, et un point placé sur une tache blanche et de forme semblable, d'un noir-foncé.

68. Hespérie Lafrenaye.

Ailes noires en dessus, d'un fauve-obscur en dessous ; des taches, d'un blanc-transparent aux supérieures ; les inférieures ayant sur leur disque supérieur une bande maculaire, et en dessous une grande tache triangulaire et marquée d'un point ferrugineux, blanches.

69. Hespérie Tibulle.

Ailes antérieures noires, avec des taches jaunes ; les secondes jaunes, avec le limbe noir.

70. Hespérie Abébalus.

Ailes antérieures et dessus des secondes noirâtres ; une ligne de points blancs transverse et arquée sur celles-là : celles-ci ayant en dessus et dans leur milieu une bande jaunâtre, transverse ; leur dessous blanc, avec des veines rougeâtres, et trois taches d'un noirâtre-fauve, deux au milieu et l'autre anale.

71. Hespérie Pertinax.

Ailes entières et dessus des secondes d'un noirâtre-foncé ; quatre petites taches et trois points d'un blanc-transparent sur celles-là : dessous de celles-ci blanc, plus foncé postérieurement, avec des veines et une rangée transverse de points, blanchâtres.

72. Hespérie Saturne.

Ailes noirâtres ; des points sur les supérieures et des stries sur le dessous des inférieures, blancs.

HESPÉRIE. (Insecte.)

73. Hespérie Cæsar.

Ailes antérieures noirâtres, avec des taches vitrées; les postérieures d'un noir-foncé en dessus, avec une tache d'un blanc de neige au milieu : leur disque inférieur cendré, avec des points noirs.

74. Hespérie Virbius.

Corps et ailes noirs; deux petites taches et deux points d'un blanc-tranparent aux supérieures, extrémité postérieure des inférieures d'un blanc de neige.

75. Hespérie Curtius.

Ailes noires; quatre points blancs aux antérieures, les postérieures sans taches.

76. Hespérie Sénèque.

Dessus des ailes noirâtre; leur dessous, le disque des premières excepté, d'un brun-cendré, avec des taches d'un jaune-obscur : une bande transverse et un point d'un blanc-transparent aux supérieures; dessus des inférieures sans taches.

77. Hespérie Claudien.

Ailes d'un noir-foncé; deux bandes maculaires d'un blanc-transparent aux supérieures; les inférieures ayant en dessus une tache blanche, orbiculaire : leur dessous d'un brun-clair, avec la base grise, une bande transverse et des veines d'un noir-foncé.

78. Hespérie Minos.

Ailes d'un noir-foncé; deux taches médianes et une série de petits traits subapicale, d'un blanc-transparent, aux supérieures : disque des inférieures ayant une bande blanche et transverse, plus longue avec les extrémités jaunes, et en dessous.

79. Hespérie Hémès.

Ailes noires; des taches médianes et plusieurs points alignés aux supérieures, et les inférieures, à l'exception du limbe extérieur, blancs.

80. Hespérie Duméril.

Dessus des ailes noir; leur dessous, à l'exception du disque des antérieures, d'un jaunâtre-brun : celles-ci ayant des taches et des lignes à leur base supérieure, jaunes; deux bandes jaunâtres et transverses sur le dessus des postérieures.

81. Hespérie Talaus.

Ailes d'un noirâtre-foncé; une tache sanguine à la base des supérieures : une bande maculaire à leur milieu et une série de points près de leur extrémité, d'un blanc-transparent; disque des inférieures, blanc.

82. Hespérie Eumèle.

Ailes supérieures d'un noir-foncé, avec une tache à leur base et le bord interne fauves, deux bandes maculaires et un point intermédiaires, blancs; ailes postérieures fauves, avec des veines et le bord antérieur, noirs.

83. Hespérie Clonias.

Ailes supérieures obtuses à leur extrémité, avec une bande transverse d'un blanc-transparent : leur dessus, ainsi que celui des inférieures, noirs; dessous de toutes mélangé de brun, de gris et de noirâtre.

84. Hespérie Busiris.

Ailes oblongues, très-noires; des taches et deux points jaunes, aux supérieures; les inférieures fauves, avec une bordure d'un noir-foncé.

HESPÉRIE. (Insecte.)

85. Hespérie Pelée.

Ailes très-noires ; deux bandes transverses aux supérieures, l'une rouge sur leur milieu, l'autre près de leur extrémité et jaunâtre : une tache transparente dans l'entre-deux.

86. Hespérie Gentius.

Jaune ; limbe des ailes postérieures et extrémité inférieure des supérieures noirs ; deux bandes transverses et un point intermédiaire jaunes près de l'extrémité de celles-ci.

87. Hespérie Celsus.

Ailes noires en dessus, d'un noirâtre-brun en dessous ; une bande d'un jaunâtre-fauve des deux côtés des supérieures ; dessus des inférieures sans taches : leur dessous ayant une poussière cendrée, avec le bord extérieur et une raie transverse d'un noirâtre-brun.

88. Hespérie Brontès.

Ailes noires; une bande médiaire aux supérieures et bord externe des inférieures, tantôt blancs, tantôt jaunes.

89. Hespérie Justinien.

Ailes noirâtres ; des points transparens aux supérieures; dessus des inférieures sans taches : milieu de leur dessous roussâtre, bordé postérieurement d'une rangée de taches cendrées, presqu'en forme d'yeux.

90. Hespérie Rémus.

Ailes noires ; les supérieures sans taches ; dessous des inférieures ayant une bande sinueuse blanche, avec un point noirâtre.

91. Hespérie Ménestriés.

Dessus des ailes noir ; celui des inférieures sans taches : deux lignes transverses, bleuâtres, sur leur dessous.

92. Hespérie Anaphus.

Ailes noirâtres ; extrémité postérieure des inférieures et des anneaux sur l'abdomen jaunes.

93. Hespérie Cebrenus.

Ailes d'un brun-clair ; une bande d'un blanchâtre-jaunâtre et demi-transparente aux supérieures.

94. Hespérie Hélius.

Ailes noirâtres ; côté extérieur des inférieures fauve.

95. Hespérie Pisistrate.

Ailes noirâtres ; les supérieures sans taches, avec un reflet jaune; milieu du dessus des inférieures jaune : une bande d'un blanc de neige, ponctuée de noir, sur leur dessous.

b. *Ailes, ou du moins les supérieures, différant sensiblement par leurs couleurs ou leur disposition dans les deux sexes : une ligne ou une tache plus ou moins noire, en forme de cicatrice oblique, coupant les nervures, sur le milieu du dessus de ces ailes, dans la plupart des mâles.*

* *Dessus des ailes supérieures ayant au milieu un trait ou une tache d'un noir plus ou moins foncé, oblique, ou coupant les nervures.*

† *Des taches constamment vitrées aux ailes supérieures.*

— *Massue des antennes terminée brusquement par un crochet.*

96. Hespérie Phocion.

Dessus des ailes noirâtre ; quatre taches jaunes et transparentes aux supérieures : les trois postérieures disposées en une rangée transverse, l'autre située à la côte, échancrée ; dessus des ailes inférieures sans taches : des lignes et des taches d'un noirâtre-brun sur leur dessous.

HESPÉRIE. (Insecte.)

97. Hespérie Sinon.

Disque des ailes d'un noirâtre-brun; quatre taches d'un jaune-transparent aux supérieures : deux près de la côte, écartées, les autres rapprochées; un point jaune et discoïdal des deux côtés des ailes inférieures.

98. Hespérie Godart.

Dessus des ailes d'un noirâtre-brun; cinq taches d'un jaune-transparent aux supérieures; un point jaune sur le dessus des inférieures : leur dessous fauve, avec deux raies parallèles d'un jaune d'or pâle.

99. Hespérie Julien.

Ailes (mâle) *noirâtres; plusieurs points blancs et transparens au milieu des supérieures, deux antérieurs et rapprochés, les autres disposés en une ligne arquée; une raie de points blancs sur le milieu du dessous des inférieures.*

— — *Antennes terminées en une massue régulièrement arquée dès son origine et sans crochet brusque à son extrémité.*

100. Hespérie Péron.

Ailes (mâle) *noirâtres en dessus, d'un noirâtre-cendré en dessous; les supérieures ayant une petite ligne placée au-dessus d'une tache très-noire et quatre points près du sommet, d'un blanc-transparent; les inférieures sans taches.*

† † *Point de taches parfaitement et constamment vitrées aux ailes supérieures, quelques-unes au plus semi-diaphanes.*

101. Hespérie Nason.

Ailes noirâtres, le plus souvent sans taches, avec la frange postérieure roussâtre ou blanchâtre.

102. Hespérie Pélopidas.

Ailes (mâle) *cendrées; les supérieures et des points marginaux aux inférieures plus obscurs.*

103. Hespérie Silius.

Ailes (femelle) *d'un noirâtre-brun; une bande transverse fauve et courte des deux côtés du disque des supérieures.*

104. Hespérie Cornélius.

Ailes (mâle) *noirâtres, luisantes; une tache d'un noir-foncé, médiaire, ovoïde et deux points blancs, sur les supérieures : une ligne de points de la même couleur, sur le dessous de toutes.*

105. Hespérie Pompée.

Ailes (mâle) *supérieures et dessus des inférieures noirâtres; une tache très-noire avec deux points d'un brun-pâle et rapprochés au milieu du dessus des supérieures; dessous des inférieures d'un jaunâtre-obscur, avec des bandes noirâtres.*

106. Hespérie Mésogramme.

Ailes noirâtres; inférieures ayant en dessus un point presque central et en dessous une bande transverse, d'un jaune-pâle ou blanchâtre; une tache d'un noir-foncé, ovoïde, bordée de fauve, sur le dessus des ailes supérieures du mâle.

107. Hespérie Phinée.

Ailes noirâtres en dessus, d'un jaunâtre-fauve en dessous, le milieu des supérieures excepté; extrémité antérieure du bord externe et une bande maculaire sur le dessus de celles-ci, extrémité du bord postérieur et une bande continue sur le même côté, aux inférieures, d'un fauve-jaune.

HESPÉRIE. (Insecte.)

108. Hespérie Coras.

Ailes noirâtres ; une bande maculaire, une tache striée à la base des supérieures et des taches à la base du dessous des inférieures, d'un jaunâtre-fauve.

109. Hespérie Thaumas.

Ailes noirâtres ; les supérieures ayant tantôt (mâle) *le côté extérieur, depuis la base jusqu'au milieu, fauve, avec une petite ligne d'un noir-foncé, terminée par un point de cette couleur, et quelques points fauves près du sommet ; tantôt* (femelle) *n'offrant qu'une raie de points blancs et vitrés.*

110. Hespérie Drury.

Ailes supérieures noirâtres, avec la côte, son extrémité exceptée, et une raie maculaire et transverse, roussâtres : un point très-noir sur leur disque, dans le mâle ; *les inférieures d'un noirâtre-roussâtre, avec une raie peu marquée de points plus pâles sur le milieu de leur dessous.*

111. Hespérie Augias.

Ailes supérieures et dessous des inférieures d'un jaune-roux ; dessus de celles-ci noir, avec un point presque central et une bande postérieure dentée de chaque côté, d'un jaune-fauve ; dessus des premières ayant une ligne oblique et courbe et le limbe postérieur noirs.

112. Hespérie Phylæus.

Ailes d'un jaune-fauve ; dessus des supérieures ayant soit (mâle) *une bande oblique et interrompue, soit* (femelle) *une tache arquée et le limbe postérieur noirâtres ; même côté des postérieures bordé extérieurement de noirâtre.*

113. Hespérie Epictète.

Dessus des ailes noir ; deux lignes aux supérieures, dont l'une costale et l'autre interne, oblique, plus longue et recourbée postérieurement, un point intermédiaire et milieu du dessous des quatre ailes, d'un jaune-jauve.

114. Hespérie Bandes-jaunes.

Ailes noires ; les supérieures ayant des deux côtés deux taches marginales, l'une à leur base, grande, triangulaire, l'autre près du sommet, et une bande postérieure, jaunes ; deux points et une bande transverse de cette couleur aux inférieures.

115. Hespérie Thémistocle.

Ailes noirâtres ; une tache et une raie maculaire jaunes aux supérieures ; les postérieures sans taches, grises en dessous.

116. Hespérie Comma.

Ailes d'un fauve-obscur, avec des taches d'un jaune-pâle en dessus et des taches blanches en dessous : taches du dessous des inférieures au nombre de neuf.

117. Hespérie Sylvain.

Ailes d'un fauve-obscur et ayant de part et d'autre des taches d'un jaune-pâle : taches du dessous des inférieures au nombre de cinq.

118. Hespérie Linéa.

Ailes d'un fauve-luisant, avec une bordure brune en dessus, et la région du sommet d'un cendré-verdâtre en dessous : les deux surfaces des quatre sans taches dans la femelle.

HESPÉRIE. (Insecte.)

119. Hespérie Linéola.

Ailes entières, divergentes, fauves, semblables de part et d'autre, sans taches dans la femelle, *avec un trait noir plus étroit dans le* mâle.

120. Hespérie Actéon.

Ailes d'un fauve-obscur, avec une bordure brune en dessus et la région du sommet d'un cendré-verdâtre en dessous : les supérieures ayant de part et d'autre un arc transverse de taches d'un jaune-pâle.

** *Milieu du dessus des ailes supérieures des mâles sans ligne ni tache noire ou noirâtre et oblique, caractérisant ce sexe.*

121. Hespérie ornée.

Ailes supérieures noirâtres, avec trois (mâle) *ou cinq* (femelle) *taches jaunâtres en dessus : taches et sommet de leur côté inférieur blanchâtres ; dessus des ailes inférieures noir, avec une bande safranée, transverse, et le bord postérieur entrecoupé de noir et de blanc : leur dessous blanchâtre, avec des rangées transverses de taches noires.*

122. Hespérie Peinte.

Dessus des ailes supérieures noirâtre, avec des taches jaunâtres et une série de points transparens près du sommet ; dessus des inférieures noir, avec une bande transverse et une rangée marginale de points, safranés : dessous de toutes, le disque des supérieures excepté, d'un fauve-brun ; des nervures longitudinales, une bande et une ligne transverses, blanchâtres, aux inférieures.

123. Hespérie Properce.

Dessus des ailes noir ; des lignes et des taches jaunes sur les supérieures ; une bande de cette couleur sur le dessus des inférieures : des bandes fauves et jaunes alternantes sur leur dessous.

124. Hespérie Galien.

Ailes noirâtres, avec des points et des taches jaunes ; une bande maculaire et transverse aux supérieures et une tache de cette couleur, grande, en forme de carré-long, s'étendant depuis le centre jusqu'au bord postérieur, aux inférieures.

125. Hespérie Nostradamus.

Ailes entières, brunes : milieu du dessus des supérieures noir dans le mâle, *traversé de part et d'autre dans la* femelle *par une ligne de taches jaunes : dessous des inférieures cendré.*

126. Hespérie Paniscus.

Ailes entières, d'un brun-noirâtre, chatoyant en rougeâtre, avec des taches fauves : les inférieures ayant dix taches en dessus et treize plus pâles en dessous.

127. Hespérie Sylvius.

Ailes entières ; les deux surfaces des supérieures d'un jaune-doré-luisant, avec des points noirs ; les inférieures brunâtres, avec onze taches d'un jaune-doré en dessus et douze en dessous.

128. Hespérie Aracynthus.

Ailes entières, d'un brun-noirâtre-luisant ; sommet des supérieures tacheté de jaune de part et d'autre ; dessous des inférieures d'un jaune-roussâtre, avec douze taches blanches orbiculaires et cerclées de noir.

129. Hespérie Métis.

Ailes supérieures et dessus des inférieures d'un noirâtre-foncé, avec des taches fauves et pour la plupart en forme de points ; dessous des inférieures d'un noirâtre-brun, sans taches.

130. Hespérie Plutargus.

Ailes noirâtres, parsemées d'or ; une

tache à l'extrémité supérieure des premières et le dessous de leur bord extérieur roussâtres.

131. Hespérie Numitor.

Dessus des ailes supérieures noirâtre, avec un reflet fauve; celui des inférieures d'un jaune-roussâtre, avec le limbe extérieur noirâtre : leur dessous jaunâtre.

132. Hespérie Catulle.

Ailes d'un noir-foncé, ayant le plus souvent en dessus une ligne postérieure de points blancs.

133. Hespérie hottentote.

Ailes supérieures d'un noirâtre-cendré : leur côté interne et les postérieures d'un jaunâtre-pâle.

134. Hespérie Lepeletier.

Ailes noirâtres; deux lignes blanches, longitudinales, droites et dont l'interne courte, sur le dessous des inférieures.

135. Hespérie l'Herminier.

Ailes sans taches, noirâtres en dessus, d'un noirâtre-cendré en dessous; antennes annelées de blanc.

B. *Ailes inférieures sans prolongement ni sinus à l'angle anal (généralement plus larges et plus arquées au bord postérieur que dans les divisions précédentes : le noir et le blanc, plus ou moins mélangés, dominant dans la plupart).*

a. *Ailes dentées.*

* *Dentelures des ailes assez fortes et très-sensibles.*

136. Hespérie de la Lavatère.

Ailes supérieures jaunâtres, avec deux bandes plus pâles et des taches transparentes; dessus des inférieures d'un brun-olivâtre et ponctué de blanchâtre : leur dessous blanchâtre et presque sans taches.

137. Hespérie de la Guimauve.

Ailes d'un brun-olivâtre en dessus; les supérieures ayant deux bandes transverses d'un gris-bleuâtre et des taches transparentes; les inférieures ponctuées de blanc de part et d'autre, et ayant le dessous d'un cendré-pâle.

138. Hespérie de la Mauve.

Ailes d'un brun-olivâtre en dessus, avec trois bandes transverses d'un gris-rougeâtre; supérieures ayant des taches transparentes; dessous des inférieures d'un brun-pâle et ponctué de blanc.

* * *Dentelures des ailes foibles ou à peine sensibles.*

139. Hespérie Eucrate.

Ailes d'un brun-pâle, et ponctuées de blanc; dessous des inférieures d'un jaune-fauve, avec des taches blanchâtres.

140. Hespérie Proto.

Ailes d'un brun-noirâtre, avec une bande maculaire et des points d'un jaune-pâle; dessous des inférieures brun, presque fascié et ponctué de blanchâtre.

b. *Ailes très entières ou sans dentelures.*

141. Hespérie Tagès.

Ailes d'un brun-noirâtre, offrant de part et d'autre une rangée marginale de petits points blancs; dessus des supérieures ayant deux bandes transverses d'un cendré-pâle.

142. Hespérie du Sida.

Ailes d'un brun-noirâtre; les supérieu-

res ayant une série flexueuse de taches blanches carrées, et une autre moins distincte avant le bord; dessous des inférieures blanc, avec une tache basilaire et deux bandes transverses d'un jaune foncé.

143. Hespérie Orbifère.

Ailes d'un brun-violet-luisant en dessous; les supérieures ayant deux séries flexueuses de taches blanches; dessous des inférieures d'un brun-tanné-clair, avec plusieurs taches blanches, dont les médiaires arrondies: dernier entrecoupé blanc de la frange des ailes supérieures, à partir du sommet, plus large que les autres.

144. Hespérie Sao.

Ailes d'un brun-violet-luisant en dessus; les supérieures ayant deux séries flexueuses de taches blanches; dessous des inférieures d'un rouge-brique, avec plusieurs taches blanches, dont les médiaires irrégulières: troisième entrecoupé blanc de la frange des ailes supérieures, à partir du sommet, plus large que les autres.

145. Hespérie Plain-chant.

Ailes d'un brun-noirâtre; les supérieures ayant une série flexueuse de taches blanches carrées, et une autre moins distincte avant le bord; dessous des inférieures d'un brun-verdâtre, avec des bandes de taches blanches: deuxième tache marginale, à partir du sommet, plus longue et ayant le bout intérieur en pointe bifide.

146. Hespérie Fritillaire.

Ailes d'un brun-noirâtre; les supérieures ayant un œil central et une série flexueuse de taches blanches, carrées; dessous des inférieures d'un brun-verdâtre, avec des bandes de taches blanches: deuxième tache marginale, à partir du sommet, plus courte et ayant le bout intérieur obtus.

147. Hespérie du Chardon.

Ailes d'un brun-noir; les supérieures ayant trois séries flexueuses de taches blanches; dessous des inférieures d'un brun-olivâtre, avec plusieurs taches blanches, dont une beaucoup plus grande sur le milieu du bord d'en haut.

148. Hespérie Vindex.

Ailes supérieures et dessus des inférieures noirs; des bandes d'un jaunâtre-obscur et blanches, alternantes, sur le dessous de celles-ci: une bande presque centrale, blanche, sur leur dessus; plusieurs taches éparses et une rangée postérieure de points de cette couleur aux supérieures.

149. Hespérie Galba.

Ailes noirâtres, plus claires en dessous; deux lignes postérieures de points sur toutes: plusieurs taches éparses aux antérieures et deux bandes aux postérieures, blanches.

150. Hespérie Syrichtus.

Dessus des ailes noir, avec un duvet, des taches en échiquier et des stries costales, blancs; dessous des supérieures presque semblable à leur dessus: celui des postérieures blanc, avec des raies noires; limbe postérieur de toutes ponctué de blanc des deux côtés.

151. Hespérie Tryxus.

Ailes supérieures et dessus des inférieures noirâtres, avec une bande transverse, composée de diverses taches anguleuses, d'un blanc-transparent; dessous des inférieures blanchâtre, avec une rangée terminale de points noirâtres.

HESPÉRIE. (Insecte.)

152. Hespérie Arsalte.

Ailes blanches, avec le bord postérieur strié de noir.

153. Hespérie Dioscoride.

Dessus des ailes noirâtre, avec deux lignes maculaires, jaunes; dessous des supérieures fauve, avec le disque noirâtre, tacheté de jaune; dessous des inférieures de cette couleur, avec des ondes noirâtres.

154. Hespérie Mavius.

Dessus des ailes noir, avec des lignes et une bande maculaire jaunâtres: leur dessous verdâtre, avec des stries et des taches blanches.

155. Hespérie Cicérou.

Ailes noirâtres; des taches aux supérieures et disque des inférieures d'un blanc presque transparent: tache discoïdale de celles-ci dentée; avec une tache noirâtre en dessous.

156. Hespérie Népos.

Ailes supérieures et dessus des inférieures d'un noirâtre-foncé, avec des taches et des points plus obscurs; des points blancs et transparens sur celles-ci: les mêmes blanches en dessous, à l'exception de leur côté extérieur, cendrées en dessus à l'angle anal, avec la frange postérieure blanche.

157. Hespérie Philémon.

Ailes sans taches, d'un noir-soyeux et luisant en dessus, d'un noirâtre-brun en dessous: bord interne des supérieures plus clair; antennes annelées de blanc.

158. Hespérie Jovien.

Ailes supérieures noires, avec une bande maculaire d'un blanc-transparent; les inférieures bleues, avec une bande blanche: les nervures et le limbe extérieur noirs.

159. Hespérie Salvien.

Dessus des ailes noirâtre, tacheté de vert; dessous des inférieures blanc, avec une ligne marginale de points noirâtres.

160. Hespérie Juvénal.

Ailes d'un noirâtre-clair, avec des lignes de points blanchâtres ou noirâtres, presqu'en forme d'yeux, sur le limbe postérieur; une rangée transverse de points transparens, bordés de noirâtre, aux ailes supérieures.

161. Hespérie Mimas.

Ailes noirâtres, avec le bord postérieur ferrugineux, et ayant en dessous une ligne de points noirs; trois points blancs et rapprochés aux supérieures.

162. Hespérie Néron.

Dessus des ailes supérieures noirâtre, avec des taches blanches et d'autres cendrées et marginales; celui des inférieures très-noir, sans taches; dessous de toutes jaunâtre, tacheté de blanc et de noir.

163. Hespérie Orcus.

Ailes supérieures et dessus des inférieures noirâtres; des points et une tache en croissant, vitrés, sur celles-là; celles-ci à bandes supérieures et dessous bleuâtres.

164. Hespérie Chlorocéphale.

Ailes d'un noirâtre-foncé, avec des bandes maculaires plus obscures; dessous des inférieures cendré au côté interne; palpes et dessus de la tête à écailles vertes et brillantes.

2. *Ailes supérieures ayant soit la côte très-arquée, soit l'angle du sommet avancé en manière de crochet ou de faulx.*

HESPÉRIE. (Insecte.)

A. *Bord postérieur des ailes supérieures presque droit ou sans courbure notable ni angle : le sommet point avancé brusquement en manière de dent ou de crochet.*

a. *Côté extérieur des ailes inférieures sans dents.*

165. Hespérie Mélandre.

Ailes blanches, avec des raies, des taches et plusieurs nervures noirâtres, obscurcissant souvent leur base et leur limbe postérieur ; quelques points transparens aux supérieures.

b. *Côté extérieur des ailes inférieures ayant une dent forte et aiguë.*

166. Hespérie Néarque.

Ailes noirâtres en dessus, brunes en dessous, avec des lignes plus foncées des deux côtés.

B. *Bord postérieur des ailes supérieures soit fortement arqué, soit anguleux, le sommet avancé ou terminé brusquement en manière de crochet ou de faulx. (Ailes inférieures comme tronquées postérieurement ou très-concaves à l'angle anal.)*

a. *Côté extérieur des ailes inférieures denté ou anguleux.*

167. Hespérie Westermann.

Ailes d'un noirâtre-cendré ou d'un brun-noirâtre en dessus, brunes en dessous, avec des lignes plus obscures et ondulées, des deux côtés ; des points vitrés et voisins de la côte aux supérieures ; un avancement bidenté au côté extérieur des inférieures.

168. Hespérie Sébaldus.

Ailes noirâtres avec des ondes d'un noir-foncé ; sommet des supérieures crochu ; limbe postérieur des inférieures jaunâtre en dessous, avec des points noirâtres.

b. *Côté extérieur des ailes inférieures sans angle ni dents.*

169. Hespérie Trasybule.

Dessus des ailes noir, avec des ondulations bleues ; dessous des inférieures cendré et ponctué de noirâtre à l'angle anal.

170. Hespérie Mithridate.

Ailes très-noires, avec une tache et une bande postérieure d'un rouge-pourpre et des taches lunulées plus pâles.

171. Hespérie Brebisson.

Ailes supérieures et dessus des inférieures d'un noirâtre-clair ; celles-ci ponctuées de noir : l'extrémité postérieure de leur dessus, leur dessous, le bord externe excepté, bleuâtres ; bord postérieur des supérieures anguleux.

I. *Angle anal des ailes inférieures prolongé en manière de queue (souvent plumeuse), longue, étroite ou presque linéaire.*

Observations. Espèces analogues, dans ce genre, aux papillons grecs à queue, toutes propres à l'Amérique, & spécialement à ses contrées équatoriales, à antennes terminées en massue courbée ou crochue; taille moyenne, envergure d'environ deux pouces.

1. *Bord postérieur des ailes inférieures entier ou sans dentelures sensibles; les uns ayant, pour la plupart, aux ailes supérieures, une ligne blanche & transparente, allant du milieu de la côte à l'angle interne: une bande blanche & transverse sur le dessous des inférieures dans les autres.*

A. *Une bande blanche ou jaunâtre aux ailes inférieures, soit interne, soit marginale.*

1. Hespérie Eudoxe.

Hesperia Eudoxus.

Hesperia alis nigro-fuscis; anticis fasciâ transversâ posticisque margine postico albis, his infrà fasciâ flavescente.

Hesperia U. Eudoxus, *alis caudatis, fuscis: anticis utrinquè, posticis subtùs fasciâ albâ.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 331. *n°.* 255.

Papilio P. U. Eudoxus. *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 85. *n°.* 775.

Papilio Eudoxus. Cram. *Pap.* 31. *pl.* 366. G. H.

Le corps est d'un noirâtre-foncé, avec un duvet d'un vert-foyeux & luisant à l'origine des ailes. Les supérieures sont traversées dans leur milieu par une bande d'un blanc-transparent, n'atteignant pas les deux bords. Les ailes inférieures sont finement bordées de blanc au bord postérieur & offrent en dessous, à peu de distance de ce bord, une bande étroite & transverse jaunâtre; les queues, d'après la figure de Cramer, sont un peu plus courtes que dans les espèces suivantes & divergentes.

Cette espèce habite Surinam.

2. Hespérie Métophis.

Hesperia Metophis.

Hesperia alis supràfuscis, infrà fusco-ferrugineis, anticarum limbo postico margineque interno, posticarum strigâ mediâ, griseis: anticis maculis quinque hyalinis transversim seriatis.

Le dessus du corps est noirâtre, avec des poils verdâtres vers l'origine des ailes. Les supérieures ont des taches transparentes, d'inégale grandeur, dont cinq formant une ligne transverse, une sixième isolée, placée extérieurement près du milieu de cette ligne, & quatre autres près de la côte, avant le sommet, très-petites, surtout les deux postérieures, disposées aussi sur une ligne, mais très-courte & divisée obliquement dans un sens opposé à la précédente; le dessous des quatre ailes est d'un brun-ferrugineux; le bord interne des supérieures & leur limbe postérieur, à l'exception du bout, est grisâtre; une raie droite & oblique de la même couleur traverse le milieu des inférieures: mais cette teinte s'étend insensiblement sur le côté postérieur, de manière à former une sorte de bande bien terminée seulement au côté antérieur & par la raie; immédiatement au-dessous, l'aile est d'un ferrugineux plus clair, avec le bord postérieur grisâtre.

Elle se trouve au Bréfil, d'où M. Langsdorff me l'a envoyée.

3. Hespérie Cœlus.

Hesperia Cœlus.

Hesperia alis supràfuscis, posticis infrà fasciâ mediâ transversâ niveâ.

Papilio Cœlus. Cram. *Pap.* 29. *pl.* 343. G. D.

Le corps proprement dit est noir en dessus & d'un jaunâtre-obscur en dessous. Le dessus des ailes est noir, avec une teinte d'un vert-foyeux se terminant avec les bords. Les supérieures ont de petites taches d'un jaune-transparent, dont cinq sur une ligne transverse, une quatrième en dehors des précédentes, isolée, & deux très-petites, en forme de points très-rapprochés, situées à la côte, avant l'angle du sommet. Le dessous des ailes est noirâtre ou plus clair que le dessus. Les inférieures n'ont point de dentelures sensibles, & leur milieu offre une bande étroite d'un très-beau blanc, un peu sinuée sur ses bords, partant près du milieu du bord externe & se rendant au bord opposé. Les queues sont plumeuses.

Elle se trouve au Bréfil, & m'a été envoyée par M. Langsdorff.

4. Hespérie Orion.

Hesperia Orion.

Hesperia nigro-fusca; alarum posticarum limbo externo caudisque albis.

Hesperia U. Orion, *alis caudatis fuscis: anticis maculis senestratis, posticis caudis albis.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 330. *n°.* 254.

Papilio P. U. Orion. *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 85. *n°.* 774. — *Spec. Inf. tom.* 2. *p.* 133. *n°.* 605.

Papilio P. U. Proteus, *var.* β. Linn. *Mus. Lud. Ulr. p.* 333.

Papilio Orion. Cram. 13. *pl.* 155. A. B.

Drury, *Inf. tom.* 3. *pl.* 17. *fig.* 3. 4.

Clerck, *Icon. tab.* 42. *fig.* 5. 6.

Les corps eſt d'un noirâtre-obſcur, avec une teinte d'un vert-foyeux à l'origine ſupérieure des ailes. La ligne blanche & tranſverſe des premières eſt compoſée de quatre à cinq taches contiguës ou ſimplement ſéparées par des nervures plus ou moins grandes, & ſe termine un peu avant l'angle interne. Les ſecondes ailes ont en outre quatre autres taches blanches & diaphanes, mais très-petites, dont une adjacente au bord poſtérieur de la raie, près de ſon milieu, & les trois autres en forme de petits points, diſpoſées en une petite ligne près de la côte, entre cette raie & le ſommet. Le limbe poſtérieur des ſecondes ailes, à l'exception de la partie ſupérieure voiſine de l'angle externe, & la queue, ſont blancs, ou d'un blanc-jaunâtre; en deſſous, cette bande blanche eſt entrecoupée au bord poſtérieur d'une rangée de petits traits preſqu'en forme de lunules & noirâtres.

Elle ſe trouve au Bréſil & à Surinam.

B. *Point de bande blanche ou jaunâtre, ſoit marginale, ſoit interne, aux ailes inférieures.*

5. Hespérie Eurycles.

Hesperia Eurycles.

Heſperia alis fuſcis; poſticis ſubtùs faſciis tribus nigris, baſilari abbreviatâ vel punctiformi.

Papilio P. U. Proteus, *var δ.* t. Linn. *Muſ. Lud. Ulr. p.* 333 ?

Papilio Dorantes. Stoll, *Suppl. aux Pap. de* Cram. *pl.* 39. *fig.* 9. *var.* A.

Papilio Simplicius. Ibid. *fig.* 6. 6. E. *var.* B.

Le corps eſt noirâtre. Les ailes ſupérieures, dans pluſieurs individus, ont la raie blanche tranſverſe & le groupe de petits points ſitués près de la côte, que l'on obſerve dans l'eſpèce précédente; mais cette ligne eſt plus fine, ſans taches adjacentes à ſon bord poſtérieur; dans d'autres individus, elle eſt plus courte & moins foncée, & finit enfin par diſparoître, ainſi que les autres taches, comme cela a lieu dans l'individu repréſenté par Stoll, ſous le nom de *Simplicius*; le nombre des points tranſparens qui compoſent le petit trait ſitué près de la côte, avant le ſommet, eſt généralement de quatre. Le deſſous des inférieures préſente trois bandes noirâtres ou plus foncées que le fond, dont la ſupérieure beaucoup plus courte & ſouvent réduite à une ſimple tache arrondie; la ſeconde, ou l'intermédiaire, eſt quelquefois diviſée en deux, près du bord extérieur. Dans les individus qui, par l'étendue de la raie des ailes ſupérieures, ſe rapprochent le plus de l'*Orion*, le deſſous des ailes inférieures & ſes bandes ſont plus foncés; une ligne très-fine, jaunâtre, ſuit en deſſous le frangé du bord poſtérieur. Cette eſpèce, avec les variétés indiquées ci-deſſus, m'a été envoyée du Bréſil par M. Langſdorff.

Je n'ai point vu d'individu qui ſe rapportât parfaitement à la figure du *Dorantes* de Stoll. Mais comme cette heſpérie ne paroît différer de notre *Eurycles*, qu'en ce que les ailes ſupérieures ont les taches plus iſolées & plus nombreuſes, & que le bord poſtérieur des ailes inférieures eſt repréſenté entier, je crois pouvoir la conſidérer comme une ſimple variété de cette eſpèce. Si ce bord avoit réellement des dentelures, cette heſpérie ne ſeroit qu'une variété du *Proteus*.

---

2. *Bord poſtérieur des ailes inférieures ſenſiblement denté ou ſinueux.*

Nota. Ailes noirâtres; des taches d'un jaunâtre-tranſparent ſur les ſupérieures de tous; quatre à cinq plus internes ſur une ligne tranſverſe, trois autres très-petites & très-rapprochées, à la côte, avant le ſommet, & une dernière, aſſez grande, iſolée dans l'eſpace intermédiaire.

6. Hespérie Catillus.

Hesperia Catillus.

Heſperia fuſca; alis anticis ſubtùs maculâ apicali poſticiſque faſciâ maculari arcuatâ brunneo fuſcis, ſpatiis adjectis griſeis.

Papilio Catillus. Cram. *Pap.* 21. *pl.* 260. F. G.

Nous penſons avec Cramer, & d'après l'obſervation de pluſieurs individus, que cette eſpèce eſt très-diſtincte de l'*H. Protée*. Le deſſous des ailes inférieures offre près de l'angle du ſommet une tache triangulaire d'un brun-foncé, placée ſur un fond gris. Dans les individus où les couleurs ſont le plus tranchées, le deſſous des inférieures préſente, à peu de diſtance de leur origine, trois à quatre taches pareillement d'un brun-foncé, & ſur un fond gris ou cendré, qui forme même une ligne ou bande oblique bifurquée, à ſon extrémité inférieure; au bord externe & au-deſſous des taches précédentes, on en voit une autre de la même couleur, & bordée auſſi de gris; le long du bord poſtérieur eſt une ligne de cette couleur, mais qui paroît peu dans d'autres individus.

Je l'ai reçue du Bréſil.

7. Hespérie Protée.

Hesperia Proteus.

Heſperia fuſca; alis poſticis ſubtùs dilutioribus, maculâ baſin verſus faſciiſque tribus nigricantibus.

Hesperia U. Proteus, *alis caudatis, fuscis, maculis feneſtratis; antennis uncinatis.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 331. *n°.* 256.

Papilio P. U. Proteus. *Mant. Inſ. tom.* 1. *p.* 85. *n°.* 76. — *Spec. Inſ. tom.* 2. *p.* 132. *n°.* 606. — *Syſt. Ent. p.* 532. *n°.* 379.

Papilio P. U. *Proteus.* Linn. *Syſt. Nat.* 2. *p.* 794. *n°.* 259. — *Muſ. Lud. Ulr. p.* 333. *n°.* 151.

Papilio Proteus. Cram. *Pap.* 22. *pl.* 260. D. E.

Papilio Proteus. Smith-Abbot, *Lépid. Georg. tom.* 1. *p.* 59. *tab.* 18.

Clerck, *Icon. Inſ. tab.* 42. *fig.* 1. 2.

Merian, *Surin. tab.* 63. *fig.* 2.

Les taches tranſparentes des ailes ſupérieures varient pour la grandeur; on voit ſouvent au-deſſous des poſtérieures un eſpace plus clair; le bord poſtérieur, dans quelques individus, offre une rangée de points noirâtres. Le deſſous des ailes inférieures eſt moins foncé que l'autre ſurface, avec une tache preſqu'en forme de point près de la baſe, & trois bandes tranſverſes, ondulées, dont la ſeconde ordinairement coupée près de la côte, & dont la dernière plus étroite ou ne formant qu'une ligne d'un noirâtre-foncé. On aperçoit çà & là de petits atomes griſâtres, dont quelques-uns réunis même quelquefois en manière de petits traits, bordant intérieurement la première bande. A l'origine ſupérieure des ailes eſt un duvet d'un vert-foyeux.

Je poſſède une variété où le deſſous des ailes inférieures eſt preſque cendré, avec trois bandes tranſverſes noirâtres, & où cette couleur cendrée forme, ſur le deſſous de l'extrémité des ailes inférieures, une grande tache.

Linnée dit (*Muſ. Lud. Ulr.*) que le papillon *Protée* varie preſqu'à l'infini, & il en cite ſept variétés principales; mais à moins qu'on ne veuille tout confondre & retomber dans le chaos, il eſt abſolument néceſſaire de diſtinguer ſpécifiquement pluſieurs de ces variétés.

Ce lépidoptère eſt commun dans toutes les parties de l'Amérique ſituées entre les tropiques, remonte même au nord, juſqu'en Géorgie, mais où, ſuivant Abbot, il eſt rare. Fabricius dit que la chenille vit ſur le dolichus; qu'elle eſt verte, avec le col noir & des raies longitudinales dont les latérales jaunes & celles du dos noires.

Abbot l'a trouvée ſur le clitoria rouge. Elle eſt verte, avec des raies jaunâtres & l'anus rouſſâtre; la tête eſt forte, un peu concave en deſſus & brune, ainſi que le col, avec les eſpaces oculaires plus pâles. De même que les autres chenilles des heſpéries, elle plie les feuilles de cette plante, pour s'y mettre à l'abri. Celle qu'il éleva ſe fila une coque le 2 juillet, & ſes métamorphoſes ſe terminèrent le 18 août. On ne trouve ainſi ce lépidoptère qu'en automne. Il fut très-commun en 1782; mais depuis cette époque, l'auteur n'en vit plus. Cette chenille ſe nourrit auſſi de diverſes autres plantes légumineuſes.

II. *Ailes inférieures ſans queue ou n'ayant au plus qu'un prolongement fort court, en manière de dent, à l'angle anal.*

1. *Ailes ſupérieures peu ou point arquées à la côte: leur ſommet peu ou point prolongé, ne formant ni crochet ni faulx.*

Nota. Dernier article des palpes extérieurs ordinairement très-petits, comparativement au précédent & peu velu.

A. *Bord poſtérieur des ailes inférieures ſoit prolongé à l'angle anal ou un peu plus extérieurement, en manière de dent ou de très-petite queue, ſoit offrant, avant cet angle, un finus ou une échancrure.*

Nota. Les eſpèces de la diviſion oppoſée ont le bord poſtérieur des ailes inférieures proportionnellement plus long, plus arqué & preſqu'inſenſiblement réuni avec le bord latéral extérieur. Le plus ſouvent les quatre ailes ſont variées de noir & de blanc, ou noirâtres, avec des lignes ou des bandes plus foncées ou d'une autre couleur, nombreuſes & ondulées. Ces caractères ſecondaires peuvent ſuppléer à ceux que j'ai donnés, & qu'il n'eſt pas toujours facile de ſaiſir, tant ces variétés de formes ſe nuancent imperceptiblement.

a. *Ailes des deux ſexes preſque ſemblables, ou ſans différences notables; les ſupérieures des mâles n'offrant jamais en deſſus, au milieu du diſque, un trait noirâtre ou plus foncé que le fond, oblique & coupant les nervures.* (*Ailes inférieures dentées ou avec l'angle anal ſenſiblement prolongé, en manière de dent, dans pluſieurs; fond du deſſus des ſupérieures généralement peu varié, & ayant dans le plus grand nombre des taches tranſparentes.*)

* *Une portion de la tête, l'anus ou l'angle anal des ailes inférieures* (*ſouvent auſſi le collier ou prothorax*) *rouges ou orangés.*

Nota. Eſpèces paroiſſant repréſenter dans cette tribu les papillons *Troyens* de Linnæus, propres aux contrées équatoriales, grandes ou moyennes, ayant les ailes noires ou d'un noir-verdâtre & les palpes extérieurs larges, très-velus & noirs à leur extrémité.

† *Bord poſtérieur des ailes inférieures droit & très-entier.*

— *Antennes courbées bruſquement à leur extrémité & terminées en une pointe fine, très-aiguë.*

8. Hespérie Arinus.

Hesperia Arinus.

Hesperia alis atris; anticis maculâ mediâ, posticis margine postico, niveis.

Hesperia U. Arinus, *alis caudatis, concoloribus, atris : maculâ transversâ niveâ, ano sanguineo.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 336. *n°.* 276.

Papilio P. U. Arinus. *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 87. *n°.* 792. — *Spec. Inf. tom.* 2. *p.* 134 *n°.* 617.

Papilio Arinas. Cram. *Pap.* 9. *pl.* 100. D.

Sa largeur, les ailes étendues, est d'environ deux pouces. Le corps est d'un noir-foncé, avec une teinte d'un bleu-chatoyant sur les ailes. Le devant de la tête & l'anus sont d'un rouge-sanguin. Les secondes ailes sont bordées de blanc au bord postérieur. Le milieu des supérieures offre une tache de cette couleur, ovale, transverse, d'un lustre argenté & tant soit peu transparente, selon Cramer.

Elle habite la colonie de Surinam.

9. Hespérie Cléanthe.

Hesperia Cleanthes.

Hesperia atra, capite anoque sanguineis; alis supra atro-cæruleis; anticarum disco maculis tribus punctoque fenestratis, posticarum margine postico albo intùs sanguineo.

Je dois à l'amitié de M. Langsdorff un individu mâle de cette espèce, qui se rapproche beaucoup de la précédente par la taille. Son corps est d'un noir-bleuâtre-foncé, avec la tête, le collier & l'anus, d'un rouge-sanguin-clair. Les hanches antérieures sont d'un rouge-foncé. Les ailes sont en dessus d'un bleu très-foncé, soyeux & luisant; leur dessous, à l'exception du centre des supérieures qui conserve la teinte supérieure, est d'un ferrugineux-obscur, avec la partie contiguë au limbe du bord postérieur, plus claire, & formant presqu'une bande transverse d'un gris d'agate. Le milieu des supérieures a sur les deux surfaces trois taches & un point au-dessus d'elles, transparens; ces taches sont disposées sur une ligne oblique & très-petites : celle du milieu est un peu plus grande, & presque lunulée. Les ailes inférieures sont terminées par une ligne blanche, jusque près de l'angle interne : cet angle est d'un rouge-sanguin. Le dessous du bouton des antennes est grisâtre.

Elle se trouve au Brésil.

10. Hespérie Polybe.

Hesperia Polybius.

Hesperia alis atris; anticis maculâ fulvâ, posticis angulo ani flavo.

Hesperia U. Polybius, *alis ecaudatis, atris : anticis maculâ fulvâ, posticis angulo ani flavo.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *pag.* 337. *n°.* 281.

Hesperia P. U Palemon. *Ibid. p.* 335. *n°.* 273. — *Papilio* P. U. Palemon. *Mant. Inf. tom.* 1. *p.* 87. *n°.* 789. — *Spec. Inf. tom.* 2. *pag.* 134. *n°.* 615.

Papilio P. U. *Polybius.* Donow. *of an Epitom. of the Nat. Hist. of the Inf. of India, n°.* 11. *pl.* 1. *fig.* 2.

Papilio Palemon. Cram. *Pap.* 11. *pl.* 131. F.

Son envergure est d'environ deux pouces. Le corps est d'un noir-foncé, avec les palpes inférieurs, le dernier article excepté, & le collier rouges. L'anus, dans cette espèce, est de la couleur du corps. Les ailes sont noires, un peu verdâtres, finement bordées de blanc au bord postérieur : la portion interne est roussâtre aux inférieures. La base des supérieures offre une teinte d'un vert-soyeux-luisant. Près du milieu de la côte est une petite tache oblongue, d'un rouge de sang, & coupée en deux parties très-inégales par une nervure.

On la trouve à Surinam & au Brésil.

11. Hespérie Lycagus.

Hesperia Lycagus.

Hesperia alis viridi-cæruleis, immaculatis.

Hesperia U. *alis rotundatis, integerrimis, viridi-cæruleis, immaculatis; ano sanguineo.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 348. *n°.* 322.

Papilio P. U. Lycagus. *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 90. *n°.* 815. — *Spec. Inf. tom.* 2. *p.* 136. *n°.* 633.

Papilio Lycagus. Cram. *Pap.* 15. *pl.* 176. G.

Nous n'avons point vu cette espèce; mais à en juger d'après la description de Fabricius & la figure de Cramer, elle se rapproche beaucoup de la précédente, & ne s'en éloigne qu'en ce que ses ailes sont sans taches & ne sont point sensiblement bordées de blanc. La tête, ou du moins sa partie supérieure & le collier, ne seroient point de couleur rouge, ainsi que cela a lieu dans les espèces de cette division.

Elle se trouve à Surinam.

— — *Antennes presque graduellement arquées à leur extrémité & terminées par une petite massue oblongue, insensiblement amincie vers sa pointe ou obtuse.*

12. Hespérie Jupiter.

Hesperia Jupiter.

Hesperia alis suprà viridi-atris, infrà aureo-virescentibus, venis margineque postico nigris.

Hesperia U. Jupiter, *alis ecaudatis, atris, viridi-nitentibus, subtùs viridibus, venis margineque nigris, capite anoque sanguineis.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 356. *n°.* 279.

Papilio P. U. Jupiter. *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 87. *n°.* 792.

Papilio Iphis. Drury, *Inf.* 2. *pl.* 15. *fig.* 3. 4.

Papilio Phidias. Cram. *Pap.* 21. *pl.* 244. A. B.

Cette espèce a environ trois pouces d'envergure, & doit être placée parmi les plus grandes de ce genre. Son corps est noir, avec les poils des deux premiers articles des palpes inférieurs, ceux de l'entre-deux des yeux, de la partie supérieure du prothorax ou du collier, le dessous du segment anal & le milieu du bord postérieur & inférieur du segment précédent d'un rouge-sanguin, mais qui tourne à l'orangé, dans les individus altérés par la vétusté. Les antennes sont entièrement noires & se terminent, un peu au-delà du milieu, en une massue presqu'en forme de fuseau, avec l'extrémité pointue & arquée. Le dernier article des palpes extérieurs est noir, beaucoup plus grêle que le précédent, proportionnellement plus alongé que dans les espèces voisines, cylindrique & arrondi ou obtus à son sommet. Le dessus des ailes est tantôt d'un noir-foncé un peu verdâtre, sans la moindre tache; tantôt généralement d'un verdâtre-bronzé, entrecoupé longitudinalement de noir, avec le sommet des ailes supérieures d'un roussâtre-pâle. Le dessous des quatre ailes est d'un vert-bronzé ou doré luisant, avec les nervures & le bord postérieur noirs; la couleur verte domine principalement sur les inférieures, & le noir des nervures y forme de grandes veines.

Selon Cramer, qui a représenté la variété dont les ailes supérieures sont roussâtres à leur sommet, elle se trouveroit à la Chine, au Bengale & sur les côtes d'Afrique voisines de l'équateur.

13. Hespérie Zéleucus.

Hesperia Zeleucus.

Hesperia alis atris, immaculatis, margine postico albo.

Hesperia U. Zeleucus, *alis integris, concoloribus, atris: posticis margine albo; capite caudâque sanguineis.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 346. *n°.* 317.

Papilio Thasus. Cram. *Pap.* 32. *pl.* 380. M. N.

Papilio Zeleucus. Donow. *of an Epitom. of the Natur. Hist. of the Insects Ind.* 11. *pl.* 3. *fig.* 3.

Elle est une des plus grandes, après la précédente. Son corps est d'un noir-foncé, avec une teinte d'un vert-foyeux foncé & chatoyant sur les ailes. Toute la tête, le collier, les hanches antérieures & l'anus sont d'un rouge de sang; le dessous du corps offre aussi sur les côtés des taches de cette couleur. Les quatre ailes sont terminées postérieurement par un liseré blanc & très-fin.

Elle se trouve à Surinam & au Brésil, d'où elle m'a été envoyée par M. Langsdorff.

14. Hespérie Mænade.

Hesperia Mænas.

Hesperia alis cœruleo-atris, margine postico posticarumque basi albis.

Hesperia U. Mænas, *alis integris, viridi-atris, nitentibus, margine albis; posticis subtùs fasciâ albâ; ore anoque rubris.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 347. *n°.* 318.

Papilio P. U. Phidias, *alis rotundatis atris, nitentibus, margine albis, ore anoque rubris.* Linn. *Syst. Nat.* 2. *p.* 795. *n°.* 263. — *Mus. Lud. Ulr p.* 334. *n°.* 152.

Clerck, *Icon. tab.* 44. *fig.* 1. 2.

Papilio Bixæ. Cram. *Pap.* 17. *pl.* 199. C. D.

Cramer s'est mépris à l'égard du papillon *Phidias* de Linnée, & l'espèce qu'il nomme ainsi est l'*H. Jupiter* de Fabricius.

Son papillon *Bixæ* ou du Roucou est considéré par le naturaliste suédois (*Mus. Lud. Ulr. p.* 334), comme le mâle du *Phidias*, & son *P. Acastus* (*pl.* 199 E) en est, selon celui-ci, la femelle. Linnée prend aussi pour des variétés du *Phidias*, celle de l'*Acastus* de Cramer (*pl.* 41, C, D), & le *P. Amyclas* de cet auteur. Il rapporte encore à son *Phidias* un lépidoptère d'un genre très-différent, figuré par Petiver, &, à ce qu'il paroît, par Clerck (*tab.* 44. *fig.* 7 & 8?), & par Cramer (*Phalæna lincea, Pap.* 19. *pl.* 228. B.) Fabricius a donné pour une espèce nouvelle (*Mænas*) l'hespérie que Linnée prend pour le mâle du *Phidias*. Dans sa seconde citation de Cramer, au lieu de répéter le nom d'*Acastus*, il écrit, mal-à-propos, *Phidias* (1); & à l'égard des autres synonymes, il copie, sans discernement, Linnée.

Cette hespérie a environ un pouce & demi de largeur, ses ailes étendues. Son corps est noir,

(1) Il n'avoit pas commis cette erreur dans son *Species Insectorum.*

avec la tête & l'anus d'un rouge de sang. Les ailes sont d'un noir-bleuâtre-foncé, glacé de vert-chatoyant. L'origine des ailes inférieures est en dessous d'un blanc-mat, y formant une bande transverse, s'étendant même, dans quelques individus, sur les deux ailes supérieures. Les unes & les autres sont terminées postérieurement par un liseré très-fin de la même couleur.

Cramer remarque que les mâles ont les ailes plus étroites & plus oblongues que les femelles. Cette observation s'applique aussi à d'autres espèces du même genre.

On trouve celle-ci à Surinam & à Cayenne.

15. Hespérie Phidias.

Hesperia Phidias.

Hesperia alis cæruleo-atris; posticarum limbo postico rubro vel flavescente, albo exterius marginato.

Hesperia U. Phidias, *alis integris, nitentibus, margine albis, ore anoque rubris.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 347. *n°.* 319.

Papilio U. Phidias. *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 90. *n°.* 814. — *Spec. Inf. tom.* 2. *p.* 136. *n°.* 652. — *Syst. Ent. p.* 534. *n°.* 393.

Papilio P. U. Phidias, *alis rotundatis, atris, nitentibus, margine albis, ore anoque rubris.* Linn. *Syst. Nat.* 2. *p.* 795. *n°.* 293. — *Mus. Lud. Ulr. p.* 334. (Fœmina.)

Clerck, *Icon. pl.* 44. *fig.* 3. 4.

Papilio Acastus. Cram. *Pap.* 17. *pl.* 199. E. — 4. *pl.* 41. C. D. (Var.)

Je n'ai vu que des mâles de cette espèce, & qui tous se rapportent à la figure précitée de Cramer, ou à son papillon *Acastus*, très-différent de celui qu'il représente ailleurs sous le nom d'*Apastus* & qui est l'*Acastus* de Fabricius. La taille de ces individus égale presque celle des mâles de l'espèce précédente. Le corps est noir, avec les palpes extérieurs, leur extrémité exceptée, le collier, l'anus, la portion supérieure du bord extérieur & inférieur des secondes ailes, & des points sur les côtés de la poitrine & du ventre, d'un rouge-vermillon. Les ailes sont d'un noir-bleuâtre foncé, avec une teinte d'un vert-doré & luisant, depuis leur milieu environ jusqu'à leur naissance. Les secondes sont terminées postérieurement par une bordure blanche très-fine, moins prononcée vers l'angle extérieur; à la face inférieure, cette ligne blanche est un peu sale ou pointillée de noirâtre, du côté du même angle, & sur elle repose, immédiatement dans toute la longueur, une bande jaunâtre, droite, rétrécie en pointe vers l'angle anal. Dans d'autres individus, les femelles, à ce qu'il paroît, tels que ceux figurés par Cramer, *pl.* 199 E, cette bande est rouge, & s'étend, en forme de ligne, tout le long du bord extérieur; ses ailes supérieures sont aussi terminées par un liseré blanc. Cramer dit que les parties du corps des femelles colorées en rouge, sont jaunes dans les mâles.

A Cayenne & à Surinam.

16. Hespérie Amiatus.

Hesperia Amiatus.

Hesperia alis atris, margine postico flavo.

Hesperia U. Amiatus, *alis integerrimis, atris; margine postico flavo; capite anoque sanguineis.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *pag.* 347. *n°.* 320.

Clerck, *Icon. pl.* 44. *fig.* 5. 6.

Papilio Amyclas. Cram. *Pap.* 7. *pl.* 199. F.

Elle est très-voisine du mâle de l'espèce précédente; mais elle en diffère en ce que les quatre ailes sont terminées postérieurement, tant en dessus qu'en dessous, par une bande d'un jaune-fouci, qui est plus étroite aux ailes supérieures.

Elle habite les mêmes contrées.

17. Hespérie Xanthippe.

Hesperia Xanthippe.

Hesperia atra, alis flavo fasciatis.

Elle est de la taille de la précédente, d'un noir-foncé & foyeux, avec la tête, l'anus & quelques taches sur les côtés du ventre, d'un rouge-sanguin, mais plus clair à la brosse anale. Le bord postérieur & supérieur des derniers anneaux, le terminal excepté, est dépourvu de poils, luisant & grisâtre, ce qui forme sur cette partie du corps de petites raies transverses de cette couleur. Les quatre ailes ont, des deux côtés & vers leur milieu, une bande transverse d'un jaune-d'ocre, coupé par les nervures: celle des inférieures est un peu plus étroite & plus divisée; les supérieures en ont une de plus, située au-dessous de la précédente, à égale distance d'elle & du bord postérieur, plus étroite, commençant vers la moitié de la largeur, gagnant ensuite le bord extérieur en se recourbant un peu, & divisée par les nervures en cinq petites taches. La poitrine offre de chaque côté, immédiatement au-dessous des ailes, une ligne jaune. Le bord externe des ailes inférieures est, vers la naissance, de cette couleur; leur bord extrême & postérieur est blanc.

Cette espèce se trouve au Brésil, & m'a été donnée par M. Langsdorff, consul de l'empereur de Russie à Rio-Janeiro.

†† *Bord postérieur des ailes inférieures sinueux, à frange entrecoupée & paroissant dentelée.*

16. Hespérie versicolore.

Hesperia versicolor.

Hesperia atra, abdomine alisque cæruleo fasciatis, alis anticis fasciâ rubrâ maculisque duabus flavidis.

Cette belle espèce a évidemment de grands rapports avec l'hespérie *Gnetus* de Fabricius & quelques autres analogues. Son envergure est de près de deux pouces. Les antennes se terminent de la même manière que dans la division précédente. Le corps est noir, mais entrecoupé d'orangé & de bleuâtre, formant des lignes. Les palpes inférieurs, le dessous des hanches & des cuisses, les côtés de la poitrine & l'anus, sont orangés; telle est aussi la couleur de deux points que l'on voit à l'extrémité de l'écusson & de deux lignes qui s'étendent longitudinalement, une de chaque côté, sur le dessus du corselet, ou plutôt du mésothorax; sur l'espace intermédiaire sont deux autres lignes parallèles aux précédentes & d'un bleu-pâle, tirant sur le blanc ou sur le jaune. Les ailes inférieures sont traversées obliquement, en dessus & en dessous, par des raies ou bandes étroites de cette couleur, deux en dessus & trois sur le dessous; la seconde des inférieures est plus large, plus pâle, ou blanchâtre vers le haut; la postérieure est un peu entrecoupée; la base des ailes offre aussi une petite ligne transverse de la même teinte; leur frange postérieure est blanche & entrecoupée de petites taches noires. Les ailes supérieures ont, dans leur milieu & des deux côtés, une bande transverse, oblique, composée de trois taches réunies, d'un rouge-sanguin en dessus, de cette couleur près de la côte & ensuite d'un jaune-foncé en dessous: cette bande n'atteint point entièrement les deux bords; entr'elle & la côte, ou près de son bord antérieur, est une petite tache blanche; au-dessous de cette bande, en allant du milieu de la surface à l'angle du sommet, sont deux taches ovales, d'un jaune tirant sur le fouci, & dont la plus voisine de la côte, un peu plus étroite & un peu plus longue; de cette tache à l'angle interne postérieur, s'étend une ligne bleuâtre un peu plus arquée, & qui n'est pas toujours bien prononcée dans toute la longueur; on en voit une autre de cette couleur, & pareillement transverse, au-dessus de la bande rouge. L'origine de ces ailes, une portion de leur surface avoisinant le milieu de la côte, & le sommet de la tête, présentent aussi des espaces ou des taches bleuâtres; enfin, l'abdomen, à l'exception du milieu du dos, a des raies transversales de cette couleur.

Elle habite le Brésil, d'où elle m'a été envoyée par M. Langsdorff.

19. Hespérie Affaricus.

Hesperia Affaricus.

Hesperia alis atris; anticis albo flavoque maculatis; posticarum disco flavo, punctis nigris.

Hesperia U. Affarius, *alis dentatis, atris; anticis maculis flavis albisque: posticis disco flavo, punctis nigris.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 343. *n°.* 303.

Papilio Affaricus. Cram. *Pap.* 22. *pl.* 261. F. G.

Elle est très-voisine des deux suivantes; mais à raison de la couleur de la brosse terminant l'abdomen, elle n'appartient point à leur division. Le corps est d'un noir-bleuâtre, avec des anneaux, les uns orangés & les autres blancs sur l'abdomen; la brosse anale est de la première de ces deux couleurs. Le corps est d'un noir-bleuâtre, un peu chatoyant sur les ailes; le corselet, la base des ailes supérieures & une grande portion des inférieures, sont garnis d'un duvet d'un brun-jaunâtre. Le milieu des ailes supérieures offre trois taches d'un jaunâtre-transparent, formant une bande transverse; entr'elle & le sommet, on en voit cinq à fix autres très-petites, de la même couleur: quelques parties des mêmes ailes en présentent de bleuâtres. Le dessus des inférieures est traversé, vers son milieu, par une raie formée d'environ cinq taches d'un noir-bleuâtre; leur dessous offre, à quelque distance du bord postérieur, une rangée transverse de taches bleuâtres, & plus haut, deux autres formées de taches jaunâtres, & parcourant aussi la largeur de l'aile. Les antennes sont brusquement crochues à leur extrémité.

Elle se trouve au Brésil.

Nota. Le *Papilio Renaldus* (Renaud) de Stoll, *Suppl. aux Pap. exot.* de Cramer, *pl.* 13, *fig.* 1, nous semble devoir être placé dans cette division. Le corps est bleu en dessus & rouge en dessous. Les ailes supérieures sont noires en dessus, avec deux taches blanches & une grande partie du bord interne bleu; le dessus des inférieures est de cette couleur, avec le bord postérieur noir, un peu anguleux & terminé à l'angle anal en une petite queue. Le dessous des quatre ailes est d'un brun-obscur, avec des espaces plus foncés & deux petites raies jaunâtres sur les supérieures; on voit une tache de cette couleur sur les inférieures; à peu de distance de leur naissance. Les pattes sont rouges.

Cette espèce est de Surinam; nous n'en parlons que d'après Stoll.

** *Point simultanément de teinte rouge ou orangée à la tête & à l'anus, ou à la tête & à l'angle anal des ailes inférieures* (1).

† *Bord postérieur des ailes inférieures notablement denté ou anguleux.*

— *Ailes inférieures sans taches vitrées, ou n'en ayant qu'une au plus & discoïdale.*

20. Hespérie Iphinous.

Hesperia Iphinous.

Hesperia atra; alis anticis fasciâ maculisque duabus flavidis; posticis subtus abdomineque lineis cæruleo-albis.

Si l'on compare cette espèce avec la précédente, l'on sera convaincu qu'elles se lient entr'elles. Les antennes se terminent de la même manière. Le corps est noir, avec le dessous des palpes, quelques taches sur la tête, des raies transverses sur le dessus de l'abdomen d'un blanc-bleuâtre. Le dessous des ailes inférieures offre des raies transverses & obliques de cette couleur, mais dont une seule, la supérieure, continue & bien terminée. La frange postérieure est blanche, avec une série de taches noirâtres qui s'entrecoupent. Les ailes supérieures ont sur leurs deux surfaces trois taches d'un jaune-roussâtre, dont une vers le milieu, très-grande, en carré-long & oblique, en forme de bande transverse, mais n'atteignant pas les deux bords; & les deux autres, petites, ovales, & situées entre la première & l'angle du sommet; la dernière, ou la plus voisine de cet angle, est plus oblongue. Le dessus du corselet de mon individu a perdu son duvet; mais on y découvre des vestiges de taches blanchâtres, & peut-être est-il rayé longitudinalement, ainsi que celui de l'espèce précédente.

Elle m'a été envoyée du Brésil par M. Langsdorff.

21. Hespérie Polyzone.

Hesperia Polyzona.

Hesperia atra, albo cæruleoque fasciata; alis anticis, maculis fenestratis, ad basin transversè fasciatis; antennarum apice sensim arcuato.

Papilio Vulcanus. Cram. *Pap.* 21. *pl.* 245. C. D.

Seba, *Mus. tom.* 4. *pl.* 20. *fig.* 12 & 13.

La manière dont les antennes de cette espèce se terminent & les bandes qui traversent la base de ses ailes supérieures & se prolongent ensuite sur les inférieures, la distinguent de l'hespérie *Gnetus* de Fabricius, dont elle se rapproche infiniment.

La femelle a un peu plus de deux pouces d'envergure. Le corps est d'un noir-foncé, avec les palpes extérieurs, des taches sur la tête, & une grande partie des pieds, blanchâtres. Le corselet & l'abdomen sont rayés de gris-bleuâtre, celui-ci transversalement & l'autre longitudinalement. Huit bandes alternativement bleuâtres & noires composent le fond de la couleur des ailes; mais le noir s'étend beaucoup plus sur les supérieures, & les bandes de l'autre couleur sont peu ou moins distinctes; celles-ci ont en outre trois à quatre taches vitrées, dont une beaucoup plus grande, en forme de bande transverse, occupant le milieu de la surface, & les autres, & le plus souvent au nombre de deux, plus rapprochées du sommet. La couleur blanche étant plus étendue sur les ailes inférieures que sur les deux autres, les bandes formées par cette couleur & le noir y sont plus prononcées; le bleu des premières est plus pâle, & dans les individus mâles, la dernière de ces bandes bleues, ou la plus voisine du bord postérieur, est divisée longitudinalement par une ligne noire; le bleu empiète aussi sur la bande noire qui précède & y forme quelques traits. Les échancrures du bord postérieur sont blanches, avec les intervalles ou les dents, noirs; l'angle anal forme une queue très-courte & tronquée. Dans un grand individu femelle de la collection du Muséum d'histoire naturelle, les taches vitrées des ailes supérieures sont proportionnellement plus grandes; les bandes bleues des ailes inférieures sont d'un bleu un peu argenté; l'une des dents du bord postérieur y forme près de son milieu un angle très-saillant.

Dans un individu mâle que M. Langsdorff m'a envoyé du Brésil, les ailes supérieures ont quatre taches vitrées, & dont la première, ou la plus interne, est plus fortement divisée par les nervures; le bleu y occupant plus d'étendue que dans la plupart des autres individus, donne à cette variété une disposition de teintes plus agréable.

Cette espèce se trouve aussi à Surinam, & probablement à Cayenne.

22. Hespérie Gnetus.

Hesperia Gnetus.

Hesperia atra, alis posticis cæruleo fasciatis; anticis maculis fenestratis, ad basin cæruleo radiatis; antennarum apice abrupte uncinato.

Hesperia U. Gnetus, *alis dentatis, subconcoloribus, atris: anticis maculis tribus fenestratis, posticis cæruleo fasciatis.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 342. *n°.* 302.

Papilio P. U. Gnetus. *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 89. *n°.* 805. — *Spec. Inf. tom.* 2. *p.* 135. *n°.* 624.

Aubent. *Miscell. pl.* 18. *fig.* 8. 9.

Papilio Pigmalion. Cram. *Pap.* 21. *pl.* 245. A. B.

Cette

(1) Anus roussâtre dans l'*H. Clonius* & palpes extérieurs roussâtres dans l'*H. Jovien.*

Cette espèce étant extrêmement voisine de celle que nous nommons *Polyzona*, & Fabricius n'ayant point donné une description complète de l'hespérie *Gnetus*, il nous est impossible de dire positivement quelle est celle des deux qu'il distingue ainsi. Mais comme il cite les planches de d'Aubenton, & que nous sommes sûrs que l'espèce dont il s'agit ici se rapporte très-bien aux figures précitées de cet auteur, il nous paroît très-probable que cette hespérie est bien celle qu'il appelle *Gnetus*. L'individu que nous avons sous les yeux, & qui vient de l'ancienne collection du Muséum d'histoire naturelle, pourroit bien être l'individu original, représenté sur ces planches. Cette espèce, ainsi que nous l'avons remarqué, ressemble beaucoup à notre H. polyzone, mais le noir y domine davantage, est un peu glacé de bleu, & les bandes ou raies formées par cette couleur sont plus vives & plus brillantes; sur le dessus des ailes supérieures, elle s'y divise en cinq raies, partant de leur origine, se dirigeant en manière de rayons longitudinaux, vers la base transparente du milieu; les intermédiaires sont plus courtes. Les taches vitrées sont proportionnellement plus petites que dans l'hespérie polyzone; le dessous des ailes inférieures est traversé obliquement par trois bandes étroites d'un bleu-verdâtre & luisant, & dont l'intermédiaire plus courte. En dessus ces raies sont moins vives; la première, ou la plus proche de la base, est même d'un gris-bleuâtre, & partagée en deux; l'intermédiaire est plus petite que sa correspondante inférieure. Le bord postérieur est un peu anguleux & très-finement bordé de blanc.

Elle se trouve à Cayenne & à Surinam. L'individu figuré par Cramer, que nous rapportons à cette espèce, se rapproche beaucoup plus que le nôtre de l'hespérie *Polyzone*, ou de son papillon *Vulcain*. L'individu qu'il représente est une femelle; nous n'en avons vu aucun de ce sexe, & le mâle que nous avons décrit est même unique dans la collection du Muséum d'histoire naturelle.

23. Hespérie Salus.

Hesperia Salus.

Hesperia alis fulvis, nigro-fasciatis; anticis maculis, posticis centro fenestratis.

Hesperia U. Salus, *alis dentatis fulvis, nigro fasciatis; anticis maculis, posticis centro fenestratis.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 342. *n°.* 300.

Papilio P. U. Salus. *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 88. *n°.* 801. — *Spec. Inf. tom.* 2. *p.* 155. *n°.* 622.

Papilio Nobilis. Cram. *Pap.* 9. *pl.* 108. A. B.

L'envergure du mâle est d'environ un pouce & demi. Les antennes sont noires & se terminent en une petite massue, brusquement recourbée à son origine, mais peu prolongée à la pointe. Le corps & le dessous des ailes sont entièrement d'un jaune-d'ocre; en dessous, cette couleur est plus claire & tire sur le citron. L'abdomen, dans la plupart des individus, paroît être rayé transversalement de noir; mais je crois que cela provient de ce que le bord postérieur des anneaux a été accidentellement dépilé. Les ailes supérieures ont des taches transparentes & inégales; trois d'entr'elles, & dont deux, particulièrement celle du milieu, plus grandes, forment au milieu de l'aile une bande transverse, mais n'atteignant pas le bord interne; les autres, au nombre de six, sont situées entre les précédentes & le bord postérieur, & disposées en une ligne courbe, dont un des bouts s'appuie sur la côte, près de l'angle du sommet; deux ou trois de ces taches sont en forme de pointes; les unes & les autres sont bordées de noirâtre; mais cette teinte est plus prononcée sur la face supérieure, y suit les nervures terminales, le bord postérieur, & forme de petites stries obliques, le long de la côte. Les ailes inférieures offrent près du milieu une autre tache transparente, presque orbiculaire; elles sont traversées obliquement par quatre lignes noirâtres, dont la dernière plus étendue, surtout en dessus, & dont la précédente beaucoup plus courte, & ne dépassant pas le milieu de la largeur de l'aile, à partir du bord externe; le bord postérieur est de cette couleur & inégalement sinué & anguleux; la dent postérieure est la plus forte.

Dans un individu mâle qui m'a été envoyé du Brésil par M. Langsdorff, le dessous des ailes est simplement un peu plus pâle; les lignes noirâtres sont plus fines, & les taches transparentes des ailes supérieures ne sont point aussi grandes; celle du milieu de la bande n'est pas aussi alongée.

Cette espèce se trouve aussi à Surinam.

24. Hespérie Saint-Hilaire.

Hesperia Santhilarius.

Hesperia alis suprà ferrugineis, infrà nigris; anticis maculis fenestratis, nigro marginatis; posticis intùs truncato-productis, suprà nigro punctatis, infrà flavido fasciatis.

Cette belle & rare espèce, que je dédie, autant par estime que par gratitude, à l'un de nos plus savans botanistes, à de grands rapports avec les hespéries *Salus*, *Polyzone*, &c. Les antennes sont noires, courbées près du bout, & terminées ensuite par une massue droite & obtuse. Tout le dessus du corps est d'un fauve-obscur, avec le bord postérieur des ailes & quelques portions de leurs nervures noirâtres. Le dessous des quatre ailes est noir. Les supérieures sont traversées dans leur milieu par une grande bande transparente d'un blanc-jaunâtre, divisée en trois taches, &

n'atteignant pas les deux bords; entre l'extrémité inférieure de cette bande & la côte eſt une rangée de ſept petites taches, inégales, preſqu'en forme de points, pareillement tranſparens, & bordés de noir, ainſi que les précédentes; en deſſous, l'eſpace occupé par ces dernières préſente quelques nébuloſités d'un jaunâtre-pâle; la baſe de ces ailes eſt auſſi de cette couleur. Les ailes inférieures ſont très-dentées, avec un prolongement large, tronqué & très-anguleux vers l'angle anal; leur milieu a en deſſus une rangée tranſverſe de points noirs; leur deſſous eſt traverſé par deux bandes d'un jaunâtre-pâle, dont l'une occupant la baſe, l'autre le milieu & ſéparée de la précédente par une bande noire, offrant près du bord extérieur une petite tache noire & oblique; au-deſſous de cette bande eſt une rangée de taches pareillement jaunâtres, mais peu prononcées; les échancrures du bord poſtérieur ſont blanchâtres.

Elle ſe trouve au Bréſil & m'a été donnée par M. Langſdorff.

25. Hespérie Éacus.

Hesperia Eacus.

Heſperia alis flavido-fuſcis, fuſco punctatis; anticis maculis albo-hyalinis.

Heſperia U. Dan, *alis ecaudatis, obſcurè cinereis, fuſco punctatis: anticis maculis feneſtratis.* Fab. *Ent. Syſt. Em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 341. *n°.* 297?

Papilio P. U. Dan. *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 88. *n°.* 798?

Elle eſt de petite taille, & reſſemble beaucoup au papillon *Avitus* de Cramer, *pl.* 354. D. E. La maſſue des antennes ſe termine inſenſiblement en pointe, ſans former de crochet. Ce caractère, qui domine plus généralement dans la diviſion des heſpéries à ailes inférieures arrondies & ſans ſaillie à l'angle anal, me feroit préſumer que cette eſpèce, nonobſtant les dentelures des ailes, devroit être placée dans cette diviſion, & près de l'*Heſperia Malvæ* & autres analogues. Les ailes ſont noirâtres, mais avec une teinte d'un jaunâtre-obſcur, formant près du limbe poſtérieur une raie tranſverſe, entrecoupée & arquée. Le fond eſt ponctué de noirâtre, particulièrement ſur les inférieures, où pluſieurs de ces points ſont diſpoſés en raies tranſverſes & arquées. Les ailes ſupérieures ont des taches tranſparentes: quatre au milieu, ſituées en une ligne tranſverſe, & dont deux plus grandes, les autres en forme de petits points, au nombre de trois dans mon individu, & compoſant un petit arc près de l'angle du ſommet. Sur le deſſous des inférieures, la teinte jaunâtre eſt diviſée en un grand nombre de petites taches, diſpoſées en lignes tranſverſes. La frange du bord poſtérieur des quatre ailes eſt griſâtre.

Cette eſpèce ſe trouve à Tranguebar ſelon Fabricius. L'individu que je poſſède vient de Java, & m'a été envoyé par M. le baron Dejean.

— — *Les quatre ailes parſemées de pluſieurs taches vitrées.*

26. Hespérie Momus.

Hesperia Momus.

Heſperia alis nigris; anticis penitùs ferè hyalino ſtriatis.

Heſperia U. Momus, *alis ſubcaudatis fuſcis, baſi hyalino ſtriatis, apice maculatis.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 334. *n°.* 268.

Papilio P. U. Momus. *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 86. *n°.* 785.

Papilio Momus. Jon. *Fig. pict.* 6. *tab.* 90. *fig.* 1.

Papilio Vitreus. Cram. *Pap.* 31. *pl.* 366. *fig.* D.

Sa taille eſt moyenne. Ses antennes ſe terminent en une maſſue inſenſiblement arquée & très-aiguë au bout. Le corps eſt recouvert en grande partie de poils d'un gris-jaunâtre, avec le deſſous de l'abdomen rayé longitudinalement de noir. Les ailes ſont noires, avec un duvet d'un gris-jaunâtre, particulièrement à la côte & au bord oppoſé; les taches vitrées ſont ſi nombreuſes, aux ailes ſupérieures ſurtout, que ces ailes ſont en grande partie tranſparentes, d'où vient le nom de *Vitreus*, donné à cette eſpèce par Cramer, & que Fabricius auroit dû conſerver; ces taches y ſont diſpoſées ſur trois rangées tranſverſes; les deux premières ſemblent ſe confondre ſur les ſupérieures, & y ſont compoſées de taches fort alongées, preſqu'en manière de ſtries longitudinales; il en part trois de la baſe, & entre les extrémités inférieures de la ſeconde & de la troiſième ligne, en commençant à compter au bord extérieur, eſt ſituée une tache profondément biſide; l'extrémité poſtérieure de la troiſième ligne eſt pareillement biſide; l'on voit près de l'angle du ſommet cinq à ſix autres petites taches, compoſant la troiſième rangée tranſverſe. Les ailes inférieures ont près de leur baſe deux taches, dont l'extérieure beaucoup plus grande & anale; elles forment la première rangée; on en compte environ cinq à chacune des deux autres; le bord poſtérieur de ces ailes eſt entrecoupé de blanc; ſes dentelures ſont peu diſtinctes dans quelques individus: l'angle anal eſt aſſez ſaillant, & en forme de dent obtuſe.

Cette heſpérie habite la Guyane & le Bréſil.

27. Hespérie Erythus.

Hesperia Erythus.

Heſperia alis fuſco nigroque variis, maculis

hyalinis : his subquadratis vel trigonis, illis punctiformibus.

Papilio Erythus. Cram. *Pap.* 5. *pl.* 59. G.

Cette hesperie est assez grande, noirâtre, avec des espaces plus foncés sur les ailes, particulièrement aux inférieures. Elles sont parsemées de taches transparentes, mais en moindre nombre que dans l'espèce précédente, & dont les unes presque carrées ou triangulaires, & les autres plus petites & en forme de points; celles des ailes supérieures y sont disposées à peu près de la même manière que dans l'hesperie *Protée* & plusieurs autres espèces. Celles des ailes inférieures n'y composent qu'une rangée transverse; la base offre en outre une tache plus grande & correspondante aux deux de la base des ailes inférieures de l'hesperie *Momus*. Le bord postérieur des ailes inférieures & la portion interne du même bord aux ailes supérieures, sont entrecoupés de blanc; cette couleur occupe les échancrures.

Je n'ai point vu cette espèce, & je la rapporte à cette division, d'après la figure de Cramer. Elle conduit à la division suivante.

De Surinam.

28. Hespérie Cramer.

Hesperia Cramer.

Hesperia alis fusco-ferrugineis, maculis fenestratis nigro marginatis; infrà fasciâ maculari cœrulescente, posteriùs lineâ nigrâ undulatâ terminatâ.

Papilio Sebaldus. Cram. *Pap.* 29. *pl.* 342. *fig.* A. B.

Fabricius, qui applique le nom de *Sebaldus* à une hesperie très-différente de celle-ci, rapporte celle que Cramer désigne de la sorte, ainsi que celles qu'il a figurées sous les dénominations de *Salus*, de *Ramusis*, au papillon *Thrax* de Linné. Mais cette dernière espèce est très-distincte des précédentes, & habite les Indes orientales, tandis que les autres ne se trouvent que dans l'Amérique méridionale. Les caractères distinctifs que Fabricius lui donne, conviennent à plusieurs espèces. Voulant conserver la dénomination de *Sebaldus* à l'hesperie qu'il appelle ainsi, l'espèce homonyme de Cramer recevra le nom de ce naturaliste, qui, par son bel ouvrage sur les lépidoptères exotiques, a rendu un service très-important à la science, & sans lequel peut-être il seroit bien difficile de reconnoître, avec l'entomologie seule de Fabricius, un grand nombre d'espèces.

L'hesperie *Cramer* est de taille moyenne & d'un brun-roussâtre un peu plus foncé sur le dessous des ailes; les taches transparentes, à l'exception de quatre à cinq & dont une située près de la base des ailes inférieures & les autres placées près de l'extrémité des ailes supérieures, sont généralement petites, en forme de points & bordées de noir. Ces taches, aux ailes inférieures, y sont disposées en deux bandes transverses, & dont la postérieure est appuyée inférieurement sur une autre bande, formée de taches bleuâtres & bordée de noir inférieurement; celle-ci est commune aux ailes supérieures. Il y a en outre, sur le dessous des inférieures, trois taches bleuâtres, entourées de noir, dont deux situées près du bord extérieur, & l'autre au bord interne.

Cette espèce, dont je ne parle que d'après Cramer, habite Surinam.

Voyez, pour quelques autres hesperies à ailes inférieures dentées, mais sans saillie anale, la division B.

---

†† *Bord postérieur des ailes inférieures entier.*

— Dessus du corps & origine supérieure des ailes verts ou d'un vert-bleuâtre. Dessus des ailes noir ou noirâtre; celui des inférieures sans taches.

Nota. Espèces généralement assez grandes, de l'Amérique méridionale; masse des antennes toujours crochue & terminée en pointe fine; angle anal des ailes inférieures prolongé en une dent pointue.

29. Hespérie Creteus.

Hesperia Creteus.

Hesperia alis suprà nigris, immaculatis, infrà fuscis, fasciis duabus transversis, obscurioribus; limbo postico sæpiùs dilutiore.

Papilio Creteus. Cram. *Pap.* 24. *pl.* 284. C. D.

Papilio Alardus. Stoll, *Suppl. aux Pap. exot. de* Cram. *pl.* 39 *fig.* 7. var. A

Les ailes sont noires en dessus, avec leur base garnie, ainsi que le dessus du corps, d'un duvet soyeux, d'un vert-bleu, un peu doré & luisant; leur dessous est noirâtre, avec deux bandes ou deux lignes transverses plus foncées, dont la dernière quelquefois bordée postérieurement de brun-jaunâtre. Le limbe postérieur est tantôt de la couleur du dessous, tantôt plus clair, quelquefois même, comme dans l'*Alardus* de Stoll, prenant une teinte grisâtre, plus étendue sur les ailes inférieures, & y formant une grande bande terminale; les bandes transverses & noirâtres sont plus ou moins prononcées & paroissent peu dans la variété précédente. Les quatre ailes n'ont aucune tache transparente.

Cette hesperie m'a été envoyée du Brésil par M. Langsdorff.

Nota. Le papillon *Celœnus* de Cramer, *Pap.* 33. *pl.* 293, A B, paroît, dans un ordre naturel, devoir se placer près de l'espèce précédente. Le corps & les ailes sont d'un brun-foncé;

le deſſous des ailes offre des bandes tranſverſes plus claires, & de même que dans cette heſpérie, les ſupérieures ont le long du bord interne, une grande tache arrondie plus pâle que le fond ou blanchâtre. L'individu que nous rapportons à cette eſpèce a auſſi ſur le deſſous de chaque aile inférieure, deux petites taches preſqu'en forme de points, de cette couleur, l'une un peu au-deſſus du milieu, & l'autre au-deſſus de l'angle anal. Elles n'exiſtent point dans la figure donnée par cet auteur.

Cette eſpèce ſe trouve à Amboine.

Nous ſoupçonnons que l'*H. Caſſandre* (*Caſſander*) de Fabricius en eſt voiſine. Sel n lui, elle eſt plus grande que l'*H. Thrax*, noirâtre & ſans aucunes taches.

Sa patrie eſt inconnue.

30. Hespérie Parménide.

Hesperia Parmenides.

Heſperia fuſca, ſuprà immaculata; alis anticis infrà maculâ magnâ albâ, internâ: poſticis ibidem faſciis nullis.

Papilio Parmenides. Cram. *Pap.* 31. *pl.* 364. E. F.

Elle n'eſt peut-être qu'une variété de la précédente. Les ailes ſont d'un noirâtre-obſcur, avec l'origine de leur ſurface ſupérieure & la partie externe de la baſe du deſſous des premières, d'un vert-bleuâtre & luiſant; on voit auſſi des traces de cette couleur à la naiſſance des inférieures. Sur le bord interne des ſupérieures, eſt appuyée une grande tache blanche triangulaire, mais que l'on obſerve quelquefois dans l'eſpèce précédente; le deſſous de ces ailes, ainſi que celui des inférieures, eſt entièrement noirâtre; on obſerve ſeulement ſur chacune de celles-ci, une petite tache ou un trait jaunâtre. Le deſſous du corps & de la maſſue des antennes ſont d'un gris-jaunâtre; le ventre eſt rayé longitudinalement de noirâtre.

Elle ſe trouve au Bréſil. Collection du Jardin du Roi.

31. Hespérie du Roucou.

Hesperia Bixæ.

Heſperia fuſca, ſuprà immaculata; alis poſticis ſubtùs faſciâ tranſverſâ luteâ.

Heſperia U. *alis rotundatis fuſcis, baſi vireſcentibus; poſticis ſubtùs faſciâ luteâ.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 344. *n°.* 307.

Papilio P. U. Bixæ. *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 89. *n°.* 807. — *Spec. Inſ. tom.* 2. *p.* 135. *n°.* 626. — *Syſt. Ent. p.* 534. *n°.* 390.

Papilio P. U. *Bixae.* Linn. *Syſt. Nat.* 12. *tom.* 2. *p.* 795. *n°.* 264. — *Muſ. Lud. Ulr. pag.* 335. *n°.* 153.

Clerck, *Icon. Inſ. tab.* 42. *fig.* 7. 8.

A en juger d'après la citation d'une figure de Petiver, Linné rapporte à cette eſpèce, comme ſimple variété, notre *H. Tityre*. Fabricius, qui a copié ſa phraſe ſpécifique, ne s'eſt pas aperçu que dans ſon *Mantiſſa Inſectorum* on avoit, par erreur, écrit *faſciâ luteâ* pour *faſciâ lacteâ*.

Les ailes ſont noirâtres; leur baſe & preſque tout le deſſous des ſecondes ſont d'un vert-bleuâtre ſoyeux & luiſant, mais qui, à l'exception de la baſe extérieure, eſt moins vif & plus foible ſur celles-ci. Le deſſous de ces ailes inférieures offre, à quelque diſtance de leur origine, une tache d'un beau blanc, en forme de parallélogramme ou de bande courbe, oblique, partant du bord externe & ſe terminant vers le milieu de la largeur de l'aile. Dans l'individu figuré par Clerck, la bande eſt centrale. Une grande partie du limbe poſtérieur & inférieur des premières ailes eſt un peu verdâtre. Les palpes extérieurs ſont d'un bleu entrecoupé de noir.

Cette eſpèce fait partie de la collection du Roi. Elle ſe trouve en Amérique.

32. Hespérie Acaſtus.

Hesperia Acaſtus.

Heſperia alis ſuprà cæruleo-nigris; anticis faſciâ utrinquè albo-hyalinâ, apice immaculato; poſticis infrà viridi-fuſcis, baſi immaculatâ, limbo poſtico cineraſcente vel dilutiore.

Heſperia A. U. Acaſtus, *alis ſubcaudatis, atris; poſticis ſubtùs vireſcentibus, ſtrigis abbreviatis flavis.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 335. *n°.* 272.

Papilio P. U. Acaſtus. *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 87. *n°.* 788. — *Spec. Inſ. tom.* 2. *pag.* 133. *n°.* 614.

Papilio Apaſtus. Cram. *Pap.* 10. *pl.* 111. *fig.* D. E. — *Ejuſd.* P. Anteſtes. *Ibid.* 24. *pl.* 283. E. F. G. *var.* A. — *Ejuſd.* P. Hylaſpes. *Ibid.* 31. *pl.* 364. G. H. *var.* B.

Cette eſpèce & les ſuivantes de la même diviſion ſont diſtinguées des précédentes par les taches blanches & tranſparentes des ailes ſupérieures. Ici & dans la ſuivante, elles forment une bande qui traverſe obliquement le milieu de leur ſurface; elles ſont au nombre de cinq, dont quatre ſur une même ligne, & dont la cinquième ſituée en dehors de la bande & dans l'entre-deux des deux taches du milieu; celles-ci ſont les plus grandes de toutes. Le deſſous des ailes inférieures eſt noirâtre ou d'un verdâtre-obſcur, & offre, dans ce cas, quelques lignes plus claires mais peu marquées; le limbe poſtérieur eſt tantôt d'un noi-

râtre plus clair & tantôt, à l'exception de son extrémité extérieure, cendré ou bleuâtre. Le bord postérieur de ces ailes & l'extrémité interne de celui des supérieures sont entrecoupés de noir & de blanc.

Le papillon *Pertinax* de Stoll (*Suppl. aux Pap. de Cramer*, pl. 35, fig. 2) n'est peut-être qu'une variété de l'espèce précédente. Il est plus petit. La bande vitrée des ailes supérieures est moins grande & sans tache extérieure. Le dessus des ailes inférieures & tout le dessous du corps sont d'un brun-noirâtre.

Ces hespéries se trouvent au Brésil, à Surinam, &c.

Nota. C'est probablement près de cette espèce que se range l'hespérie *Scipion* de Fabricius. (*Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 338. *n°.* 284.) Son corps est grand, noir, avec les antennes crochues. Les quatre ailes sont noires en dessus, avec la base bleuâtre. Les antérieures ont une bande maculaire d'un blanc-transparent; leur dessous est vert & offre la même bande. Le bord interne des postérieures est plus obscur. Cet auteur avoit décrit cette espèce d'après les dessins de Jones (6. *tab.* 87. *fig.* 1.). Le *P. Narcosius* de Stoll (*Suppl. aux Pap. de Cramer*, pl. 39. fig. 8) ne me paroît pas en différer. L'*H. Scipion*, selon Fabricius, se trouve aux Indes.

33. Hespérie Mercatus.

Hesperia Mercatus.

Hesperia alis supra nigris; anticis utrinquè fasciâ mediâ punctisque ante apicem albo-hyalinis, posticis infrà basi albis.

Hesperia U. Mercatus, *alis subcaudatis, atris: anticis maculis hyalinis, posticis subtùs fuscis, fasciâ baseos albâ.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 332. *n°.* 260.

Papilio Mercatus. Jon. *Fig. pict.* 6. *tab.* 87. D.

Papilio Fulgerator. Cram. *Pap.* 24. *pl.* 284. A. B.

Fabricius cite pour synonyme de cette espèce le *P. Talus* de Cramer; mais il est évident que sa description ne peut convenir qu'au *Fulgerator* de celui ci.

Le dessus des ailes de l'*H. Mercatus* n'offre point ce reflet bleuâtre que l'on observe dans l'*Acastus*. Les supérieures ont en outre, avant l'angle du sommet & près de la côte, une petite ligne formée de trois points transparens; la bande blanche est terminée en dessous, au bord interne, par une tache blanche assez grande. Le dessous des inférieures est d'un bleu-obscur, avec une bande blanche, courte & transverse à sa base; le bord extérieur est jaunâtre à son origine, & séparé de la bande blanche par une petite ligne transverse, noirâtre. Le dessous du corps est jaunâtre, avec une partie des pattes & une ligne sur le milieu de l'abdomen, noirâtres.

Elle se trouve à Surinam & au Brésil.

34. Hespérie Ausone.

Hesperia Ausonius.

Hesperia alis fuscis; anticis fasciâ maculari punctorumque lineolâ ante apicem hyalino-flavidis; posticis supra, limbo excepto, viridibus.

Papilio Talus. Cram. *Pap.* 15. *pl.* 176. D.

Tout le dessus du corps, celui des ailes inférieures, à l'exception du bord extérieur, leur origine inférieure & celle des supérieures, tant en dessus qu'en dessous, sont d'un vert-foyeux, mais point luisant; les autres parties sont d'un noirâtre-obscur. Les ailes supérieures ont une bande transverse oblique, formée de quatre taches d'un jaunâtre-pâle & transparentes; près du milieu de cette bande, est situé en dehors une tache de la même couleur, & près du sommet est une petite ligne composée de trois points, pareillement jaunâtres & diaphanes. Le dessous des ailes inférieures présente au-dessus de l'angle anal une petite tache jaunâtre, en forme de chevron. Le bord postérieur des anneaux du ventre est grisâtre. L'angle anal se prolonge en une queue très-courte & pointue.

Cette espèce & la suivante paroissent conduire à l'hespérie *Protée* & aux autres de la même division.

Elle se trouve au Brésil & à Surinam.

35. Hespérie Savigny.

Hesperia Savigny.

Hesperia alis anticis supra nigris, maculis punctisque tribus albo-hyalinis; posticis supra fuscis, infrà brunneis, puncto nigro ad basin fuscoque tribus fuscis transversis.

Le nom de cette hespérie nous rappelle l'un des plus profonds naturalistes de ce siècle, M. Savigny, membre de l'Académie royale des sciences. Le vert-foyeux qui colore le dessus du corps & la base des ailes dans les autres espèces de cette division, est ici beaucoup moins étendu & plus foncé; il ne se montre bien qu'à la naissance des ailes supérieures. Le corps est noirâtre, mais un peu plus clair en dessous. Le dessus des ailes supérieures est noir, avec trois taches & un pareil nombre de points d'un blanc-transparent; deux de ces taches sont placées au milieu & rapprochées sur une ligne transverse; elles répondent à la bande maculaire des espèces précédentes; les trois points sont disposés sur une petite ligne oblique, près de la côte, un peu avant l'angle du sommet; la troisième tache est isolée au milieu de l'espace qui sépare les deux

premières & la ligne de points; le deſſous de ces ailes eſt d'un brun-vineux foncé, avec le diſque noirâtre. Les ailes inférieures ſont en deſſus d'un noirâtre tirant ſur le brun; leur deſſous eſt d'un brun plus clair, un peu vineux ou rougeâtre, avec une teinte d'un gris de perle luiſant. Près de leur baſe & vers le milieu de la largeur, eſt un point noir, mais qui n'eſt point conſtant; au-deſſous ſont trois bandes tranſverſes, noirâtres, dont la plus baſſe occupe le limbe poſtérieur; la dent de l'angle anal eſt bien prononcée.

Cette eſpèce ſe trouve aux Antilles. Entr'elle & la précédente, me paroît devoir ſe ranger le *P. Pyramus* de Cramer, *Pap.* 21, *pl.* 245 E. Mais ici, le duvet qui garnit le deſſus du corps & la baſe des ailes eſt, ſelon cet auteur, couleur de canelle. Je n'ai point vu en nature cette heſpérie.

Près de ces eſpèces, l'on placera encore le *P. Phidon* de Cramer, *Pap.* 21, *pl.* 219, F G. Le deſſous des ailes eſt plus varié que dans les autres de la même diviſion. Le milieu de celui des inférieures eſt noirâtre, avec de petites taches jaunâtres; leur deſſus offre près du milieu du diſque un point de cette couleur; l'angle anal eſt peu ſaillant.

Cette eſpèce ſe rapproche auſſi du *P. Sinon* de cet auteur, *Pap.* 29, *pl.* 343, D, E, & de quelques autres heſpéries analogues.

Son *P. Cometes*, *ibid.* 19, *pl.* 227 F, paroît, ſous quelques rapports, lier cette diviſion avec la précédente, & par d'autres, devoir ſe placer avec les heſpéries à tête & à anus rouges, ou du moins avec les eſpèces qui, dans notre méthode, viennent immédiatement après elles. N'ayant point vu cette eſpèce, il nous eſt impoſſible de fixer à cet égard notre opinion.

— — *Deſſus du corps & origine ſupérieure des ailes jaunâtres; deſſus des ailes noirâtre; des taches jaunâtres, tranſparentes, & pour la plupart diſpoſées en une ligne tranſverſe, aux ſupérieures; deſſous des inférieures ayant, ſoit des taches diſcoïdales d'un blanc-argenté (s'effaçant quelquefois), ſoit une bande ou une raie (quelquefois commune aux deux ſurfaces) parcourant toute ſa longueur ou toute ſa largeur, tantôt de cette couleur, tantôt blanche ou jaunâtre: ces ailes ordinairement ſans taches vitrées.*

φ. Dont extérieure de la troncature oblique du prolongement anal des ailes inférieures très-ſaillante.

36. Hespérie Schœnherr.

Hesperia Schœnherr.

Heſperia alis fuſcis; poſticarum limbo poſtico ſupero anguloque anali infrà nigris; anticis faſciâ feneſtratâ maculâque ſubapicali albis; poſticis utrinquè faſciâ tranſverſâ, latâ, pallido-flavâ.

Nous devons à M. Schœnherr, naturaliſte ſuédois, un excellent ouvrage ſur la ſynonymie des coléoptères, & qui, à ce précieux avantage, joint celui de nous faire connoître un grand nombre d'eſpèces nouvelles, ſoit de ſa collection, ſoit de celles de ſes amis. Qu'il reçoive, par la dédicace de cette eſpèce, un témoignage bien ſincère de notre profonde eſtime & de notre amitié!

L'heſpérie *Schœnherr* eſt de grandeur moyenne. Les ailes ſont d'un brun-noirâtre, avec la baſe, particulièrement en deſſous, d'un brun-jaunâtre pâle ou verdâtre: ici cette teinte occupe preſque toute la moitié antérieure de la ſurface. Les ailes ſupérieures ont dans leur milieu une bande tranſparente, compoſée de trois taches réunies, & accompagnée intérieurement & en deſſus de jaune-pâle; de ſon bord intérieur part un petit trait de la même couleur, comme formé de points réunis, ſe rendant obliquement au bord interne, en ſe rapprochant de la baſe. Près de la côte, & à peu de diſtance de ſon origine, eſt en deſſus une tache oblongue, longitudinale, pareillement d'un jaune-pâle; l'on voit, à l'autre extrémité, un peu avant le ſommet, une petite tache tranſverſe, oblongue, d'un blanc-tranſparent, & commune aux deux côtés. Le milieu des inférieures, en allant du bord extérieur à l'angle interne, eſt traverſé par une large bande d'un jaune-pâle, tirant un peu ſur le fauve, qui ſe rétrécit légèrement vers le bas; en deſſus, l'eſpace qui s'étend de cette bande à l'extrémité, ou le limbe poſtérieur, eſt d'un noirâtre plus foncé ou forme une bande terminale preſque noire; en deſſous, l'eſpace correſpondant n'eſt plus foncé ou noir que vers le bord interne, ou à l'angle anal. En général, le deſſous des quatre ailes eſt un peu plus clair que le deſſus, ou d'un noirâtre tirant ſur le brun. Les palpes extérieurs ſont blanchâtres. Les antennes manquent.

Elle a été apportée de Java par M. Leſchenault. Collection du Jardin du Roi.

37. Hespérie Mercure.

Heſperia Mercurius.

Heſperia alis poſticis ſubtùs maculis duabus tranſverſis atro-fuſcis, ſpatio interjecto margaritaceo, nitido: limbo poſtico extùs cinereſcente, intùs fuſco; abdomine albo annulato.

Heſperia U. Mercurius, *alis ſubcaudatis, fuſcis, baſi flavis, anticis punctis hyalinis, poſticis ſubtùs nigris, faſciâ cinereâ.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 333. *n°.* 263.

Papilio P. U. Mercurius. *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 96. *n°.* 780.

Papilio Idas. Cram. *Pap.* 22. *pl.* 260. A. B.

Son envergure eſt d'un peu plus de deux pou-

ces. Les ailes ſont noirâtres & un peu plus foncées en deſſous. Le duvet jaunâtre de leur baſe & du deſſus du corps eſt plus clair & plus apparent que dans les autres eſpèces de la même diviſion. La grandeur des taches tranſparentes des ailes ſupérieures varie. Les quatre inférieures ſont diſpoſées en une ligne tranſverſe ou oblique; la cinquième, mais qui manque quelquefois, eſt ſituée près de la troiſième des précédentes; on en voit une ou deux autres, en forme de point, près de la côte, avant le ſommet; en deſſous, le limbe poſtérieur de ces ailes eſt, à l'exception du ſommet, cendré. Le deſſus des inférieures eſt ſans taches; leur deſſous eſt mélangé; la baſe eſt noirâtre, avec une tache plus foncée ou tirant ſur le noir; immédiatement après eſt une bande tranſverſe & arquée de cette couleur; au-delà du milieu de la longueur de l'aile, on voit intérieurement une grande tache preſque noire, en forme de triangle alongé & tranſverſe, dont la pointe eſt en dehors & repoſe ſur une autre bande, mais plus claire, gagnant le bord antérieur & offrant, près de ce bord, deux petites taches plus obſcures; l'intervalle compris entre les deux bandes eſt gris-blanchâtre & luiſant; le bord interne, & ſurtout ſon extrémité inférieure, eſt d'un brun-noirâtre; à partir de-là, le limbe poſtérieur eſt cendré, & préſente quelquefois une rangée de points noirâtres. Le bord poſtérieur des anneaux de l'abdomen eſt blanchâtre.

Dans quelques individus, le deſſous des ailes inférieures eſt d'un brun couleur de ſuie & luiſant, ſans teinte griſe dans l'entre-deux des bandes; le limbe poſtérieur eſt noirâtre.

Elle ſe trouve au Bréſil, à Surinam, &c.

38. Hespérie Tityre.

Hesperia Tityrus.

Heſperia alis poſticis ſubtùs fuſco-brunneis, maculâ mediâ, angulatâ faſciâve tranſverſâ argenteo-niveâ.

Heſperia U. Tityrus, *alis ſubcaudatis, fuſcis: anticis utrinquè faſciâ flavâ, ſubtùs ſtrigâ argentea.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 331. *n°.* 258.

Papilio P. U. Tityrus. *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 85. *n°.* 777. — *Spec. Inſ. tom.* 2. *p.* 132. *n°.* 607. — *Syſt. Ent. p.* 532. *n°.* 282.

Papilio Tityrus. Smith-Abbot, *Lépid. de la Géorg. tom.* 1. *p.* 39; *tab.* 19.

Petiv. *Gazoph.* 51. *tab.* 32. *fig.* 5.

Papilio Clarus. Cram. *Pap.* 4. *pl.* 41. E. D. — *Ejuſd.* P. Exadeus. 22. *pl.* 260. C. *var.* A.

Peu d'eſpèces varient autant que celle-ci pour le deſſous des ailes, & particulièrement des inférieures. C'eſt ce dont nous nous ſommes aſſurés en comparant un grand nombre d'individus, tant de l'Amérique ſeptentrionale que du Bréſil. Les ailes ſupérieures ont dans tous des taches jaunâtres & tranſparentes, diſpoſées comme dans l'eſpèce précédente, l'heſpérie *Protée* & autres eſpèces analogues; quatre de ces taches forment une bande tranſverſe; trois à quatre autres très-petites, ſous la forme de points, ſont placées en une petite ligne, près de la côte, un peu avant ſon extrémité; la dernière tache eſt ſituée entre les dernières & la bande. Le deſſous des ailes inférieures eſt d'un brun plus ou moins foncé, d'un rougeâtre-obſcur, avec le limbe poſtérieur, l'angle anal excepté, plus ou moins ſaupoudré de petits atomes d'un gris-cendré ou d'un gris de perle, qui, lorſqu'ils ſont plus abondans & plus étendus dans le ſens de la largeur, y forment une bande de cette couleur. Le limbe inférieur des ailes ſupérieures offre, dans pluſieurs individus, les mêmes caractères; la bande y eſt interrompue avant l'angle du ſommet, & s'y termine avant celui qui lui eſt oppoſé ou l'interne; quelquefois cependant la bande eſt continue.

Dans le papillon *Exadeus* de Cramer, qui ſe trouve au Bréſil, à Surinam, &c., le diſque du deſſous des ailes inférieures préſente près de ſon milieu une tache ovale d'un blanc-argenté, placée au-deſſus d'une raie de la même couleur, anguleuſe, tranſverſe, oblique & interrompue; très du bord externe, au-deſſus du point où elle ſe termine, ſont deux petits traits ſitués tranſverſalement & pareillement argentés. Dans d'autres individus des mêmes contrées, la tache centrale eſt convertie en une bande tranſverſe, & le gris de perle du limbe poſtérieur paroît y dominer ſur le brun.

Les individus de l'Amérique ſeptentrionale, ceux qui paroiſſent avoir ſervi de type au *P. Clarus* de Cramer, ſont un peu plus petits; la couleur jaunâtre des taches tranſparentes, & particulièrement de la bande, tire un peu ſur le rouſſâtre; le deſſous des ailes inférieures eſt preſqu'entièrement rougeâtre; la tache argentée y forme une bande, mais bruſquement rétrécie & interrompue vers ſon extrémité extérieure; cette tache manque dans quelques autres individus. M. Lherminier m'a envoyé cette variété de la Guadeloupe.

La chenille, d'après les obſervations d'Abbot, vit ſur le *Robinia pſeudo-acacia* & le *Caroubier* ſauvage; elle eſt verte, ponctuée & rayée tranſverſalement de noir, avec la tête rougeâtre, marquée en devant de deux taches oculaires, jaunes; elle fait ſa coque en automne, & l'inſecte parfait éclot au printemps ſuivant.

φ φ. Dent extérieure de la troncature oblique du prolongement anal des ailes inférieures ſoit point ou peu ſaillante, ſoit obtuſe ou arrondie.

39. Hespérie Epitus.

Hesperia Epitus.

Hesperia alis suprà fuscis, infrà fusco-ferrugineis; anticis maculis vitreis, flavidis: tribus internis in triangulum dispositis; alis posticis infrà fasciâ transversâ, argenteâ.

Hesperia U. Epitus, *alis subcaudatis fuscis, flavo maculatis; posticis subtùs fasciâ argenteâ.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 332. *n°.* 261.

Papilio P. U. Epitus *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 86. *n°.* 778.

Papilio Epitus. Cram. *Pap.* 29. *pl.* 343. E. F. — *P. Evadnes. Ibid.* G.

Elle est un peu plus petite que l'espèce précédente. Le dessous de la massue des antennes & les palpes extérieurs sont jaunâtres. Les ailes sont noirâtres en dessus & d'un brun-ferrugineux en dessous, avec le limbe postérieur souvent plus clair ou même cendré, du moins en partie, & spécialement sur les ailes inférieures, l'angle anal excepté; les taches transparentes & jaunâtres des ailes supérieures, qui dans les espèces précédentes forment une bande, sont ici au nombre de trois, & disposées en triangle, celle du milieu étant plus en dehors; les autres taches ressemblent, par leur situation & leur grandeur, à celle que l'extrémité postérieure des mêmes ailes nous offre dans ces espèces. Le milieu de la surface inférieure des secondes ailes est traversé par une bande argentée plus ou moins large, tantôt entière, tantôt échancrée, & ne formant quelquefois qu'une simple ligne transverse; le dessus de ces ailes offre aussi quelquefois un point jaune. (*Epitus*, Cram.)

Elle se trouve au Brésil & à la Guyane.

Il faut rapprocher de cette espèce : 1°. le *P. Comes* de Cramer, *Pap.* 35. *pl.* 391. N. O, voisin de l'*H. Pisistrate* de Fabricius; 2°. son *P. Brino, ibid.* 30. *pl.* 355. E. F. & 33. *pl.* 392. C. D.

Le dessous des ailes est d'un rouge-foncé ou d'un brun-marron. Les inférieures ont deux bandes maculaires & transverses argentées; leur dessus offre aussi un point jaune, peu éloigné du bord postérieur.

M. Longsdorff m'a envoyé du Brésil une hespérie que je soupçonne n'être qu'une variété de cette espèce, & qui en diffère par les caractères suivans : les ailes supérieures ont près du sommet quelques taches transparentes que l'on n'observe point dans les figures de Cramer. Le dessus des inférieures présente près de la base une tache blanchâtre, & entre le milieu & le bord postérieur une bande courte, transverse, arquée, de cette couleur, mais en partie transparente : cette bande est plus étendue en dessous, & se prolonge en manière de dent, dirigée en avant, au milieu de sa courbure; son extrémité interne s'élargit & s'arrondit; à la place de la tache antérieure est une raie transverse, pareillement blanchâtre.

On rapprochera encore de cette espèce le *P. Dubius* de Cramer, *ibid. pl.* 354. B. C. Les taches transparentes des ailes supérieures sont toutes très-petites, en forme de points, & disposées en une ligne oblique. Le dessous des ailes inférieures est d'un rouge-noirâtre, avec une ligne jaune, traversant l'aile d'un bord à l'autre.

Viennent encore se placer ici son *P. Floresian, ibid.* 33. *pl.* 391. E. F; son *P. Orchamus, ibid.* 13. *pl.* 155. E. F, & enfin son *P. Arcalaus, ibid.* 33. *pl.* 391. I. K; mais je ne connois ces espèces que d'après leur figure; elles sont toutes de l'Amérique méridionale. Le *P. Ethlius* de cet auteur, que je décrirai plus bas, & quelques autres espèces, doivent, dans un ordre naturel, leur être associées.

40. Hespérie Ericus.

Hesperia Ericus.

Hesperia alis fuscis; alis anticis punctis tribus fenestratis, minutissimis; posticis subtùs maculâ posticâ flavescente.

Hesperia U. Ericus, *alis subcaudatis, fuscis: punctis anticis fenestratis minutis; posticis subtùs maculâ post. câ flavescente.* Fab. *Suppl. Ent. Syst. p.* 432.

Elle a entièrement le port de l'*H. Phocas.* Les antennes sont crochues. Les ailes sont noirâtres. Les antérieures sont plus pâles & en dessous, & ont près de leur extrémité trois points très-petits, transparens. Les inférieures sont presqu'en queue, & offrent postérieurement en dessous une tache jaunâtre; on n'en voit aucune sur l'autre face.

Je n'ai point vu cette espèce, & je ne la place ici que par présomption.

Elle se trouve aux Indes orientales.

41. Hespérie Chromus.

Hesperia Chromus.

Hesperia suprà fusca, subtùs dilutior; alis posticis infrà lineâ transversâ albâ, maculâ anali fuscâ.

Papilio Chromus. Cram. *Pap.* 24. *pl.* 284. E.

Elle est de moyenne taille, noirâtre en dessus, d'une teinte plus claire ou d'un brun-cendré en dessous. Le dessous de la massue des antennes est roussâtre. Le milieu des ailes supérieures offre, dans quelques individus, deux ou trois petites taches transparentes. Le dessous des inférieures est traversé de l'angle extérieur à l'angle anal, par une raie étroite, droite & blanchâtre. L'on voit sur l'angle anal une tache noirâtre, assez grande & alongée.

Elle se trouve, selon Cramer, à la côte de Coromandel.

L'hespérie

L'hesṕérie *Alexis* de Fabricius paroît en être très-voisine; la bande du dessous des ailes inférieures est bleuâtre.

— — — *Dessus du corps & base supérieure des ailes point garnis de duvet soyeux vert ou d'un vert-bleuâtre; dessous des inférieures n'offrant point, du moins dans les espèces où ces parties sont jaunâtres, de taches discoïdales argentées, ni une bande longitudinale ou transverse, soit pareillement argentée, soit blanche ou jaunâtre.*

Nota. Prolongement postérieur & interne des ailes inférieures ordinairement très-court, obtus ou arrondi; ces ailes sont arrondies ou très-arquées vers l'angle extérieur, dans plusieurs.

φ. *Des taches vitrées, & dont plusieurs bordées de noir ou de noirâtre, en forme de petits yeux, sur les quatre ailes.*

Massue des antennes entrecoupée de noirâtre & de blanc.

42. Hespérie Polygius.

Hesperia Polygius.

Hesperia rufo-fusca; alarum anticarum medio fusciâ maculari fenestratâ, transversâ.

Elle est très-voisine du papillon *Euribates* de Cramer (*Pap.* 33. *p.* 393. D), & peut-être même n'en est-elle qu'une variété à taches jaunâtres & transparentes plus nombreuses. Cinq d'entr'elles forment sur le milieu des ailes supérieures une bande transverse; la seconde & la troisième, en commençant à compter du bord extérieur, sont beaucoup plus grandes que les autres, presque carrées, un peu échancrées aux deux bouts; les dents les plus internes sont en forme de points & bordées de noirâtre; entre cette bande & l'angle du sommet sont quatre autres taches, dont une plus grande, triangulaire, située près de l'entre-deux des deux grandes de cette bande, & les trois autres, en forme de points ovales, disposées sur une petite ligne, près de la côte, vers le milieu de l'espace compris entre la bande & l'angle du sommet. Les inférieures présentent chacune trois petites taches transparentes, arrondies & bordées de noirâtre; l'une un peu plus grande, près du milieu, & les deux autres rapprochées sur une ligne transverse, au-dessous de la précédente, vers les deux tiers de la longueur de l'aile.

J'ai reçu cette espèce de M. Langsdorff.

43. Hespérie Salatis.

Hesperia Salatis.

Hesperia alis suprà fusco rufescentibus, maculis vitreis omnibus punctiformibus.

Papilio Salatis. Cram. *Pap.* 33. *pl.* 393. E.

Les antennes sont finement annelées de noir & de blanc, avec la massue noirâtre & marquée d'un anneau blanc. Le dessus du corps est d'un brun-roussâtre ou presque de couleur de tabac d'Espagne; le dessous, le limbe postérieur des ailes & le bord extérieur des inférieures sont plus foncés. Les quatre ailes offrent, depuis leur milieu jusqu'à leur extrémité postérieure, quelques taches transparentes, petites, en forme de points jaunâtres & bordées de noir; leur nombre varie; l'une d'elles est placée près du milieu, mais manque quelquefois aux ailes supérieures; les autres sont situées un peu plus bas, sur une ligne transverse & un peu arquée; souvent on n'en distingue bien que deux ou trois, celles des deux extrémités de la ligne étant très-petites.

Cette espèce m'a été envoyée du Brésil par M. Langsdorff.

Je soupçonne qu'elle est la même que l'*H. Muretus* de Fabricius; mais la description qu'il en donne est si vague, que je n'ai point osé le citer dans la synonymie.

44. Hespérie Ramusis.

Hesperia Ramusis.

Hesperia alis brunneo-fuscis, maculis punctisque vitreis albis.

Papilio Ramusis. Cram. *Pap.* 29. *pl.* 242. G.

Cette espèce, à la couleur du fond des ailes & des taches près, diffère peu de la précédente. Les taches du milieu des ailes supérieures sont plus grandes & plus rapprochées; celles des ailes inférieures sont toutes en forme de points, disposées sur deux lignes transverses, arquées, & presque toutes cerclées de noir.

Elle se trouve au Brésil.

Nota. Quelques espèces de Fabricius, telles que son *Phocas*, son *Nicias*, son *Rhetus*, le *P. Crinisus* de Cramer, &c., paroissent se lier avec les précédentes, & avoir aussi de l'affinité avec les hespéries *Gnetus*, *Salus*, & autres espèces analogues. La première, ou le *Phocas*, semble faire le passage de celles-ci aux précédentes. L'absence ou la présence des taches vitrées est un caractère très-artificiel, mais que nous sommes forcés d'employer pour arriver plus facilement à la détermination de certaines espèces.

φ φ. *Des taches transparentes sur les quatre ailes, sans cercle brun ou noirâtre autour; dessus des ailes inférieures d'un brun ou d'un noir uniforme, soit avec un ou plusieurs points, soit avec de petites taches transparentes.*

45. Hespérie Chemnis.

Hesperia Chemnis.

Hesperia corpore brunneo ; alis fuscis, margine postico flavo ; posticis utrinquè concoloribus, maculis tribus quadratis hyalinis.

Hesperia U. Chemnis, *alis subcaudatis, fuscis, hyalino maculatis margineque postico flavo.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *pag.* 331. *n°.* 257.

Papilio Chemnis. Donov. *of an Epit. of the Nat. Hist. of the Inf. Ind.* 6. *pl.* 3. *fig.* 1.

Sa grandeur est un peu au-dessus de la moyenne. Le dessus du corps, le milieu des ailes supérieures & la base des inférieures sont d'un brun-roussâtre ; le bord postérieur des unes & des autres est jaune ; toutes les autres parties du corps & des ailes sont brun-noirâtre, mais plus pâle sous les ailes inférieures. Les supérieures ont sept taches transparentes, jaunâtres : trois postérieures très-petites, en forme de points, disposées sur une ligne transverse & oblique, trois autres centrales, & la dernière ou septième entre celle-ci & les précédentes. On en voit trois ayant la même forme & une couleur semblable, mais un peu plus grandes, au milieu des inférieures & formant une ligne transverse.

Elle se trouve aux Indes.

46. Hespérie Ethlius.

Hesperia Ethlius.

Hesperia alis supra fuscis, infrà, primorum disco excepto, flavidis ; his maculis quatuor punctisque tribus ante apicem, fenestratis ; alis posticis macularum quatuor flavidarum punctiformium serie transversâ.

Papilio Ethlius. Cram. *Pap.* 33. *pl.* 392. A. B.

Cette espèce est si voisine de l'*H. Chemnis* de Fabricius, qu'elle n'est peut-être qu'une variété un peu plus grande, d'un brun plus fauve & commun aux deux surfaces des ailes. Le milieu du dessous des supérieures est noirâtre ; celui des inférieures présente une série transverse de quatre petites taches, presque carrées, d'un jaunâtre-transparent ; on pourroit n'en compter que trois, l'extérieure étant simplement divisée en deux ou double ; celles des ailes supérieures ont la même disposition que dans l'*H. Chemnis*. Les quatre ailes sont finement bordées postérieurement de jaunâtre, ainsi que dans cette espèce, & les inférieures ont la même forme que les siennes. La base supérieure des unes & des autres, & le dessus du corps, sont un peu jaunâtres.

Elle se trouve à Surinam & au Brésil.

47. Hespérie Antonin.

Hesperia Antoninus.

Hesperia alis anticis posticisque supra fuscis ; illarum costâ subtùs flavidâ ; his punctis duobus flavidis, infrà rubro-fuscis, basi flavo-griseâ.

Je suis redevable à l'amitié de M. Langsdorff de plusieurs individus de cette espèce, qui, dans une méthode naturelle, se rapproche beaucoup de l'*H. Epitus*. Elle a encore plus de rapports avec l'*H. Ethlius*. L'angle anal des ailes inférieures est moins prolongé & leur dessous est autrement coloré. Sa taille varie ; celle des plus grands individus est un peu au-dessus de la moyenne. La massue des antennes est jaunâtre & se termine brusquement en manière de crochet acéré. Le dessus du corps & des ailes est noirâtre. Les supérieures ont depuis leur milieu jusque près du sommet six à sept taches jaunâtres, transparentes, dont une près du milieu de la côte, deux ou trois autres en forme de petits points & alignées, près du sommet, & les autres inférieures & disposées en une ligne oblique ; en dessous, le disque de ces ailes est plus foncé ou noirâtre, & la côte, depuis la base jusque près du milieu, est d'un gris-jaunâtre. Sur le milieu des ailes inférieures est une rangée transverse de deux petites taches, tantôt presque carrées, tantôt punctiformes, jaunâtres & vitrées. L'une d'elles, quelquefois même les deux, & quelques-unes des ailes supérieures s'oblitèrent. Le dessous de ces ailes est d'un grisâtre ou jaunâtre, depuis la base jusque près du milieu ; ensuite, d'un brun-rougeâtre, avec la portion du limbe contiguë à l'angle extérieur plus pâle ou cendrée. Cette espèce ressemble beaucoup, à cet égard, au *P. Phidon* de Cramer.

C'est près de l'*H. Antonin* ou de l'*H. Ethlius*, que paroît devoir se placer le *P. Salius* de cet auteur. (*Pap.* 6. *pl.* 68. K.) Il n'a représenté que sa face supérieure. Le dessous, selon lui, ne diffère du dessus qu'en ce que les ailes inférieures ont leur base d'un gris-cendré obscur.

J'ai reçu de M. Langsdorff quelques individus d'une hespérie fort analogue. Le dessus de ces ailes offre tantôt deux petites taches, dont une transparente, tantôt de foibles vestiges d'une bande maculaire d'un jaunâtre-pâle. Le dessous est généralement d'un cendré un peu jaunâtre, avec deux bandes transverses, brunes, & une tache de cette couleur, en forme de point & située au-dessus d'elle, près du bord extérieur, à peu de distance de la base. Dans une variété, le dessous de ces ailes est d'un brun-ferrugineux, avec la base & une raie transverse jaunâtres. J'ai donné à cette espèce le nom de *Nyctelius*.

Toutes ces hespéries se trouvent au Brésil & à Surinam.

48. Hespérie Dalman.

Hesperia Dalman.

Hesperia alis suprà fuscis ; anticis maculâ apicali trigonâ, nigro-fuscâ, flavido marginatâ ; posticis suprà punctorum quatuor flavescentium serie transversâ : infrà fuscis, fusciâ flavidâ, fusco punctatâ maculâque atrâ subocellatâ.

Je donnerai à cette espèce le nom de l'un de nos plus célèbres entomologistes vivans, M. Dalman, directeur du cabinet d'histoire naturelle de Stockholm, regrettant seulement qu'il m'ait prévenu à l'égard de ces témoignages d'estime réciproque.

L'*H. Dalman* est très-voisine du *P. Arcalaus* de Cramer, *Pap.* 33. *pl.* 391. I. K. La grandeur, les couleurs du dessous du corps & des ailes, les taches supérieures, sont presque semblables. Les taches transparentes des ailes supérieures sont au nombre de sept, & ont la même forme & la même disposition que celles de l'espèce précédente, de l'*H. Ethlius* & de plusieurs autres. Le bord interne de ces ailes est garni en dessus, depuis la base jusqu'au milieu de sa longueur, d'un duvet d'un jaunâtre-pâle ou grisâtre, & formant une raie longitudinale. Le milieu de la face supérieure des secondes ailes présente une rangée transverse de petites taches de cette couleur, & dont les deux du milieu transparentes. Le dessous des ailes antérieures est d'un brun-noirâtre-foncé, avec la portion supérieure de la côte & un espace près de l'angle du sommet, d'un jaunâtre-pâle; cet espace renferme une tache triangulaire, de la couleur du fond, dont la base est formée par le bord extérieur, & offre à son milieu une petite tache d'un jaunâtre-pâle; les petits points transparens & ordinaires bordent le côté interne de la tache. Le dessous des ailes inférieures est aussi d'un brun-noirâtre-foncé, avec la partie basilaire du bord extérieur, une bande transverse, située immédiatement au-dessus des taches du milieu, & l'extrémité du côté extérieur, d'un gris-jaunâtre; sur cette bande sont intérieurement deux points noirâtres; au-dessous de celui qui est le plus interne, est une tache plus foncée, & à laquelle la petite tache jaune interne de la rangée du dessus de ces ailes forme une bordure en manière d'iris; le point transparent qui vient ensuite, ou l'interne des deux, est surmonté d'une petite tache d'un noirâtre-foncé & presque contiguë à la précédente; plus loin, en tirant vers le bord extérieur & au-dessus de la première tache de la série du milieu, est un point noirâtre; une partie du limbe postérieur est d'un brun plus clair, de manière que cette couleur se détache davantage au-dessous de la bande jaunâtre, & semble former elle-même une autre bande. La massue des antennes est noirâtre en dessus, blanchâtre en dessous & terminée par un petit crochet. Le dessous du corps, & particulièrement les palpes extérieurs, sont grisâtres.

Cette espèce fait partie de la collection du Muséum d'histoire naturelle du Jardin du Roi, & lui est venue du Bréfil.

49. Hespérie Basoches.

Hesperia Basoches.

Hesperia alis suprà fusco-nigris, infrà, primorum disco excepto, cinereo-brunneis ; omnium disco maculis tribus albido-hyalinis ; posticis suprà maculâ apicali niveâ, subtùs, ante apicem, nigro tripunctatis.

Parmi les savans qui m'honorent de leur amitié, & dont la correspondance m'a été des plus utile, je distinguerai spécialement M. de Basoches, habitant de Falaise, département du Calvados. La reconnoissance & l'amitié me font donc un devoir de lui consacrer cette espèce, qu'aucun naturaliste n'a fait connoître. Elle se rapproche beaucoup du *P. Phidon* de Cramer, dont nous avons parlé en décrivant l'*H. Antonin*. Mais elle en diffère néanmoins par plusieurs caractères exprimés dans notre phrase spécifique. Elle est de grandeur moyenne. Les antennes sont noires, avec des anneaux blancs, mais dont un beaucoup plus étendu & en forme de bande, sur la massue, avant son crochet. Le corps est noirâtre. Les ailes sont presque noires en dessus, d'un brun-violet-pâle & un peu cendré en dessous, mais le disque des supérieures est noirâtre. Les inférieures offrent aussi un espace plus foncé, en forme de tache alongée ou de bande, allant obliquement du milieu de leur disque au bord extérieur. Sur le milieu de chaque aile sont trois taches transparentes & blanchâtres; celles des supérieures sont plus grandes & disposées en triangle; celles des inférieures sont très-petites, contiguës, en manière de tache centrale & transverse; l'intérieure est en forme de petit point; entr'elle & le bord interne est un point noirâtre; on en voit trois autres, formant un triangle, sur le dessous des supérieures, un peu avant le sommet; l'extérieur de ce sommet ou de l'angle apical est blanc en dessus.

M. Lansgdorff m'a fait don de cette espèce, qu'il a recueillie au Bréfil.

50. Hespérie Fischer.

Hesperia Fischer.

Hesperia alis nigris ; anticis maculis septem, posticis tribus, albo-hyalinis.

Je dédie cette espèce au savant auteur de l'*Entomographie de la Russie*, M. Fischer, vice-chancelier de l'Université de Moscow. Elle est de taille moyenne, noire, avec quelques points sur le dessus de la tête, les palpes extérieurs,

la poitrine & la majeure partie des pattes gris; le deſſous des ailes inférieures & une grande partie de la portion extérieure de celui des ſupérieures ont une teinte d'un cendré-verdâtre & luiſant. Le milieu de ces dernières ailes offre trois taches tranſparentes, dont la poſtérieure plus grande, preſque carrée; les quatre autres ſont ſituées entr'elle & l'angle apical; les deux les plus voiſines de la côte ſont très-petites, en forme de points & très-rapprochées; celle qui eſt la plus en arrière eſt auſſi très-petite. Entre le milieu & le bord poſtérieur de chaque aile inférieure ſont trois autres taches tranſparentes, preſque cendrées, ſur une rangée tranſverſe, un peu arquée; les deux internes ne ſont ſéparées l'une de l'autre que par une nervure. Les antennes ſont entièrement noires.

Elle ſe trouve au Bréſil, & je l'ai reçue de M. Langſdorff.

51. Hespérie Leſueur.

Hesperia Leſueur.

Heſperia alis nigro-fuſcis, maculis punctiſve albo-hyalinis; alis poſticis puncto diſcoïdali alteriſque quatuor inferis per ſeriem tranſverſam diſpoſitis.

Elle eſt un peu plus grande que l'*H. Ethlius*, d'un noirâtre plus foncé, avec les taches ordinaires des ailes ſupérieures & celles en forme de points des inférieures d'un blanc-tranſparent; celle des quatre taches antérieures des premières ailes, qui eſt la plus voiſine de la côte, eſt échancrée à chaque bout; celles des ailes inférieures ſont en forme de points, dont un iſolé, preſque central, & les quatre autres au-deſſous, en une rangée tranſverſe; l'avant-dernier eſt un peu plus grand; au-deſſus de l'extrémité extérieure de cette ſérie, eſt un cinquième point, très-petit & moins apparent. Les ailes ſont finement bordées de blanc.

Cette eſpèce a été envoyée des États-Unis au Muſéum d'hiſtoire naturelle, par l'un de ſes plus zélés correſpondans, l'ami & le compagnon de feu Peron, M. Leſueur, & auquel j'ai conſacré cette eſpèce.

52. Hespérie Bonfils.

Hesperia Bonfilius.

Heſperia alis ſuprà fuſcis, infrà fuſco-ferrugineis, limbo poſtico dilutiori; anticis faſciâ, poſticis punctis in ſeriem tranſverſam mediamque diſpoſitis, albo-hyalinis; omnium fimbriâ poſticâ albâ, nigro interſectâ.

M. Bonfils de Bordeaux cultive depuis long-temps l'étude des inſectes, en poſſède une belle collection, & s'empreſſe de mettre à profit toutes les occaſions qui lui permettent d'être utile à tous les naturaliſtes. Ceux qui, comme moi & M. le général Dejean, ont éprouvé les témoignages de ſa bienveillance, partageront, j'eſpère, ce tribut de ma gratitude.

Cette heſpérie eſt large (les ailes étendues) d'environ un pouce & demi. Le milieu des ailes ſupérieures eſt traverſé obliquement par une bande d'un blanc-tranſparent, n'atteignant pas les deux bords, & formée de deux taches réunies; entr'elle & la baſe, près du bord interne, eſt un point de la même couleur; on en voit quatre autres, entre la bande & le bord poſtérieur, dont les trois ſupérieurs rapprochés en une ligne; le deſſous de ces ailes eſt d'un fauve-obſcur, avec le limbe poſtérieur d'un brun-clair; chaque extrémité de la bande eſt appuyée ſur une tache griſâtre & marginale. Le diſque des inférieures préſente une ſérie tranſverſe de trois points tranſparens, dont l'intérieur, beaucoup plus grand, eſt formé de petites taches arrondies; en deſſous, ces ailes ſont d'un fauve-obſcur au milieu, d'un brun-clair au côté interne & ſur le limbe poſtérieur, mais pâle ici, & même griſâtre à l'angle extérieur; un peu au-deſſus du centre eſt un point ſolitaire blanchâtre; au-deſſous des points tranſparens eſt une bande d'un fauve-obſcur, diviſée en petites taches, preſqu'en forme de points, & recourbée tout autour du diſque; deux de ces points bordent extérieurement la tache tranſparente: le plus élevé eſt accolé intérieurement à une petite tache ſolitaire. L'angle anal eſt ainſi que dans beaucoup d'eſpèces voiſines, comme tronqué obliquement & terminé par une dent.

Elle ſe trouve au Bréſil & m'a été envoyée par M. Langſdorff.

φ φ φ. Des taches ou des points tranſparens aux ailes ſupérieures au plus.

53. Hespérie Thrax.

Hesperia Thrax.

Heſperia alis fuſcis, infrà dilutioribus; anticis maculis tribus flavido-hyalinis, in triangulum diſpoſitis; anteriorum inferâ magnâ, elongato-quadratâ.

Heſperia P. U. Thrax, *alis ecaudatis, fuſcis: maculis aliquot feneſtratis, antenis uncinatis.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 337. *n°.* 282.

Papilio U. Thrax. *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 87. *n°.* 795. — *Spec. Inſ. tom.* 2. *p.* 134. *n°.* 620. — *Syſt. Ent. p.* 533. *n°.* 338.

Papilio U. Thrax, *alis ecaudatis, fuſcis, maculis tribus feneſtratis; antennis ſubuncinatis.* Linn. *Syſt. Nat. edit.* 12. *tom.* 2. *p.* 794. *n°.* 260.

Papilio P. U. *Thrax.* Donov. *of an Epit. of the Nat. Hiſt. of the Inſ. of Ind.* 6. *pl.* 2. *fig.* 2.

Fabricius n'ayant point connu le *P. Thrax* de Linné, y rapporte, comme synonymes, plusieurs espèces essentiellement différentes. Peut-être cette confusion provient-elle de la citation qu'a faite celui-ci d'une figure de Clerck, qui ne s'accorde point avec la description de cet insecte. Il n'en est pas ainsi de celle qu'en a donnée M. Donovan; elle nous rappelle en tout point la description du naturaliste suédois. Nous sommes d'autant plus sûrs de l'identité, que M. Westermann nous a envoyé une hespérie de Java (patrie, selon Linné, du *P. Thrax*), parfaitement semblable à celle que le naturaliste anglais a représentée. Elle est assez grande, d'un brun-noirâtre, plus clair en dessous, ainsi qu'au bord extérieur des premières ailes. Celles-ci ont trois taches transparentes & jaunâtres, dont les deux antérieures plus grandes, l'inférieure furtout; la supérieure est échancrée postérieurement; en dessous, le disque de ces ailes est plus foncé; celui des inférieures présente l'apparence d'une ligne noirâtre en forme d'ovale. La massue des antennes est crochue, aiguë à son extrémité, noirâtre, avec un anneau blanc, près de son origine.

Dans la figure de Clerck (*Icon. Inf. tab.* 42. *fig.* 2 & 3.), les ailes supérieures y sont représentées avec des taches plus nombreuses & plus petites; les ailes inférieures ont sur leurs deux surfaces un point jaunâtre central; l'échancrure du bord postérieur voisine de l'angle anal y est peu sentie. D'après ces caractères & quelques autres, nous pensons que cette figure se rapporte plutôt à quelque variété de l'hespérie *Chemnis* ou des papillons *Phidon*, *Ethlius* de Cramer.

Nous ne connoissons point l'*H. Flesus* de Fabricius. (*Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 338. *n°.* 286.) Cette espèce est, selon lui, voisine de l'*H. Thrax*. Ses antennes sont noires & crochues. Les ailes sont noirâtres; les antérieures ont des taches vitrées; le disque inférieur des secondes est blanc, avec des points noirs. Elle habite l'Afrique équinoxiale.

L'hespérie *Vespasien* du même (*Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 334. *n°.* 269.) doit être voisine de notre *H. Thrax*, ou de quelqu'autre espèce analogue. Le corps est grand, fauve. Les ailes sont d'un noirâtre-fauve sur leurs deux surfaces; les supérieures ont, avant leur sommet, quelques taches vitrées. Les postérieures sont presqu'en queue & sans taches.

Elle habite les Indes.

Le *P. Ladon* de Cramer (*Pap.* 24. *pl.* 284 G) paroît encore se ranger près des espèces précédentes. Il habite la côte de Coromandel.

Je suis redevable à l'amitié de M. le baron Dejean d'une grande hespérie de Java, que je considère comme une variété de cette espèce. Ses ailes supérieures ont dans leur milieu trois taches blanches & transparentes, & près du sommet, cinq à six autres de la même couleur, mais en forme de points & composant une ligne courbe.

Les ailes inférieures sont blanches, avec une large bordure noire au bord extérieur; en dessous, cette bordure est largement interrompue & elle ne se montre que sur une portion du côté extérieur & à l'angle anal.

54. Hespérie Ennius.

Hesperia Ennius.

Hesperia alis anticis fuscis, maculis flavo-hyalinis; posticis supra flavis, fusciâ submarginali, atrâ, arcuatâ: subtùs fuscis, disco albo.

Hesperia V. Ennius, *alis fuscis; anticis hyalino maculatis; posticis supra atris, disco flavo: subtùs fuscis, disco albo.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 337. *n°.* 283.

Papilio Ennius. Jon. *Fig. pict. tab.* 89. *fig.* 1.

Papilio P. U. *Ennius.* Donov. *of an Epit. of the Hist. of the Nat. Inf. of Ind.* 11. *pl.* 3. *fig.* 1.

Elle est grande & noirâtre. Les ailes supérieures, d'après la figure de Donovan, ont sept taches jaunâtres, dont une près du milieu de la côte, trois petites ou en forme de points & groupées près de son extrémité, & les trois autres situées en une ligne oblique, au-dessous de la première. Le dessus des ailes inférieures est jaune, avec une bande noire & arquée près des bords extérieurs; leur dessous, suivant Fabricius, est noirâtre, tacheté de noir, avec le disque blanc. L'abdomen, dans la figure de Donovan, est roussâtre.

Elle habite les Indes.

55. Hespérie Phocas.

Hesperia Phocas.

Hesperia fusco-flavida aut rufescens; alis anticis maculis flavido-hyalinis: tribus anticis majoribus, posticè emarginatis, quinque aut sex minutis, subapicalibus; alis posticis flavescentibus, fasciis punctorumve lineis transversis, fuscis; antennis abruptè uncinatis.

Hesperia U. Phocas, *alis subcaudatis fuscis, fenestrato maculatis; posticis subtùs puncto baseos atro.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 334. *n°.* 267.

Papilio Phocus. Cram. 14. *pl.* 162. F. — *Ejusd.* P. Morpheus. 33. *pl.* 392. G. H. Variété.

Son envergure est d'environ deux pouces. L'extrémité supérieure des antennes est brusquement courbée & se termine en une pointe aiguë. Le corps & les ailes sont d'un noirâtre tirant sur le jaune, ou même presqu'entièrement jaunâtres dans quelques individus; cette teinte do-

mine sur les inférieures, & elle est coupée transversalement par une ou deux raies obliques & noirâtres, mais qui, dans quelques individus, s'effacent & se réduisent à une série de points; le bord postérieur est noirâtre. Le milieu des supérieures offre un groupe de quatre taches d'un jaunâtre-transparent, dont trois beaucoup plus grandes & échancrées à leur extrémité postérieure; près du sommet est un autre groupe de taches semblables pour la couleur & la transparence, au nombre de six, petites & presqu'en forme de points; une portion de la côte est séparée en dessus de la première nervure, par un sillon étroit, profond & linéaire. Le fond de la couleur des ailes est quelquefois roussâtre, & quelques-uns de ces individus ont même sur le dessous des inférieures de petites taches jaunâtres.

Je soupçonne que cette variété est l'*H. Nicias* de Fabricius (*Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 332. *n°.* 262), & qu'il dit être de Cayenne. Son corps, selon lui, est grand, fauve, avec les antennes noires & crochues. Les ailes antérieures ont la base fauve, marquée d'un point noir, & l'extrémité noirâtre, avec une grande tache sinuée, d'un jaune transparent. Les postérieures sont fauves, avec des points noirâtres; le dessous est de la couleur du dessus.

Cette espèce habite la Guyane & le Brésil.

56. Hespérie Avitus.

Hesperia Avitus.

Hesperia fusco-flavescens; alis anticis maculis flavido-hyalinis; duabus anticis majoribus, subquadratis; duabus tribusve punctiformibus, subapicalibus; alis posticis punctis fuscis, per series transversas dispositis; antennarum clavâ sensim arcuatâ.

Papilio Avitus. Cram. *Pap.* 30. *pl.* 354. D. E.

Elle est presque de moitié plus petite que l'*H. Phocas*, & lui ressemble beaucoup. La massue des antennes est simplement arquée, noire, avec un anneau blanc. Les ailes sont d'un jaunâtre-obscur, ou mélangées de noirâtre & de jaunâtre. La côte des supérieures n'est point réfléchie en dessus; leurs taches transparentes sont plus petites & moins nombreuses que dans l'espèce précédente; on n'en voit que deux ou trois près de leur extrémité, & les antérieures, ou celles du milieu, ne sont qu'au nombre de trois, au lieu de quatre, l'inférieure de celles qui composent la rangée transverse manquant; ces taches, à l'exception de l'extérieure, ne sont point échancrées postérieurement. Les ailes inférieures ont une rangée transverse de points noirâtres; on en voit aussi quelques-uns près de la base.

Cette espèce se trouve au Brésil & à Surinam. Je l'ai reçue de M. Langsdorff.

57. Hespérie Rhétus.

Hesperia Rhetus.

Hesperia flavo-ferruginea; alis fusco undatis; anticarum margine externo valdè reflexo, posticarum cœruleo-atro.

Hesperia U. Rhetus, *alis subcaudatis fulvis: posticis margine exteriori cœruleo-atro.* Fab. *Ent. Syst. em. tom* 3. *pars* 1. *p.* 334. *n°.* 270.

Papilio P. U. Rhetus. *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 86. *n°.* 786. — *Spec. Inf. tom.* 2. *p.* 133. *n°.* 612.

Papilio Midas. Cram. *Pap.* 6. *pl.* 63. G.

Le corps des plus grands individus a, les ailes étendues, un peu plus de deux pouces de largeur; il est, en majeure partie, couleur de souci. Les antennes sont noires, avec le sommet courbé & très-pointu. Les ailes supérieures & le dessus des inférieures présentent dans les individus les plus colorés, deux raies ondées noirâtres transverses, dont la dernière terminale, & une tache de la même couleur, en forme de gros point, en avant de la première, près du milieu de la longueur; celle des supérieures est située près de la côte; une portion de cette côte est fortement réfléchie en dessus, ou forme une espèce de pli, contigu, dans sa plus grande largeur, à la première nervure; on observe le même caractère dans le *P. Salutis* de Cramer, & dans quelques autres espèces. Le bord extérieur des ailes inférieures est d'un noir-foncé, tirant sur le bleuâtre; leur dessous est noirâtre, avec des bandes transverses roussâtres, ou du moins mélangé de ces deux teintes.

Cette espèce se trouve à Surinam & au Brésil. C'est probablement auprès d'elle ou dans son voisinage, que se trouve l'*H. Silvius* de Fabricius. (*Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 342. *n°.* 299.) Elle est grande & du Cap de Bonne-Espérance. Le dessus de ses ailes est noirâtre, avec le disque jaunâtre & tacheté de noirâtre. Le dessous des postérieures est cendré, avec des raies noirâtres & ondées.

58. Hespérie Crinisus.

Hesperia Crinisus.

Hesperia alis fuscis, ad basin suprà rufescentibus, infrà griseo-flavidis; posticarum disco infero rufescenti, fusco fasciato; anticis sæpiùs maculis hyalinis, minutis.

Papilio Crinisus. Cram. *Pap.* 25. *pl.* 300. G. H.

Elle est de taille moyenne. La massue des antennes est graduellement arquée. Tout le corps est d'un gris-jaunâtre, plus pâle à la tête; les ailes sont noirâtres, avec la moitié antérieure de leur surface supérieure roussâtre ou couleur de tabac

d'Eſpagne; l'autre moitié eſt ſaupoudrée de la même couleur, & offre ordinairement un aſſez grand nombre de petites taches tranſparentes, dont les antérieures & les dernières ſont rapprochées trois par trois; l'eſpace intermédiaire en a trois autres. En deſſus, l'origine des quatre ailes eſt de la couleur du corps. Le milieu des inférieures eſt rouſſâtre, avec une bande tranſverſe, noirâtre, paroiſſant un peu en deſſus, diviſant la teinte rouſſâtre en deux parties inégales, & dont la poſtérieure forme une raie; l'angle anal eſt ſenſiblement prolongé en une dent aſſez pointue.

Cette eſpece m'a été envoyée du Bréſil par M. Langſdorff. Elle ſe trouve auſſi à Surinam. Elle varie, à ce qu'il me paroît, par l'abſence totale de taches tranſparentes, puiſque les individus qui ſont dans ce cas, ne diffèrent qu'en cela du précédent.

59. Hespérie Lycidas.

Hesperia Lycidas.

Heſperia alis anticis poſticiſque ſuprà diluto-fuſcis; his maculis diſci hyalino-flaveſcentibus; illis ſubtùs ad baſin fuſco-nebuloſis, extùs albidis; omnium fimbriâ poſticâ fuſco alboque interſectâ.

Papilio U. Lycidus, *alis ſubcaudtis fuſcis nigro dentatis; primoribus utrinquè faſciâ flavâ; poſticis ſubtùs baſi fuſco-nebuloſis, extùs albis.* Smith-Abbot, *Lepid. Georg. tom.* 1. *p.* 39. *pl.* 20.

Elle eſt de moyenne taille, d'un noirâtre-cendré & un peu jaunâtre en deſſus, ainſi que ſur le deſſous des ailes ſupérieures. Les antennes ſont crochues. Le diſque des ſupérieures préſente un groupe de taches d'un jaunâtre-pâle & tranſparent, formant une bande, & dont trois beaucoup plus grandes; entre cette bande & le bord poſtérieur, ſont deux ou trois points de la même couleur. Le deſſous des ailes inférieures eſt depuis la baſe juſqu'au milieu, noirâtre, avec quelques taches plus claires; l'autre portion de l'aile eſt blanchâtre, avec de petits traits & l'angle anal noirâtres. La frange poſtérieure, tant en deſſus qu'en deſſous, eſt entrecoupée de noirâtre & de blanc. Les ailes inférieures étant plus arrondies que dans les autres eſpèces de cette diviſion, peut-être faudroit-il la placer près des *H. Cicéron, Nepos* & autres analogues.

La chenille eſt couleur de chair, avec une ligne noirâtre le long du milieu du dos, & deux taches ſur le premier ſegment & les ſtigmates de cette couleur. La tête eſt pareillement noirâtre, mais avec l'extrémité antérieure plus claire. Elle vit ſur l'*hedyſarum paniculatum* de Linné. Les individus qu'Abbot avoit élevés ſe transformèrent en chryſalides le 10 juillet, & parvinrent à leur dernier état le 23 du même mois.

Cette eſpèce continue de ſe reproduire.

60. Hespérie Lucas.

Hesperia Lucas.

Heſperia alis fuſcis; anticarum diſco maculis 4-5 flavo hyalinis; poſticis immaculatis.

Heſperia U. Lucas, *alis ecaudatis, fuſcis: anticis utrinquè maculis flavo-hyalinis.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 2. *pars* 1. *p.* 339. *n°.* 290.

J'ai vu dans la collection du Jardin du Roi, une heſpérie très-voiſine de l'*Ethlius*, mais plus petite, d'un brun-noirâtre, un peu luiſant & un peu plus clair ſur le deſſous des ailes, ayant, comme dans cette heſpérie, des taches jaunâtres & tranſparentes aux ailes ſupérieures, mais en moindre nombre & plus petites, & ſur le deſſous des inférieures ſeulement une rangée de quatre à cinq petits points jaunâtres. Ces points, d'après la comparaiſon de pluſieurs individus de diverſes eſpèces analogues, pouvant s'oblitérer & diſparoître, il ſeroit poſſible que l'heſpérie *Lucas* ne fût qu'une variété de la précédente. Selon Fabricius, elle eſt une fois plus petite que l'heſpérie *Thrax*. Ses antennes ſont noires & crochues. Ses autres caractères ſont expoſés dans ſa phraſe ſpécifique.

Elle ſe trouve aux Antilles.

61. Hespérie Mathias.

Hesperia Mathias.

Heſperia alis ſuprà fuſcis, infrà flavido-fuſcis; anticis maculis punctiſque albo-hyalinis; poſticis utrinquè aut infrà punctorum alborum ſerie tranſverſâ.

Heſperia U. Mathias, *alis ecaudatis, fuſcis: anticis utrinquè hyalino maculatis, poſticis ſubtùs punctis albis.* Fab. *Suppl. Ent. Syſt. p.* 435.

Elle eſt de taille moyenne, d'un noirâtre-clair ou un peu cendré, mais qui ſur le deſſus des ailes de pluſieurs individus tire un peu ſur le jaunâtre. Les antennes ſont noires, avec la maſſue crochue & rouſſâtre en deſſous. Les palpes extérieurs ſont gris. Les ailes ſupérieures ont ſur leurs deux ſurfaces de petites taches d'un blanc-tranſparent, au nombre de huit à neuf, dans les individus où il y en a le plus, diſpoſées comme à l'ordinaire & dont les trois les plus voiſines du ſommet, en forme auſſi de petits points: telle eſt auſſi quelquefois la forme de toutes les taches. Sur le deſſous des ailes inférieures, un peu au-deſſus du milieu eſt une rangée, plus ou moins prononcée, de cinq points blanchâtres, dont les extérieurs plus rapprochés de la baſe; on en voit un ſixième ou ſolitaire, un peu plus haut. Pluſieurs de ces points ſont quelquefois communs aux deux côtés de l'aile.

Elle habite le Bengale, d'où elle avoit été envoyée au Muſéum d'hiſtoire naturelle par feu Macé.

62. Hespérie Gremius.

Hesperia Gremius.

Hesperia alis suprà fuscis, subtùs fusco-cinereis; anticis maculis punctisque albo-hyalinis; posticis infrà punctis quatuor aut quinque discoidalibus, atris, albo marginatis.

Hesperia U. Gremius, *alis ecaudatis, fuscis: anticis hyalino-maculatis maculâque flavâ; posticis subtùs cinereis, atro-punctatis.* Fab. *Suppl. Ent. Syst. em. p.* 453.

Elle ne diffère de l'*H. Mathias* qu'en ce que le dessous des ailes est d'un noirâtre-cendré, & que celui des inférieures offre dans son milieu quatre à cinq points très-noirs, bordés de blanc, ou en forme de petits yeux, & disposés en arc, du côté du bord extérieur.

Elle habite les mêmes contrées.

J'ai reçu du Brésil une hespérie (*tripunctata*) ne différant de la précédente qu'en ce que les ailes supérieures sont presque sans taches, & que le dessous des inférieures n'offre que trois points noirs & rapprochés presqu'en manière de triangle.

63. Hespérie Néron.

Hesperia Nero.

Hesperia nigro-fusca, submicans; alis anticis utrinquè, posticis subtùs, punctorum alborum strigâ transversâ.

Hesperio U. Nero, *alis ecaudais, fuscis; anticis hyalino maculatis; posticis subtùs strigâ interruptâ albâ.* Fab. *Suppl. Ent. Syst. p.* 443.

Papilio P. U. *Accius.* Smith-Abbot, *Hist. nat. des Lépid. de la Géorg. tom.* 1. *p.* 45. *tab.* 25?

Elle est très-voisine de l'*H. Mathias*, mais, à ce qu'il m'a paru, d'un noirâtre plus foncé, du moins en dessus, & avec un reflet d'un vert-chatoyant. Le dessous est plus clair, quelquefois d'un brun-ferrugineux, plus pâle à l'extrémité postérieure des inférieures. Les taches transparentes des ailes supérieures sont moins nombreuses que dans l'*H. Mathias*, & ne forment qu'une série transverse & arquée. Leur nombre & leur grandeur varient; elles disparoissent même en tout ou en partie dans quelques individus; mais le plus ordinairement elles sont petites & en forme de points; souvent un ou deux de ces points forment une sorte de centre à l'arc composé par les autres.

Elle se trouve au Brésil & aux Antilles.

Le papillon *Accius* de Smith (*Hist. nat. des lépid. de Géorgie*, publiée d'après les dessins & les notes d'Abbot) a de grands rapports avec cette espèce, s'il n'en est pas une variété. Sa chenille vit sur le blé indien, *zea mays.* Elle est blanchâtre, avec des raies verdâtres; la tête a une ligne rouge dans son milieu & des espaces ou de petites raies noires sur les côtés. Sa chrysalide est remarquable par le prolongement de sa pointe antérieure. Elle est appliquée contre les tiges de cette plante & enveloppée dans les feuilles. Elle éclot vers le solstice d'été.

Il paroît que les points blancs des ailes supérieures sont plus nombreux & plus grands dans les femelles.

Le papillon *Adrastus* de Cramer, 27, *pl.* 319, F, G, est encore très-rapproché de cette espèce: car, dans quelques variétés de celle-ci, quelques-uns des points du dessous des ailes inférieures forment des taches. Il nous semble enfin que son *P. Eligius*, 30, *pl.* 354, H, vient auprès des précédens. Ici, les ailes supérieures ont des taches blanches, disposées en une bande transverse, mais le fond des ailes inférieures est essentiellement le même. J'ai reçu de M. Langsdorff une hespérie qui ne diffère de la précédente qu'en ce que les taches des ailes supérieures sont moins nombreuses & ne composent point de bande.

L'éducation des chenilles peut seule déterminer les limites de ces variations & nous fixer à l'égard des dimensions spécifiques. Il faudroit d'ailleurs voir beaucoup d'individus & bien conservés, ce qui nous manque souvent.

64. Hespérie Jacchus.

Hesperia Jacchus.

Hesperia alis fuscis; anticis maculis flavo-feneſtratis; posticis suprà maculâ mediâ, flavâ, compositâ, subtùs punctis sex niveis.

Hesperia U. Jacchus, *alis ecaudatis, flavo maculatis: posticis punctis sex niveis.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 342. *n°.* 301.

Papilio P. U. Jacchus, *Mant. Inſ. tom.* 2. *pag.* 88. *n°.* 802. — *Spec. Inſ. tom.* 2. *pag.* 135. *n°.* 623. — *Syst. Ent. pag.* 533. *n°.* 389.

Papilio P. U. *Jacchus.* Donov. *an Epit. of the Nat. Hist. of the Inſ. New Holl. Lep. pl.* 20. *fig.* 1.

Cette hespérie est de moyenne grandeur. Les antennes sont crochues & annelées de blanc & de noir. Les ailes supérieures sont noirâtres, selon Fabricius, mais d'un brun-fauve dans les figures de Donovan, avec environ huit taches d'un jaune-transparent, dont trois petites, situées près du sommet, trois autres disposées en une bande transverse, & les deux autres entre celles-ci & la côte. Les ailes inférieures sont de la couleur des supérieures (plus foncées en dessus dans les figures de Donovan), avec une grande tache jaune, formant une bande courte, transverse & divisée en trois; le dessous offre des points d'un blanc de neige, au nombre de six, suivant Fabricius;

Fabricius; on en compte sept dans la figure de Donovan, dont trois supérieurs, plus petits, écartés, & quatre inférieurs, contigus, sur une ligne transverse; ils sont bordés de noir.

Elle se trouve à la Nouvelle-Hollande.

65. Hespérie Flaccus.

Hesperia Flaccus.

Hesperia fusca; alis anticis hyalino-punctatis; posticis puncto fasciâque albis.

Hesperia U. Flaccus, *alis integerrimis, reversis, fuscis: anticis hyalino-punctatis; posticis puncto fasciâque albis.* Fab. *Suppl. Ent. Syst. pag.* 434.

Son corps est petit, noirâtre en dessus, blanc en dessous. Les ailes sont noirâtres, avec le dessous plus clair. Les premières ont quelques points transparens; les secondes ont un point & une bande blancs: cette bande occupe le milieu & n'atteint pas les deux bords.

Elle se trouve aux Indes orientales.

On peut placer près de cette espèce le *P. Hylaspes* de Cramer, *Pap.* 31. *pl.* 365. I. K. Ses ailes sont noires; les supérieures ont des taches blanches, dont les postérieures en forme de petits points alignés en manière de raies; en dessous cette raie est jaunâtre. Les inférieures ont une bande longitudinale & étroite de cette couleur, fort courte sur la face supérieure, de toute la longueur de l'aile, coupée & roussâtre en haut, sur l'autre face. Sa patrie est inconnue.

66. Hespérie Marc.

Hesperia Marcus.

Hesperia alis suprà nigris; anticis maculis albo-hyalinis; posticis suprà fasciâ maculari, mediâ, transversâ, cærulescenti-albidâ: infrà dilutè-fuscis, latere externo vittâque longitudinali internâ pallido-flavis.

Hesperia U. Marcus, *alis ecaudatis fuscis hyalino-maculatis; posticis subtùs vittis duabus flavescentibus, margine tenuiori fulvo.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *pag.* 338. *n°.* 285.

Papilio Phyllus. Cram. *Pap.* 15. *pl.* 176. B C.

Elle est petite, noire en dessus, avec des points blancs sur la tête. Les antennes sont noires, arquées à leur extrémité, terminées en pointe, avec une portion inférieure de leur massue blanchâtre. Les ailes supérieures sont noires, avec six taches transparentes, d'un blanc un peu bleuâtre; une petite, au bord interne, peu éloignée de la base; trois au milieu, dont l'inférieure la plus grande de toutes; & les deux autres en forme de petits points & rapprochées près du sommet. En dessous les ailes sont d'un noir moins foncé, avec la côte jaunâtre & l'extrémité d'un brun-clair, lavé de jaunâtre. Le dessus des ailes inférieures est noir, avec une bande transverse au milieu, composée de quatre à cinq taches oblongues d'un blanc-bleuâtre, un peu transparentes; cette bande commence à quelque distance du bord extérieur; le dessous est d'un brun-clair, avec le côté extérieur, une bande longitudinale interne, commençant à la base & se terminant avant le bord postérieur, d'un jaune-pâle; une portion du bord interne & de ses côtés, près l'origine de l'aile, est roussâtre. Les palpes extérieurs & le dessous du corps sont blancs.

Elle m'a été envoyée du Brésil par M. Langsdorff. Elle se trouve aussi dans la Guyane hollandaise. Le Papillon *Jolus* de Cramer, 33, *pl.* 392, I, K, qui vient de ce dernier pays, se rapproche de cette espèce & de son *P. Hylaspes*, dont nous avons parlé à la suite de la description de l'*H. Flaccus*, trois espèces que nous n'avons point vues en nature.

67. Hespérie Lucrèce.

Hesperia Lucretius.

Hesperia alis anticis posticisque suprà fuscis; his suprà punctorum flavescentium serie transversâ, infrà griseis, fusco-nebulosis, maculâ trigonâ internâ puncto que infero maculæ albidæ trigonæque impositò, atris.

Les ailes antérieures de cette petite espèce & le dessus des inférieures sont d'un noirâtre-luisant; vers le milieu des premières sont des deux côtés deux ou trois petites taches, presqu'en forme de points, d'un brun-jaunâtre & un peu transparent; en dessous, le limbe postérieur est plus clair, avec une tache grisâtre ou cendrée au sommet. Les ailes inférieures sont très-arquées extérieurement; le milieu de leur face supérieure offre quatre ou cinq petites taches ou points jaunâtres, disposés en une ligne transverse. En dessous ces ailes sont grisâtres, avec le bord interne, le disque & une portion du bord postérieur, noirâtres; entre le centre & le bord interne, est une tache triangulaire, d'un noir-foncé, bordée de bleuâtre intérieurement, & située immédiatement au-dessus d'une autre tache blanchâtre, & formant, avec la précédente, un triangle isocèle; l'on voit près du milieu du bord interne de celle-ci un gros point d'un noir-foncé. Le dessous du corps est cendré.

Elle se trouve au Brésil.

68. Hespérie Lafrenaye.

Hesperia Lafrenaye.

Hesperia alis suprà nigris, infrà fusco-ferrugineis; anticis maculis albo-hyalinis; posticarum disco suprà fasciâ maculari transversâ,

maculâque infrà magnâ, trigonâ, puncto ferrugineo notatâ, albis.

M. le baron Dejean (*Catal. des Coléop.*) avoit déjà donné à une espèce de carabique le nom d'un ami commun & qui l'avoit découverte dans les Pyrénées, M. de Lafontaye. Je me plais à offrir l'hommage particulier de mon estime & de ma reconnoissance à ce naturaliste du département du Calvados, qui, formé à l'école de M. de Basoches, son beau-père, cité bien souvent dans mes écrits, a recueilli plusieurs observations importantes sur divers insectes, & dont le zèle pour leur étude est au-dessus de nos éloges.

Cramer a représenté sous la dénomination de *Nitocris* (*Pap.* 33, *f.* 393, F. C.) une hespérie très-voisine de celle-ci. Mais ici les ailes sont concolores, & le dessus des inférieures est sans taches. L'*H. Lafontaye* est petite. Les antennes sont noires, avec des anneaux blancs & un peu crochues à leur extrémité. Le corps est noir en dessus, avec l'abdomen annelé de blanc & garni à sa base d'un duvet d'un blanc-bleuâtre. Les palpes extérieurs, le duvet de la poitrine & des cuisses sont blanchâtres. Le dessus des ailes est noir. Les antérieures ont environ six taches blanches & transparentes, dont trois contiguës & sur une ligne transverse au milieu, & les autres placées entre les précédentes & le sommet, & plus petites; le bord interne offre une ligne courbe d'un blanc-bleuâtre, formée par des poils; le dessus de chaque aile inférieure présente, près du même bord, deux lignes semblables, & dont la plus intérieure, beaucoup plus longue, s'étendant depuis la base jusqu'au-delà du milieu; on voit, sur le milieu, une bande courte, transverse, d'un blanc un peu transparent & composée de trois taches contiguës. Le dessus des quatre ailes est d'un brun-fauve, mais plus foncé sur le disque des supérieures : le sommet de celles-ci est comme saupoudré, en manière de taches, de blanchâtre. Les deux taches discoïdales & blanches du dessus des inférieures, indiquées dans notre phrase spécifique, forment réunies un grand triangle presqu'isocèle, dont les côtés sont parfaitement rectilignes, & dont la base est ondulée & bordée inférieurement de gris; sur chaque tache est une petite ligne d'un brun-fauve, flexueuse, entrecoupée & terminée vers le bord interne par une petite tache arrondie, en forme de gros point & de la même couleur; les taches se prolongent un peu inférieurement, au bord interne; la tranche du bord postérieur est en partie blanche.

Cette espèce m'a été envoyée du Brésil par M. Langsdorff.

69. Hespérie Tibulle.

Hesperia Tibullus.

Hesperia alis anticis nigris, flavo maculatis; posticis flavis, limbo nigro.

Hesperia U. Tibullus, *alis integerrimis: anticis nigris, flavo maculatis; posticis flavis, limbo nigro.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 336. *n°.* 325.

Papilio Tibullus. Jon. *Fig. pict.* 6. *tab.* 76. *fig.* 1.

Papilio Tibullus. Donov. *of an Epit. of the Nat. Hist. of the Ins. of. Ind.* 4. *fig.* 3.

Les ailes antérieures sont noires, avec une dizaine de petites taches jaunes, dont deux antérieures & opposées, & les autres disposées en une rangée transverse & arquée; la côte est un peu roussâtre en dessous. Les ailes postérieures sont jaunes & entièrement bordées de noir; cette couleur est interrompue au bord postérieur; le dessous de ces ailes est mélangé.

Elle se trouve aux Indes.

70. Hespérie Abebalus.

Hesperia Abebalus.

Hesperia alis anticis utrinquè posticisque supràfuscis; illis punctorum albornm serie transversâ arcuatâ; his fuscâ fasciâ flavescente, transversâ, mediâ: fulvis albis, venis ferrugineis, maculis duabus mediis alterâque anali ferrugineo-fuscis.

Papilio Abebalus. Cram. *Pap.* 31. *pl.* 365. G. H. *P. Fantafos. Ibid.* 25. *pl.* 300. E. F.

Si l'on compare les figures précitées de Cramer, l'on n'hésitera pas à les considérer comme essentiellement identiques. L'erreur vient probablement de ce qu'il a été trompé sur l'habitation de son papillon *Abebalus*. Il le dit du Cap de Bonne-Espérance & de Guinée, tandis que son *P. Fantafos* habite Surinam.

Le corps de cette petite espèce est noirâtre en dessus & blanchâtre en dessous. Les antennes sont noires & terminées par un petit crochet. Les ailes supérieures sont noirâtres, mais un peu plus claires ou d'un brun-foncé en dessous; elles ont six petites taches arrondies, blanches, dont les trois dernières ou les plus voisines du sommet, en forme de très-petits points, contigus, & sur une ligne, forment un angle avec la ligne transverse & oblique, composée par les trois autres taches; en dessous, les trois points placés près du sommet, forment avec une tache d'un roussâtre-pâle, une sorte d'arc. Le dessus des ailes inférieures est noirâtre, avec une petite bande transverse, d'un jaunâtre pâle ou roussâtre, formée de petites taches réunies, placée au milieu du disque, & ne gagnant pas les deux bords. Le dessous de ces ailes est blanc, avec des veines roussâtres & trois taches de cette couleur, mais plus foncées ou même noirâtres, dont une supérieure, la se-

conde au-deſſous du milieu, & ſe réuniſſant, en manière de bande arquée, avec la troiſième, qui eſt ſinuée à l'angle anal : l'eſpace compris entre la ſupérieure & les deux autres préſente ainſi l'apparence d'une bande tranſverſe.

Cette eſpèce m'a été envoyée du Bréſil par M. Langſdorff.

71. Hespérie Pertinax.

Hesperia Pertinax.

Heſperia alis anticis utrinquè, poſticis ſuprà nigro-fuſcis; illis maculis quatuor parvis punctiſque tribus hyalino-albis; his ſubtùs albidis, poſteriùs obſcurioribus, venis punctorumque ſerie tranſverſâ, albidis.

Papilio Pertinax. Cram. *Pap.* 30. *pl.* 334. F. G. — *P. Æcas.* 29. *pl.* 343. A. B. var.

Le deſſus du corps & des ailes de cette petite eſpèce eſt d'un noirâtre-foncé. L'une des quatre taches blanches des ailes ſupérieures eſt placée près du milieu de la côte; les trois autres forment une ligne oblique; près du ſommet ſont trois petits points blancs, diſpoſés en ſérie; en deſſous, le ſommet des mêmes ailes eſt blanchâtre. Le milieu du deſſus des inférieures préſente quelquefois une ſérie de taches blanches, en forme de bande renverſée. Le deſſous de ces ailes eſt blanchâtre, mais plus obſcur ou d'un brun-clair, depuis le milieu juſqu'au bord poſtérieur; on y voit une ſérie arquée de points blanchâtres; la couleur de l'extrémité poſtérieure des veines longitudinales ſemble même ſe dilater un peu au dépens de cette ſérie de points, & former une ſeconde rangée, mais très-foible, de taches blanchâtres. Dans quelques individus, comme dans l'*Æcas* de Cramer, ces points blanchâtres manquent.

Cette eſpèce ſe trouve au Bréſil & à Surinam.

72. Hespérie Saturne.

Hesperia Saturnus.

Heſperia alis fuſcis : anticis albo-punctatis, poſticis ſubtùs albo ſtriatis.

Heſperia U. Saturnus, *alis divaricatis, fuſcis, poſticis ſubtùs ſtriatis.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *pag.* 328. *n°.* 244.

D'après Fabricius, elle eſt plus petite que l'*H. Comma*; les deux ſurfaces de ſes ailes antérieures & le deſſus des deux autres ſont noirâtres : celles-là ont quelques points blancs; celles-ci ſont ſans taches en deſſus & leur deſſous offre des ſtries blanches, formées par les nervures. Elle ſe trouve à Cayenne. Nous en avons reçu du Bréſil une variété où le limbe poſtérieur des ailes ſupérieures eſt de plus ſtrié de blanc, & où les ailes inférieures ont, au milieu & des deux côtés, une rangée tranſverſe de petites taches blanchâtres. Les premières ailes ont quatre petites taches blanchâtres ou d'un blanc-jaunâtre, entre les trois petits points de cette couleur, ſitués près du ſommet, & que l'on retrouve dans pluſieurs autres eſpèces. Celle-ci ſe rapproche évidemment de l'*H. Pertinax*.

73. Hespérie Cæſar.

Hesperia Cæſar.

Heſperia alis anticis fuſcis, feneſtrato maculatis; poſticis ſuprà atris, maculâ mediâ niveâ, ſubtùs diſco cinereo, nigro punctato.

Heſperia U. Cæſar, *alis integerrimis; anticis fuſcis, feneſtrato maculatis; poſticis atris, maculâ mediâ niveâ.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *pag.* 340. *n°.* 294.

Papilio Cæſar. Jon. *Fig. pict.* 6. *tab.* 79. *fig.* 4.

Elle eſt petite. Les ailes antérieures ſont preſque concolores, noirâtres, avec des taches vitrées. Le deſſus des poſtérieures eſt d'un noir-foncé, avec une grande tache d'un blanc de neige & dentée au milieu; en deſſous, leur diſque eſt cendré, avec des points noirs.

Elle habite les Indes.

Près de cette eſpèce & de la précédente peuvent être rangées quelques heſpéries de Surinam, figurées par Cramer, ayant toutes les ailes ſupérieures noires ou noirâtres, avec des taches blanches vitrées, & les ailes inférieures, en grande partie de cette couleur, tant en deſſus qu'en deſſous & bordées de noir, du moins au côté extérieur ou au bord poſtérieur. Tels ſont, 1°. le P. Ebuſus, *Pap.* 25, *pl.* 300, C. D.; 2°. le P. Pfecas, *ibid.* 29, *pl.* 342. F. G. & le P. Alcmon, *ibid.* 22, *pl.* 261, D. E., eſpèces très-rapprochées; & 3°. le P. Artemides, *ibid.* 33. *pl.* 391. L. M., eſpèce très-voiſine de l'*H. Virbius*.

74. Hespérie Virbius.

Hesperia Virbius.

Heſperia corpore aliſque nigris; anticis maculis duabus minutis punctiſque totidem albo-hyalinis; poſticis apice niveis.

Heſperia U. Virbius, *alis integerrimis nigris : anticis punctis tribus, poſticis apice albis.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 333. *n°.* 343.

Papilio P. U. Virbius. *Mantiſſ. Inſect. tom.* 2. *pag.* 92. *n°.* 829. — *Spec. Inſ. tom.* 2. *pag.* 138. *n°.* 641.

Papilio Virbius. Cram. *Pap.* 12. *pl.* 143. F.

Le corps & les ailes de cette petite eſpèce ſont noirs, mais un peu bruns ſur le deſſous de ces parties; l'extrémité poſtérieure de l'abdomen offre en deſſous deux petites taches blanches. Les antennes ſont noires, bruſquement crochues, avec

un anneau blanchâtre avant la maſſue. Les ailes ſupérieures ont quatre petites taches d'un blanc tranſparent, deux ſupérieures en forme de petits points & très-écartées, & deux inférieures un peu plus grandes & étroites. Les ailes inférieures ſont terminées vers l'angle interne par une grande tache d'un beau blanc, en forme d'ovale tranſverſe & rétrécie à l'angle anal.

Elle ſe trouve à Surinam & au Bréſil, d'où elle m'a été envoyée par M. Langſdorff.

75. Hespérie Curtius.

Hesperia Curtius.

Heſperia alis nigris; anticis punctis quatuor albis, poſticis immaculatis.

Heſperia U. Curtius, *alis integerrimis, concoloribus, nigris : anticis punctis quattuor albis, poſticis immaculatis.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *pag.* 354. *n°.* 344.

Jon. *Fig. pict.* 6. *tab.* 70. *fig.* 1.

Elle ne diffère de l'*H. Virbius* que par ſes ailes inférieures entièrement noires. Ce n'eſt peut-être qu'une variété.

76. Hespérie Sénèque.

Hesperia Seneca.

Heſperia alis ſuprà fuſcis, infrà, anticarum diſco excepto, cinereo-brunneis, maculis fuſco-ferrugineis; anticis faſciâ tranſverſâ punctoque albo-hyalinis; poſticis ſuprà immaculatis.

Elle a le port des *H. Marcus, Lafrenaye, Virbius*, &c., mais elle eſt un peu plus grande. Toutes les parties ſupérieures du corps ſont noirâtres. Le deſſous des antennes, ou du moins de leur maſſue, eſt rouſſâtre. Le milieu des ailes ſupérieures eſt traverſé obliquement par une bande blanche, tranſparente, compoſée de trois taches; entre la ſeconde & le bord poſtérieur eſt un petit trait ou point alongé de la même couleur. En deſſous, le milieu de ces ailes eſt noirâtre, mais les autres eſpaces de cette ſurface, ainſi que la correſpondante des antérieures, ſont d'un brun-clair ou tirant ſur le cendré, avec des taches d'un brun-fauve, ſavoir : une à la côte des ailes ſupérieures, en dehors de la bande blanche, & cinq ſur chaque aile inférieure; les deux ſupérieures ſont réunies extérieurement en manière de bande oblique, un peu arquée & ſéparées au côté oppoſé par une petite ligne oblique, grisâtre; les deux autres ſont placées, l'une au-deſſus de l'autre, vers le bord interne; la baſe de ces ailes eſt d'un brun plus clair.

Elle ſe trouve au Bréſil.

77. Hespérie Claudien.

Hesperia Claudianus.

Heſperia alis atris; anticis faſciis duabus, macularibus, niveo-hyalinis; poſticis ſuprà maculâ orbiculatâ niveâ, infrà diluto-fuſcis, baſi griſeâ, faſciâ tranſverſâ veniſque atris.

Elle eſt de moyenne grandeur, noire, avec des points ſur la tête, un anneau à la maſſue des antennes & le deſſous du ventre, blancs; une ligne noire diviſe le blanc de cette dernière partie du corps en deux bandes longitudinales. L'antérienre des ailes ſupérieures & qui occupe leur milieu eſt compoſée de trois taches; il y en a cinq, & toutes contiguës, & tranſverſes, à leur bande poſtérieure, ou celle qui précède le ſommet; l'on voit un petit trait d'un blanc-tranſparent dans l'intervalle de ces bandes. La tache orbiculaire du deſſus des ailes inférieures eſt grande & placée entre le centre & le bord poſtérieur; leur ſurface inférieure eſt d'un noirâtre-pâle, avec la baſe griſâtre & une bande tranſverſe près du milieu, d'un noir-foncé; les nervures étant de cette dernière couleur paroiſſent y former des ſtries ou des veines longitudinales.

Elle habite le Bréſil, d'où elle m'a été envoyée par M. Langſdorff.

78. Hespérie Minos.

Hesperia Minos.

Heſperia alis atris; anticis maculis duabus mediis lineolarumque ſerie ſubapicali, niveis, hyalinis : poſticarum diſco faſciâ tranſverſâ, niveâ, infrà longiori, apicibus flavidis.

Son corps eſt de grandeur moyenne, noir, avec le deſſous de l'abdomen rayé de blanc. Les ailes paroiſſent être proportionnellement plus alongées que dans les eſpèces voiſines, & l'angle anal des inférieures forme une ſaillie arrondie; elles ſont d'un noir-foncé, un peu chatoyant en deſſous. Les antérieures ont des taches blanches & tranſparentes; une plus grande, centrale & diviſée en deux portions inégales par une nervure; une ſeconde, petite, preſque triangulaire, un peu en deçà de la précédente; & quatre autres en forme de petites lignes tranſverſes, diſpoſées en une ſérie près de la côte, avant le ſommet; l'extrémité poſtérieure de ces ailes eſt moins foncée en deſſous, & offre quelques raies ou ſtries longitudinales blanchâtres. Le milieu du deſſus des ailes inférieures eſt traverſé par une bande blanche, n'atteignant point les deux bords; mais en deſſous, elle eſt plus longue, l'une de ſes extrémités étant prolongée juſqu'au bord interne; elle prend à chaque bout une teinte jaunâtre. La tranche du bord poſtérieur des quatre ailes eſt en partie blanche.

Elle ſe trouve au Bréſil.

79. Hespérie Hémès.

Hesperia Hemes.

Hesperia alis nigris; anticis maculis mediis punctisque plurimis, seriatis, ante apicem, posticis, limbo externo excepto, albis.

Hesperia U. Hemes, *alis rotundatis integerrimis atris : anticis maculâ, posticis fusciâ albâ.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 345. *n°.* 312.

Papilio Hemes. *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 89. *n°.* 810. — *Spec. Inf. tom.* 2. *p.* 136. *n°.* 629.

Hesperia P. U. Clito, *alis integris concoloribus, nigris : anticis punctis, posticis fusciâ albis.* Ejusd. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 353. *n°.* 342.

Papilio P. R. Neleus, *alis integerrimis concoloribus, nigris : primoribus punctis decem albis; posticis disco toto albis.* Linn. *Syst. Nat.* 12. *tom.* 2. *p.* 792. *n°.* 246? — *Mus. Ludov. Ulr. p.* 260. *n°.* 79?

Clerck, *Icon. Inf. tab.* 45. *fig.* 2. 4?

Papilio Hemes. Cram. *Pap.* 9. *pl.* 103. *fig.* F. Mâle.

Papilio Phoreus. Ibid. 13. *pl.* 156. D. Fem. *var.?*

Sa grandeur varie; mais, en général, les plus grands individus font de taille moyenne. Les antennes font insensiblement arquées à leur extrémité. Le corps est noir en dessus & blanchâtre en dessous. Les ailes sont noires, avec une teinte d'un brun-luisant sur une partie de leur contour extérieur & de leurs surfaces inférieures; leur dessus offre même, dans quelques individus, une nuance de cette couleur, avec quelques taches plus foncées, mais peu distinctes, près du bord postérieur. Les antérieures ont une dizaine de taches ou de points blancs & un peu transparens; quatre de ces taches, & dont deux plus grandes, sont placées au milieu; les autres, toutes en forme de petits points, sont disposées en une ligne courbe & transverse, près du sommet. Les ailes inférieures sont blanches, avec une large bordure extérieure noire.

Les caractères que Fabricius assigne à son *H. Clito*, ne me paroissent pas la distinguer spécifiquement de son *H. Hemes*. Je soupçonne aussi que le *P. Neleus* de Linné n'est qu'une variété plus grande & fort analogue au *P. Phoreus* de Cramer.

Elle habite le Brésil & la Guyane.

80. Hespérie Duméril.

Hesperia Dumeril.

Hesperia alis supra nigris, infra, anticarum disco excepto, brunneo-flavidis; anticis maculis flavo-hyalinis; posticis ibidem fusciis duabus transversis, flavidis.

Le nom du savant auquel je consacre cette espèce est trop connu, pour qu'il soit nécessaire de motiver cette dédicace. Mais elle est fondée sur d'autres sentimens que ceux d'une estime universelle, ceux de l'amitié.

Cette espèce est de la grandeur de l'*H. Talaus.* Les antennes sont noires, avec de petits anneaux blancs, & se terminent par une massue arquée, roussâtre en dessous. La majeure partie du corps est garnie d'un duvet jaunâtre, formant des anneaux sur l'abdomen. Les ailes sont noires en dessus, & généralement d'un jaunâtre un peu brun, avec un reflet opalin, en dessous. Le dessus des antérieures offre, à partir de leur origine, deux ou trois lignes jaunâtres, longitudinales & courtes; ensuite cinq taches d'un jaunâtre-transparent, formant, la plus interne non comprise, un carré, & près du sommet deux ou trois points de la même couleur; le milieu du dessous de ces ailes est noirâtre. Le dessus des secondes présente deux bandes jaunâtres, partant du bord interne, transverses, & n'atteignant pas le bord extérieur; l'antérieure est plus large & interrompue à son extrémité extérieure; le bord interne est de cette couleur; ces deux bandes se voient aussi sur la face inférieure, mais l'antérieure s'y présente sous la forme d'une grande tache blanchâtre; l'angle anal est noirâtre; on remarque aussi une ou deux petites taches de cette couleur, au-dessus de la bande antérieure.

J'ignore quelle est la patrie de cette espèce. Elle fait partie de la belle collection du Jardin du Roi.

81. Hespérie Talaus.

Hesperia Talaus.

Hesperia alis nigro-fuscis; anticis maculâ basilari sanguineâ, fusciâ maculari mediâ punctorumque serie subapicali, hyalino-albis; alis posticis disco albo.

Hesperia U. Talaus, *alis integerrimis, concoloribus, fuscis : anticis punctis albis basique sanguineis, posticis disco albo.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 349. *n°.* 328.

Papilio P. U. Talaus. *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 90. *n°.* 818.

Papilio P. R. Talaus, *alis integerrimis, concoloribus, fuscis : primoribus punctis albis basique sanguineis, posticis disco albo.* Linn. *Syst. Nat.* 12. *tom.* 2. *p.* 792. *n°.* 247. — *Amœn. Acad. tom.* 6. *p.* 407. *n°.* 70.

Papilio Talaus. Cram. *Pap.* 33. *pl.* 393. C.

Clerck, *Icon. Inf. tab.* 45. *fig.* 1.

Seba, *Mus. tom.* 4. *tab.* 57. *fig.* 18.

Elle est petite, d'un noirâtre-foncé, avec le dessous du corps gris. La massue des antennes est

arquée. Les ailes supérieures ont à leur base une tache médiane, alongée, d'un rouge de sang; elles présentent ensuite des taches d'un blanc-transparent, au nombre de onze, dont six en forme de points, composant une ligne transverse, près du sommet; trois disposées en une bande transverse, vers le milieu, & les deux autres isolées, l'une près du bord interne, en dedans de cette bande, & l'autre entr'elle & la ligne de points. Le disque des inférieures a une grande tache d'un blanc un peu jaunâtre & un peu transparente, vue à la lumière.

Elle se trouve à la Guyane & au Brésil.

Nota. La variété B du *papilio Phereclus* de Linné, dont il fait mention dans son *Museum Ludovicæ Ulricæ, p.* 326, paroît appartenir à quelque hespérie voisine de la précédente & des suivantes.

82. Hespérie Eumèle.

Hesperia Eumelus.

Hesperia alis anticis atris, maculâ ad basin margineque interno fulvis, fasciis duabus macularibus punctoque interjecto albis; alis posticis fulvis, venis margineque externo atris.

Hesperia U. Eumelus, *alis rotundatis, integerrimis atris: anticis albo maculatis, posticis fulvis, nigro venosis.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 345. *n°.* 313.

Papilio P. U. Eumelus. *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 89. *n°.* 811. — *Spec. Inf. tom.* 2. *p.* 136. *n°.* 630.

Papilio Eumelus. Cram. *Pap.* 13. *pl.* 156. E.

Elle est très-voisine de l'*H. Talaus;* mais elle en est très-distincte par les couleurs des ailes inférieures. La patrie est la même.

83. Hespérie Clonias.

Hesperia Clonias.

Hesperia alis anticis ad apicem obtusis, fasciâ transversâ albo-hyalinâ; omnibus supra nigris, infrà brunneo, griseo fusco que varius.

Hesperia U. Clonias, *alis subcaudatis atris; anticis fasciâ niveâ, posticis subtùs cæruleascentibus, ano sanguineo.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 334. *n°.* 271.

Papilio P. U. Clonias. *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 87. *n°.* 787. — *Spec. Inf. tom.* 2. *p.* 135. *n°.* 615.

Papilio Clonius. Cram. *Pap.* 7. *pl.* 80. C. D.

Cette petite espèce est remarquable par la forme de ses ailes supérieures, qui sont comme tronquées à leur sommet. Leur dessus, ainsi que celui des inférieures, est noir. Les premières offrent vers leur milieu une bande transverse, d'un blanc-transparent, & près de la côte, un peu avant l'angle du sommet, un trait formé de petits points très-rapprochés, de la même couleur & pareillement diaphanes. Le dessous des quatre ailes est d'un brun-grisâtre ou cendré; il est coupé sur les inférieures par diverses taches d'un brun-ferrugineux, bordées en partie de gris; le sommet des premières est aussi de cette couleur, du moins dans quelques individus. L'anus seul est rougeâtre.

Elle se trouve au Brésil, d'où elle m'a été envoyée par M. Langsdorff.

84. Hespérie Busiris.

Hesperia Busiris.

Hesperia alis oblongis, atris: anticis maculis punctisque duobus flavis; posticis fulvis, atro marginatis.

Hesperia U. Busiris, *alis oblongis, integerrimis, atris: anticis maculis punctisque duobus flavis, posticis disco fulvo.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 345. *n°.* 410.

Papilio Busiris. Jon. *Fig. pict.* 6. *tab.* 23. *fig.* 1.

Papilio Busiris. Donov. *of an Epit. of the Nat. Insect. of Ind.* 11. *pl.* 4. *fig.* 2.

Son corps est noir, avec des points sur le thorax & des anneaux sur l'abdomen, blancs. Les ailes supérieures sont d'un noir-foncé, avec deux taches alongées & transverses, & deux points intermédiaires, jaunes; le sommet de ces ailes est cendré. Les postérieures sont fauves & bordées de noir-foncé postérieurement. Le dessous des quatre ailes ressemble au dessus.

Cette jolie espèce a les ailes oblongues, ce qui lui donne le port d'un héliconien. Les hespéries *Gentius, Pelée, Brontès,* s'en rapprochent à cet égard, leurs ailes étant proportionnellement plus oblongues que dans les autres espèces de ce genre.

L'*H. Busiris* se trouve aux Indes.

85. Hespérie Pelée.

Hesperia Peleus.

Hesperia alis atris; anticis fasciis duabus, transversis, alterâ mediâ rubrâ, alterâ subapicali, flavidâ: maculâ flavido-hyalinâ, trigonâ, interjectâ.

Papilio P. R. Peleus, *alis integerrimis utrinquè atris; primoribus fasciâ lineari rubrâ: exteriùs luteo maculatis.* Linn. *Syst. Nat.* 12. *tom.* 2. *p.* 792. *n°.* 249. — *Mus. Ludov. Ulr. p.* 327.

Papilio Peleus. Cram. *Pap.* 24. *pl.* 284. F.

Clerck, *Icon. Inf. tab.* 45. *fig.* 5.

Le corps, les antennes & les ailes sont noirs.

Les supérieures sont traversées, du milieu de la côte à l'angle interne, par une bande d'un rouge-orangé, de la même largeur partout; près de l'extrémité est une tache alongée, en forme de bande oblique, rétrécie inférieurement, d'un jaune-foncé, transparente & coupée par les nervures; entre ces deux bandes est une tache du même jaune, en forme de triangle, placée obliquement, s'avançant à l'angle interne, sur la bande rouge, & libre à l'angle opposé. La massue des antennes est simplement arquée.

Elle se trouve au Brésil & à Surinam.

86. Hespérie Gentius.

Hesperia Gentius.

Hesperia flava; alarum posticarum limbo anticisque posteriùs nigris; hujus apice fasciis duabus transversis maculâque interjectâ flavis.

Hesperia U. Gentius, *alis integris, concoloribus, flavis: limbo atro, anticarum fasciis flavis.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 330. *n°.* 330.

Papilio P. U. Gentius. *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 90. *n°.* 820. — *Spec. Inf. tom.* 2. *p.* 137. *n°.* 637.

Papilio Gentius. Cram. *Pap.* 15. *pl.* 179. C.

Nous n'avons presque rien à ajouter aux caractères spécifiques. Les ailes supérieures ont, de même que celles de l'*H. Pelée*, deux bandes transverses & une tache triangulaire, dans leur entre-deux; mais la première de ces bandes est jaune, & la tache est plus petite & entièrement libre; elle manque quelquefois. Le corps est jaune, avec une ligne noire au milieu du dos de l'abdomen; quelquefois aussi le jaune offre une foible teinte fauve sur les ailes inférieures, la base des supérieures & sur une partie de leur bande antérieure.

Dans le *P. Procas* de Cramer, représenté sur la même planche, *fig.* D, le jaune domine davantage sur les ailes supérieures; leur extrémité n'offre qu'une bande, & le contour entier de ces ailes est noir.

Elle habite le Brésil & la Guyane.

87. Hespérie Celsus.

Hesperia Celsus.

Hesperia alis suprà nigris, subtùs brunneo-fuscis; anticis utrinquè fasciâ transversâ rufo-flavidâ; posticis suprà immaculatis, infrà cinereo-pulverulentis, margine externo strigâque transversâ brunneo-fuscis.

Hesperia U. Celsus, *alis integerrimis, concoloribus, atris; anticis fasciâ flavâ.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 346. *n°.* 316.

Papilio Celsus. Jon. *Fig. pict.* 6. *tab.* 71. *fig.* 1. *Papilio Celsus.* Donov. *Cat. of the Pict. of the Nat. Hist. of the Inf. of Ind.* 11. *pl.* 4. *fig.* 5.

Papilio Huartas. Cram. *Pap.* 11. *pl.* 18. F.

Elle est de moyenne grandeur, & a, au premier coup d'œil, une grande ressemblance avec le papillon *Phereclus* de Linné. Les antennes sont noires en dessus, presqu'entièrement grisâtres en dessous, avec la massue entrecoupée de ces deux couleurs & crochue. Le corps est noir, avec les palpes extérieurs d'un cendré-obscur, & le milieu du dessous du ventre jaunâtre, du moins dans quelques individus. Les ailes sont noires en dessus, d'un noirâtre-brun-foncé en dessous, mais finement saupoudré de cendré, au limbe postérieur des supérieures & sur la majeure partie des inférieures. Les premières ont dans leur milieu & des deux côtés, une large bande transverse, couleur de fauve-pâle, un peu transparente, commençant au milieu de la côte & se terminant vers l'angle postérieur, mais sans gagner tout-à-fait le bord interne; sa largeur varie un peu; en dessous, la côte offre, au point où elle commence, une tache jaunâtre. Les ailes inférieures, par la forme très-arquée de la portion antérieure de leur bord antérieur, doivent être convexes ou débordantes; en dessous, le limbe de ce bord, & la marge du bord postérieur n'étant pas saupoudrés de cendré, tranchent avec le fond de l'aile; un peu au-dessous du milieu, le fond est traversé par une raie noirâtre & formée de la même manière, on remarque sur la bordure latérale une tache arrondie d'un brun plus clair. Quelquefois cependant le dessous de ces ailes est d'une teinte uniforme; quelquefois aussi leur bord extérieur est en partie un peu blanchâtre, & c'est ce que l'on voit dans la figure précitée de Cramer (1). Tantôt les bords de la bande des ailes supérieures sont entiers; tantôt ils offrent quelques échancrures, particulièrement au bord interne.

J'ai reçu du Brésil plusieurs individus de cette espèce, & envoyés par M. Langsdorff. Dans aucun d'eux je n'ai vu à l'extrémité des ailes antérieures les trois petites pointes jaunes que Fabricius a observées dans l'*H. Thyrsis*, à laquelle il rapporte, mais avec doute, le *H. Hiarbas* de Cramer; d'ailleurs ces ailes ont la bande jaune de l'*H. Celsus*. Leur dessus, ainsi que celui des inférieures, est noirâtre; la surface inférieure des quatre est pourprée & parsemée d'une infinité de petits atomes jaunâtres. Cette espèce se trouve dans les îles de l'Amérique.

88. Hespérie Brontès.

Hesperia Brontes.

Hesperia alis nigris; anticis fasciâ mediâ, pos-

(1) *Voyez* aussi l'*H. Brontès.*

ticis margine externo, modò albis, modò flavis.

Hesperia U. *alis subcaudatis, concoloribus fuscis: anticis fasciâ, posticis margine niveis.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *pag.* 335. *n°.* 235.

Elle est de la taille de l'*H. Celsus*, & lui ressemble au premier coup d'œil par les couleurs; mais elle en est bien distincte par les ailes inférieures plus oblongues & presqu'ovales. Le corps & les antennes sont noirs; le dessous de leur massue est tantôt roussâtre, tantôt annelé de blanchâtre. Les pieds, dans quelques individus, sont roussâtres. Les ailes sont noires; mais le dessous des inférieures est quelquefois un peu plus clair, avec deux bandes transversales plus foncées & la base d'un cendré obscur; ces bandes sont çà & là un peu bordées de gris; l'antérieure est un peu entrecoupée: on voit aussi au-dessus d'elle, près du bord extérieur, un point plus foncé. Les ailes antérieures sont traversées de part & d'autre par une bande soit continue, soit formée de trois taches, blanche ou jaunâtre & transparente. Les ailes inférieures sont, à l'exception de leur partie supérieure, bordées extérieurement de l'une ou l'autre de ces couleurs. Le dessous du ventre de quelques individus est jaunâtre, avec une ligne noire & longitudinale au milieu.

M. Langsdorff m'a envoyé du Brésil plusieurs individus de cette espèce.

89. Hespérie Justinien.

Hesperia Justinianus.

Hesperia alis fuscis; anticis punctis albo-hyalinis; posticis supra immaculatis, infrà disco rufescente, macularum cinerascentium subocellatarum serie posteriùs marginato.

Les antennes de cette petite espèce sont noirâtres, avec un anneau blanc près de la massue. Les ailes supérieures ont cinq à six points blancs & transparens, dont trois, l'intermédiaire surtout, plus grands, disposés en une rangée oblique, & les deux ou trois autres près de la côte, avant l'angle du sommet. Dans quelques individus, le dessous de ces ailes présente cinq taches d'un cendré-bleuâtre à la place où ces derniers points sont situés, avec une rangée de points noirâtres entre les précédens & le bord postérieur. Le milieu du dessous des ailes inférieures est occupé par une tache ou bande, courte, roussâtre, placée immédiatement au-dessus d'une rangée de taches ovales d'un gris-cendré plus ou moins vif, quelquefois opalin, bordées de noirâtre, & appuyées intérieurement sur une rangée de points de cette couleur; les extrémités antérieures de ces taches traversant le disque, font paroître le bord postérieur de la bande ondulé. Dans les individus dont les teintes sont les plus vives & les plus variées, cette bande offre en devant un point noirâtre, & l'origine de l'aile, sur la même surface, est en grande partie cendrée.

Elle habite le Brésil, d'où elle m'a été envoyée par M. Langsdorff.

90. Hespérie Rémus.

Hesperia Remus.

Hesperia alis nigris; anticis immaculatis; posticis subtùs fusciâ repandâ albâ, puncto fusco.

Hesperia U. Remus, *alis intergerrimis, subrevertis, nigris: posticis fasciâ repandâ, albâ, puncto fusco.* Fab. *Suppl. Ent. Syst. p.* 434.

Elle est petite, noire, &, à l'exception du dessous des ailes inférieures, où l'on voit une bande blanche, sinueuse & marquée d'un point noirâtre, elle ne présente aucune tache; ses antennes sont crochues. Elle avoit été apportée de Cayenne par feu Richard, l'un de nos plus profonds botanistes.

91. Hespérie Ménestriés.

Hesperia Menestries.

Hesperia alis supra fuscis; posticis infrà cœrulescentibus lineis duabus transversis fuscis, supra immaculatis.

Le nom de cette espèce rappelle celui d'un jeune naturaliste français qui seconde, avec beaucoup de zèle & d'instruction, M. Langsdorff dans les recherches sur l'histoire naturelle du Brésil, & qui m'a donné des preuves de son attachement par un envoi d'insectes de cette riche contrée. J'ajouterai aux caractères spécifiques, que cette hespérie est de petite taille, & que ses ailes supérieures, tantôt sans taches transparentes, tantôt en offrant trois, placées vers le milieu, ont en dessous, près du sommet, une teinte d'un bleuâtre-foncé & luisant. Cette couleur forme le fond de la surface inférieure des secondes ailes; elle est traversée dans son milieu par deux lignes noirâtres, droites, parallèles, partant du bord latéral, mais se terminant avant le bord interne.

Elle se trouve au Brésil.

92. Hespérie Anaphus.

Hesperia Anaphus.

Hesperia alis fuscis; posticarum apice abdominisque annulis flavis.

Hesperia U. Anaphus, *alis integris, concoloribus, fuscis: posticis apice flavis.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *pag.* 345. *n°.* 304.

Papilio P. U. Anaphus. *Mant. Ins. t.* 2. *p.* 89. *n°.* 804. — *Spec. Ins. tom.* 2. *p.* 155. *n°.* 625.

Papilio

Papilio Anaphus. Cram. *Pap.* 15. *pl.* 178. F.

Elle eſt aſſez grande, noirâtre, avec quelques bandes tranſverſes, plus foncées ſur les ailes; l'extrémité poſtérieure & interne des inférieures eſt jaune, & cette couleur y forme une grande tache arrondie en devant. Les bords des anneaux de l'abdomen ſont encore jaunes. Les antennes ſont noires & crochues.

Elle ſe trouve à Surinam.

93. Hespérie Cebrenus.

Hesperia Cebrenus.

Heſperia alis diluto-brunneis; anticis fuſciâ flavo-albidâ, ſemidiaphanâ.

Papilio Cebrenus. Cram. *Pap.* 15. *pl.* 178. G.

Elle ſe rapproche de l'*H. Anaphus* par la taille & la forme. Les ailes ſont d'un brun-clair, avec la baſe jaunâtre & le bord poſtérieur terminé par une ligne blanche. Dans l'individu figuré par Cramer, les antérieures ſont traverſées par une bande jaunâtre interrompue au milieu, & ont près du ſommet trois petits points de cette couleur. Dans un individu de la collection du Jardin du Roi, les points manquent, & la bande eſt continue & plus large.

L'*H. Helirius* de Fabricius, *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 328. *n°.* 243, paroît avoir de grands rapports avec cette eſpèce. Selon cet auteur, les ailes ſont très-entières, divergentes ou en chevron, noirâtres, avec le bord noir; les antennes ont un point central jaune. Cramer l'a figurée, *Pap. exot.* 5. *pl.* 60. D.

Elle ſe trouve, ainſi que la précédente, à Surinam.

94. Hespérie Hélius.

Hesperia Helius.

Heſperia alis fuſcis; poſticis latere externo fulvo.

Heſperia U. Helius, *alis ſubdivaricatis, fuſcis: poſticis margine interiori fulvis.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 329. *n°.* 248.

Papilio P. U. Helius. *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 85. *n°.* 771. — *Spec. Inſ. tom.* 2. *p.* 132. *n°.* 602.

Papilio Helius. Cram. *Pap.* 17. *pl.* 198. B.

Selon Fabricius, elle eſt de la grandeur de l'*H. Comma.* Ses ailes inférieures ont au bord interne (mais l'oppoſé, d'après la figure de Cramer), une grande tache ovale, fauve.

Elle ſe trouve à Surinam.

95. Hespérie Piſiſtrate.

Hesperia Piſiſtratus.

Heſperia alis fuſcis; anticis flavo-nitentibus, immaculatis; poſticis ſuprà diſco flavo, ſubtùs faſciâ niveâ, nigro punctatâ.

Heſperia U. Piſiſtratus, *alis integerrmis fuſcis; poſticis ſuprà diſco flavo, ſubtùs faſciâ niveâ, nigro punctatâ.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 345. *n°.* 311.

Papilio Piſiſtrates. Jon. *Fig. pict.* 6. *tab.* 26. *fig.* 1.

Nous ne parlons de cette eſpèce que d'après Fabricius : elle a, ſelon lui, le port de l'*H. du Rocou* (*bixæ*). Ses antennes ſont noires & crochues; les ailes inférieures ſont preſqu'en queue; les autres caractères ſont indiqués dans la phrase ſpécifique.

Elle habite l'Amérique.

Nota. On peut terminer cette ſubdiviſion par des eſpèces ſans taches ni bandes vitrées, & dont les teintes ſont foncées, uniformes ou peu mélangées; comme, 1°. le *P. Corbulo* de Cramer (3o. *pl.* 354. A), dont tout le corps eſt d'un noirâtre-foncé, avec un anneau blanc aux antennes, & deux points de la même couleur, mais manquant quelquefois, près du ſommet des ailes ſupérieures; 2°. une nouvelle eſpèce, à laquelle nous donnerons le nom d'un naturaliſte voyageur, trop tôt enlevé aux ſciences, *de Lalande.* Tout ſon corps eſt d'un brun-ferrugineux-foncé, avec deux lignes tranſverſes, plus obſcures, & dont l'extérieure plus diſtincte eſt flexueuſe; les ailes inférieures ont à l'angle anal une dent bien apparente. Sous ce rapport, cette eſpèce ſe rapprocheroit des premières de la diviſion.

Nous poſſédons auſſi quelques autres eſpèces inédites, qui viennent à la ſuite des précédentes, mais dont il ſeroit difficile de donner une connoiſſance exacte ſans le concours de bonnes figures. Elles nous ont été envoyées du Brésil par M. Langſdorff.

---

b. *Ailes, ou du moins les ſupérieures, différant ſenſiblement par leurs couleurs ou leur diſpoſition, dans les deux ſexes; une ligne ou une tache noire ou noirâtre, en forme de cicatrice, oblique, coupant les nervures, au milieu de la face ſupérieure de ces ailes, dans la plupart des mâles.* (*Ailes inférieures, jamais dentées, & ſans prolongement notable à l'angle anal; point ou rarement de taches vitrées; l'une des faces au moins, ſoit des quatre ailes, ſoit de deux d'entre elles, mais le plus ſouvent la ſupérieure des premières, très-variée de noirâtre & de fauve ou de jaunâtre.*)

* *Deſſus des ailes ſupérieures ayant au milieu un trait ou une tache d'un noir plus ou moins foncé, oblique & coupant les nervures.*

† *Des taches conſtamment vitrées aux ailes ſupérieures.*

— *Maſſue des antennes, terminée bruſquement par un crochet.*

96. Hespérie Phocion.

Hesperia Phocion.

Heſperia alis ſuprà fuſcis; anticis maculis quatuor flavo-hyalinis, tribus poſticis tranſversè ſeriatis, alterâ coſtali, emarginatâ; alis poſticis ſuprà immaculatis, ſubtùs cinereo-brunneis, lineis maculiſque brunneo-fuſcis.

Heſperia U. Phocion, *alis ſubcaudatis fuſcis: anticis flavo maculatis, poſticis ſubtùs fuſco glaucoque variis.*

Papilio P. U. Coridon. *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 87. *n°.* 270. — *Spec. Inſ. tom.* 2. *p.* 134. *n°.* 616. — *Syſt. Ent. p.* 533. *n°.* 385.

Elle eſt de moyenne grandeur, & aux caractères ſexuels près, qui diſtinguent cette diviſion, elle a, ainſi que les deux ſuivantes, de grands rapports avec les *H. Antonin, Ethlius, Thrax*, &c. Les antennes ſont noirâtres, avec une portion de la maſſue rouſſâtre. Tout le deſſus du corps, ainſi que le deſſous des ailes ſupérieures, eſt noirâtre; mais le deſſous des inférieures eſt d'un brun-cendré tirant ſur le gris-de-perle, avec des lignes & des taches d'un brun-foncé, & dont une beaucoup plus grande, de forme triangulaire, s'étend du milieu du diſque au bord intérieur; une partie du limbe poſtérieur eſt de cette couleur; ce bord, ainſi que celui des ailes ſupérieures, eſt entrecoupé, du moins dans quelques individus, de petites taches blanches: ces dernières ailes offrent des deux côtés quatre taches jaunes & tranſparentes, dont les trois poſtérieures placées en diagonale, & dont la quatrième, ordinairement plus grande & compoſée, repoſe, par l'une de ſes extrémités, ſur le milieu de la côte. Ces quatre taches ſont rapprochées de manière que la plus reculée eſt encore aſſez éloignée du ſommet de l'aile; en deſſous, ce ſommet préſente quelques taches d'un brun-cendré. Les palpes extérieurs ſont griſâtres, & les pattes ſont en partie d'un brun-rougeâtre.

Elle ſe trouve au Bréſil, à Cuba & à la Jamaïque, ſelon Fabricius. Cet auteur a donné le même nom de *Phocion* à trois eſpèces.

97. Hespérie Sinon.

Hesperia Sinon.

Heſperia alis ſuprà brunneo-fuſcis; anticis maculis quatuor flavo-hyalinis: duabus ſubcoſtalibus, diſſitis, aliis approximatis; alis poſticis utrinquè puncto diſcoidali flavo.

Papilio Sergeſtus. Cram. *Pap.* 7. *pl.* 74. C. Le mâle.

P. *Sinon.* Ibid. 29. *pl.* 342. D. E.

Cette eſpèce eſt de la taille de la précédente, & d'un noirâtre moins foncé; il tire davantage ſur le brun, particulièrement ſur la tête, le deſſous du corps & à la côte des ailes ſupérieures; le limbe poſtérieur & le bord interne du deſſous de ces ailes, ainſi que celui des inférieures en entier, ſont d'un brun plus clair. Des quatre taches jaunes & tranſparentes des ailes ſupérieures, celle qui eſt la plus voiſine du ſommet eſt diviſée en trois par des nervures. Dans la figure du *P. Sinon* de Cramer, il y a une tache de plus, & qui eſt placée au bord interne; le deſſus des ailes inférieures préſente, un peu au-deſſous du centre, un point jaune, qui paroît auſſi de l'autre côté, mais plus foiblement: il y eſt placé ſur une tache ou ſur une bande d'un brun-rougeâtre; au-deſſus ſont quelques autres taches de la même couleur.

Elle m'a été envoyée du Bréſil par M. Langſdorff.

98. Hespérie Godart (1).

Hesperia Godart.

Heſperia alis ſuprà brunneo-fuſcis; anticis maculis quinque flavo-hyalinis; poſticis ſuprà puncto flavo, infrà ferrugineis, ſtrigis duabus parallelis, pallido-aureis.

Par le deſſus des ailes, cette eſpèce eſt preſque ſemblable à l'*H. Sinon;* les ſupérieures ont

(1) Sans vouloir déprécier les travaux d'Illiger & d'Ochſenheimer, toujours, ſelon nous, eſt-il inconteſtable qu'avant celui de M. Godart, la plupart des caractères ſpécifiques des lépidoptères diurnes étoient inſignifians; que pluſieurs de leurs deſcriptions, celles ſurtout des eſpèces exotiques, étoient incomplètes & nullement comparatives; qu'on n'avoit point ou preſque pas donné d'attention aux différences ſexuelles, & que la ſynonymie de ces dernières eſpèces étoit ſingulièrement embrouillée.

M. Godart, en ſurmontant ces difficultés & en faiſant diſparoître autant que poſſible tous ces défauts, a donc rendu un ſervice éminent à la ſcience, & je ne puis m'empêcher d'admirer le zèle & la perſévérance avec laquelle il a rempli ſa tâche. Je n'ai d'autre part à ſon travail que celle de lui avoir fourni des moyens d'exécution & de l'avoir aidé de mes conſeils. Lorſque je l'ai choiſi pour mon collaborateur, à l'égard de cette partie de l'*Encyclopédie*, j'avois déjà claſſé la collection publique des inſectes du Muſéum. Les lépidoptères y étoient diſtribués d'après ma méthode & tous nommés; la détermination de quelques eſpèces avoit cependant beſoin d'être revue, & ne pouvant alors m'en occuper, M. Godart a bien voulu s'en charger. Il a encore eu le ſoin de nommer, en rédigeant cette partie de l'*Encyclopédie*, les lépidoptères diurnes de la collection particulière du même établiſſement. Un fait important pour moi & que l'on ignore, c'eſt que Fabricius avoit compoſé ſon *Syſtème des Gloſſates* d'après une revue générale des lépidoptères qui faiſoient alors partie des mêmes collections, & d'après la communication du catalogue que j'en avois fait; les eſpèces qu'il avoit, dans ſes premiers ouvrages, éloignées de leur place naturelle, y étoient remiſes, & toutes les coupes principales étoient établies.

une tache de plus & placée sur le bord interne, comme dans l'individu femelle représenté par Cramer : la tache située au-dessus est la plus grande de toutes ; mais le dessous des ailes inférieures est très-différent, il est entièrement foncé, ou d'un rouge-brun, avec deux raies d'une couleur d'or pâle, luisantes, droites, parallèles, traversant obliquement toute la largeur de l'aile, du bord extérieur au bord interne. Je n'ai vu que le mâle.

Il m'a été envoyé du Brésil par M. Langsdorff.

99. Hespérie Julien.

Hesperia Julianus.

Hesperia (mas) *alis fuscis ; anticarum medio punctis plurimis albo-hyalinis : duobus anticis, approximatis, aliis transversè arcuato-seriatis ; alis posticis subtùs punctorum alborum stngâ mediâ.*

Elle a environ quinze lignes de largeur, les ailes étendues ; leur couleur est d'un noirâtre-clair, un peu plus pâle ou un peu cendré en dessous. Les supérieures offrent au milieu sept à huit points blancs & transparens, deux plus rapprochés de la base, & les autres disposés en une ligne arquée, & dont les deux inférieurs oblongs. Le milieu du dessous des inférieures a quatre points blanchâtres, formant une ligne transverse comprise entre le centre & le côté extérieur. Les quatre ailes vues en dessus sont terminées postérieurement par une frange de cette couleur ; le dessus des supérieures présente une petite tache oblique, caractère distinctif du mâle, mais sans être environnée aussi sensiblement de noir que dans les mâles des espèces voisines. Les palpes extérieurs & le dessous de l'extrémité inférieure de la massue des antennes sont blanchâtres ; leur crochet terminal est proportionnellement plus court que dans les autres hespéries de cette division.

Elle se trouve à Java & paroît avoir des rapports avec l'*H. Nero* & quelques autres espèces analogues.

— — Antennes terminées en une massue régulièrement arquée dès son origine, & sans crochet brusque à son extrémité.

100. Hespérie Péron.

Hesperia Peron.

Hesperia (mas) *alis suprà fuscis, infrà cinereo-fuscis ; anticis lineolâ, maculæ atræ superpositâ punctisque quatuor, ante apicem, albo-vitreis ; posticis immaculatis.*

Je ne connois que le mâle de cette espèce, dont la taille égale presque celle de l'*H. Comma.* Ses antennes sont annelées de noirâtre & de blanc, avec la massue roussâtre ; les ailes sont noirâtres, mais plus claires en dessous & tirant sur le cendré ; le trait noir du milieu des ailes supérieures caractérisant les individus de ce sexe, est enfoncé & forme une sorte de cicatrice ou d'impression : au-dessus est une petite ligne vitrée & oblongue ; près de l'extrémité postérieure de la ligne noire est un point blanc, transparent ; on en voit ensuite trois autres, mais plus petits, & rapprochés en une petite ligne près de la côte, avant l'angle du sommet. Les ailes inférieures sont sans taches.

Le nom du naturaliste auquel je la dédie est trop connu pour qu'il soit nécessaire de parler de lui ; il avoit recueilli cette espèce à la Nouvelle-Hollande.

†† *Point de taches parfaitement & constamment vitrées aux ailes supérieures : quelques-unes au plus semi-diaphanes.*

Nota. Massue des antennes généralement courte, presqu'ovoïde & à crochet terminal très-petit.

Toutes nos espèces d'Europe appartiennent à cette division & aux deux suivantes.

101. Hespérie Nason.

Hesperia Naso.

Hesperia alis fuscis, sæpiùs immaculatis : fimbriâ posticâ rufescente aut albidâ.

Hesperia U. Naso, *alis integerrimis, divaricatis, suprà fuscis, subtùs brunneis : margine postico tenuissimè fulvo.* Fab. *Suppl. Ent. p.* 431.

Le Muséum d'histoire naturelle possède plusieurs individus de cette espèce, les uns recueillis au Bengale par feu Macé, les autres venant de l'Ile-de-France ; leur taille égale presque celle de l'*H. Comma.* Les antennes sont noires, avec des anneaux blancs, & l'extrémité inférieure de la massue roussâtre. Le corps & les ailes sont noirâtres. Dans les individus du Bengale, le dessous des ailes, à l'exception du côté interne des supérieures, est d'un brun-jaunâtre-foncé ; une partie du duvet supérieur est de la même teinte. Le milieu des supérieures offre quelquefois deux points rapprochés, oblongs, blanchâtres & transparens ; la frange postérieure des uns & des autres est blanchâtre ou roussâtre. Dans les individus de l'Ile-de-France, les yeux sont quelquefois rougeâtres ; les écailles des palpes extérieurs sont grisâtres, mais un peu roussâtres dans d'autres. Peut-être faudroit-il distinguer spécifiquement les derniers individus.

Seroit-ce une variété entièrement noirâtre, & venant du Bengale, que Fabricius auroit décrite sous le nom de *Pygmæus* (*Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 354. *n°.* 349), ou quelqu'autre espèce analogue ? C'est sur quoi, vu le laconisme de la description & l'indication trop vague du lieu d'habitation, il m'est impossible de prononcer.

102. Hespérie Pélopidas.

Hesperia Pelopidas.

Hesperia (mas) *alis cinereis, anticis posticarumque punctis marginalibus obscurioribus.*

Hesperia U. Pelopidas, *alis integerrimis : anticis obscurè cinereis, lineolâ mediâ fuscâ ; posticis cinereis.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 350. *n°.* 331.

Papilio Pelopidas. Jon. *Fig. pict.* 6. *tab.* 27. *fig.* 2.

La ligne noirâtre que, suivant Fabricius, l'on observe au milieu des ailes supérieures, paroît nous indiquer qu'il a décrit un individu mâle. Son corps est de grandeur moyenne; les antennes sont noires & crochues; les ailes sont entièrement cendrées; les supérieures, & des points marginaux aux inférieures sont plus foncés.

On la trouve aux Indes.

103. Hespérie Silius.

Hesperia Silius.

Hesperia (fœmina) *alis brunneo-fuscis ; anticarum disco utrinque fascià abbreviatâ, transversâ, rufâ.*

Je ne connois que la femelle de cette espèce, & ce n'est que par analogie que je la place dans cette division. Ses ailes étendues ont un peu plus d'un pouce d'envergure. Les antennes & le corps sont noirâtres, avec les pieds d'un roussâtre obscur. Les ailes sont d'un brun-noirâtre-foncé ; le milieu des supérieures offre une bande courte, transverse, oblique, rétrécie en pointe au côté qui regarde le sommet, roussâtre, & divisée par les nervures; leur base, ou du moins la partie supérieure de leur côte, une partie du duvet qui revêt les inférieures & leur frange postérieure, ont une teinte semblable.

Elle m'a été envoyée du Bréfil par M. Langsdorff.

104. Hespérie Cornélius.

Hesperia Cornelius.

Hesperia (mas) *alis fuscis, nitidis ; anticis supra maculâ mediâ atrâ, ovatâ, punctisque duobus albidis ; omnibus infrà punctorum albarum fingâ.*

Cette espèce, dont l'envergure est d'environ quinze lignes, est presqu'entièrement d'un noirâtre-luisant. Les antennes sont noires, avec le dessous de la massue grisâtre. Les écailles des palpes extérieurs & les poils de la poitrine sont aussi de cette couleur. Sur la tache noire & médiane du dessus des supérieures est la cicatrice ou impression d'un noirâtre-mat, qui caractérise le mâle; elle est formée de deux taches réunies longitudinalement ; les écailles des bords extérieurs paroissent, vues à un certain jour, d'un cuivreux mêlé de vert & très-brillant. Près du sommet sont deux points blanchâtres, écartés & posés transversalement l'un sur l'autre : en dessous, on en voit deux autres, & situés dans l'espace intermédiaire, un peu en dehors, de manière que les quatre forment une ligne courbe. Le dessous de chaque aile inférieure en présente trois autres, disposés transversalement, un peu au-dessous du milieu.

Cette espèce vient de l'île de Cuba. J'ai eu aussi de cette île, ainsi que du Bréfil, une hespérie femelle, presqu'entièrement semblable, à l'absence près des points blancs, ou du moins de ceux des ailes inférieures, & de la tache noire des ailes supérieures. Il seroit possible que ces différences fussent purement sexuelles.

L'*H. Cassandre* de Fabricius paroît être très-voisine de cette espèce. Il l'a décrite d'après la collection de Drury, qui a figuré une espèce pareillement très-analogue, mais qui nous semble devoir se rapporter à son *H. Philémon*.

Nous avons cité, à l'occasion de l'*H. Néron* de cet auteur, le papillon *Accius*, figuré dans l'*Histoire naturelle des lépidoptères de la Georgie*. En examinant depuis, avec plus d'attention, un individu mâle, nous avons découvert aux ailes supérieures, la marque distinctive, formant le caractère de cette division, de sorte que cette espèce doit y être rangée. L'éditeur de cet ouvrage la signale ainsi : *alis ecaudatis, fuscis, primoribus punctis feneſtratis, albis; subtùs omnibus apice purpureo-pallescentibus.* On observe à l'origine de la massue des antennes une tache blanche. Les ailes supérieures ont trois petits points blancs, près de la côte, & un quatrième, isolé, en dessous. Les ailes inférieures nous ont paru avoir sur leur dessous quelques taches, situées près de la base, & une bande transverse, plus foncée.

Tout auprès doit encore venir le *P. Bethyllus* du même ouvrage (*tom.* 1. *p.* 43. *tab.* 22.). Voici les caractères spécifiques qui lui sont assignés : *alis ecaudatis, fuscis, primoribus maculis feneſtratis, quadratis, albis; posticis subtùs undato nebulosis.* Les points ou petites taches blancs & transparens des ailes supérieures sont nombreux & y forment presque deux lignes convergentes inférieurement. Le dessous des ailes inférieures offre deux bandes au moins de taches plus foncées. La chenille vit sur le *glycine reticulata* de Swartz. Elle est verdâtre, avec deux lignes jaunâtres & longitudinales de chaque côté; la tête est entièrement noire; le segment suivant est d'un beau rouge, avec une tache noire en devant. La transformation se fait au mois de juillet. Cette espèce se trouve aussi en Virginie. Elle nous semble se rapprocher beaucoup, du moins par le dessin, du *P. Daunus* de Cramer, *p.* 15. *pl.* 126. F.

105. Hespérie Pompée.

Hesperia Pompeius.

Hesperia (mas) *alis anticis posticisque supra fuscis; anticarum medio supra maculâ atrâ punctisque duobus approximatis pallido-brunneis; posticis infra fusco-flavidis, fasciis fuscis.*

L'envergure de cette espèce est d'environ un pouce. Son corps est noir en dessus & d'un grisâtre-foncé en dessous. Les antennes sont noires, avec des anneaux & une partie du dessous de la massue grisâtres. Immédiatement au-dessous de la tache discoïdale & noire du dessus des ailes supérieures, est un petit trait oblique, d'un brun-pâle ou roussâtre, formé de deux ou trois points très-rapprochés; le dessous des ailes inférieures est d'un jaunâtre-obscur, avec la base, une bande transverse près du milieu, & une autre plus étroite & maculaire au-dessous, d'un brun-noirâtre. Une partie du côté interne & de l'extrémité postérieure de la surface inférieure des premières ailes, ainsi qu'une rangée transverse & oblique de cinq à six taches, située près du limbe postérieur, sont de la même couleur que le fond du dessous des ailes inférieures.

Cette espèce m'a été envoyée du Brésil par M. Langsdorff. Feu Delalande fils avoit apporté de ce pays une hespérie femelle, dont les ailes inférieures sont des deux côtés d'un noirâtre uniforme, mais dont les supérieures ressemblent assez à celles de l'espèce précédente. Leur milieu offre trois petites taches blanchâtres, plus apparentes en dessous, & rapprochées en une ligne diagonale. Seroit-ce une variété de sa femelle ?

106. Hespérie Mésogramme.

Hesperia Mesogramma.

Hesperia alis fuscis; posticis puncto subcentrali fasciâque inferâ transversâ, supra rufescentibus, infra pallido-flavis albidisve; alis anticis maris supra maculâ atrâ, ovatâ, fulvo cinctâ.

Cette espèce ressemble beaucoup, d'une part, au papillon *Phineus* de Cramer, & dont elle n'est peut-être qu'une variété, & de l'autre à l'*H. Comma*. Mais elle diffère notamment de celle-ci par les ailes inférieures, & de l'autre, en ce que dans le mâle, le trait noir forme, avec l'espace adjacent, une grande tache ovale, sur un fond fauve, & non une bande oblique. Dans l'*H. Mésogramme*, celle du dessus des ailes inférieures est plus étroite, moins continue, tandis qu'en dessous elle est plus distincte, à raison de la teinte différente du fond. Les taches fauves des ailes supérieures qui, dans l'*H. Comma*, forment une raie transverse & arquée, sont souvent dans l'*H. Mésogramme*, en majeure partie diaphanes & blanchâtres; peut-être perdent-elles, avec l'âge, leurs écailles: car on trouve des individus, où elles sont toutes roussâtres; au-dessus de la seconde, en commençant au bord interne, est un point soit roussâtre, soit hyalin. La bande transverse du milieu des inférieures est composée de taches contiguës, ou qui ne sont séparées que par des nervures: on n'observe au-dessus d'elle, près du centre, qu'une seule tache & en forme de petit point; elle est roussâtre en dessus & blanchâtre en dessous. Dans une variété femelle du Brésil, elle est remplacée en dessous par un point noir, & les taches de la bande, vues du même côté, sont un peu bordées de noir aux deux extrémités; le fond de la couleur du dessous de ces ailes varie: il est tantôt noirâtre, tantôt d'un cendré-verdâtre; la frange du bord postérieur est jaunâtre & n'offre point cette suite de points noirs que l'on remarque dans l'*H. Comma*, ou du moins dans sa femelle. Si l'on en excepte la bande maculaire, le dessus des ailes supérieures des individus de ce sexe est presqu'entièrement noirâtre.

107. Hespérie Phinée.

Hesperia Phineus.

Hesperia alis supra fuscis, infra anticarum medio excepto, rufo-flavidis; his supra margine externo antico fasciâque maculari, posticis ibidem fasciâ continuâ extimoque margine postico fulvo-rufis.

Hesperia U. Phineus, *alis subangulatis, divaricatis, fuscis: fasciâ flavâ anticarum interruptâ.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 329. *n°.* 247.

Papilio P. U. Phineus. *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 85. *n°.* 770. — *Spec. Inf. tom.* 2. *p.* 152. *n°.* 601.

Papilio Phineus. Cram. *Pap.* 15. *pl.* 176. E. Femelle.

Nous n'avons vu que le mâle de cette espèce, & qui a été apporté du Brésil par M. de Saint-Hilaire. Elle a de grands rapports avec la précédente, mais elle s'en éloigne par plusieurs caractères. La couleur fauve, & tirant sur le fauci, domine moins sur le dessus des ailes supérieures; la côte, depuis la base jusqu'un peu au-delà du milieu, & la bande transverse & maculaire, sont seules de cette couleur: le mâle a en outre, près de l'extrémité postérieure du trait noirâtre qui distingue ce sexe, une tache de la même teinte; le trait noirâtre, ou la cicatricule, est divisé en deux ou trois taches. Les ailes inférieures n'offrent pas le point central que l'on observe dans l'*H. Mésogramme*. Le milieu du dessous des supérieures, en tirant vers le bord interne, est noirâtre, mais les autres parties de cette surface, ainsi que la correspondance des inférieures, sont d'un jaunâtre-roussâtre; la bande fauve & transverse du dessus paroît cependant un peu. Dans la figure de Cramer, l'abdomen offre des anneaux jaunes;

l'individu qu'il a repréſenté avoit été trouvé à Surinam.

108. Hespérie Coras.

Hesperia Coras.

Heſperia alis fuſcis, fuſciâ maculari, baſis anticarum maculâ ſtriatâ, poſticarum baſis infernæ maculis, rufo-flavidis.

Papilio Coras. Cram. *Pap.* 3. *pl.* 31. Femelle.

Papilio P. U. Otho, *alis divaricatis, baſi fulvis: diſco utrinquè maculis ſubquadratis flavis.* Smith-Abbot, *Hiſt. natur. des Lépid. de la Georg. tom.* 1. *p.* 31. *tab.* 16. Var. ?

Heſperia U. Æſculapius, *alis integerrimis, nigris, fulvo maculatis: margine flavo punctato.* Fab. *Ent. Syſt. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 347. *n°.* 321. ?

Elle eſt petite, noirâtre, mais avec le corps & même l'origine des ailes couverts de poils jaunâtre. Les antennes ſont rouſſâtres en deſſus, blanchâtres ou plus pâles en deſſous, avec des anneaux noirs. Les ailes ſont traverſées entre leur milieu & le bord poſtérieur, & de part & d'autre, par une bande d'un jaune-rouſſâtre, formée d'une ſuite des taches; les deux avant-dernières & intérieures de la bande des ailes inférieures s'alongent poſtérieurement; le deſſus de ces ailes offre près du centre un point de cette couleur; leur deſſous a une bande de plus, ſituée près de ſa baſe, & compoſée auſſi de taches, & diſpoſée en arc. Dans le mâle, la baſe des ailes ſupérieures juſqu'à la ligne oblique & particulière propre aux individus de ce ſexe, eſt d'un jaune-rouſſâtre, couleur qui ſe diviſe en manière de ſtries en ſe terminant; la ligne noirâtre, & en forme de cicatrice, eſt bordée extérieurement par un trait d'un noir-foncé. Dans la femelle, cette partie des mêmes ailes eſt noirâtre, avec une tache d'un jaune-rouſſâtre, en forme de coin renverſé & alongé, & coupée dans ſon milieu par une ligne noirâtre. Sur le deſſous des quatre ailes, les taches ſont plus pâles & tirent davantage ſur le jaune. On aperçoit le long du bord poſtérieur une rangée de petites taches arrondies de cette couleur, mais peu prononcées.

Nous ſoupçonnons que le *P. Othon* de M. Smith, & l'*H. Eſculape* de Fabricius, ſont des variétés de cette eſpèce. Le premier de ces naturaliſtes cite, avec doute, l'*H. Thaumas* de celui-ci; mais dans cette eſpèce, les ailes inférieures n'ont point de taches, caractère qui exclut évidemment ce ſynonyme.

La chenille du *P. Othon* vit ſur la bermudienne, mais plus communément ſur le *panicum ſanguinale*. Elle eſt d'un vert-pâle, avec des lignes longitudinales plus foncées, & des points noirs ſur les ſtigmates; la tête eſt brunâtre. Abbot dit que le 19 août elle attacha, avec des fils de ſoie, pluſieurs feuilles enſemble, & que l'inſecte parfait parut le 30 du même mois.

M. Milbert, correſpondant du Muſéum d'hiſtoire naturelle, a envoyé de Philadelphie pluſieurs individus de cette eſpèce.

109. Hespérie Thaumas.

Hesperia Thaumas.

Heſperia alis fuſcis; anticis modò (mas) *ſupra à baſi ad medium exteriùs fulvis, lineolâ atrâ, puncto concolore internè terminatâ punctiſque aliquot rufis ante apicem; modò* (fœmina) *punctorum alborum vitreorumque ſtrigâ ſolummodò notatis.*

Heſperia P. Thaumas (mas), *alis divaricatis, fuſcis; liturâ baſeos fulvâ lineolâque mediâ atrâ.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *pag.* 327. *n°.* 238.

Heſperia Origenes, *alis divaricatis, concoloribus, fuſcis; ſtrigâ punctorum alborum, anticis baſi teſſaceis.* Ibid. *p.* 328. *n°.* 245. Fœmina ?

Papilio Origenes. Jon. *Fig. pict.* 6. *tab.* 74. *fig.* 2. Fœmina ?

Papilio Origenes. Donov. *of an Epitom. of the Nat. Hiſt. of the Inſ. of Ind. cah.* 5. *pl.* 4. *fig.* 2. ?

Dans un envoi d'hiſtoire naturelle, adreſſé de Philadelphie au Muſéum d'hiſtoire naturelle, j'ai trouvé trois individus de cette eſpèce, dont un mâle me paroît offrir tous les caractères de l'*H. Thaumas* de Fabricius, & dont les deux autres appartenant à l'autre ſexe. L'un de ceux-ci n'a de points blancs que ſur les ailes ſupérieures; mais dans le ſecond, outre que les points de ces ailes ſont plus grands & plus nombreux, le deſſus des inférieures offre, en outre, entre le milieu & le bord poſtérieur, une ſérie tranſverſe de petites taches blanchâtres: c'eſt peut-être une variété analogue que Fabricius a décrite ſous le nom d'*Origène*. Quoi qu'il en ſoit, ſon *H. Thaumas* eſt petite, d'un noirâtre-clair ou un peu brun. La moitié antérieure des ailes ſupérieures, à l'exception du côté interne, eſt fauve. La ligne noire du milieu, propre aux individus mâles, eſt ſurmontée, à ſon extrémité intérieure, d'un point de la même couleur, & comme diſtinguée bruſquement à ſon bord poſtérieur de la portion adjacente de la ſurface, par l'apparence d'une fente ou d'une inciſion linéaire, ſuivie d'une dépreſſion: entre cette dépreſſion & la côte, & preſque dans une même ligne tranſverſe, ſont quatre petits points fauves, dont l'inférieur un peu plus grand & iſolé, & dont les autres rapprochés ſur une petite ligne. Dans la femelle, on voit en cette place des points blancs & tranſparens; leur

nombre varie de six à huit, mais les trois supérieurs, & représentant ceux dont nous venons de parler, sont constans. Dans la variété à ailes inférieures tachetées, les taches sont au nombre de cinq, & paroissent aussi un peu en dessous, mais sous une teinte d'un brun-jaunâtre; la base du dessous des mêmes ailes offre aussi quelques espaces plus clairs. La frange postérieure des quatre ailes est blanche.

110. Hespérie Drury.

Hesperia Drury.

Hesperia alis anticis fuscis, costâ, apice excepto, strigâque maculari, transversa, rufescentibus: disco maris puncto oblongo atro; posticis rufescenti-fuscis, subtùs punctorum pallidiorum strigâ transversâ mediâque obsoletâ.

Cette espèce est très-voisine de l'*H. Thaumas*, & habite les mêmes contrées. Les ailes antérieures sont noirâtres, avec la côte jusque près du bout, souvent aussi une portion du bord interne, & une rangée transverse de petites taches, pour la plupart en forme de petits points, d'un fauve-roussâtre ou couleur de tabac d'Espagne. Le mâle n'en offre que deux, & dont l'intérieure divisée en deux parties inégales; la ligne noire & distinctive du sexe ne forme qu'un point oblong; il est terminé postérieurement par la plus inférieure des taches précédentes. Immédiatement au-dessous l'on observe entre les nervures deux espaces dont les écailles sont relevées en forme de petites brosses finement striées. Le fond des ailes inférieures est d'un brun-roussâtre luisant; leur dessous est plus terne, traversé dans son milieu par une raie de petites taches d'un jaunâtre-pâle, mais qui s'effacent presque dans quelques individus.

Cette espèce se rapproche beaucoup de celle qui est figurée sous le nom de *Vitellius* dans l'*Histoire naturelle des lépidoptères de la Georgie*, *tom.* 1. *tab.* 17. Je soupçonne aussi qu'elle s'éloigne peu, si ce n'est pas la même, de l'hespérie *Bion* de Fabricius. *Suppl. Ent. Syst. p.* 432.

Les caractères qu'il assigne à l'*H. Phocion* de ce supplément, *pag.* 431, la troisième espèce de ce nom, semblent convenir à une variété de la femelle de notre espèce, dont les ailes inférieures seroient plus foncées.

Une autre hespérie analogue aux précédentes, ainsi qu'à l'*H. Thaumas*, est celle qu'il nomme *Exclamationis*. (*Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 326. *n°.* 232.) Ses ailes, ainsi que le corps, sont noirâtres; les supérieures ont une tache linéaire jaunâtre, avec un point de la même couleur au-dessous.

111. Hespérie Augias.

Hesperia Augias.

Hesperia alis anticis posticisque infrà rufo-flavis; his suprà nigris, puncto subcentrali fusciâque posticâ utrinquè dentatâ rufo-flavis; anticis suprà lineâ obliquâ incurvâ limboque postico nigris.

Hesperia U. Augias, *alis divaricatis, fulvis: fasciâ obliquâ margineque postico nigris.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 327. *n°.* 239.

Papilio P. U. Augias. *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 84. *n°.* 765. — *Spec. Inf. tom.* 2. *p.* 131. *n°.* 597. — *Syst. Ent. p.* 531. *n°.* 375.

Papilio P. U. Augias, *alis divaricatis, fulvis: fasciâ obliquâ margineque postico nigris.* Linn. *Syst. Nat.* 12. *tom.* 2. *p.* 794. *n°.* 257. — *Amœn. Acad. tom.* 4. *p.* 410. *n°.* 80.

Papilio Augias. Donov. *of an Epitom. of the Natur. Hist. of the Inf. of Ind.* 5. *pl.* 4. *fig.* 1.

Elle est un peu plus petite que l'*H. Comma*. Son corps est noir, mais garni en majeure partie d'un duvet d'un jaune-fauve. Les ailes supérieures & le dessous des inférieures sont de cette dernière couleur: le dessus des premières offre au milieu une bande oblique & un peu courbe à son extrémité postérieure, noire & continue. Son milieu offre, dans le mâle, une ligne d'un cendré-obscur, composée de trois à quatre taches contiguës. Le limbe postérieur est noir en manière de bande terminale & obtusément dentée ou crénelée au bord interne; plusieurs nervures rapprochées forment près de la côte des stries fines & noires: au-dessous, la bande noire du milieu forme une tache noire & triangulaire; l'angle interne est aussi de cette couleur, & la bande terminale paroît un peu, mais sous une teinte plus pâle. Les traces du point subcentral & de la bande transverse du dessus des ailes inférieures se montrent aussi sur l'autre surface, mais plus foiblement, selon que cette surface est presqu'entièrement d'un jaune-fauve, ou que son contour est plus foncé & présente les vestiges de la bordure noire supérieure. J'ai vu une variété de la femelle dans laquelle la bande noire des ailes supérieures est plus grande & offre une tache d'un jaune-fauve.

Elle se trouve aux Indes orientales, dans l'île de Java, d'où elle a été envoyée au Muséum d'histoire naturelle par MM. Diard & de Vaucelle: telle est aussi la patrie que Linnæus donne à cette espèce.

112. Hespérie Phylæus.

Hesperia Phylæus.

Hesperia alis rufo-flavis; anticis suprà fasciâ obliquâ interruptâ (mas) *maculâve arcuatâ* (fœmina) *limboque posticoque fuscis; posticis ibidem extùs fusco marginatis.*

Hesperia Colon (maris var.) *alis divaricatis*

fulvis, maculâ mediâ margineque ſtriato fuſcis. Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 327. *n°.* 241.

Papilio P. U. Colon. *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 84. *n°.* 766. — *Spec. Inſ. tom.* 2. *p.* 131. *n°.* 598. — *Syſt. Ent. p.* 531. *n°.* 376.

Heſperia Vitellius (fœmina), *alis divaricatis, fulvis: anticis maculâ mediâ margineque poſticis limbo fuſcis.* Ejuſd. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 327. *n°.* 240.

Papilio Phyllæus. Drury. *Inſ. tom.* 1. *pl.* 13. *fig.* 4. 5. Mâle.

Etant certain que cette eſpèce eſt bien celle dont Drury a figuré le mâle, ſous le nom de *Phyllæus*, j'adopterai cette dénomination de préférence à celle de *Colon* ou de *Vitellius* de Fabricius, que je rapporte à cette heſpérie, mais avec moins d'aſſurance; elle eſt voiſine de l'*H. Augias;* mais outre qu'elle eſt propre à l'Amérique méridionale, elle s'en éloigne par pluſieurs caractères. Sa couleur fauve, du moins dans les mâles, eſt moins vive, & tire davantage ſur le jaune. La bande noire & oblique du diſque des ailes ſupérieures de ces individus eſt preſque toujours partagée en deux taches; la ligne cendrée, qui coupe longitudinalement le milieu de cette bande, ne paroît preſque pas, ou n'y forme qu'un trait continu. Le limbe poſtérieur & ſupérieur des mêmes ailes, & quelquefois auſſi des inférieures, offre une rangée de taches triangulaires; ſouvent elles ſont communes à la ſurface inférieure, mais elles y ſont beaucoup plus petites; bien ſouvent encore le deſſous eſt ponctué çà & là de noirâtre. Les ailes inférieures ſont bordées extérieurement & quelquefois entièrement de cette couleur; mais elle s'étend davantage à la baſe extérieure & y forme une grande tache oblongue & marginale. Les femelles, ou les individus préſumés tels, ont, près de leur baſe, une tache noirâtre, plus prononcée en deſſous; leur deſſus, un peu au-delà du milieu, en préſente une autre, de la même couleur, un peu arquée ou en forme de C; & elles ſe terminent par une bande continue. Le deſſous des quatre ailes, ſi on en excepte la tache de la baſe des premières & quelquefois une ſeconde, placée à leur angle interne, eſt d'un fauve-jaunâtre uniforme. Le Muſéum poſſède cependant une variété où les quatre ailes ſont bordées de noirâtre ſur les deux ſurfaces, où la couleur fauve eſt diviſée ſur le diſque par des nervures noires, & où le deſſous des inférieures eſt d'un fauve-obſcur. Cette eſpèce ſe trouve aux Antilles & au Brésil.

113. Heſpérie Epictète.

Heſperia Epictetus.

Heſperia alis ſuprà nigris; anticis vittis duabus, aliâ coſtali, alteri internâ, obliquâ, longiore, poſteriùs recurvâ, puncto intermedio, poſticarumque diſco, omnibus infrà, ruſo-flavis.

Heſperia U. Epictetus, *alis integerrimis, nigris, diſco flavo; anticis maculâ fuſcâ, lunulâ flavâ; poſticis ſubtùs flavis, immaculatis.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 330. *n°.* 252.

Papilio Epictetus. Jon. *Fig. pict.* 6. *tab.* 75. *fig.* 3.

Papilio Epictetus. Donov. *of an Epit. of the Nat. Hiſt. of the Inſ. of Ind.* 5. *pl.* 4. *fig.* 4.

Ses ailes étendues n'ont guère plus de neuf à dix lignes de largeur. Leur deſſus eſt d'un noirâtre-foncé & varié de jaune-fauve. Le deſſus des ſupérieures offre deux bandes & un point de cette couleur; l'une occupe la côte depuis la baſe juſque près du milieu; l'autre s'étend obliquement depuis le bord interne, juſque près du ſommet, où elle ſe recourbe en manière de crochet; quelquefois cette extrémité forme une tache iſolée; le point eſt ſitué entre les deux bandes, un peu avant l'extrémité poſtérieure de la première; quelquefois il y en a un autre plus petit. Le diſque ſupérieur des ſecondes ailes eſt d'un jaune-fauve; tantôt il n'y forme qu'une bande, tantôt il occupe preſque toute la ſurface, à l'exception des bords. Le deſſous des quatre ailes eſt un peu plus jaunâtre. La baſe des ſupérieures & leur angle interne ont quelquefois une tache noirâtre.

Cette eſpèce ſe trouve au Brésil, d'où elle m'a été envoyée par M. Langſdorff. N'ayant pu remarquer diſtinctement ſur les ailes ſupérieures le caractère qui diſtingue les mâles de cette diviſion, je ne la place ici, de même que la ſuivante, que proviſoirement & par analogie.

114. Heſpérie Bandes-jaunes.

Heſperia flavo-vittata.

Heſperia alis fuſcis; anticis utrinquè maculis duabus marginalibus, aliâ baſilari, magnâ, trigonâ, alterâ ſubapicali, parvâ, faſciâ poſticâ, tranſverſâ, aliſque poſticis punctis duobus faſciâque tranſverſâ flavis.

Heſperia U. Maro, *alis integerrimis, divaricatis flavis, apice fuſcis flavo maculatis; poſticis ſubtùs fuſco-punctatis.* Fab. *Suppl. Ent. Syſt. p.* 432?

Cette eſpèce eſt de la taille de l'*H. Epictète* & s'en rapproche beaucoup. Les ailes ſont noirâtres, mais d'une teinte un peu plus claire en deſſous. Leur deſſin eſt le même de part & d'autre. Aux caractères de la phraſe ſpécifique, j'ajouterai les ſuivans: le bord interne des ailes ſupérieures eſt jaunâtre à ſa baſe, & entre lui & la grande tache triangulaire de la côte, l'on voit encore une petite ligne de cette couleur; la tache ſituée près de la côte, avant le ſommet, eſt preſque carrée ou arrondie, & ſe réunit quelquefois avec la bande qui traverſe poſtérieurement ces ailes. L'un des deux

points

points jaunes des ailes supérieures est placé au milieu, près de leur base, & l'autre au-dessus de l'extrémité extérieure de la bande transversale, & qui est située à peu de distance du bord postérieur. Les bandes jaunes ne forment quelquefois que des lignes, & celle de l'extrémité postérieure des premières ailes est partagée en deux.

Ces ailes ont leurs deux surfaces coloriées de même, tandis que dans l'*H. Maron* de Fabricius, leur dessous est jaune, avec des points noirs. J'ai quelque doute sur l'identité spécifique. Mon ami M. Macleay, secrétaire de la Société linnéenne, m'a envoyé plusieurs individus de cette espèce, & qu'il avoit reçus de la Nouvelle-Hollande.

Selon Fabricius, l'*H. Maron* habite les Indes orientales.

115. Hespérie Thémistocle.

Hesperia Themistocles.

Hesperia alis fuscis; anticis maculâ strigâque maculari fulvis; posticis immaculatis, subtùs griseis.

Hesperia U. Phocion, *alis divaricatis, fuscis; anticis maculâ strigâque maculari fulvis; posticis immaculatis.* Fab. *Suppl. Ent. p.* 431.

Elle a entièrement le port de l'*H. Comma*. Les antennes sont noires, avec la massue obscure. Les ailes supérieures sont noirâtres, avec une tache oblongue, presque marginale, & une raie au-delà du milieu, fauves. Les inférieures sont sans taches & grises en dessous.

Elle habite l'Amérique méridionale. Ne l'ayant point vue, nous ne la plaçons ici qu'avec doute.

116. Hespérie Comma.

Hesperia Comma.

Hesp. alis obscurè fulvis, suprà flavescenti, subtùs albo maculatis : posticis subtùs maculis novem.

Papilio P. U. Comma, *alis integerrimis, divaricatis, fulvis, punctis albis lineolisque nigris.* Linn. *Syst. Nat.* 2. *pag.* 793. *n°.* 256. — *Faun. Suec. edit.* 2. *p.* 285. *n°.* 1080.

Papilio P. U. Comma, *alis integerrimis, divaricatis, fulvis, lineolâ nigrâ : subtùs punctis albis.* Fab. *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 84. *n°.* 761.

Hesperia U. *Comma.* Fab. *Entom. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 325. *n°.* 233.

Papilio Comma. Wien. *Verz. p.* 160. *fam.* A. *n°.* 4.

Papilio Comma. Schæff. *Icon. tab.* 260. *fig.* 1. 2. (Mas.) — *tab.* 274. *fig.* 1. 2. (Fœm.)

Naturf. 6. *p.* 8. *n°.* 32.

De Geer, *Mem. Inf. tom.* 2. *p.* 132. *tab.* 1. *fig.* 4. 5.

Papilio Comma. Huenag. *Tabell. im. Berl. Magaz. tom.* 2. *p.* 74. *n°.* 32.

Papilio Comma. Muller, *Zool. Dan. p.* 115. *n°.* 1332.

Papilio Comma. Muller, *Faun. Fridr. p.* 37. *n°.* 339.

Papilio Comma. Esp. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 300. *tab.* 23. *fig.* 1. a. b.

Papilio Comma. Lewin, *Inf. tab.* 45. *fig.* 1. 2.

Papilio Comma. Borkh. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 179 & 284. *n°.* 1.

Papilio Comma. Borkh. *Rhein. Magaz. tom.* 1. *p.* 299. *n°.* 113.

Papilio Comma. Schneid. *Syst. Beschr. p.* 272. *n°.* 170.

Papilio Comma. Lang. *Verz.* 2. *pag.* 59. *n°.* 499-502.

Papilio Comma. Schwarz, *Raupenkal. p.* 180.

Papilio Comma. Fuessl. *Suiff. Inf. pag.* 32. *n°.* 608.

Rossi, *Faun. Etr. tom.* 2. *pag.* 158. *n°.* 1041.

Rossi, *edit.* Illig. *p.* 251. *n°.* 1041.

Papilio Comma. Petagna, *Instit. Ent. tom.* 1. *p.* 492. *n°.* 139.

Papilio Comma. Devill. *Ent. Linn. tom.* 2. *p.* 79. *n°.* 160.

Papilio Comma. Hubn. *Pap. tab.* 95. *fig.* 479. (Mas.) 480. 481. (Fœm.)

Hubn. *Larv. lepid.* 1. *Pap.* 2. *Gens* E. *fig.* 3. a.

Erynnis Comma. Schrank, *Faun. Boic. tom.* 2. *p.* 159. *n°.* 1280.

Papilio Comma. Ochsen. *Pap. Eur. tom.* 1.

Hefpérie Comma. Latr. *nouv. Diction. d'Hist. nat. édit.* 2. *tom.* 14.

Hefpérie Comma. God. *Hist. natur. des lépid. de France, tom.* 1. *p.* 237. *pl.* 12 *tert. fig.* 4.

Hefpérie Comma. God. *Tab. méth. des lépid. de France,* Diurnes, *p.* 62. *n°.* 181.

Elle reffemble beaucoup en deffus à l'hefpérie *Sylvain;* mais elle a le deffous d'un ton plus verdâtre & tacheté de blanc. Les taches du deffous de fes ailes inférieures font au nombre de neuf, dont trois vers la bafe, les fix autres formant une rangée courbe derrière le milieu. La frange de toutes fes ailes eft d'ailleurs blanche de part & d'autre, & mouchetée de noirâtre en deffous. Ses antennes offrent auffi une différence, laquelle con-

fifte en ce que la maſſue eſt terminée en deſſous par un gros point ferrugineux.

Commune dans les clairières des bois de l'Europe, à la fin de juillet & dans le courant d'août.

La chenille, ſelon Hubner, eſt d'un vert-pâle, mélangé de ferrugineux, avec la tête noire & trois rangées longitudinales de points de cette dernière couleur. Elle a un collier blanc, bordé de noirâtre. Les auteurs du Catalogue ſyſtématique des lépidoptères des environs de Vienne diſent qu'elle vit principalement ſur la *coronille bigarrée* (*coronilla varia*). La chryſalide n'eſt ni figurée, ni décrite, du moins à notre connoiſſance.

117. Hespérie Sylvain.

Hesperia Sylvanus.

Heſp. alis obſcurè fulvis, utrinquè flaveſcenti maculatis : poſticis ſubtùs maculis quinque.

Papilio P. U. Sylvanus, *alis divaricatis, fuſcis, maculis quadratis ſuprà flavis, ſubtùs albis.* Fab. *Mant. Inſ. tom. 2. p. 84. n°. 763.*

Heſperia U. *Sylvanus.* Fab. *Entom. Syſt. em. tom. 3. pars 1. p. 326. n°. 237.*

Papilio Sylvanus. Esp. *Pap. Eur. part. 1. p. 345. tab. 56. Suppl. 12. fig. 1.* (Fœm.)

Papilio Sylvanus. Illig. *Magaz. tom. 3. pag. 204.*

Papilio Sylvanus. Lang. *Verz. 2. pag. 59. n°. 503. 506.*

Papilio Sylvanus. Lewin, *Inſ. tab. 46. fig. 1-3.*

Papilio Sylvanus. Schneid. *Syſt. Beſchr. pag. 273. n°. 171.*

Rossi, *Faun. Etr. tom. 2. p. 158. n°. 1042.*

Rossi, *Faun. Etr. edit.* Illig. *p. 251. n°. 1042.*

Papilio Sylvanus. Devill. *Ent. Linn. tom. 2. p. 82. n°. 164.*

Papilio Sylvanus. Hubn. *Pap. tab. 95. fig. 482.* (Mas.) *fig. 483. 484.* (Fœm.)

Papilio Sylvanus. Ochsen. *Pap. Eur. tom. 1.*

Papilio Sylvanus. Bergstr. *Nomenkl.ª p. 37. tab. 89. fig. 4. 5.*

Papilio Melicerta. Bergstr. *Nomenkl. p. 38. tab. 90. fig. 1-4.*

Papilio Sylvanus. Borkh. *Rhein. Mag. tom. 1. p. 300. n°. 114.*

Papilio Sylvanus. Borkh. *Pap. Eur. part. 1. p. 180 & 285. n°. 2. — part. 2. p. 236.*

Papilio Melicerta. Borkh. *Pap. Eur. part. 1. p. 180 & 285. n°. 3.*

La Bande-noire. Engram. *Pap. d'Eur. tom. 1. p. 192. pl. 45. fig. 95. a. b. c. d. g. h.*

Variété de la Bande-noire. Geoff. *Hiſt. Inſ. tom. 2. p. 67.*

Heſpérie Sylvain. Latr. *nouv. Diction. d'Hiſt. nat. édit. 2. tom. 14.*

Heſpérie Sylvain. God. *Hiſt. nat. des lépid. de France, tom. 1. p. 235. pl. 12 ſecund. fig. 2, & pl. 12 tert. fig. 3.*

Heſpérie Sylvain. God. *Tabl. méthod. des lépid. de France,* Diurnes, *p. 61. n°. 180.*

Elle a de quinze à dix-ſept lignes d'envergure. Le deſſus des ailes eſt fauve, avec des taches jaunâtres, dont une ſituée vers la baſe, les autres formant derrière le milieu une rangée tranſverſe & flexueuſe. Ces taches ſont plus apparentes chez la femelle, parce qu'elle eſt d'un fauve plus obſcur que le mâle : celui-ci a au milieu des ailes ſupérieures un trait noir, large & oblique.

Le deſſous des deux ſexes eſt d'un fauve-verdâtre, mais plus gai au milieu des ailes ſupérieures & à l'angle interne des inférieures, avec des taches jaunâtres, pâles, & répondant à celles du deſſus. Les taches des ſecondes ailes ſont au nombre de cinq. Le corps à le deſſus à peu près du même ton que les ailes, & le deſſous blanchâtre. Les antennes ſont noirâtres, annelées de blanchâtre, avec la maſſue terminée par un crochet noir, & marquée en deſſous d'un trait longitudinal ferrugineux.

Commune dans les clairières des bois de l'Europe, en mai & en juin.

118. Hespérie Linéa.

Hesperia Linea.

Heſp. alis fulvis, nitidis, ſuprà margine fuſco, ſubtùs apice virefcenti-cinereo : omnibus fœminæ utrinquè immaculatis.

Papilio Linea, *alis divaricatis, fulvis,* fœminæ *immaculatis,* mais *lineolâ nigrâ cruſſiore : poſticis ſubtùs griſeis.* Ochsen. *Pap. Eur. tom. 1. p. 228. n°. 18.*

Papilio P. U. Linea, *alis integerrimis, divaricatis, fulvis, margine nigro.* Fab. *Mant. Inſ. tom. 2. p. 84. n°. 762.*

Heſperia U. *Linea.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom. 3. pars 1. p. 326. n°. 236.*

Papilio Linea. Wien. *Verz. fam. A. n°. 5.*

Papilio Linea. Illig. *N. Aufg. Deſſ. tom. 2. p. 146. n°. 5.*

Papilio Linea. Illig. *Magaz. tom. 3. p. 197. — tom. 4. p. 25.*

Papilio Linea. Schæff. *Icon. tab. 234. fig. 5. 6.* (Fœm.)

Papilio Linea. Bergstr. *Nomenkl. tab.* 90. *fig.* 5-8.

Papilio Linea. Hubn. *Pap. tab.* 96. *fig.* 485-487.

Hubn. *Larv. lepid.* 1. *Pap.* 2. *Gens* E. *fig.* 2. a. b. c.

Papilio Linea. Lang. *Verz.* 2. *p.* 59. *n°.* 507-510.

Papilio Linea. Petag. *Inſlit. Ent. tom.* 1. *p.* 492. *n°.* 140.

Erynnis Linea. Schrank, *Faun. Boic. tom.* 2. *p.* 159. *n°.* 1281.

Papilio Linea. Borkh. *Rhein. Magaz. tom.* 1. *p.* 300. *n°.* 115.

Papilio Thaumas. Borkh. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 181 & 285. *n°.* 4. — *part.* 2. *p.* 256.

Papilio Thaumas, *alis integerrimis, divaricatis, fulvis, immaculatis, lineâ tenuiori nigrâ alis ſuperioribus, quâ fœmina caret.* Esp. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 344. *tab.* 36. *Suppl.* 12. *fig.* 2. 3. (mâle & fem.) — *tab.* 98. *cont.* 53. *fig.* 5-10. (chen. & chryſ.)

Nature. 6. *p.* 4. *n°.* 10. — 20. *p.* 133. *tab.* 2. *fig.* A. B.

Papilio Thaumas. Hufn. *Tab. im. Berl. Mag. tom.* 2. *p.* 62. *n°.* 10.

Papilio Thaumas. Lewin, *Inſ. tab.* 45. *fig.* 5-7.

Papilio Thaumas. Schneid. *Syſt. Beſchr. p.* 273. *n°.* 172.

Papilio Thaumas. Schwarz. *Raupenkalend. p.* 193.

Papilio Thaumas. Devill. *Ent. Linn. p.* 82. *n°.* 165.

Papilio Flavus. Muller, *Zool. Dan. p.* 115. *n°.* 1333. (Fœm.)

La Bande-noire. Geoff. *Hiſt. Inſ. tom.* 2. *p.* 66. *n°.* 37.

Variété de la Bande-noire. Engram. *Pap. d'Europe, tom.* 1. *p.* 192. *pl.* 45. *fig.* 95. e. f.

Heſpérie Bande-noire. Lata. *nouv. Diction. d'Hiſt. nat.* 2e. *édit. tom.* 14.

Heſpérie Bande-noire. God. *Hiſt. nat. des lépid. de France, tom.* 1. *p.* 233. *pl.* 12. *fig.* 3, *& pl.* 11 *tert. fig.* 2.

Heſpérie Linéa. God. *Tabl. méthod. des lépid. de France*, Diurnes, *p.* 61. *n°.* 178.

Elle a de douze à treize lignes d'envergure. Le deſſus des deux ſexes eſt d'un fauve-luiſant, avec les bords & l'extrémité des nervures d'un brun-noirâtre. La femelle eſt ſans taches, mais le mâle a au milieu des premières ailes un trait noir, oblique & aſſez large.

Le deſſous des ailes ſupérieures eſt du même fauve que le deſſus, avec l'origine du bord interne noirâtre, & le ſommet d'un cendré-verdâtre.

Le deſſous des ailes inférieures eſt d'un cendré-verdâtre, avec la région de l'angle interne d'un fauve-gai. Le corps a le deſſus d'un fauve-obſcur, & le deſſous d'un gris-jaunâtre. Les antennes ſont noires, annelées de jaune-pâle, avec le deſſous de la maſſue ferrugineux vers le haut.

Commune dans les bois & dans les jardins de l'Europe, vers la fin de juillet.

La chenille, ſelon Hubner, eſt d'un vert-foncé, avec une ligne dorſale obſcure, & deux lignes latérales blanchâtres dont les bords ſont noirs. Elle vit ſur la *canche de montagne* (*aira montana*), & ſur quelques autres *graminées*.

La chryſalide, d'après le même auteur, eſt jaunâtre, avec l'étui de la trompe brun, & une petite pointe près de la tête.

119. Heſpérie Linéola.

Heſperia Lineola.

Heſp. alis integerrimis, divaricatis, fulvis, concoloribus, fœminæ *immaculatis*, maris *lineolâ nigrâ tenuiore.* Ochsen.

Papilio Lineola. Oschen. *Pap. Eur. tom.* 1. *p.* 230. *n°.* 19. — *tom.* 4. *p.* 161. *n°.* 20.

Papilio Virgula. Hubn. *Pap. tab.* 130. *fig.* 660. 661. (Mas.) *fig.* 662. 663. (Fœm.)

Ce lépidoptère, dit M. Ochſenheimer, a peut-être été trop ſouvent confondu avec l'heſpérie *Linéa;* auſſi me ſuis-je décidé, d'après l'avis unanime des entomologiſtes que j'ai conſultés à cet égard, à en faire une eſpèce ſéparée.

Il a le port & la taille du *P. Linéa.* Ses ailes ſupérieures ſont cependant plus larges, plus obtuſes, d'un fauve plus clair, & le trait noir qu'elles offrent chez le mâle eſt plus grêle & tout droit. La maſſue de ſes antennes eſt noire en deſſous, tandis qu'elle eſt ferrugineuſe dans le *Linéa.* Le deſſous des ailes ſupérieures eſt d'un fauve uniforme. Le deſſous des ailes inférieures eſt d'un jaune-blanchâtre, avec la région de l'angle interne d'un jaune-clair.

Il ſe trouve en même temps que le *P. Linéa* dans pluſieurs contrées de l'Allemagne.

Nota. L'auteur que nous traduiſons ici ajoute que le *P. Venula* de Hubner, *tab.* 131, *fig.* 666-669, ne diffère du *P. Linéa*, autant qu'il a pu en juger par des figures, qu'en ce que le mâle n'a pas de trait noir ſur le milieu des ailes ſupérieures.

120. Hespérie Actéon.

Hesperia Actæon.

Hesp. alis obscurè fulvis, suprà margine fusco, subtùs apice virescenti-cinereo : anticis utrinquè maculis flavescentibus in arcum digestis.

Papilio Actæon, *alis integerrimis, divaricatis, fulvis : anticis lineolâ nigrâ maculisque luteis ; posticis immaculatis.* Ochsen. *Pap. Eur. edit. 2. tom. 1. p. 231. n°. 20.*

Papilio P. U. Actæon, *alis integerrimis, divaricatis, fulvis : superioribus suprà maculâ in medio fuscâ, subtùs pluribus pallidis.* Esp. *Pap. Eur. part. 1. p. 345. tab. 56. Suppl. 12. fig. 4.*

Naturf. 6. *p.* 30. *n°.* 18.

Papilio Actæon. Borkh. *Pap. Eur. part. 1. p. 182 & 286. n°. 5.*

Papilio Actæon. Schneid. *Syst. Beschr. p. 274. n°. 173.*

Papilio Actæon. Bergstr. *Nomenkl. tab. 89. fig. 6. 7.*

Papilio Actæon. Illig. *Magaz. tom. 3. p. 183.*

Papilio Actæon. Devill. *Ent. Linn. tom. 2. p. 82. n°. 166.*

Papilio Actæon. Hubn. *Pap. tab. 96. fig. 488. 489.* (Mas.) *fig. 490.* (Fœm.)

Hespérie Actéon. God. *Hist. nat. des lépidop. de France, tom. 2. p. 207. pl. A. a. XXVII. fig. 3. 4.*

Hespérie Actéon. God. *Tabl. méth. des lépid. de France*, Diurnes, *p. 61. n°. 179.*

Elle est un peu plus petite que l'hespérie *Linéa*. Le dessus de ses ailes est d'un fauve-obscur, bordé de brun-noirâtre, avec un double trait longitudinal & un arc transverse de petites taches d'un jaune-pâle vers la côte des supérieures chez les deux sexes. Dans le mâle, le dessus des ailes inférieures est sans taches, mais il offre dans la femelle un arc presque semblable à celui des ailes supérieures.

Le dessous des premières ailes est fauve dans les deux sexes, avec le sommet d'un gris-verdâtre, & précédé d'un arc de petites taches plus pâles qui ne sont que la répétition de celles qu'on voit sur la face opposée.

Le dessous des secondes ailes est d'un gris-verdâtre, avec l'angle interne largement fauve. Les antennes sont noirâtres & annelées de jaune, avec le bout de la massue ferrugineux.

Le trait noir du dessus des ailes supérieures du mâle est oblique & assez large.

Elle habite l'Allemagne, le Portugal, la France, &c. M. Cotty de Brécourt l'a prise, à la fin de juin & au commencement d'août, aux environs de Dieppe & de la Roche-elle, dans des lieux en pente & exposés au midi.

---

* * *Milieu du dessus des ailes supérieures des mâles sans ligne ou tache noire ou noirâtre, & oblique, caractérisant le sexe.*

121. Hespérie ornée.

Hesperia ornata.

Hesperia alis anticis fuscis, suprà maculis tribus (mas) *vel quinque* (fœmina) *flavescentibus, subtùs maculis apiceque albidis ; posticis suprà nigris, fasciâ transversâ croceâ, margine postico albido nigroque intersecto ; subtùs albidis, maculis nigris, transversè ordinatis.*

Hesperia ornata. Leach, *the Zool. Miscell. vol. 1. tab. 55. fig. 1. 2. 3.*

Cette jolie espèce & propre à la Nouvelle-Hollande, a environ seize lignes de largeur, les ailes étendues. Le dessous du corps est en grande partie d'un blanc un peu jaunâtre ; son dessus est noirâtre, mais avec des taches & des anneaux sur l'abdomen de la couleur précédente. Telle est aussi celle du dessous des ailes inférieures, des taches & du bord postérieur des supérieures, vues du même côté ; le bord offre une rangée de points ; la tache du sommet en a une de plus, outre deux autres points supérieurs, ou le commencement d'une autre série. Dans un individu que j'ai reçu de M. Macleay, les taches du dessus des ailes supérieures sont presque toutes blanchâtres.

La bande jaune-safran des ailes inférieures est large & sinuée, ou un peu dentée sur les bords. Le dessous des inférieures offre un grand nombre de petites taches noires, dont une isolée à la base, & les autres formant trois lignes transverses ; les deux internes de la première sont annulaires.

122. Hespérie Peinte.

Hesperia Picta.

Hesperia alis anticis suprà fuscis, maculis flavidis punctorumque hyalinorum serie subapicali, posticis suprà nigris, fasciâ transversâ punctorumque serie marginali, croceis ; omnibus infrà, anticarum disco excepto, brunneo-rufis ; posticis nervis longitudinalibus, fasciâ, lineâque transversis, albidis.

Hesperia picta. Leach, *the Zool. Miscell. vol. 1. tab. 55. fig. 4. 5.*

Elle est très-voisine de l'*H. Ornée*, de la même taille & du même pays, mais elle en diffère par la couleur du dessous des ailes, & particulièrement sous le rapport du dessin des inférieures. Les supérieures ont quelques taches jaunâtres & trois

petits points transparens, rapprochés en une petite ligne, à la côte; & près du sommet, mais en dessous, l'on voit entr'eux & le bord inférieur une ligne blanchâtre; le milieu de ces ailes est noirâtre; le bord postérieur du dessous des quatre ailes offre une raie blanchâtre, plus large, terminale & entrecoupée de points noirs, formant une rangée, sur les inférieures.

123. Hespérie Properce.

Hesperia Propertius.

Hesperia alis suprà nigris; anticis suprà lineis maculisque flavis; posticis ibidem fusciâ flavâ, subtùs fasciis rufis flavisque alternis.

Hesperia U. Propertius, *alis divaricatis nigris, flavo maculatis; posticis subtùs fasciis rufis flavisque alternis.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 325. *n°.* 234.

Papilio Propertius. Jon. *Fig. pict.* 6. *tab.* 73. *fig.* 1.

Papilio Propertius Donov. *of an Epit. of the Nat. Hist. of the Inf. of Ind. cah.* 4. *pl.* 4. *fig.* 2.

Elle est petite. Les ailes sont noires en dessus. Les antennes ont deux lignes marginales & situées à la base & des taches jaunes; leur dessous est mélangé de noir-foncé, de fauve & de jaune. Les postérieures ont en dessus une bande jaune; leur dessous est de cette couleur, mais coupé transversalement au milieu par une bande fauve, couleur qui borde presqu'entièrement son contour marginal.

Elle se trouve aux Indes.

124. Hespérie Galenus.

Hesperia Galenus.

Hesperia alis utrinquè fuscis, punctis maculisque flavis; anticis fusciâ maculari, transversâ; posticis maculâ magnâ, elongato-quadratâ, à centro ad marginem posticum extensâ flavis.

Hesperia U. Galenus, *alis integerrimis, concoloribus, fuscis, flavo maculatis.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 350. *n°.* 332.

Papilio Galenus. Donov. *of an Epit. of the Nat. Hist. of the Inf. of Ind. cah.* 5. *pl.* 1. *fig.* 3.

Nous avons suppléé, dans nos caractères spécifiques, ceux de Fabricius, au moyen de la figure de Donovan, car il se borne à ajouter que cette espèce a entièrement le port de l'*H. Mimas*, & que ses antennes sont crochues. Il répète sans détail que ses ailes sont noirâtres & tachetées de jaune.

Elle se trouve aux Indes.

125. Hespérie Nostradamus.

Hesperia Nostradamus.

Hesp. alis integris fuscis: anticis maris *suprà disco nigro*, fœminæ *utrinquè strigâ maculari flavâ: posticis subtùs cinereis.*

Hesperia U. Nostradamus, *alis divaricatis, fuscis: anticis suprà fusciâ maculari albidâ: posticis subtùs cinereis.* Fab. *Entom. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 328. *n°.* 246. (La femelle.)

Hesperia Nostradamus. Coquebert, *Illust. Icon. Inf. Dec.* 2. *p.* 70. *tab.* 17. *fig.* 2. (La femelle.)

Papilio Pumilio, *alis integris, divaricatis, fuscis nigro nebulosis* (fœminæ *luteo maculatis*), *concoloribus.* Ochsen. *Pap. Eur. edit.* 2. *tom.* 1. *p.* 216. *n°.* 12.

Papilio Pumilio. Hubn. *Pap. tab.* 91. *fig.* 459. (Mas.) *fig.* 459. 460. (Fœm.)

Papilio Pygmæus. Cyrill. *Ent. Neap. tab.* 5. *fig.* 5.

Papilio Pygmæus. Esp. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 54. *tab.* 99. *cont.* 54. *fig.* 3.

Papilio Pygmæus. Illig. *Magaz. tom.* 3. *pag.* 202.

A en juger par les noms de Cyrille & de Hubner, cette espèce devroit être un pygmée parmi les Hespéries; cependant elle a, comme le dit Fabricius, la taille de l'hesp. *Comma*. Les ailes supérieures sont d'un brun-foncé, avec le milieu noir en dessus dans le mâle, & traversé de part & d'autre dans la femelle par une ligne flexueuse de taches jaunes. Les ailes inférieures ont le dessus brun & sans taches, le dessous cendré. Les deux surfaces du corps sont de la même couleur que celles des secondes ailes, & les antennes ont la massue terminée de ferrugineux.

Trouvée en Barbarie par M. Desfontaines, professeur de botanique au Jardin du Roi. Elle habite aussi la Calabre.

Nota. Dans l'individu femelle décrit par Fabricius & figuré par Coquebert, les taches des ailes supérieures avoient passé du jaune au blanc-sale.

126. Hespérie Panisçus.

Hesperia Panisçus.

Hesp. alis integris, fuscis, rubescenti nitidis, fulvo maculatis: posticis suprà maculis 10, *subtùs* 13 *pallidioribus.*

Papilio P. U. Panisçus, *alis integerrimis, divaricatis: posticis utrinquè fuscis, fulvo maculatis.* Fab. *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 85. *n°.* 767.

Hesperia U. *Panisçus.* Fab. *Entom. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 328. *n°.* 242.

Papilio Panifcus, *alis integerrimis, divaricatis, fufcis, fulvo maculatis : poflicis fubtùs fulvis, maculis flavefcentibus.* Ochsen. *Pap. Eur. tom.* 1. *p.* 219. *n°.* 14.

Papilio Panifcus. Esp. *Pap. Eur. part.* 1. *pag.* 322. *tab.* 28. *Suppl.* 4. *fig.* 2. — *tab.* 115. *cont.* 50. *fig.* 5. (Var.)

Papilio Panifcus. Sulz. *Inf. tab.* 19. *fig.* 8. 9.

Papilio Panifcus. Bergstr. *Nomenkl. tab.* 91. *fig.* 7. 8.

Papilio Panifcus. Naturf. 12. *tab.* 2. *fig.* 11. 12.

Papilio Panifcus. Borkh. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 183 & 286. *n°.* 7. — *part.* 2. *p.* 236.

Papilio Panifcus. Borkh. *Rhein. Mag. tom.* 1. *p.* 300. *n°.* 116.

Papilio Panifcus. Schneid. *Syft. Befchr. pag.* 280. *n°.* 180.

Papilio Panifcus. Rossi, *Faun. Etr. Mantis. tom.* 2. *p.* 13. *n°.* 357.

Papilio Panifcus. Brahm. *Inf. Kalend. pag.* 259. *n°.* 135.

Papilio Panifcus. Petag. *Inflit. Ent. tom.* 1. *p.* 495. *n°.* 141.

Papilio Panifcus. Devill. *Ent. Linn. tom.* 2. *p.* 82. *n°.* 163. *tab.* 4. *fig.* 14.

Papilio Brontes. Wien. *Verz. p.* 160. *fam.* A. *n°.* 6.

Papilio Brontes. Illig. *N. Aufg. Deff. tom.* 2. *p.* 147. *n°.* 6.

Papilio Brontes. Illig. *Magaz. tom.* 3. *p.* 188. — *tom.* 4. *p.* 25.

Papilio Brontes. Lang. *Verz.* 2. *p.* 59. *n°.* 511-514.

Papilio Brontes. Hubn. *Pap. tab.* 94. *fig.* 475. 476. (Mas.)

Hubn. *Larv. lepid.* 1. *Pap.* 2. *Gens* E. c. *fig.* 1. a.

Papilio Palæmon. Pallas, *Voy. tom.* 1. *App. n°.* 63.

L'Echiquier. Engram. *Pap. d'Europe, tom.* 1. *pag.* 194. *pl.* 45. *fig.* 96. a. b. — *fig.* 96. c. d. (Var.)

Hefpérie Echiquier. Latr. *nouv. Dict. d'Hift. nat.* 2e. *édit. tom.* 14.

Hefpérie Echiquier. God. *Hift. nat. des lépid. de France, tom.* 1. *p.* 231. *pl.* 12. *fig.* 1. 2.

Hefpérie Panifcus. God. *Tabl. méthod. des lépid. de France,* Diurnes, *p.* 60. *n°.* 176.

Elle a de douze à treize lignes d'envergure. Le deffus des ailes eft d'un brun-noirâtre à reflet vineux, avec des taches fauves, dont les intérieures plus grandes & éparfes, les poftérieures formant une férie parallèle au bord terminal. Les taches des fecondes ailes font au nombre de dix, & l'antérieure d'entr'elles eft bafilaire & arrondie.

Le deffous des ailes fupérieures eft fauve, avec quelques taches, & l'extrémité des nervures, noires.

Le deffous des ailes inférieures eft d'un brun-jaunâtre, avec treize taches blanchâtres, inégales, bordées de noirâtre, & rangées tranfverfalement, à partir de la bafe, ainfi qu'il fuit : 1, 2, 3, 7. Le corps eft brun en deffus, avec des poils verdâtres fur le corfelet; il eft d'un jaune-d'ocre pâle en deffous, avec quatre lignes longitudinales noirâtres fur l'abdomen. Les antennes font noires, annelées de jaune, avec la moitié antérieure de la maffue orangée.

La femelle offre les mêmes caractères que le mâle, mais elle a les taches du deffus d'un fauve moins gai.

Cette efpèce habite les avenues & les clairières des bois un peu humides, & paroît dans les commencemens de mai. Elle eft affez commune aux environs de Paris.

127. Hespérie Sylvius.

Hesperia Sylvius.

Hefp. alis integris : anticis utrinquè aureo-flavis, nitidis, nigro punctatis : poflicis fufcefcentibus, maculis aureo-flavis, fuprà 11, *fubtùs* 12.

Papilio Sylvius, *alis integerrimis, divaricatis : anticis flavis nigro maculatis, poflicis fufcis flavo maculatis.* Ochsen. *Pap. Eur. tom.* 1. *pag.* 221. *n°.* 4.

Papilio P. U. Sylvius, *alis divaricatis, fulvis : omnibus fuprà maculis fparfis, fufcis : inferioribus fubtùs maculis pallidis ovatis nigro inductis.* Esp. *Pap. Eur. part.* 1. *pag.* 140. *tab.* 80. *cont.* 30. *fig.* 5. 6.

Papilio Sylvius. Knoch, *Beytr. part.* 1. *tab.* 5. *fig.* 1. 2.

Papilio Sylvius. Schneid. *Syft. Befchr. p.* 281. *n°.* 181.

Papilio Sylvius. Devill. *Ent. Linn. tom.* 2. *p.* 83. *n°.* 170.

Papilio Sylvius. Hubn. *Pap. tab.* 94. *fig.* 477. 478. (Mas.) — *tab.* 126. *fig.* 641. 642. (Mas.) 643. 644. (Fœm.)

Papilio Sylvius. Borkh. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 184 & 286. *n°.* 8. — *part.* 2. *p.* 236.

Papilio Sylvius. Borkh. *Rhein. Mag. tom.* 1. *p.* 301. *n°.* 117.

Papilio P. U. *Panifcus.* (Var.) Fab. *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 85. *n°.* 767. *f.*

Hefperia U. *Panifcus.* (Var.) Fab. *Ent. Syft. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 328. *n°.* 242. *β.*

Papilio Palæmon. (Var.) Pallas, *Voy. tom.* 1. *App. n°.* 63. *f.*

Papilio Panifcus. (Var.) Petag. *Inftit. Ent. tom.* 1. *p.* 493. *n°.* 142. *β.*

Engram. *Pap. d'Europe, tom.* 1. *pag.* 285. *pl.* 74. *Suppl.* 20. *fig.* 96. e. f.

Hefpérie Sylvius. God. *Hift. nat. des lépid. de France, tom.* 2. *pag.* 214. *pl.* A. a. XXVII. *fig.* 1. 2.

Hefpérie Sylvius. God. *Tab. méthod. des lépidop. de France,* Diurnes, *p.* 61. *n°.* 177.

Elle fe rapproche beaucoup de l'hefpérie *Panifcus ;* mais le deffus de fes premières ailes eft toujours d'un jaune-doré-luifant ; les fecondes ont une tache de plus fur la face fupérieure, &, au contraire, une de moins fur la face inférieure. Ces taches font d'ailleurs plus grandes en deffus & plus jaunes en deffous. Deux caractères qu'il eft encore bon de remarquer, c'eft que la maffue de fes antennes eft entièrement jaune, & que la tache bafilaire du deffus de fes ailes inférieures eft alongée & ovale.

La femelle eft un peu moins gaie en deffus que le mâle, & elle a les points de l'extrémité des premières ailes moins détachés du bord.

Se trouve en mai, aux environs de Brunfwick, & dans quelques cantons des bords du Rhin.

128. Hespérie Aracynthus.

Hesperia Aracynthus.

Hefp. alis integris, nigro-fufcis, nitidis : anticis utrinquè apice flavo maculatis : poftcis fubtùs lutefcentibus, maculis 12 *rotundatis albis nigro cinctis.*

Papilio P. U. Aracinthus, *alis rotundatis, integerrimis fufcis : poftcis fubtùs grifeis, maculis ocellaribus albis.* Fab. *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 89. *n°.* 809.

Hefperia U. *Aracinthus.* Fab. *Ent. Syft. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 344. *n°.* 309.

Papilio P. U. *Aracinthus.* Panz. *Faun. Germ.* 9. 16.

Papilio P. U. *Aracynthus.* Petag. *Inftit. Ent. tom.* 1. *p.* 493. *n°.* 142.

Papilio Steropes. Wien. *Verz. p.* 160. *fam.* A. *n°.* 7.

Papilio Steropes. Esp. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 361. *tab.* 41. *Suppl.* 17. *fig.* 1. — *tab.* 80. *cont.* 30. *fig.* 4.

Papilio Steropes. Illig. *N. Aufg. Deff. tom.* 2. *p.* 148. *n°.* 7.

Papilio Steropes. Illig. *Magaz. tom.* 3. *p.* 204.

Papilio Steropes. Bergstr. *Nomenkl. tab.* 96. *fig.* 3. 4.

Papilio Steropes. Ochsenh. *Pap. Eur. tom.* 1. *p.* 215. *n°.* 15.

Papilio Steropes. Borkh. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 182 & 266. *n°.* 6. — *part.* 2. *p.* 256.

Papilio Steropes. Scheid. *Syft. Befchr. p.* 281. *n°.* 182.

Papilio Steropes. Lang. *Verz.* 2. *p.* 60. *n°.* 515-517.

Papilio Steropes. Devill. *Ent. Linn. tom.* 2. *p.* 82. *n°.* 167.

Papilio Steropes. Hubn. *Pap. tab.* 94. *fig.* 473. 474. (Mas.)

Papilio U. *Morpheus.* Pallas, *Voy. tom.* 1. *p.* 471. *n°.* 64.

Erynnis Speculum. Schrank, *Faun. Boic. tom.* 2. *p.* 160. *n°.* 1282.

Le Miroir. Geoff. *Hift. Inf. tom.* 2. *p.* 66. *n°.* 36.

Le Miroir. Engram. *Pap. d'Europe, tom.* 1. *p.* 191. *pl.* 64. *fig.* 94. a. b. — *pl.* 74. *Suppl.* 20. *fig.* 94. c. d.

Hefpérie Miroir. Latr. *nouv. Dict. d'Hift. nat.* 2e. *édit. tom.* 14.

Hefpérie Miroir. God. *Hift. nat. des lépid. de France, tom.* 1. *p.* 229. *pl.* 12 *fecund. & pl.* 12 *tert. fig.* 1.

Hefpérie Aracynthus. God. *Tabl. méth. des lépid. de France,* Diurnes, *p.* 60. *n°.* 175.

Geoffroy a mis cette efpèce parmi les Argus ou Polyommates, & il lui a donné le nom de *Miroir,* parce qu'elle a le deffous des ailes inférieures chargé de taches blanches encadrées de brun.

Elle a de feize à dix-fept lignes d'envergure. Le deffus des ailes eft d'un brun-noirâtre-luifant, avec quelques taches jaunes vis-à-vis du fommet des fupérieures.

Le deffous des ailes fupérieures reffemble au deffus ; mais le bord terminal eft longé en majeure partie par une ligne jaune crénelée intérieurement, & la frange eft entrecoupée de blanc.

Le deffous des ailes inférieures eft d'un jaune-rouffâtre, avec douze taches blanches, orbiculaires, bordées de noir, & rangées tranfverfale-

ment, à partir de la base, ainsi qu'il suit : 2, 4, 6. Le corps a le dessus entièrement noirâtre ; il a le dessous blanchâtre, avec trois lignes noires longitudinales. Les antennes sont noires, annelées de blanchâtre, & elles ont la moitié supérieure de la massue d'un jaune-orangé.

La femelle diffère du mâle en ce qu'elle a quatre taches jaunes, dont une discoïdale, sur le dessus des ailes inférieures, & quelquefois une de plus sur le dessus des supérieures.

Elle habite les bois marécageux, & elle paroît à la Saint-Jean ou au solstice d'été. Il faut frapper les buissons pour en faire sortir les femelles. Les forêts de Bondy & de Senart sont, aux environs de Paris, des localités où l'on est presque toujours sûr de rencontrer cette espèce. M. Durville, lieutenant de la marine royale, a rapporté, des bords de la Mer-Noire, des individus parfaitement semblables à ceux qu'on trouve dans les différentes contrées de l'Europe.

129. Hespérie Métis.

Hesperia Metis.

Hesperia alis anticis utrinquè posticisque suprà nigro-fuscis, maculis fulvis, pluriscque punctiformibus ; alis posticis subtùs brunneo-fuscis, immaculatis.

Hesperia U. Metis, *alis integerrimis, fuscis, maculis fulvis sparsis ; posticis subtùs immaculatis.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 329. *n°.* 249.

Papilio P. U. *Metis.* Fab. *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 85. *n°.* 772. — *Spec. Inf. tom.* 2. *p.* 132. *n°.* 605. — *Syst. Ent. p.* 528. *n°.* 360.

Papilio P. R. Metis, *alis integerrimis, ferrugineo-fuscis : maculis fulvis sparsis ; posticis subtùs immaculatis.* Linn. *Syst. Nat. edit.* 12. *tom.* 2. *p.* 792. *n°.* 245. — *Mus. Ludov. Ulr. pag.* 325. *n°.* 143.

Drury, *Inf. tom.* 2. *pl.* 16. *fig.* 3. 4.

Papilio Metis. Cram. *Pap.* 14. *pl.* 162. G.

Elle a environ un pouce d'envergure. Son corps est noirâtre, avec la majeure partie des antennes, les palpes extérieurs & les poils de l'anus, fauves. Les ailes supérieures en entier, & le dessus des inférieures sont presque noires avec des taches d'un fauve-orangé, & pour la plupart arrondies, ou en forme de points ; on en compte environ cinq sur les supérieures, dont deux près de la côte, & dont l'antérieure double, & les trois autres situées transversalement à l'extrémité postérieure ; l'intermédiaire est encore double. Celles du dessus des ailes inférieures y sont disposées sur deux rangées transverses, trois & six ; l'interne de la rangée intérieure, & les deux de chaque extrémité de l'inférieure sont très-petites, punctiformes. Le dessous de ces ailes est d'un brun-noirâtre & sans taches. Cette description a été faite sur un individu mâle. D'autres individus présentent quelques différences dans le nombre des taches. Les taches supérieures des secondes ailes se montrent quelquefois en dessous ; quelquefois il n'y a que la rangée antérieure, & le dessous présente une ou deux taches blanches.

Elle se trouve au Cap de Bonne-Espérance.

On peut placer près de cette espèce le papillon *Menès* de Cramer, 33. *pl.* 393. H. Z. Il est noirâtre, avec de petites lignes jaunes, en forme de stries, à l'extrémité des ailes supérieures, & une rangée de points de la même couleur, sous les inférieures, le long de leur bord postérieur. Cet auteur dit qu'elle se trouve à Suriname, au Coromandel & au Cap de Bonne-Espérance. Cela n'est point croyable, & il y a ici quelque confusion. Stoll a représenté, *pl.* 7, *fig.* 6, de son Supplément à l'ouvrage précédent, la chenille & la chrysalide de cette espèce. Le corps de la chenille est d'un vert-pâle, avec une raie brune sur le dos, les stigmates d'un rouge-brun, la tête noire & marquée de deux taches vertes. On la trouve, dit-il, dans l'herbe. La chrysalide est longue, mince, couleur de paille obscure, & ne demeure en cet état que cinq à six jours. Il a aussi figuré un individu femelle de l'insecte parfait.

130. Hespérie Plutargue.

Hesperia Plutargus.

Hesperia alis fuscis, auro irroratis ; anticis suprà maculâ apicis, subtùs margine exteriori testaceis.

Hesperia U. Plutargus, *alis integerrimis, fuscis, auro irroratis : anticis suprà maculâ apicis, subtùs margine exteriori testaceis.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 329. *n°.* 251.

Papilio Plutargus. Jon. *Fig. pict.* 6. *tab.* 75. *fig.* 1.

Papilio Plutargus. Donov. *of an Epitom. of the Nat. Hist. of the Inf. of Ind. cah.* 5. *pl.* 4. *fig.* 3.

Elle est de la taille de l'*H. Metis.* Tout le dessus est noirâtre, avec un grand nombre de petits points ou d'atomes dorés ; les ailes supérieures ont une tache à leur sommet. Le dessous des quatre ailes est plus pâle : le bord extérieur des supérieures est d'un fauve-jaunâtre ; les inférieures ont un point & une raie plus foncés.

Elle se trouve aux Indes orientales.

131. Hespérie Numitor.

Hesperia Numitor.

Hesperia alis anticis suprà fuscis, fulvo nitentibus ; posticis ibidem rufo-flavis, limbo externo fusco, infrà flavescentibus.

Hesperia

Hesperia R. Numitor, *alis integerrimis, fuscis; posticis supra disco flavo, subtùs totis flavis, immaculatis.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* n°. 228.

Papilio Numitor. Jon. *Fig. pict.* 6. *tab.* 40. 324. *fig.* 2.

Papilio Numitor. Donov. *of an Epit. of the Nat. Hist. of the Insect. of Ind.* 10. *pl.* 2. *fig.* 3.

Cette espèce, l'une des plus petites du genre, & qui a le port de l'*H. Aracynthus* & de quelques autres analogues, m'a été envoyée de Philadelphie par mon ami M. Lesueur. Les antennes sont noires, avec des anneaux blancs, & elles se terminent en une pointe très-petite. Le corps est noir en dessus & blanc en dessous. Le dessus des ailes supérieures est noirâtre, mais glacé, en grande partie, d'un fauve-luisant; leur dessous est noirâtre, avec le bord extérieur & le sommet jaunâtres; telle est aussi la couleur de la surface inférieure des secondes ailes; leur dessous est fauve, avec le limbe extérieur noirâtre.

132. Hespérie Catullus.

Hesperia Catulus.

Hesperia alis atris, supra sæpiùs punctorum alborum strigâ posticâ.

Hesperia U. Catullus, *alis rotundatis, integerrimis, atris: anticis albo punctatis, posticis strigâ punctorum alborum.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 348. *n°.* 323.

Papilio Catullus. Jon. *Fig. pict.* 6. *tab.* 80. *fig.* 2.

Papilio Catullus. Donov. *of an Epit. of the Nat. Hist. of the Inf. of Ind. cah.* 5. *pl.* 1. *fig.* 4.

Papilio P. U. *Catullus.* Smith-Abbot, *Hist. nat. des lépid. de la Georg. tom.* 1. *p.* 47. *tab.* 24.

Elle est petite. Le corps est noir, avec la tête blanche. Les ailes sont d'un noir-foncé, avec une ligne transverse de points blancs sur leur surface supérieure, à peu de distance du bord postérieur: les premières ont, en outre, d'autres petits points de cette couleur; ils sont en moindre nombre sur leur dessous & celui des secondes. J'ai reçu de l'Amérique septentrionale une variété où ces ailes sont même sans taches en dessus, & où les postérieures n'ont qu'un seul point blanc en avant de la raie formée par les autres; cette raie est commune aux deux surfaces. Dans un autre individu, ces points manquent entièrement, ou l'on n'en voit que quelques-uns & près du sommet des supérieures.

La chenille vit sur le *monarda punctata.* Elle est d'un vert-obscur, avec deux taches noires sur le premier segment; la tête est noire, avec deux points oculaires blancs.

133. Hespérie Hottentote.

Hesperia Hottentota.

Hesperia alis anticis cinereo-fuscis, illarum latere interno posticisque pallido-flavidis.

Cette nouvelle espèce a été recueillie dans la colonie du Cap de Bonne-Espérance par feu de Lalande, naturaliste du Gouvernement. Elle est de la taille de l'*H. Métis.* Son corps est noirâtre, avec les palpes extérieurs gris & le dessous de la massue des antennes roussâtre. Les ailes supérieures sont d'un noirâtre-clair ou presque cendré, avec une grande tache occupant la majeure partie du côté interne d'un jaunâtre très-pâle; ce côté, en dessous, est presque blanchâtre. Les ailes inférieures sont presqu'entièrement d'un jaunâtre-pâle. Les couleurs de l'individu que j'ai décrit étoient un peu altérées.

134. Hespérie Lepeletier.

Hesperia Lepeletier.

Hesperia alis fuscis; posticis subtùs lineis duabus albis, longitudinalibus, rectis: internâ abbreviatâ.

M. Amédée Lepeletier de Saint-Fargeau, bien connu des savans par des Mémoires d'entomologie, & surtout par son intéressante Monographie des insectes de la famille des tenthrédines, & qui, secondé par son ami M. de Serville, a bien voulu se charger de terminer cette partie de l'Encyclopédie, ne doit pas être oublié dans cette liste de naturalistes auxquels j'ai donné ici des témoignages de mon estime particulière.

Cette espèce a environ un pouce de largeur, les ailes étendues. Son corps & ses ailes sont noirâtres; les antennes sont annelées de blanc. Les ailes supérieures & le dessus des inférieures sont sans taches; mais le dessous de celles-ci est remarquable par deux lignes d'un beau blanc, dont l'extérieure part de la base, se termine au bord postérieur, entre son milieu & l'angle externe, & dont l'interne commence vers le milieu de la longueur de l'aile, & finit aussi au bord postérieur; l'une & l'autre sont parfaitement droites, fines, & de la même largeur partout.

Elle a été apportée de la colonie du Cap de Bonne-Espérance par feu de Lalande, naturaliste-voyageur du Gouvernement.

135. Hespérie l'Herminier.

Hesperia l'Herminier.

Hesperia alis immaculatis, supra fuscis, subtùs cinereo-fuscis; antennis albo annulatis.

M. l'Herminier, correspondant du Muséum d'histoire naturelle, & qui, par ses intéressantes communications, ainsi que par divers envois, a beaucoup

contribué aux progrès de cette ſcience, a envoyé cette eſpèce de la Caroline. Elle n'a guère plus de neuf lignes d'envergure. Ses antennes ſont noires, avec des anneaux & une partie du deſſous de la maſſue blanchâtres; le crochet terminal eſt d'un brun-clair. Les ailes ſont noirâtres, mais plus pâles en deſſous, ou tirant ſur le cendré, & ſans aucune tache. Nous avons vu que la deſcription de l'*H. Pygmée* de Fabricius pouvoit convenir à une variété de ſon *H. Naſo*; elle s'applique encore à celle-ci.

B. *Ailes inférieures ſans prolongement ni ſinus à l'angle anal (généralement plus larges & plus arquées au bord poſtérieur que dans les diviſions précédentes; le noir & le blanc plus ou moins mélangés, dominant dans la plupart).*

Nota. On pourroit mettre en tête de cette ſubdiviſion des eſpèces ayant les quatre ailes ou les inférieures au moins *vitrées*; telles que l'*H. Atticus* de Fabricius & le *P. Julettus* de Stoll, *pl.* 9, *fig.* 1.

a. *Ailes dentées.*

* *Dentelures des ailes aſſez fortes ou très-ſenſibles.*

136. Hespérie de la Lavatère.

Hesperia Lavateræ.

Heſp. alis anticis flavidis, fuſciis duabus pallidioribus maculiſque feneſtratis: poſticis ſuprà olivaceo-fuſcis, albido punctatis; ſubtùs albidis, ferè immaculatis.

Papilio P. U. Alceæ, *alis divaricatis, fuſco cinereoque variis: anticis punctis feneſtratis; poſticis ſubtùs cinereis, immaculatis.* Fab. *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 90. *n°.* 822.

Heſperia U. *Alceæ.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 351. *n°.* 334.

Papilio Alceæ. Roem. *Gen. Inſ. tab.* 19. *fig.* 6. 7.

Papilio Alceæ. Petag. *Inſlit. Ent. tom.* 1. *p.* 494. *n°.* 144.

Papilio P. U. Lavatheræ, *alis denticulatis, divaricatis, ſuprà pallidis, maculis majoribus albis fuſciſque: ſubtùs albidis.* Esp. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 148. *tab.* 82. *cont.* 32. *fig.* 4.

Papilio Lavatheræ. Borkh. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 189 & 288. *n°.* 15.

Papilio Lavatheræ. Schneid. *Syſt. Beſchr. p.* 279. *n°.* 179.

Papilio Lavatheræ. Illig. *Magaz. tom.* 3. *p.* 197.

Papilio Lavatheræ. Brahm. *Inſ. Kalend. pag.* 490.

Papilio Lavateræ. Devill. *Ent. Linn. tom.* 2. *p.* 83. *n°.* 171.

Papilio Lavateræ. Hubn. *Pap. tab.* 90. *fig.* 454. 455. (Fæm.)

Papilio Lavateræ. Ochsen. *Pap. Eur. tom.* 1.

Engram. *Pap. d'Europe, tom.* 1. *p.* 288. *pl.* 75. *Suppl.* 21. *fig.* 98. d. e.

Heſpérie de la Lavatère. Latr. *nouv. Dict. d'Hiſt. nat. édit.* 2. *tom.* 14.

Heſpérie de la Lavatère. God. *Hiſt. nat. des lépid. de France, tom.* 2. *p.* 232. *pl.* B b. XXVIII. *fig.* 7. 8.

Heſpérie de la Lavatère. God. *Tabl. méthod. des lépid. de France,* Diurnes, *p.* 64. *n°.* 190.

Elle reſſemble beaucoup à l'heſpérie de la *Guimauve*; mais le deſſus de ſes ailes ſupérieures eſt toujours jaunâtre, avec les deux bandes plus pâles. Le deſſous de ſes ailes inférieures eſt d'un ton blanchâtre qui rend les taches preſque nulles, ſurtout chez le mâle.

Se trouve en mai & en juillet, dans le midi de la France, en Suiſſe, en Styrie, dans le ſud de la Ruſſie, &c.

Nota. Fabricius y a rapporté à tort la figure 3 de la planche 51 d'Eſper. Cette figure repréſente exactement notre heſpérie de la *Mauve*.

137. Hespérie de la Guimauve.

Hesperia Althææ.

Heſp. alis ſuprà olivaceo-fuſcis: anticis fuſciis duabus tranſverſis cæruleſcenti-griſeis maculiſque feneſtratis: poſticis utrinquè albo punctatis, ſubtùſque cinereſcentibus.

Papilio Althææ. Hubn. *Pap. tab.* 90. *fig.* 452. 453. (Fæm.)

Heſpérie de la Guimauve. God. *Hiſt. nat. des lépid. de France, tom.* 2. *p.* 230. *pl.* B b. XXVIII. *fig.* 5. 6.

Heſpérie de la Guimauve. God. *Tab. méthod. des lépid. de France,* Diurnes, *p.* 64. *n°.* 189.

Illiger & Ochſenheimer ont pris cette eſpèce pour une variété de l'heſpérie de la *Mauve*.

Elle a de ſeize à dix-ſept lignes d'envergure. Le deſſus des ailes eſt d'un brun-olivâtre, avec deux bandes tranſverſes d'un gris-bleuâtre aux ſupérieures; avec une dixaine de points blancs, dont l'antérieur baſilaire eſt iſolé, aux inférieures. Les premières ailes ont ſept taches tranſparentes, ſavoir: trois échancrées & une linéaire ſur la bande poſtérieure qui eſt en même temps dif-

coïdale, & trois quadrangulaires alignées obliquement vis-à-vis du ſommet. Il y a en outre un trait blanc à chaque échancrure du bord poſtérieur de toutes les ailes, & les traits de la troiſième & de la ſixième échancrures ſont doubles & plus longs que tous les autres.

Le deſſous ne diffère du deſſus que parce que le fond des ailes eſt d'un cendré-brunâtre, & parce qu'il y a deux points blancs au lieu d'un à la baſe des inférieures. Les deux ſurfaces du corps ſont à peu près du même ton que celles des ailes. Les antennes ont le deſſus noirâtre & légèrement annelé de gris; elles ont le deſſous blanchâtre, avec la moitié antérieure de la maſſue très-noire & terminée de ferrugineux.

Les deux ſexes ſont ſemblables.

Elle ſe trouve en mai & en juillet. M. Cotty de Brécourt & M. le capitaine Devilliers l'ont priſe abondamment dans les foſſés de la Rochelle.

138. Hespérie de la Mauve.

Hesperia Malvæ.

Heſp. alis ſuprà olivaceo-fuſcis, faſciis tribus tranſverſis rubido-griſeis : anticis maculis feneſtratis : poſticis ſubtùs fuſceſcentibus, albido punctatis.

Papilio P. U. Malvæ, *alis dentatis, divaricatis, fuſcis, cinereo undatis : anticis punctis feneſtratis : poſticis ſubtùs punctis albis.* Fab. *Mant. Inſ tom. 2. p. 90. n°. 821.*

Heſperia U. *Malvæ.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom. 3. pars 1. p. 350. n°. 333.*

Papilio Malvæ. Wien. *Verz. p. 159. fam. A. n°. 1.*

Roes. *Inſ. part. 1. claſſ. 2. Pap. diur. tab. 10. fig. 1-6.*

Papilio Malvæ. Borkh. *Pap. Eur. part. 1. p. 185 & 287. n°. 10.*

Papilio Malvæ. Borkh. *Rhein. Magaz. tom. 1. p. 297. n°. 108.*

Papilio Malvæ. Bergstr. *Nomenkl. tab. 40. fig. 6. 7. — tab. 91. fig. 1. 2.*

Papilio Malvæ. Hufnag. *Tabell. im. Berl. Magaz. tom. 2. p. 66. n°. 20.*

Papilio Malvæ. Illig. *N. Auſg. Deſſ. tom. 2. p. 142. n°. 1.*

Papilio Malvæ. Schwarz, *Raupenkal. p. 40 & 180.*

Papilio Malvæ. Fuessl. *Alt. Magaz. tom. 1. p. 262.*

Papilio Malvæ. Rossi, *Faun. Etr. tom. 2. p. 185. n°. 1043.*

Papilio Malvæ. Rossi, *edit.* Illig. *p. 252.*

Papilio Malvæ. Hubn. *Pap. tab. 90. fig. 450. 451.*

Erynnis Malvæ. Schrank, *Faun. Boic. tom. 2. p. 157. n°. 1277.*

Papilio Malvæ. Ochsen. *Pap. Eur. edit. 1. p. 448.*

Papilio Malvarum. Ochsen. *Pap. Eur. edit. 2. p. 195. n°. 1.*

Papilio P. U. Alceæ, *alis denticulatis, fuſcis, nigro maculatis : ſuperioribus maculis pellucidis in apice tribus, in diſco quatuor ſparſis.* Esp. *Pap. Eur. part. 1. p. 4. tab. 51. cont. 1. fig. 3.*

Papilio Alceæ. Schæff. *Icon. tab. 162. fig. 7. 8.*

Papilio Alceæ. Devill. *Ent. Linn. tom. 2. p. 83. n°. 168.*

Papilio Alceæ. Schneid. *Syſt. Beſchr. p. 276. n°. 175.*

Papilio Alceæ. Brahm. *Inſ. Kalend. p. 488. n°. 350.*

Le Papillon Griſette. Engram. *Pap. d'Europe, tom. 1. p. 198. pl. 46. fig. 98. a. b. c.*

Heſpérie de la Mauve. Latr. *nouv. Diction. d'Hiſt. nat. édit. 2. tom. 14.*

Heſpérie de la Mauve. God. *Hiſt. natur. des lépid. de France, tom. 1. p. 243. pl. 12. ſecund. fig. 5.*

Heſpérie de la Mauve. God. *Tabl. méthod. des lépid. de France,* Diurnes, *p. 64. n°. 188.*

Elle a de quinze à ſeize lignes d'envergure. Le deſſus des ailes eſt d'un brun-olivâtre, avec trois bandes tranſverſes d'un gris-rougeâtre, & les échancrures du bord poſtérieur blanchâtres. Les premières ailes ont en outre ſix petites taches tranſparentes, ſavoir : trois, linéaires & dont une flexueuſe, éparſes ſur le diſque; trois, quadrangulaires & à peu près égales, alignées obliquement vis-à-vis du ſommet.

Le deſſous des quatre ailes eſt un peu plus pâle que le deſſus, & celui des inférieures offre des points blancs, dont l'antérieur ſolitaire, les autres formant deux rangées courbes & tranſverſales. Le corps eſt approchant du même ton que les ailes. Les antennes ſont noirâtres en deſſus, blanchâtres en deſſous, avec l'extrémité de la maſſue ferrugineuſe.

La chenille eſt pubeſcente, d'un gris-cendré, avec la tête noire, & quatre points jaunes ſur le premier anneau. Elle vit ſur la *mauve ſauvage*, la *paſſe-roſe* ou *roſe-trémière*, (*alcea roſea*), &c. Lorſqu'elle n'a point ſubi ſa métamorphoſe avant l'hiver, elle s'enferme dans la tige de la *bardane* ou de quelques *chardons*, & elle y reſte

engourdie jusqu'au printemps. Geoffroy l'a prise pour la chenille de l'hespérie *Plain-chant*.

La chrysalide est d'un cendré-bleuâtre.

En mai & en juillet, dans les bois, dans les jardins, &c. Elle se trouve aux environs de Paris & dans toute la France.

** *Dentelures des ailes foibles ou à peine sensibles.*

139. Hespérie Eucrate.

Hesperia Eucrate.

Hesp. alis fusce scentibus, albo punctatis : posticis subtùs luteis, albido maculatis. Ochsen.

Papilio Eucrate. Ochsen. *Pap. Eur. tom.* 1. *p.* 213. *n°.* 10.

Papilio Eucrate. Esp. *Pap. part.* 1. *tab.* 124. *cont.* 79. *fig.* 6.

N'ayant point vu cette hespérie, nous ne pouvons en parler que d'après M. Ochsenheimer, qui la compare pour la taille aux plus petits exemplaires du *Polysperchon*. (*Voyez* Polyommate *Amyntas*, n°. 146.)

Le dessus des ailes est d'un brun-noirâtre, avec la frange d'un gris-obscur & entrecoupée de brun. Les supérieures ont plusieurs points blancs épars, entre lesquels il y a une petite lunule également blanche : les inférieures sont foiblement dentées, & elles ont quatre ou cinq points blancs, dont un basilaire, les autres disposés en une ligne transverse au milieu de la surface. Il y a en outre une série de points moins distincts avant le bord postérieur de toutes les ailes.

Le dessous des premières ailes est d'un brun-verdâtre, mais plus clair aux bords antérieur & postérieur, avec le même dessin qu'en dessus.

Le dessous des secondes ailes est d'un jaune-brunâtre, avec des atomes plus foncés, quelques taches blanchâtres à la base, une bande irrégulière de cette couleur au milieu, & des points pareillement blanchâtres vers le bord postérieur.

Du Portugal.

Nota. M. Ochsenheimer ne fait pas assez sentir les différences qui séparent cette hespérie de ses analogues; il avoit cependant des termes de comparaison dans le *Sao*, & dans l'*Alveolus* ou hespérie du chardon.

140. Hespérie Proto.

Hesperia Proto.

Hesp. alis fusc is, fasciâ maculari punctisque flavescentibus : posticis subtùs brunneis, albido subfasciatis punctatisque. Ochsen.

Papilio Proto. Ochsen. *Pap. Eur. edit.* 2. *tom.* 1. *p.* 210. *n°.* 8.

Papilio Proto. Esp. *Pap. Eur. part.* 1. *tab.* 123. *cont.* 78. *fig.* 5. (Mas.) *fig.* 6. (Fœm.)

Nous ne connoissons point cette hespérie; mais d'après la description de M. Ochsenheimer, elle est presqu'aussi grande que le *P. Tessalum* (le Plain-chant), & elle en diffère principalement en ce que les taches du dessus de ses quatre ailes sont d'un jaune-pâle au lieu d'être blanches; en ce que le dessous de ses ailes inférieures est d'un brun-jaunâtre & non verdâtre, & qu'il a le bord interne d'un jaune-clair.

Le mâle a en outre le dessus des ailes saupoudré de jaunâtre.

Du Portugal.

---

b. *Ailes très-entières ou sans dentelures.*

141. Hespérie Tagès.

Hesperia Tages.

Hesp. alis fuscis, utrinquè strigâ marginali è punctis minutis albis : anticis suprà fasciis duabus transversis cinerascentibus.

Papilio P. U. Tages, *alis denticulatis, divaricatis, fuscis, obsolete albido punctatis.* Linn. *Syst. Nat.* 2. *p.* 795. *n°.* 268. — *Faun. Succ. edit.* 2. *p.* 286. *n°.* 1082.

Papilio P. U. *Tages.* Fab. *Mant. Inst. tom.* 2, *p.* 92. *n°.* 831.

Hesperia U. *Tages.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 354. *n°.* 346.

Papilio Tages. Wien. *Verz. p.* 159. *fam.* A. *n°.* 2.

Papilio Tages. Esp. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 306. *tab.* 23. *fig.* 3.

Papilio Tages. Illig. *N. Aufg. Dess. tom.* 2. *p.* 143. *n°.* 2.

Papilio Tages. Illig. *Magaz. tom.* 3. *p.* 204.

Papilio Tages. Schæff. *Icon. tab.* 162. *fig.* 3. 4.

Papilio Tages. Bergstr. *Nomenkl. tab.* 91. *fig.* 3. 4.

Papilio Tages. Lewin, *Inst. tab.* 45. *fig.* 3. 4.

Papilio Tages. Borkh. *Pap. Eur. part.* 1. *p.* 188. *n°.* 14.

Papilio Tages. Borkh. *Rhein. Magaz. tom.* 1. *p.* 299. *n°.* 112.

Papilio Tages. Scheid. *Syst. Beschr. p.* 278. *n°.* 178.

Papilio Tages. Lang. *Verz.* 2. *p.* 60. *n°.* 523. 526.

Papilio Tages. Brahm. *Inst. Kalend. p.* 360. *n°.* 240.

Papilio Tages. Rossi, *Faun. Etr. tom.* 2. *p.* 159. *n°.* 1045.

Papilio Tages. Rossi, *edit.* Illig. *p.* 253. *n°.* 1045.

Papilio Tages. Fuessl. *Suiff. Inf. p.* 32. *n°.* 610.

Papilio Tages. Cyrill. *Ent. Neap. tab.* 12. *fig.* 5.

Papilio Tages. Petagna, *Inſtit. Ent. tom.* 1. *p.* 495. *n°.* 148.

Papilio Tages. Devill. *Ent. Linn. tom.* 2. *p.* 81. *n°.* 162.

Papilio Tages. Hubn. *Pap. tab.* 91. *fig.* 456. 457. (Mas.)

Hubn. *Larv. lepid.* 1. *p.* 2. *Gens* E. *fig.* 1. a. b.

Papilio Tages. Ochsen. *Pap. Eur. tom.* 1.

Erynnis Tages. Schrank, *Faun. Boic. tom.* 2. *p.* 158. *n°.* 1279.

Papilio Geryon. Naturf. 6. *p.* 31. *n°.* 19.

Papilio Morio, var. 1. Scop. *Ent. Carn. p.* 181. *n°.* 464. (Il fait une fauſſe citation de Roëſel.)

Le Papillon Griſette. Geoff. *Hiſt. Inſ. tom.* 2. *p.* 68. *n°.* 39.

Le Point d'Hongrie. Engram. *Pap. d'Eur. tom.* 1. *p.* 286. *pl.* 75. *Suppl.* 21. *fig.* 97. a. b. *bis.*

Heſpérie Griſette. Latr. *nouv. Dict. d'Hiſt. nat. édit.* 2. *tom.* 14.

Heſpérie Griſette. God. *Hiſt. nat. des lépid. de France, tom.* 1. *p.* 241. *pl.* 12 *ſecund. fig.* 4.

Heſpérie Tagès. God. *Tabl. méth. des lépid. de France,* Diurnes, *p.* 63. *n°.* 187.

Elle a environ quatorze lignes d'envergure. Le deſſus des ailes eſt d'un brun-noirâtre, avec une ſérie courbe & marginale de points blancs très-petits. Entre ces points & le milieu de la ſurface, les ailes ſupérieures ont deux bandes tranſverſes d'un cendré-pâle, & les inférieures une ligne flexueuſe de points blanchâtres peu prononcés. L'extrémité de la frange eſt griſâtre, principalement aux ſecondes ailes.

Le deſſous diffère du deſſus en ce qu'il eſt plus clair, & en ce que les ailes inférieures n'ont pas de bandes cendrées, du moins apparentes. Le corps eſt de la couleur des ailes. Les antennes ont le deſſus noir & annelé de blanc, le deſſous entièrement blanchâtre, avec la ſommité de la maſſue ferrugineuſe de part & d'autre.

Elle ſe trouve communément dans toute l'Europe, en avril, en juillet & en août.

La chenille, d'après les auteurs du Catalogue ſyſtématique des lépidoptères de Vienne, vit ſur le *chardon-rolland* (*eryngium campeſtre*) & ſur le *lotier corniculé* ou *trèfle jaune* (*lotus corniculatus*). Elle eſt d'un vert-tendre, avec la tête brune, & des lignes longitudinales jaunes, ponctuées de noir.

La chryſalide eſt rougeâtre, avec l'enveloppe des ailes d'un vert-obſcur.

142. Heſpérie du Sida.

Hesperia Sidæ.

Heſp. alis fuſcis : anticis ſtrigâ flexuoſâ è maculis quadratis albis, alteráque ante marginem obſoletâ : poſticis ſubtùs albis, maculâ baſeos faſciiſque duabus tranſverſis luteis.

Papilio P. U. Sidæ, *alis integris, divaricatis, nigris, albo punctatis : poſticis ſubtùs cinereis, faſciis duabus flavis.* Fab. *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 91. *n°.* 823.

Heſperia U. *Sidæ.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 351. *n°.* 335.

Papilio P. U. Sidæ, *alis denticulatis, divaricatis, fuſco-vireſcentibus, albo-maculatis : inferioribus ſubtùs faſciâ tranſverſâ fulvâ.* Esp. *Pap. Eur. part.* 1. *pag.* 178. *tab.* 90. *cont.* 40. *fig.* 3.

Papilio Sidæ. Borkh. *Pap. Eur. part.* 1. *pag.* 189. *n°.* 16. — *part.* 2. *p.* 257.

Papilio Sidæ. Illig. *Magaz. tom.* 3. *p.* 204.

Papilio Sidæ. Petagna, *Inſtit. Ent. tom.* 1. *p.* 494. *n°.* 145.

Papilio Sidæ. Devill. *Ent. Linn. tom.* 2. *pag.* 83. *n°.* 172.

Papilio Sidæ. Hubn. *Pap. tab.* 93. *fig.* 468. (Mas.)

Papilio Sidæ. Ochsen. *Pap. Eur. tom.* 1.

Le Chamarré. Engram. *Pap. d'Eur. tom.* 1. *p.* 330. *pl.* 7. *Suppl.* 3. *fig.* 97. a. b. *quart.*

Heſpérie du Sida. God. *Hiſt. nat. des lépid. de France, tom.* 2. *p.* 219. *pl.* A a. XXVII. *fig.* 5. 6.

Heſpérie du Sida. God. *Tabl. méthod. des lépid. de France,* Diurnes, *p.* 62. *n°.* 182.

Elle eſt à peu près de la taille de notre heſpérie *Plain-chant*, & elle lui reſſemble par le deſſus des quatre ailes, ainſi que par le deſſous des ſupérieures.

Le deſſous de ſes ailes inférieures eſt blanc, avec une tache baſilaire, & deux bandes tranſverſes, d'un jaune-fauve. Les bandes ſont bordées de noir & diviſées par des nervures brunes. Il y a en outre quelques mouchetures noirâtres avant le bord poſtérieur.

Quelquefois les taches blanches du deſſus des ailes inférieures ſont peu diſtinctes.

Elle ſe trouve aux environs de Toulon, en Italie, en Hongrie, dans les contrées les plus méridionales de la Ruſſie, &c.

143. Hespérie Orbifère.

Hesperia Orbifera.

Hesp. alis ſuprà violaceo-fuſcis, nitidis : anticis ſtrigis duabus flexuoſis è maculis albis : poſticis ſubtùs dilutè corticinis, maculis plurimis albis, mediis orbicularibus : fimbriæ alarum anticarum interſtitio albo ab apice ultimo latiore.

M. Franck de Strasbourg nous a envoyé cette heſpérie comme eſpèce nouvelle & comme n'étant pas encore figurée.

Elle reſſemble beaucoup à l'heſpérie *Sao*; mais elle a le dernier, & non le troiſième, entrecoupé blanc de la frange des ailes ſupérieures plus large que tous les autres. Le deſſous de ſes ailes inférieures, au lieu d'être d'un rouge-brique, eſt d'un brun-tanné-clair, & il a les taches de la rangée du milieu orbiculaires, ce qui a probablement fait impoſer à cette eſpèce le nom ſous lequel nous la donnons ici. Indépendamment de cela, le collier & l'anus ſont verdâtres, tandis qu'ils ſont d'un rouge-briqueté chez l'heſpérie *Sao*.

De la Hongrie.

144. Hespérie Sao.

Hesperia Sao.

Hesp. alis ſuprà violaceo-fuſcis, nitidis : anticis ſtrigis duabus flexuoſis è maculis albis : poſticis ſubtùs teſtaceis, maculis plurimis albis, mediis irregularibus : fimbriæ alarum anticarum interſtitio albo ab apice tertio latiore.

Papilio Sao. Hubn. *Pap. tab.* 95. *fig.* 471. 472. (Fœm.)

Papilio Sertorius. Hubn. *Text. p.* 71. *n°.* 8.

Papilio Sao. Illig. *Mag. tom.* 3. *p.* 203.

Papilio Sao. Ochsen. *Pap. Eur. edit.* 1. *p.* 459.

Papilio Sertorius, *alis ſubdentatis, divaricatis, fuſcis, lunulâ mediâ maculiſque albis : poſticis ſubtùs teſtaceis, albo maculatis faciatiſque.* Ochsen. *Pap. Eur. edit.* 2. *tom.* 1. *p.* 211. *n°.* 9.

Papilio Fritillum. Schæff. *Icon. Nomenkl. P.inz. p.* 149. *tab.* 162. *fig.* 1. 2.

Le Tacheté. Engram. *Pap. d'Europe, tom.* 1. *pl.* 7. *Suppl.* 3. *fig.* 97. c. d. *tert.*

Heſpérie Sao. Latr. *nouv. Dict. d'Hiſt. nat. édit.* 2. *tom.* 14.

Heſpérie Sao. God. *Hiſt. nat. des lépidop. de France, tom.* 2. *pag.* 227. *pl.* B b. XXVIII. *fig.* 3. 4.

Heſpérie Sao. God. *Tabl. méthod. des lépid. de France,* Diurnes, *p.* 63. *n°.* 186.

Elle a de dix à onze lignes d'envergure. Le deſſus des ailes eſt d'un brun-violet-luiſant, avec deux ſéries tranſverſes de taches blanches, & la frange entrecoupée de blanc & de brun. La ſérie antérieure des premières ailes eſt flexueuſe & précédée de trois taches blanches, dont deux lunulées & ſe regardant par leur concavité, ſur le diſque; la troiſième, en forme de point, vers le milieu du bord interne. La ſérie antérieure des ſecondes ailes ne ſe compoſe le plus ſouvent que d'une petite ligne tranſverſale & d'un point placé au-deſſous de cette ligne, ce qui repréſente en quelque ſorte un ! ou un point d'exclamation.

Le deſſous des ailes ſupérieures eſt noirâtre, avec la côte jaunâtre, & des taches blanches répondant à celles du deſſus.

Le deſſous des ailes inférieures eſt d'un rouge-brique, plus ou moins foncé, avec des taches blanches, dont deux plus grandes ſur la moitié poſtérieure du bord d'en haut. Ces taches forment trois rangées, & celles de la rangée du milieu ſont irrégulières. Le corps eſt brun, avec un collier & l'anus d'un rouge-briqueté. Les antennes ont le deſſus noirâtre & annelé de gris; le deſſous blanc, avec la maſſue toute noire.

Le principal caractère diſtinctif de cette heſpérie, c'eſt d'avoir le troiſième entrecoupé blanc de la frange des ailes ſupérieures plus large que tous les autres.

Elle ſe trouve au printemps & en été dans l'Autriche, la Suiſſe, le midi & le centre de la France, &c. Elle habite auſſi les environs de Paris, mais elle y eſt rare.

145. Hespérie Plain-chant.

Hesperia Teſſelum (1).

Heſp. alis fuſcis : anticis ſtrigâ flexuoſâ è maculis quadratis albis alterôque ante marginem obſoletâ : poſticis ſubtùs vireſcenti-fuſcis, faſciis macularibus albis; maculâ marginali ab apice ſecundâ longiore intùſque acuto-bifidâ.

Papilio Teſſelum. Ochsen. *Pap. Eur. edit.* 2. *tom.* 1. *p.* 205. *n°.* 4.

Heſperia Teſſelum, *alis ſubdentatis, divaricatis, fuſcis, maculis quadratis punctiſque albis : poſticis ſuprà puncto baſeos faſciiſque duabus macularum albarum; ſubtùs vireſcentibus, puncto*

(1) Les noms de *Teſſelum*, *Fritillum*, *Aveus* & *Alveolus*, impoſés par les auteurs à des eſpèces de cette diviſion, ne peuvent guère ſe rendre en français que par les mots *damier* & *échiquier*, mots déjà employés pour déſigner d'autres diurnes; c'eſt pourquoi nous les avons rendus par des équivalens.

baſeos, faſciâ mediâ maculiſque marginalibus albidis. Ochsen. *Pap. Eur. edit.* 2. *tom.* 4. *pag.* 157. *n°.* 3.

Papilio Teſſelum. Hubn. *Pap. tab.* 93. *fig.* 469. 470. (Mas.)

Papilio Carthami. Hubn. *Pap. tab.* 143. *fig.* 726-723.

Papilio P. U. *Fritillum.* (Var. major.) Fab. *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 91. *n°.* 824.

Heſperia U. *Fritillum.* (Var. major.) Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 351. *n°.* 336.

Le Plain-chant. Geoff. *Hiſt. Inſ. tom.* 2. *p.* 67. *n°.* 38.

Le Bigarré. Engram. *Pap. d'Europe, tom.* 1. *p.* 330. *pl.* 7. *Suppl.* 3. *fig.* 97. *quint.*

Heſpérie Plain-chant. God. *Hiſt. nat. des lépid. de France, tom.* 2 (par correction), *pag.* 221. *pl.* 12. *fig.* 4. 5. (Le mâle.)

Heſpérie Plain-chant. God. *Tabl. méthod. des lépid. de France*, Diurnes, *p.* 62. *n°.* 183.

Cette heſpérie répond, ſuivant nous, au véritable *Plain-chant* de Geoffroy & au *Fritillum var. major* de Fabricius.

Elle a de quatorze à quinze lignes d'envergure. Le deſſus des ailes eſt d'un brun-noirâtre, avec deux ſéries tranſverſes de taches blanches. La ſérie antérieure des premières ailes eſt flexueuſe, plus apparente, compoſée de taches carrées, & précédée intérieurement de deux autres taches blanches, dont une en forme d'*i* ſur le diſque, une ronde & ſouvent moins apparente vers le milieu du bord interne. Outre cela, la frange de toutes les ailes eſt entrecoupée de blanc & de brun, & il y a ſur la côte des ſupérieures quatre petits traits blancs conſécutifs.

Le deſſous des ailes ſupérieures eſt d'un gris-noirâtre, avec des taches blanches comme en deſſus, mais plus rapprochées, notamment celles du bord.

Le deſſous des ailes inférieures eſt d'un brun-verdâtre, avec trois bandes blanches, tranſverſes & maculaires, dont l'intermédiaire très-inégale; la poſtérieure marginale, mouchetée de noirâtre, excepté ſur la ſeconde tache à partir de l'angle externe: cette tache eſt plus longue que toutes celles de l'extrémité, & elle a le ſommet ou le bout intérieur aigu & bifide. Les antennes ſont noires & annelées de blanc; leur maſſue a le deſſous d'un ferrugineux-foncé, caractère qui ſert encore à diſtinguer cette eſpèce de l'heſpérie *Fritillaire.*

Dans les prés & dans les jardins, au printemps & en été. Elle eſt commune aux environs de Paris.

Nota. Quoique nous n'ayons point vu le *P. Carthami* de Hubner, nous l'avons rapporté ici, parce que M. Ochſenheimer aſſure que c'eſt le même que ſon *Teſſelum.*

146. Heſpérie Fritillaire.

Hesperia Fritillum.

Heſp. alis fuſcis: anticis ocello centrali ſtrigâque flexuoſâ è maculis quadratis albis: poſticis ſubtùs virescenti-fuſcis, faſciis macularibus albis; maculâ marginali ab apice ſecundâ breviori intùſque obtuſâ.

Papilio P. U. Malvæ, *alis denticulatis, divaricatis, nigris, albo maculatis.* Linn. *Syſt. Nat. edit.* 12. *tom.* 2. *p.* 795. *n°.* 267.

Papilio P. R. Malvæ, *alis denticulatis, divaricatis, nigris, albo punctatis.* Linn. *Faun. Suec. edit.* 2. *p.* 285. *n°.* 1081. — *Faun. Suec. edit.* 1. *p.* 241. *n°.* 794.

Roes. *Inſ. part.* 1. *claſſ.* 2. *Pap. diurn. tab.* 10. *fig.* 7.

Papilio Malvæ. Esp. *Pap. Eur. part.* 1. *tab.* 23. *fig.* 2. a.

Papilio Malvæ. Devill. *Ent. Linn. tom.* 2. *p.* 80. *n°.* 161.

Papilio P. U. Fritillum, *alis integris, divaricatis, nigris, albo punctatis.* Fab. *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 91. *n°.* 824.

Heſperia U. *Fritillum.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 351. *n°.* 336.

Papilio Fritillum, *alis integris, divaricatis, fuſcis: anticis maculis quadratis; poſticis ſupràalbido, ſubtùs virescenti albòque variis.* Ochsen. *Pap. Eur. edit.* 2. *tom.* 1. *p.* 207. *n°.* 6.

Heſperia Fritillum, *alis fuſcis, punctis albis anticis faſciâ ſinuatâ è maculis quadratis albis: ſubtùs griſeo-olivaceis, albo variegatis, faſciâ mediâ irregulari albâ diſtinctiori.* (Major.) J. W. Dalman, *Extr. des Mém. de l'Acad. de Stockholm* (année 1816), *n°.* 7 *du genre* Heſperia.

Papilio Alveus. Hubn. *Pap. tab.* 92. *fig.* 461. (Mas.) *fig.* 462. 463. (Fœm.)

Le Plain-chant. Engram. *Pap. d'Eur. tom.* 1. *pl.* 46. *fig.* 97. c. d.

Heſpérie Plain-chant. Latr. *nouv. Dict. d'Hiſt. nat. édit.* 2. *tom.* 14.

Heſpérie Fritillaire. God. *Hiſt. nat. des lépid. d. France, tom.* 2. *p.* 223. *pl.* Bb. XXVIII. *fig.* 1. 2.

Heſpérie Fritillaire. God. *Tabl. méthod. des lépid. de France*, Diurnes, *p.* 62. *n°.* 184.

C'eſt à cette heſpérie que ſe rapportent, ſelon nous, le *Papilio Malvæ* de Linnæus, & le *Fritillum* proprement dit de Fabricius.

Elle a de douze à treize lignes d'envergure. Le deſſus des ailes eſt d'un brun-noirâtre, avec une ſérie tranſverſe de taches blanches carrées aux ſupérieures, avec deux ſéries moins diſtinctes aux inférieures. La ſérie des ailes ſupérieures eſt flexueuſe, & précédée intérieurement de quatre taches blanches, dont trois formant une ſorte d'œil ſur le diſque, la quatrième avoiſinant le milieu du bord interne. Outre cela, la frange de toutes les ailes eſt entrecoupée de blanc & de brun, & il y a ſur la côte des ſupérieures quatre petits traits blancs confécutifs.

Le deſſous des ailes ſupérieures eſt d'un gris-noirâtre, avec une ſérie de taches blanches & un petit œil comme en deſſus.

Le deſſous des ailes inférieures eſt d'un brun plus ou moins verdâtre, avec trois bandes blanches, maculaires & tranſverſes, dont l'intermédiaire très-inégale; la poſtérieure marginale, mouchetée de noirâtre, excepté cependant ſur la ſeconde tache à partir de l'angle externe. Cette tache eſt moins longue que celles avec leſquelles elle s'aligne, & elle a le ſommet, ou ſi l'on veut le bout intérieur, obtus. Les antennes ſont noires & annelées de blanc en deſſus; elles ſont blanchâtres en deſſous, avec la maſſue d'un ferrugineux-jaunâtre.

Se trouve en juin & en août dans les lieux ſecs & incultes. Elle habite preſque toute l'Europe, & elle eſt commune aux environs de Paris.

147. Hespérie du Chardon.

Hesperia Cardui.

Hesp. alis ſuprà nigro-fuſcis : anticis ſtrigis tribus flexuoſis è maculis albis : poſticis ſubtùs olivaceo-fuſcis, maculis plurimis albis, mediâ coſtali multò majore.

Papilio Alveolus, *alis integris, divaricatis, nigris, albo maculatis punctatiſque : poſticis ſubtùs virescentibus, maculis punctiſque albis.* Ochsen. *Pap. Eur. edit. 2. tom. 1. p. 208. n°. 7.*

Papilio Alveolus. Hubn. *Pap. tab. 92. fig. 466. 467.*

Papilio Fritillum. Hubn. *Pap. tab. 464. 465.* (Var. fœm.)

Papilio Alveolus. Hubn. *Pap. tab. 116. fig. 597.* (Var.)

Papilio Alveolus. Illig. *Mag. tom. 3. p. 183.*

Papilio Malvæ minor. Esp. *Pap. Eur. part. 1. p. 545. tab. 36. Suppl. 12. fig. 5.*

Papilio Malvæ, var. Esp. *Pap. Eur. part. 1. tab. 51. fig. 2.*

Heſperia Malvæ, *alis nigris, punctis maculiſque quadratis albis, numeroſis : poſticis ſubtùs griſeo-olivaceis, albo punctatis maculatiſque, maculâque marginis anterioris majore.* (Minor.) J. W. Dalman, *Extrait des Mém. de l'Acad. de Stockholm* (année 1816), *n°. 6 du genre* Hesperia.

Papilio Althææ. Borkh. *Pap. Eur.* (Var.)

Papilio Taras. Bergstr. *tab. 91. fig. 5. 6.* (Var.)

Papilio P. U. Lavateræ, *alis integris, fuſcis : anticis albo maculatis, poſticis punctatis : omnibus lunulâ mediâ niveâ.* Fab. *Mant. Inſ. tom. 2. p. 91. n°. 825.* (Var.)

Heſperia U. *Lavateræ.* Fab. *Entom. Syſt. em. tom. 3. pars 1. p. 353. n°. 339.* (Var.)

Papilio P. U. *Lavateræ.* Petag. *Inſtit. Ent. tom. 1. p. 494. n°. 147.* (Var.)

Le Tacheté. Engram. *Pap. d'Europe, tom. 1. pl. 7. Suppl. 3. fig. 97. a. b. tert.*

Le Plain-chant, var. Engram. *Pap. d'Europe, tom. 1. pl. 46. fig. 97. g. h.* (Var.)

Heſpérie du Chardon. God. *Hiſt. nat. des lépid. de France, tom. 2* (par correction), *pag. 229. pl. 12. fecund. fig. 4.*

God. *Hiſt. nat des lépid. de France, tom. 2. p. 233.* Observation. (Var.)

Heſpérie du Chardon (*Alveolus*). God. *Tabl. méthod. des lépid. de France,* Diurnes, *p. 63. n°. 185.*

Ce lépidoptère eſt pour M. Dalman le véritable *Papilio Malvæ* de Linnæus, attendu, ſelon lui, qu'il n'y a en Suède aucune autre eſpèce voiſine avec laquelle on puiſſe le confondre. Nous n'adoptons pas proviſoirement l'opinion de M. Dalman, parce qu'il nous ſemble bien étonnant que l'heſpérie *Fritillaire* ou *Fritillum*, à laquelle nous avons rapporté ce même papillon *Malvæ*, n'habite pas la Suède, tandis qu'elle ſe trouve dans le nord de l'Allemagne & en Laponie; parce que d'ailleurs Linnæus, en citant les figures de Roëſel & de Schæffer, & en aſſignant à ſon papillon *Malvæ* la même taille qu'à l'*Argus* proprement dit, nous paroît avoir eu en vue une eſpèce plus grande que celle dont il eſt ici queſtion.

L'heſpérie du *Chardon* a de dix à onze lignes d'envergure. Le deſſus de ſes ailes eſt d'un brun-noir, avec trois ſéries tranſverſes de taches blanches aux ſupérieures, avec deux, dont l'antérieure plus courte aux inférieures. Les deux ſéries antérieures des premières ailes ſont flexueuſes, plus diſtinctes, compoſées de taches quadrangulaires, & ſéparées l'une de l'autre par une lunule centrale blanche. Indépendamment de cela, la frange de toutes les ailes eſt entrecoupée de blanc & de brun.

Le deſſous des ailes ſupérieures eſt d'un brun-noirâtre, avec des taches blanches répondant à celles du deſſus, mais un peu plus grandes.

Le

Le deſſous des ailes inférieures eſt d'un brun plus ou moins olivâtre, avec des taches blanches formant trois rangées tranſverſales. La tache qui occupe le milieu du bord d'en haut eſt irrégulière & beaucoup plus grande que les autres. Le corps eſt d'un brun-noirâtre. Les antennes ſont noires & annelées de blanc en deſſus; elles ſont blanches en deſſous, avec la maſſue ferrugineuſe.

Quelquefois le deſſous des ſecondes ailes offre moins de taches blanches à la rangée du milieu, comme dans la variété femelle que Hubner a figurée ſous le nom de *Fritillum*.

On rencontre aſſez ſouvent une autre variété chez laquelle les taches du milieu des premières ailes ſont réunies de manière à former une large bande blanche ſur laquelle il y a un eſpace noir marqué d'un croiſſant blanc. Cette ſeconde variété eſt, ſans contredit, le *papilio Lavateræ* de Fabricius. Elle répond : au *P. Malvæ*, *var.* d'Eſper, au *P. Althææ* de Borkhauſen, au *P. Turis* de Bergſtraſſer, au *P. Alveolus* de Hubner, *tab.* 116, *fig.* 597, & au *Plain-chant*, *var.* d'Engramelle, *pl.* 46. *fig.* 97. g. h.

Dans les bois & dans les lieux arides, au printemps & en été. On la trouve communément aux environs de Paris. Elle ſe repoſe de préférence ſur le *chardon à bonnetier*.

148. Hespérie Vindex.

Hesperia Vindex.

Heſperia alis anticis utrinquè poſticiſque ſuprà nigris; his ſubtùs faſciis fuſco-luteſcentibus albidiſque alternis, ſuprà faſciâ ſubcentrali albâ; illis maculis plurimis ſparſis punctorumque ſerie poſticâ albis.

Papilio Vindex. Cram. *Pap.* 30. *pl.* 253. G. H.

Son envergure n'eſt guère que de dix lignes. Le deſſus du corps eſt noir; ſon deſſous & les antennes ſont blanchâtres. Le deſſus des ailes ſupérieures eſt noir, avec quelques petits traits à la côte, ſept à huit petites taches éparſes ſur toute ſa ſurface, dont les unes oblongues & les autres arrondies & même punctiformes, & une rangée de points près du bord poſtérieur, blancs; le deſſous offre le même deſſin, mais la côte & le ſommet ſont d'un cendré-jaunâtre-pâle, & le noir du fond eſt moins foncé. Le deſſus des ailes inférieures eſt noir, avec une petite bande oblique, maculaire ou divifée intérieurement, & la frange poſtérieure, blanches; entre elle & la bande, l'on voit auſſi des taches de cette couleur, tantôt rares & peu apparentes, tantôt nombreuſes & diſpoſées en une ſérie. Le deſſous de ces ailes eſt blanchâtre & même tout-à-fait blanc au bord interne; mais cette couleur eſt divifée alternativement & tranſverſalement, en manière de bandes, par une teinte d'un jaunâtre-obſcur, formant trois bandes, & dont les deux de la baſe convergent & ſe réuniſſent intérieurement; le limbe poſtérieur, ou la dernière bande, eſt d'un gris-jaunâtre.

Elle ſe trouve au Cap de Bonne-Eſpérance.

149. Hespérie Galba.

Hesperia Galba.

Heſperia alis ſuſcis, ſubtùs dilutioribus; omnibus punctorum ſerie duplici poſticâ, anticis maculis plurimis ſparſis, poſticis faſciis duabus albis.

Heſperia U. Galba, *alis integris, divaricatis, nigris, albo punctatis: poſticis ſubtùs griſeis, faſciis duabus albis.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 352. *n°.* 337.

C'eſt, de toutes les eſpèces que je connois, la plus petite de ce genre. Le corps eſt varié de noirâtre & de blanc. Les ailes ſont noirâtres, luiſantes, d'une teinte plus claire en deſſous, particulièrement ſous les inférieures & au bord extérieur des ſupérieures, & entièrement tachetées ou ponctuées de blanc, ſur les deux ſurfaces; leur limbe poſtérieur offre deux ſéries tranſverſes de points, dont la dernière entrecoupe la frange. Sur les ailes inférieures, les taches qui précèdent forment deux bandes tranſverſes, dont la ſeconde, placée près du milieu, eſt plus grande & même continue en deſſous. Parmi les taches des ailes ſupérieures, trois d'entr'elles ſont rangées, à partir de la baſe, en une ſérie longitudinale; quatre autres très-petites & contiguës forment une petite ligne tranſverſe, près de cette côte, à la ſuite des précédentes.

Cette eſpèce pourroit bien être le *P. Spio* de Linnæus. (*Voyez* les remarques ſur des eſpèces douteuſes ou inconnues, terminant ce genre.) On la trouve à Tranquebar & au Bengale.

150. Hespérie Syrichtus.

Hesperia Syrichtus.

Heſperia alis ſuprà nigris, pube, maculis teſſellatim diſpoſitis ſtriſque coſtalibus albis; anticis ſubtùs ferè concoloribus; poſticis ibidem albis, ſtrigis undatis nigris; omnium limbo poſtico utrinquè albo punctato.

Heſperia U. Syrichtus, *alis rotundatis, integris, nigro albòque variis; poſticis ſubtùs cinereis, ſtrigis undatis nigris.* Fab. *Ent. Syſt. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 349. *n°.* 326.

Papilio P. U. Syrichtus. *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 90. *n°.* 816. — *Spec. Inſ. tom.* 2. *p.* 137. *n°.* 654. — *Syſt. Ent. p* 534. *n°.* 395.

Papilio Orcus. Cram. *Pap.* 28. *pl.* 334. I-L.

Linnæus, dans ſon *Syſtema Naturæ* (tom. 2. p. 795.) avoit décrit ſous le nom ſpécifique d'*Ci-*

leus, une espèce de polyommate trouvée à Alger. Cramer l'a faussement citée pour synonyme de son papillon *Orcus*, & Fabricius, à partir de son *Mantissa*, a continué de reproduire cette erreur.

Cette hespérie a environ un pouce d'envergure. Les antennes sont noires, avec des anneaux blancs, & se terminent par une massue arquée & peu pointue. Le corps est varié de noir & de blanc. Le dessus des ailes est d'un noir plus ou moins foncé, mais tout coupé par une infinité de petites taches, formant pour la plupart, & notamment sur les inférieures, des séries transverses; le bord postérieur est noir, avec une ligne transverse de points blancs; sa frange est entrecoupée alternativement des mêmes couleurs; les deux bords de la côte des ailes antérieures sont blancs & forment ainsi deux raies longitudinales; au bout sont aussi des stries de cette couleur, mais très-courtes & obliques. Le dessous de ces ailes diffère peu du dessus; mais celui des inférieures est en majeure partie blanc ou blanchâtre & coupé transversalement par des lignes noires, très-flexueuses, & qui généralement rapprochées deux par deux, y forment des bandes transverses. Leur bord postérieur, ainsi que celui des supérieures, vu du même côté, n'offre qu'une ligne noire, très-fine, au-dessus de laquelle est la rangée dont nous avons parlé.

Elle se trouve au Brésil, à Cayenne & à Surinam.

151. Hespérie Tryxus.

Hesperia Tryxus.

Hesperia alis anticis posticisque supra fuscis, fascia transversa è maculis variis, angulosis, compositâ; posticis subtùs albidis, punctorum fuscorum serie terminali.

Papilio Tryxus. Cram. *Pap.* 28. *pl.* 334. G. H.

Elle avoisine évidemment les *H. Syrichtus*, *Arsalte*, & plus spécialement encore le *P. Afychis* de Cramer. Les ailes supérieures & le dessus des inférieures sont noirâtres; leur milieu offre une bande commune & transverse, d'un blanc-transparent, & formée de taches de grandeur & de forme diverses, & la plupart anguleuses: celles des ailes inférieures semblent y être divisées en en deux séries; deux des supérieures, celle du milieu surtout, sont plus grandes. Les premières ailes ont de plus une ligne de points transparens, située, comme à l'ordinaire, près de la côte, avant le sommet; près de leur base est encore un autre point transparent, mais isolé; dans quelques individus, les ailes inférieures offrent son correspondant. En dessous, ces ailes sont blanchâtres, avec une rangée de petites taches noirâtres, triangulaires ou presque lunulées, près du bord postérieur. Celui des ailes supérieures présente aussi, sur la même surface, les vestiges de taches semblables & disposées de même; le côté interne est blanchâtre.

Elle se trouve au Brésil & à Surinam.

152. Hespérie Arsalte.

Hesperia Arsalte.

Hesperia alis albis, margine postico nigro striato.

Hesperia U. Menalcas, *alis integerrimis concoloribus, albis: margine nigro.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 353. *n°.* 340.

Papilio P. U. Menalcas. *Mant. Inf. tom.* 2. *pag.* 91. *n°.* 826. — *Spec. Inf. tom.* 2. *pag.* 138. *n°.* 639. — *Syst. Ent. p.* 535. *n°.* 397.

Papilio P. D. Arsalte, *alis integerrimis, rotundatis, albis: striis marginalibus nigris; anticis basi flavescentibus.* Linn. *System. Nat. ed.* 12. *tom.* 2. *p.* 762. *n°.* 91. — *Mus. Lud. Ulr. p.* 246. *n°.* 265.

Papilio Arsalte. Clerck, *Icon. Inf. tab.* 23.

Papilio Niveus. Cram. *Pap.* 2. *pl.* 22. C.

Je rends à cette espèce le nom que Linnæus lui avoit imposé, & que Cramer & Fabricius auroient aisément reconnue si, sans avoir égard à la division où il l'avoit placée, ils avoient lu la description qu'il en donne, & consulté la figure de Clerck, à laquelle il renvoie.

L'envergure des ailes de cette espèce est de près d'un pouce & demi. Les antennes sont noires & terminées en une massue simplement arquée. Le corps est noir, mais couvert en majeure partie de poils ou d'écailles blancs. Les ailes sont d'un blanc-chatoyant, avec une ligne fine le long du bord postérieur, & d'autres lignes qui la coupent presque perpendiculairement en manière de stries, & formées par les extrémités postérieures de nervures, noires ou noirâtres; cette couleur s'étend davantage au sommet des ailes supérieures, en sorte que cet espace, & même la portion avoisinant la côte, présente alternativement des raies noires & des raies blanches, & le plus souvent aussi une rangée de points blancs au-dessus de la ligne noire du bord postérieur. On voit encore quelquefois une rangée semblable de points près du bord postérieur des inférieures; sur le dessous de ces ailes, plusieurs des nervures longitudinales, particulièrement la plus extérieure, sont noires dans presque toute leur étendue. La côte des ailes supérieures est quelquefois noirâtre antérieurement; en dessous, elle est toujours roussâtre à son origine.

Elle se trouve au Brésil & dans toute la Guyane.

N. B. Fabricius rapporte avec doute à son *H. Maimon*, la figure précitée de Cramer; mais il est bien évident que ce sont deux espèces très-

distinctes. Celle de Fabricius se rapprocheroit davantage des papillons *Asychis* & *Tryaus* de ce dernier, *Pap.* 28, *pl.* 334, E-II ; mais il nous est impossible, dans ce moment, de prononcer à cet égard : il en sera de même de son *H. Menippus*. Ne pouvant, d'après les seules descriptions, faire ressortir, par opposition, les caractères de cette espèce, nous sommes forcés de les exclure du tableau.

153. Hespérie Dioscoride.

Hesperia Dioscorides.

Hesperia alis suprà fuscis, strigis duabus, macularibus, flavis ; anticis infrà fulvis, disco fusco flavo maculato ; posticis subtùs flavis, fusco undatis.

Hesperia U. Dioscorides, *alis integerrimis, flavo maculatis ; posticis subtùs flavis, fusco undatis.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 329. *n°.* 250.

Elle est une fois plus petite que l'*H. Métis*. Son corps & le dessus des ailes sont noirâtres. Cette surface offre sur les unes & les autres deux raies jaunes ; le milieu des supérieures a, en outre, un point de cette couleur ; leur dessous est fauve, avec le disque noirâtre, tacheté de jaune. Le dessous des inférieures est de cette couleur, avec plusieurs ondulations noirâtres.

Elle se trouve à Tranguebar.

Il nous paroît que cette espèce a de grands rapports avec le *P. Edipus* de Cramer, *Pap.* 31, *pl.* 166, E, F, & qu'il dit être du Cap de Bonne-Espérance.

154. Hespérie Mœvius.

Hesperia Mœvius.

Hesperia alis suprà nigris, lineis fasciâque maculari flavescentibus : subtùs virescentibus, striis maculisque albis.

Hesperia U. Mœvius, *alis integris, suprà nigris, subtùs virescentibus, utrinquè lineis maculisque albidis.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 352. *n°.* 338.

Suivant Fabricius, elle a le port & la grandeur de l'*H. Galba*. Ses antennes sont noires, avec des anneaux blancs. Le dessus des ailes est noir, & celui des supérieures offre à sa base deux ou trois lignes jaunâtres, & postérieurement une bande maculaire de cette couleur. Le dessus des inférieures ne diffère du précédent qu'en ce que sa base n'a qu'une seule ligne. Le dessous des quatre ailes est verdâtre, avec des stries & des taches blanches.

Elle habite les Indes orientales.

155. Hespérie Cicéron.

Hesperia Cicero.

Hesperia alis fuscis ; anticis maculis, posticisque disco subhyalino-albis ; harum maculâ discoïdali dentatâ, subtùs maculâ fuscâ notatâ.

Hesperia U. Cicero, *alis rotundatis, fuscis : anticis maculis, posticis disco albo-hyalinis.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 338. *n°.* 287.

Papilio Folus. Cram. *Pap.* 7. *pl.* 74. F.?

Cette espèce, de grandeur moyenne, a le corps noirâtre en dessus & blanc en dessous. Les ailes sont noirâtres, un peu plus claires en dessous, & même un peu brunes, du moins dans quelques individus, au côté externe, & tachetées de blanc ; ces taches sont demi-transparentes ; il y en a cinq sur les supérieures, deux au milieu, & dont l'inférieure, plus grande & échancrée au côté interne, & les trois autres petites, disposées en triangle entre les précédentes & le sommet. La plus voisine de la côte est partagée en trois par des nervures. Les inférieures n'ont qu'une seule tache blanche, elle occupe tout le milieu de leur surface, & ses bords sont dentés ; en dessous elle est plus anguleuse, semble se prolonger vers la base, & offre vers le côté interne une tache noirâtre, arrondie, ayant extérieurement un petit prolongement en manière de queue. Sur le limbe noirâtre, du côté extérieur, est un point blanc ; le côté opposé est grisâtre, & cette couleur s'étend même au-dessous de la tache discoïdale, & gagne l'autre bord. Le bord postérieur des quatre ailes est entrecoupé de petites taches blanches.

Elle se trouve à Java. Le *P. Folus* de Cramer, vu en dessus, ressemble parfaitement à cette espèce ; mais il le dit de Surinam.

156. Hespérie Népos.

Hesperia Nepos.

Hesperia alis anticis utrinquè posticisque suprà fusco-nigris, maculis punctisve atris ; illis albo-hyalino punctatis ; his, latere externo excepto, subtùs albis, suprè ad angulum ani cinerascentibus, fimbriâ posticâ albâ.

Hesperia U. Nepos, *alis rotundatis nigris : anticis albo punctatis, posticis suprà angulo ani, subtùs disco albis.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 340. *n°.* 292.

Papilio Nepos. Jon. *Fig. pict.* 6. *tab.* 79. *fig.* 2.

Papilio Japetus. Cram. *Pap.* 31. *pl.* 365. E. F. Daur. *Inf. tom.* 3. *pl.* 17. *fig.* 1. 2.

Elle est de la taille de l'*H. Cicéron*. Le corps est noirâtre en dessus & blanc en dessous. Les antennes sont noires, avec la massue grêle, alongée, arquée & en partie brune. Les ailes supérieures & le dessus des inférieures sont d'un noirâtre foncé, avec des taches & des points noirs, qui paroissent davantage sur celles-ci. Les supérieures

ont de petites taches, la plupart en forme de points blancs & transparens; il y en a trois au milieu, dont la supérieure, la plus grande de toutes, est échancrée de chaque côté; les autres, toutes punctiformes, sont au nombre de quatre, & forment une petite ligne transverse & arquée près de la côte, avant le sommet; l'espace situé au dessous de ces taches est un peu plus clair. En dessus, les ailes inférieures sont plus foncées ou noires au côté extérieur; leur disque offre trois petites taches arrondies, de cette couleur, & disposées transversalement en arc de cercle; le limbe postérieur, vers l'angle anal, est cendré; la frange postérieure est blanche; le dessous est de cette couleur, mais avec une teinte bleuâtre: le côté extérieur est noirâtre & plus foncé vers sa jonction avec le bord postérieur; près de ce bord est une ligne noirâtre interrompue, ou divisée en trois ou quatre points noirs; on voit aussi près du côté extérieur trois autres points de cette couleur, mais plus grands, l'intermédiaire surtout, plus ronds, & disposés en une série longitudinale.

Elle se trouve à Java, à l'île d'Amboine, &c., & m'a été envoyée par M. Roger, de Bordeaux, & par M. Westermann, naturaliste anglais qui a enrichi ma collection d'un grand nombre d'espèces des Indes orientales.

157. Hespérie Philémon.

Hesperia Philemon.

Hesperia alis immaculatis, suprà holosericeo-atris, nitidis, subtùs brunneo-fuscis, anticarum margine interno dilutiore; antennis alboannulatis.

Hesperia U. Philemon, *alis rotundatis, integris, atris, immaculatis, antennis uncinatis.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 346. *n°.* 314.

Papilio P. U. Philemon. *Mant. Inf. tom.* 1. *p.* 89. *n°.* 812. — *Spec. Inf. tom.* 2. *p.* 136. *n°.* 631. — *Syst. Ent. p.* 534. *n°.* 592.

Papilio Flyas. Cram. *Pap.* 28. *pl.* 328. E.

Drur. *Inf. tom.* 1. *pl.* 19. *fig.* 5. 6.

Elle est de taille moyenne, entièrement noire, à l'exception de la surface inférieure des ailes qui est d'un noirâtre-brun & plus clair au côté interne des ailes supérieures. Les antennes sont finement annelées de blanc.

Elle se trouve au Brésil & aux Antilles.

Dans le *P. Corbulo* de Cramer, *Pap.* 30, *pl.* 334 A, espèce très-voisine, le limbe postérieur & supérieur des ailes est plus clair & un peu bleuâtre; le dessous des ailes inférieures est d'un brun-pâle.

Une autre espèce de Cramer, venant près de celles-ci, est son *P. Otreus, Pap.* 28. *pl.* 328. F. Ses ailes sont d'un brun-noirâtre, avec des bandes plus foncées, transverses & ondulées. L'île de Java fournit une autre espèce semblable (*nigrita*) à la précédente, mais d'une teinte entièrement uniforme.

158. Hespérie Jovien.

Hesperia Jovianus.

Hesperia alis anticis nigris, fasciâ maculari, albo-hyalinâ; posticis coruleis, fasciâ albâ, venis limboque externo nigris.

Hesperia U. Jovianus, *alis concoloribus, atris: posticis caruleo alboque radiatis.* Fab. *Entom. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 348. *n°.* 324.

Papilio Jovianus. Jon. *Fig. pict.* 6. *tab.* 93. *fig.* 2.

Papilio Jovianus. Donov. *of an Epit. of the Nat. Hist. of the Inf. of Ind.* 3. *pl.* 1. *fig.* 1.

L'envergure de cette espèce est d'environ seize lignes. Son corps est varié de noir, de bleuâtre & de blanc. Dans les individus mâles, les palpes extérieurs sont presque safranés, tandis que ceux des femelles ou du moins de quelques autres individus sont blancs. Les ailes supérieures présentent aussi des différences. Leur milieu offre constamment une bande courte, transverse, oblongue, blanche & transparente, composée de trois à quatre taches, dont une très-petite, occupant la bifurcation d'une nervure transverse, & située vers le milieu du bord postérieur de cette bande; mais quelques individus (les femelles, à ce qu'il me paroît) ont, en outre, avant le sommet, une ligne transverse de quatre points blancs & transparens. Le limbe postérieur a sur les deux surfaces une rangée plus ou moins prononcée de taches linéaires ou de petites stries parallèles, bleues; on en voit d'autres, en forme de rayons, à la base de ces ailes, dans les individus mâles, ou ceux où les points blancs du bout manquent. Le disque des ailes inférieures présente, entre leur base & le centre, une bande transverse de taches blanches, longues, étroites; dans les individus mâles, il n'y a qu'une seule tache blanche, & en forme de bande longitudinale, oblique & elliptique; elle est assez rapprochée du bord extérieur, part de la base & se termine au limbe postérieur.

Cette jolie espèce m'a été envoyée du Brésil par M. Langsdorff.

159. Hespérie Salvien.

Hesperia Salvianus.

Hesperia alis suprà fuscis, viridi maculatis; posticis subtùs albis, punctorum fuscorum strigâ marginali.

Hesperia U. Salvianus, *alis integerrimis, fuscis, viridi maculatis; posticis subtùs albis, strigâ marginali punctorum fuscorum.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 348. *n°.* 325.

Papilio Salvianus. Jon. *Fig. pict.* 6. *tab.* 94. *fig.* 4.

Papilio Salvianus. Donov. *of an Epit. of the Nat. Hist. of the Inf. of Ind.* 5. *pl.* 1 *fig.* 2.

Cette eſpèce eſt de moyenne grandeur & a le deſſus du corps & des ailes noirâtre ; près de leur bord poſtérieur eſt une rangée de points plus foncés. Le deſſus des ailes inférieures préſente deux bandes maculaires vertes, mais dont la poſtérieure plus étroite & en forme de raie ; le milieu du deſſus des ſupérieures eſt traverſé d'une bande de la même couleur, & offre en outre, près de la baſe & du ſommet, des taches pareillement vertes. Sur le deſſous de ces ailes eſt une large bande blanche ; celui des inférieures eſt de la même couleur, avec une rangée de points noirâtres.

On la trouve aux Indes.

160. Hespérie Juvénal.

Hesperia Juvenalis.

Heſperia alis diluto-ſuſcis : limbo poſtico punctorum albidorum fuſcorumve ſubocellatorum ſtrigis ; alis anticis punctorum hyalinorum, fuſco marginatorum ſerie tranſverſâ.

Heſperia U. Juvenalis, *alis ecaudatis, fuſcis : anticis atro maculatis alboque punctatis.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 335. *n°.* 291.

Papilio Juvenalis. Jon. *Fig. pict.* 6. *tab.* 78. *fig.* 1.

Papilio Juvenalis. Smith-Abbot, *Hiſt. Nat. des lépid. de la Georg. tom.* 1. *p.* 41. *tab.* 21.

Elle a quelqu'analogie avec notre *H. Tages*, & plus encore avec le *P. Bromius* de Stoll, *Suppl. pl.* 8. *fig.* 1. Son envergure eſt d'environ un pouce & demi. Le fond de la couleur des ailes eſt d'un noirâtre-brun, tantôt plus clair, tantôt plus foncé ; leur limbe poſtérieur offre deux ou trois lignes tranſverſes de petites taches arrondies, blanchâtres, bordées de noirâtre ; lorſque le fond eſt plus clair, pluſieurs de ces taches, & particulièrement celles de la rangée antérieure des ailes inférieures, deviennent oculaires ; cette rangée eſt courbe ou ſinuée ; elle eſt remplacée ſur les ailes ſupérieures par des points tranſparens, au nombre de cinq à ſept, variant en grandeur, & dont la ſérie eſt interrompue au milieu ; en avant & près du milieu de la côte eſt un autre point tranſparent. La maſſue des antennes eſt inſenſiblement arquée & rouſſâtre.

La chenille eſt verdâtre, avec le deſſus de la tête biſide ou bicornue. Elle vit ſur la *glycine elliptica* & quelques autres plantes. Cette heſpérie paroît donner deux fois.

Elle ſe trouve en Georgie & dans d'autres contrées de l'Amérique ſeptentrionale ; elle vient ſouvent près des maiſons, & fréquente les lieux humides ou les bords des courans d'eau.

161. Hespérie Mimas.

Hesperia Mimas.

Heſperia alis ſuſcis, margine poſtico ferrugineo, ſubtùs punctorum nigrorum, ſtrigâ ; anticis punctis tribus approximatis albis.

Heſperia U. Mimas, *alis integerrimis, ſuſcis, margine ferrugineis, ſtrigâ punctorum nigrorum.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 349. *n°.* 329.

Papilio P. U. Mimas. *Mant. Inſ. tom.* 2. *pag.* 90. *n°.* 619. — *Spec. Inſ. tom.* 2. *p.* 137. *n°.* 656.

Papilio Mimas. Cram. *Pap.* 5. *pl.* 52. E. F.

Cette petite eſpèce eſt très-voiſine du *P. Bromius* de Stoll, de l'*H. Juvénal*, &c. Les ailes ſont noirâtres, avec des taches ou des lignes tranſverſes plus foncées, & le bord poſtérieur d'un brun-fauve ; en deſſous, cette couleur s'étend davantage, & l'on y obſerve une raie tranſverſe de points noirâtres. Les ailes ſupérieures ont près du ſommet trois points blanchâtres rapprochés en triangle.

Elle ſe trouve à Surinam & au Bréſil.

162. Hespérie Nerva.

Hesperia Nerva.

Heſperia alis anticis ſuprà ſuſcis, maculis albis aliiſque marginalibus cinereis ; poſticis ibidem atris, immaculatis ; omnibus ſubtùs flaveſcentibus, maculis albis nigriſque.

Heſperia U. Nerva, *alis integerrimis ; anticis ſuſcis, albo maculatis, poſticis ſuprà nigris, immaculatis.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 340. *n°.* 295.

Papilio Nerva. Jon. *Fig. pict.* 6. *tab.* 79. *fig.* 3.

Je n'ai point vu cette eſpèce. Selon Fabricius, ſon corps eſt petit & noirâtre. Notre phraſe ſpécifique comprend les autres détails deſcriptifs. Elle me paroît avoir beaucoup de rapports avec le *P. Paulinus* de Cramer, *Pap.* 33. *pl.* 391. G. H.

Elle ſe trouve aux Indes.

163. Hespérie Orcus.

Hesperia Orcus.

Heſperia alis anticis poſticiſque ſuprà ſuſcis ; illis punctis maculâque lunatâ albeis ; hisſuſcis ſuperis infràque cæruleſcentibus.

Heſperia U. *alis rotundatis ſuſcis : anticis flavo maculatis, poſticis ſubtùs cæruleſcentibus.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 341. *n°.* 296.

Papilio Orcus. Jon. *Fig. pict.* 6. *tab.* 91 *fig.* 4.

Papilio Orcus. Donov. *of an Epit. of the Nat. Hiſt. of the Inſ. of Ind.* 11. *pl.* 4. *fig.* 1.

Papilio Cerialis. Cram. *Pap.* 33. *pl.* 392. N. O.

Stoll, *Suppl. aux Pap. de* Cram. *pl.* 10. *fig.* 1.

Le deſſus du corps de cette heſpérie eſt noir, avec des taches & des raies blanches; ſon deſſous eſt blanchâtre. Les ailes ſupérieures ſont d'un noirâtre-foncé, avec de petites taches & des points vitrés, entre le milieu & le ſommet; la plus antérieure de ces taches eſt plus grande, preſqu'en forme de fer-à-cheval, dont l'échancrure regardant le bord poſtérieur, & ſurmontée d'un point; on diſtingue près ce bord les traces d'une raie bleuâtre; en deſſous la côte eſt auſſi, à ſa baſe, de cette couleur. Le deſſus des ailes inférieures eſt noirâtre, avec trois bandes pareillement bleuâtres, dont l'antérieure plus large, & offre ſouvent, dans ſon milieu, un point noirâtre; le deſſous de ces ailes eſt d'un bleu plus vif, avec le limbe extérieur noirâtre, & traverſé au bord poſtérieur par une ligne bleue.

Sa chenille, ſuivant Stoll, vit ſur une eſpèce de poivrier. Elle eſt d'un vert-fale, avec la tête brune, une tache ſur chaque côté de ſes anneaux, & deux lignes le long du ventre blanches.

Elle ne reſte qu'environ ſept jours en chryſalyde.

Près de cette eſpèce doivent être placés le *P. Jovianus* de Cramer, *ibid.* pl. 392 L. M., dont les ailes inférieures ſont preſqu'entièrement bleues des deux côtés, ſon *Herennius*, E. F. de la même planche, ainſi que le *P. Ophion* de Stoll, *pl.* 26, *fig.* 4. Nous penſons auſſi que l'heſpérie *Tertulien* de Fabricius (*Ent. Syſt. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 341. n°. 295) ne doit pas en être éloignée. Le deſſus de ſes ailes eſt d'un blanchâtre-foncé, avec des points plus obſcurs; les ſupérieures ont quelques points tranſparens.

Ces eſpèces habitent l'Amérique méridionale.

164. Hespérie Chlorocéphale.

Hesperia Chlorocephala.

Heſperia alis nigro ſuſcis, faſciis macularibus atris, poſticis infrà intùs cinereſcentibus; palpis capitiſque vertice ſquamis viridibus, micantibus.

M. Ladgſdorff, qui m'a envoyé cette eſpèce découverte par lui au Bréſil & dans les environs de ſon habitation, avoit remarqué qu'elle différoit des autres par les écailles ou poils d'un vert doré & brillant de l'extrémité de ſes palpes extérieurs & du ſommet de la tête. Elle eſt petite. Ses ailes offrent en deſſus quelques zônes cendrées, peu prononcées & formées de petits atomes. Leur deſſous eſt un peu plus clair; celui des inférieures a, vers le bord interne & juſqu'à l'angle anal, une teinte cendrée ou d'un brun-jaunâtre, avec des taches ou des points plus foncés.

Cette eſpèce eſt très-voiſine du papillon *Hérennius* de Cramer, 33, *pl.* 392, E, F, dont j'ai parlé à la ſuite de la deſcription de l'eſpèce précédente.

---

2. *Ailes ſupérieures ayant ſoit la côte très-arquée, ſoit l'angle du ſommet avancé en manière de crochet ou de faulx.*

Nota. Palpes extérieurs proportionnellement moins épais, plus cylindriques, plus avancés, avec le dernier article plus grand que dans les autres diviſions, quelques eſpèces de la précédente cependant exceptées. Souvent les ailes inférieures paroiſſent comme tronquées, ou ayant le bord poſtérieur très-dilaté, préſentent vers l'angle anal une concavité remarquable. Dans d'autres, leur côté extérieur eſt anguleux ou denté, & elles reſſemblent alors à celles de quelques phalènes.

Ces eſpèces, toutes propres au Bréſil & à la Guyane, repréſentent, dans cette tribu, les *Pyrales* ou les *Phalènes rouleuſes* (*tortrices*) de Linnæus.

A. *Bord poſtérieur des ailes ſupérieures preſque droit ou ſans courbure notable ni angle: le ſommet point avancé bruſquement en manière de dent ou de crochet.*

Nota. Les deux eſpèces qui compoſent cette diviſion, faiſant le paſſage de la précédente à la ſuivante, ſont par-là même ambiguës. Dans la ſeconde eſpèce, la côte des ailes ſupérieures eſt peu arquée; mais, par la forme des inférieures, elle ſe rapproche des dernières eſpèces.

a. *Côté extérieur des ailes inférieures ſans dents.*

165. Hespérie Mélandre.

Hesperia Melander.

Heſperia alis albidis, ſtrigis, maculis nerviſque plurimis ſuſcis, limbum poſticum baſinque ſæpiùs obſcurantibus; anticis punctis aliquot hyalinis.

Papilio Melander. Cram. *Pap.* 23. *pl.* 270. H.

Cette eſpèce a beaucoup d'affinité, tant par la forme des antennes que par les couleurs, avec les *H. Syrichtus*, *Arſalte* & autres analogues, & paroît appartenir, à raiſon de la courbure de la côte des ailes antérieures, aux eſpèces de notre dernière diviſion; leur ſommet cependant ne ſe termine point en manière de crochet ou de dent, comme dans l'*H. Sebaldus*, &c.

Les ailes ſont d'un blanchâtre-luiſant, particulièrement en deſſous & au milieu de la ſurface

supérieure ; cette couleur est coupée transversalement par des lignes ondulées, des taches ou des points disposés en séries transverses, & par des nervures d'un noirâtre tirant sur le brun : cette couleur domine quelquefois sur les ailes supérieures. Près de leur sommet est une série transverse de quatre points transparens, mais qui, dans des individus plus clairs, sont moins tranchés ou peu apparens. Le limbe postérieur est tantôt d'un brun-noirâtre, avec des rangées de taches blanchâtres ou d'un brun-pâle, tantôt presque blanchâtres, avec des lignes de taches noirâtres.

Elle se trouve au Brésil & à Surinam.

---

b. *Côté extérieur des ailes inférieures ayant une dent forte & aiguë.*

166. Hespérie Néarque.

Hesperia Nœarchus.

Hesperia alis suprà fuscis, subtùs pullis, utrinquè lineis saturationibus.

Hesperia Nearchus. Latr. *Rec. d'observat. de Zool. & d'Anat. comp. de* MM. de Humboldt & Bonpl. *part.* 2. *p.* 135. *pl.* 43. *fig.* 3. 4.

Son envergure est d'environ deux pouces ; le crochet de leurs antennes est fortement replié en dehors. Le corps & le dessus des ailes sont d'un brun-noirâtre très-foncé, avec des lignes noires, nombreuses & ondulées ; le dessous est d'un brun plus clair, & offre aussi des lignes & des traits transverses plus foncés que le fond. Le côté extérieur des ailes inférieures présente une faillie en manière de dent forte & aiguë.

Cette espèce a été apportée de l'Amérique méridionale par MM. de Humboldt & Aimé Bonpland. Elle se trouve aussi au Brésil.

B. *Bord postérieur des ailes supérieures soit fortement arqué, soit anguleux ; le sommet avancé ou terminé brusquement en manière de crochet ou de faulx.* (*Ailes inférieures comme tronquées postérieurement, ou très-concaves à l'angle anal.*)

a. *Côté extérieur des ailes inférieures, denté ou anguleux.*

167. Hespérie Westermann.

Hesperia Westermann.

Hesperia alis suprà cinereo-fuscis, vel fusco-brunneis, infrà brunneis, utrinquè lineis undulatis, transversis, obscurioribus ; anticis punctis subcostalibus vitreis : posticis processu externo bidentato.

J'ai déjà cité M. Westermann pour quelques espèces qu'il a eu l'amitié de me communiquer : je lui dédie maintenant celle-ci ; & avec d'autant plus de raison, qu'il vient de nous faire connoître plusieurs insectes curieux, soit des Indes orientales, soit du Cap de Bonne-Espérance.

La taille de cette espèce égale celle de l'*H. Mithridate*. La couleur du dessus des ailes varie un peu du noirâtre-cendré au brun-foncé ; mais leur dessous est constamment d'un brun plus clair, tirant même sur le marron. Les deux surfaces sont traversées de lignes ou de bandes très-ondulées, nombreuses & noirâtres ; le bord postérieur présente quelquefois une série de lunules de cette couleur. Les ailes supérieures ont près du sommet deux ou trois points transparens & très-rapprochés, mais qui sont quelquefois peu apparens ; dans d'autres individus, on en voit encore quelques autres vers le milieu de leur disque. Le bord latéral externe des ailes inférieures se prolonge à sa jonction avec le bord postérieur en une saillie obtusément bidentée.

Elle se trouve au Brésil, & m'a été envoyée par M. Langsdorff.

168. Hespérie Sébaldus.

Hesperia Sebaldus.

Hesperia alis fuscis, atro transversim undatis ; anticis apice uncinatis ; posticis subtùs limbo postico flavido, fusco punctato.

Hesperia U. Sebaldus, *alis ecaudatis, fusco atroque variis : posticis subtùs angulo ani flavo.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *pag.* 343. *n°.* 305.

Papilio P. U. Sebaldus. *Mant. Inst. tom.* 2. *p.* 89. *n°.* 80.

Papilio Bubius. Cram. *Pap.* 22. *pl.* 261. A. B. C.

Elle a un peu plus de deux pouces d'envergure. La massue des antennes est longue, grêle & arquée. Le corps & les ailes sont d'un noirâtre plus ou moins foncé, & quelquefois presque noirs ; ces ailes sont traversées par diverses taches ou bandes plus foncées ou noires. Les ailes inférieures ont extérieurement un angle avancé ou une forte dent ; en dessous, leur limbe postérieur est jaunâtre, avec une ou deux rangées de points noirâtres : la couleur jaune y forme une large bande. Vers l'angle interne, ces ailes sont fortement concaves, & celui du sommet des ailes supérieures a la forme d'une dent brusque ou d'un petit crochet.

Elle se trouve au Brésil & à Surinam.

J'ai reçu du Brésil une hespérie très-analogue à la précédente par la forme générale & la couleur des ailes ; mais les inférieures n'ont point de dent au bord extérieur, & ses palpes labiaux sont

plus longs & plus avancés que dans ſes congenères. Je la nommerai *H. Palpalis*.

---

b. *Côté extérieur des ailes inférieures ſans angles ni dents.*

169. Hespérie Thraſybule.

Hesperia Thraſybulus.

Heſperia alis ſuprà nigris, cœruleo undulatis; poſticis ſubtùs angulo ani cinereo, fuſco punctato.

Heſperia U. Thraſybulus, *alis integerrimis, atris, lunulis cœruleis; poſticis ſubtùs angulo ani cinereo, fuſco punctato.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *pag.* 346. *n°.* 315.

Papilio Thraſybulus. Jon. *Fig. pict.* 6. *tab.* 28. *fig.* 1.

Papilio Thraſybulus. Donov. *of an Epit. of the Nat. Hiſt. of the Inſ. of Ind.* 6. *pl.* 3. *fig.* 4.

Elle a de grands rapports avec la précédente, mais elle eſt beaucoup plus petite. Les ailes inférieures n'ont point de dents au côté extérieur, & le ſommet des ſupérieures ne forme pas un angle auſſi bruſque. Le deſſus des quatre eſt noir ou noirâtre, avec des lignes ondulées d'un bleu très-foncé; leur deſſous eſt plus clair, tirant ſur le brun, & même un peu jaunâtre ou cendré ſur l'extrémité poſtérieure & interne des inférieures, avec des taches & des points plus foncés.

Elle ſe trouve au Bréſil.

170. Hespérie Mithridate.

Hesperia Mithridates.

Heſperia alis atris, maculâ faſciâque poſticâ purpureis, lunulis pallidioribus.

Heſperia P. U. Mithridates, *alis rotundatis atris: maculâ faſciâque poſticâ purpureis, lunulis pallidioribus.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 335. *n°.* 277.

Papilio Mithridates. Donov. *of an Epit. Nat. Hiſt. Inſ.* 6. *pl.* 3. *fig.* 3.

Papilio Mithridates. Jon. *Fig. pict.* 5. *tab.* 25. *fig.* 1.

Elle eſt grande, d'un noir-foncé, avec des taches d'un rouge-pourpre ſur le corps & les ailes. Le deſſus de ces ailes a poſtérieurement une bande de cette couleur, avec des lunules plus pâles. Leur deſſous eſt noir, avec deux bandes pareillement purpurines & formées par des taches.

Selon Fabricius, elle ſe trouve aux Indes; mais d'après l'analogie, elle doit être propre à l'Amérique méridionale. J'ai reçu du Bréſil une heſpérie ne différant de la précédente qu'en ce que les taches & la bande poſtérieures des ailes ſont d'un brun-cendré au lieu d'être rouges.

171. Hespérie Brébiſſon.

Hesperia Brébiſſon.

Heſperia alis anticis utrinquè poſticiſque ſuprà dilutè fuſcis; his nigro punctatis, ibidem poſteriùs infràque, margine externo excepto, cœruleſcentibus; anticarum margine poſtico angulato.

M. de Brébiſſon, de Falaiſe, a fait de nombreuſes recherches ſur les inſectes des environs de cette ville, & particulièrement ſur divers hyménoptères négligés ou peu obſervés juſqu'à ce jour, à raiſon de leur extrême petiteſſe.

L'eſpèce à laquelle je donne ſon nom eſt une des plus remarquables de ce genre. Le milieu du bord poſtérieur de ſes premières ailes forme un angle: elles ſont, ainſi que la ſurface ſupérieure des ſecondes, d'un noirâtre-clair; en deſſus, leur milieu préſente une grande tache noire, ſur laquelle on remarque quelques points vitrés, jaunâtres, luiſans, & dont un, beaucoup plus grand, a une teinte dorée; l'angle interne a une tache noire, triangulaire, entourée de bleu-cendré; en deſſous, la baſe de ces ailes & une portion du bord interne ſont de cette couleur. Telle eſt auſſi la teinte du limbe poſtérieur & ſupérieur des ailes inférieures & de leur deſſous, à l'exception du bord extérieur, qui eſt noirâtre. Ces ailes paroiſſent comme ſortement tronquées; leur angle extérieur eſt noir en deſſus & bordé de bleuâtre intérieurement; leur deſſous eſt tacheté & ponctué de noir.

Elle ſe trouve au Bréſil.

N. B. Quelques heſpéries *Urbicoles* de Fabricius, telles que l'*Alphæus*, le *Pretus*, le *Silenus*, le *Polycletus*, doivent être placées avec nos polyommates.

Il en eſt d'autres que, faute de données ſuffiſantes, nous avons été forcés d'omettre. En voici l'énumération:

1°. *H. Atticus*, *n°.* 288. Elle rentreroit dans la diviſion des H. a ailes inférieures arrondies & entièrement vitrées. Stoll, dans ſon Supplément aux papillons de Cramer, a repréſenté une eſpèce analogue, *P. Julettus*, *pl.* 9, *fig.* 1.

2°. *H. Clericus*, *n°.* 289. Elle paroît ſe rapprocher du *P. Bromius* de Stoll, ou de quelque autre eſpèce de la diviſion, l'avant-dernière de notre méthode.

3°. *H. Nathus.* Les ailes, à l'exception du deſſous des inférieures, ſont noirâtres; les ſupérieures ont de petites taches vitrées; le deſſous des inférieures eſt blanc, avec trois points argentés tirant ſur le bleu, entourés d'un anneau noirâtre, & ſix autres ſemblables ſur le bord poſtérieur:

rieur : ce bord eſt noirâtre ; le deſſous du corps eſt blanc. Cette eſpèce eſt d'Amérique.

Le *P. Ophion* de Stoll, *Suppl. aux Pap. exot.* de Cramer, *pl.* 26, *fig.* 4, s'en rapproche un peu. Il le dit de Sierra-Leone en Afrique, ce qui me paroît douteux.

4°. Les *H. Niſo*, n°. 347, & *Spio*, 348. Fabricius dit que la première ſe trouve à Cayenne ; mais Linnæus, qui la compare, ainſi que la ſeconde, à ſon *P. Tages*, leur donne le Cap de Bonne-Eſpérance pour patrie. M. Donovan a figuré dans le cinquième faſcicule de ſon Epitome de l'hiſtoire naturelle des inſectes de l'Inde, une heſpérie ſous le nom de *Spio*, mais ſimplement en deſſus. A en juger d'après ſon deſſin, cette eſpèce ſe rapprocheroit beaucoup de l'*H. Galba* de Fabricius. Dans celle-ci, le deſſous des ailes eſt preſque ſemblable au deſſus ; la couleur du fond eſt ſeulement plus claire : or, c'eſt ce que dit formellement Linnæus à l'égard du *P. Spio*, & ce qui ne convient nullement à l'*H. Vindex*. Quant à ſon *P. Niſo*, n'ayant point vu un aſſez grand nombre d'heſpéries du Cap de Bonne-Eſpérance, il nous eſt impoſſible de nous former ſur ce ſujet une opinion.

5°. L'heſpérie *Phocion* de Fabricius, n°. 345, & qu'il ne faut pas confondre avec celle du n°. 274, que nous avons décrite, paroîtroit ſe rapprocher de l'*H. Aracinthus*, en ce que deux de ſes ailes ſeroient jaunes en deſſous, avec des taches blanches en forme d'yeux ; mais comme les caractères ſpécifiques qu'il donne au *Phocion* du n°. 345 ne s'accordent pas avec ſa deſcription, & qu'il doit y avoir quelqu'erreur, nous n'avons pas cru devoir mentioner autrement cette eſpèce.

6°. Le *Papilio* P. U. *Protumnus* de Linnæus nous eſt encore inconnu ; nous préſumons qu'il ſe rapproche de l'*H. Mœvius* de Fabricius, ou de quelqu'autre eſpèce de ſon voiſinage. Si nous euſſions eu à notre diſpoſition un plus grand nombre de matériaux & ſi nous n'euſſions pas été preſſés par le temps, notre travail eût été moins imparfait : nous eſpérons néanmoins qu'il offrira quelqu'intérêt, ſurtout à ceux qui, ayant des collections conſidérables de lépidoptères exotiques, compareront l'état où Fabricius a laiſſé cette partie de la ſcience, avec ce que nous avons fait pour elle, ſoit en éclairciſſant la ſynonymie, ſoit en caractériſant les eſpèces & en les rapprochant par petits groupes naturels.

Nous aurions pu, en en décrivant pluſieurs autres, donner plus d'étendue à cet article ; mais comme la plupart de ces eſpèces inédites ont généralement des teintes ſombres, & qu'il eſt bien difficile de les reconnoître ſans le ſecours de bonnes figures, nous avons cru devoir les omettre.

FAMILLE SECONDE.

CRÉPUSCULAIRES. *Crepuscularia.*

Les quatre ailes horizontales, ou en toit, dans le repos. Un crin à l'origine du bord antérieur des inférieures pour retenir les supérieures.

TRIBU PREMIÈRE.

HESPÉRIES-SPHINX. *Hesperio-Sphinges.*

GENRE CASTNIE. *Castnia.* FAB.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

PALPES distinctement triarticulés, non contigus, et brièvement garnis d'écailles.

OBSERVATION. Depuis l'impression de la première partie de ce volume, l'examen d'objets nouveaux nous a déterminés à former une tribu particulière, tenant le milieu entre les HESPÉRIDES et les SPHINGIDES, & à laquelle pour cette raison nous avons donné le nom de tribu des HESPÉRIES-SPHINX. Elle a pour caractères : *antennes toujours sans dents, en massue fusiforme, crochue et sans houppe d'écailles à son extrémité*, et elle se compose des genres *Castnie* et *Agariste*, genres chez lesquels la cellule discoïdale des secondes ailes est ouverte. Quelques Castnies avoient été mises par Fabricius dans le genre *Papillon*, tel que Linné l'a formé.

ESPÈCES.

Nota. Les Castnies ont les écailles plus grandes que la plupart des autres lépidoptères connus.

1. CASTNIE Cyparissias.

Ailes entières, d'un noir-brun chatoyant, avec deux bandes blanches de part et d'autre : bandes es supérieures sinuées, bandes des inférieures maculaires.

2. CASTNIE Pylade.

Ailes entières, d'un noir-brun chatoyant : supérieures avec deux bandes sinuées, d'un blanc-sale en dessus, roussâtres en dessous ; inférieures ayant de part et d'autre une bande marginale fauve, tachetée de noir.

3. CASTNIE Licas.

Ailes entières, ayant le dessus d'un noir-brun chatoyant : supérieures avec deux bandes blanches, dont une plus courte ; inférieures avec une rangée marginale de taches rouges : dessous des inférieures cendré.

4. CASTNIE Évalthé.

Ailes entières, d'un noir chatoyant : supérieures avec deux bandes jaunes de part et d'autre, inférieures avec une seule : dessus des inférieures avec une série de taches marginales, leur dessous avec toute la surface, rouges.

CASTNIE. (Insecte.)

5. Castnie Icare.

Ailes entières, presque semblables de part et d'autre : supérieures d'un brun-noirâtre chatoyant, avec trois bandes [illegible] ; inférieures rouges, avec deux lignes ondulées transversales, et le limbe, noirs.

6. Castnie Amycus.

Ailes entières, d'un noir chatoyant : supérieures ayant de part et d'autre une bande et un point blancs ; dessus des inférieures avec deux bandes, leur dessous avec toute la surface, rouges.

7. Castnie Brécourt.

Ailes entières, d'un noir-brun chatoyant : supérieures avec une bande difforme blanchâtre ; inférieures avec deux bandes transverses blanches et une bande intermédiaire d'un rouge-minium.

8. Castnie Cochrus.

Ailes entières, semblables de part et d'autre, d'un noir-brun chatoyant, avec une bande blanche courte sur le milieu des quatre : anneaux postérieurs de l'abdomen rouges et bordés de blanc.

9. Castnie Latreille.

Ailes entières, d'un noir-brun chatoyant : supérieures avec une bande blanchâtre, oblique et bifide ; inférieures avec une bandelette longitudinale, et un arc maculaire, d'un bleu-tendre.

10. Castnie Sautoir.

Ailes entières, d'un vert-brun chatoyant : supérieures avec deux bandes blanches, en sautoir ; inférieures avec une seule, maculaire.

11. Castnie Phalaris.

Ailes entières, d'un gris-brun chatoyant, avec deux bandes blanchâtres : bandes des supérieures peu prononcées en dessus, bifides en dessous ; bandes des inférieures maculaires de part et d'autre.

12. Castnie Palatinus.

Ailes entières : supérieures d'un ferrugineux-chatoyant, avec un point oculaire noir ; inférieures noires, avec une bande médiaire, et une ligne postérieure maculaire, d'un jaune-blanchâtre.

13. Castnie Fonscolombe.

Ailes entières : dessus des supérieures d'un ferrugineux-chatoyant, avec cinq points d'un jaune-transparent sur le milieu ; dessus des inférieures d'un rouge-brique, avec une série postérieure de taches noires.

14. Castnie Thalaïre.

Ailes entières : dessus des supérieures d'un vert-brun chatoyant, avec la base et deux bandes d'un gris-incarnat ; inférieures rouges de part et d'autre, avec deux bandes et le bord noirs.

15. Castnie Fabricius.

Ailes entières : dessus des supérieures d'un gris-incarnat chatoyant, avec deux lignes transverses, et une tache intermédiaire, ferrugineuses ; inférieures d'un rouge-brique, avec deux bandes maculaires, et une bordure crénelée, noires.

16. Castnie Marcel-Serres.

Ailes entières, d'un brun-chatoyant en dessus, avec des bandes peu prononcées d'un gris-incarnat : bandes des supérieures continues et au nombre de trois, bandes des inférieures maculaires et au nombre de deux.

CASTNIE. (Insecte.)

17. Castnie Cronis.

Ailes entières, semblables de part et d'autre : supérieures noires, avec le disque et des taches marginales d'un beau blanc; inférieures d'un jaune-pâle, avec une bordure noire, crénelée.

18. Castnie Pélasgus.

Ailes très-entières, semblables de part et d'autre : supérieures verdâtres, avec une bande fauve; inférieures noires, et sans taches. Fab.

1. Castnie Cyparissias.

Castnia Cyparissias.

Cast. alis integris, atris, nitidis : utrinquè fasciis duabus albis, anticarum repandis, posticarum macularibus.

Papilio D. F. Cyparissias, *alis integerrimis, nigris, fasciis duabus albis : anticarum obliquis, posticarum punctatis.* Fab. *Spec. Inf. tom.* 2. *p.* 52. *n°.* 226. — *Mant. Inf. tom.* 2. *pag.* 25. *n°.* 259. — *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 39. *n°.* 415.

Papilio Cyparissias. Herbst, *Pap. tab.* 118. *fig.* 1. 2.

Papilio Dedalus. Cram. *pl.* 1. *fig.* A. B.

Elle a de sept pouces à sept pouces & demi d'envergure. Le dessus des ailes est d'un brun-noirâtre, chatoyant en vert ou en violet selon les aspects, avec deux bandes blanches. Les bandes des premières ailes sont obliques, continues, sinuées, inégales, & suivies d'une rangée transverse de quatre à sept taches blanches. Les bandes des secondes ailes sont maculaires, un peu courbes & disposées transversalement entre le milieu & le bord postérieur.

Le dessous ressemble au dessus, mais l'extrémité des premières ailes & toute la surface des secondes sont d'un brun beaucoup plus pâle que du côté opposé.

Se trouve à Surinam, dans les bois.

2. Castnie Pylade.

Castnia Pylades.

Cast. alis integris, atris, nitidis : anticis fasciis duabus repandis, suprà albidis, subtùs rufescentibus; posticis fasciâ marginali utrinquè fulvâ nigroque maculatâ.

Papilio Pylades. Cram. *pl.* 387. *fig.* A. B.

Papilio Pylades. Herbst, *Pap. tab.* 135. *fig.* 1. 2.

Elle a environ cinq pouces & demi d'envergure, & elle est d'un brun-noir, chatoyant en vert ou en violet, selon les aspects. Ses premières ailes ont derrière le milieu deux bandes transverses & sinuées, qui sont d'un blanc-fale en dessus, roussâtres en dessous. Ses secondes ailes offrent parallèlement au bord postérieur une bande fauve, divisée dans le sens de sa longueur par une série de taches noires orbiculaires.

Des Indes occidentales.

3. Castnie Licas.

Castnia Licas.

Cast. alis integris, suprà atris, nitidis : anticis fasciâ albâ, posticis serie marginali è maculis rubris : posticarum paginâ inferiori cinereâ.

Papilio D. F. Licas, *alis integerrimis, fascis : anticis fasciis duabus, posticis unicâ albis maculisque rubris : subtùs cinereis, albo fasciatis.* Fab. *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 26. *n°.* 273. — *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 45. *n°.* 137.

Papilio Licus. Cram. *pl.* 223. *fig.* A. B.

Papillo Lycus. Herbst, *Pap. tab.* 134. *fig.* 3. 4.

Papilio Licus. Drury, *Inf.* 1. *pl.* 16. *fig.* 1. 2.

Merian, *Surin. Inf tab.* 36.

Seba, *Mus.* 4. *tab.* 19. *fig.* 11. 12. — *tab.* 21. *fig.* 10.

Jon. *Fig. pict.* 3. *tab.* 73. *fig.* 2.

β. Papilio D. F. Syphax, *alis integerrimis, atris : anticis fasciâ albâ, posticis rubrâ marginali.* Fab. *Mant. Inf. tom.* 2. *pag.* 26. *n°.* 271. — *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 45. *n°.* 135.

Papilio Syphax. Herbst, *Pap. tab.* 134. *fig.* 1. 2.

Papilio Harmodius. Cram. *pl.* 223. *fig.* C. D.

Elle a environ quatre pouces d'envergure. Le dessus des ailes est d'un noir-brun, jetant un reflet vert ou violet selon les aspects, avec deux bandes blanches aux supérieures, & une seule aux inférieures. La bande antérieure des premières ailes est continue, & elle descend du milieu de la côte à l'angle interne. Leur bande postérieure est plus courte, maculaire, flexueuse & située vis-à-vis du sommet. La bande des secondes ailes est oblique, médiaire, & suivie d'une rangée marginale de taches orbiculaires rouges.

Le dessous diffère du dessus, en ce que les premières ailes ont des taches blanches ou rougeâtres sur le milieu du bord postérieur, en ce que les secondes ailes sont cendrées & qu'elles ont les taches rouges de l'extrémité ordinairement peu prononcées.

La bande blanche des ailes inférieures est quelquefois oblitérée. Il arrive même qu'elle manque totalement, comme dans la variété que les auteurs ont donnée sous le nom de *Syphax*. On voit aussi des mâles chez lesquels la bande postérieure du dessus des premières ailes est à peine sensible.

4. Castnie Evalthé.

Castnia Evalthe.

Cast. alis integris, nigris, nitidis : utrinquè anticis fasciis duabus, posticis unicâ flavis : posticis suprà serie è maculis marginalibus, subtùs paginâ omni rubris.

Papilio D. F. Evalthe, *alis integerrimis, ni-*

gris : anticis fasciis duabus, posticis unicâ flavis maculisque rubris, subtùs rubris fasciâ maculari flavâ. Fab. *Syst. Ent. p.* 480. *n°.* 166. — *Spec. Inf. tom.* 2. *p.* 53. *n°.* 255. — *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 26. *n°.* 272. — *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 45. *n°.* 136.

Papilio Evalthus. Herbst, *Pap. tab.* 137. *fig.* 1. 2.

Papilio Dardanus. Cram. *pl.* 17. *fig.* E. F.

Elle a environ trois pouces d'envergure. Le dessus des ailes est noir, & chatoyant en vert ou en violet selon les aspects, avec trois bandes jaunes, dont deux obliques & continues aux supérieures, & une maculaire aux inférieures. Ces dernières ailes offrent parallèlement à leur bord terminal une rangée de taches rouges, arrondies.

Le dessous des premières ailes ne diffère du dessus que parce que la côte & le sommet sont lavés de rougeâtre. Le dessous des secondes ailes est tout rouge, avec une bande maculaire jaune, répondant à celle de la surface opposée.

Dans quelques individus, les taches rouges du dessus des secondes ailes s'étendent jusqu'à la bande jaune; dans d'autres, cette bande est remplacée par une grande tache semi-lunaire de sa couleur.

De Surinam & du Brésil, dans les bois.

5. Castnie Icare.

Castnia Icarus.

Cast. alis integris, subconcoloribus : anticis fuscis, nitidis, fasciis tribus albis; posticis rubris, strigis duabus undulatis limboque nigris.

Papilio Icarus. Cram. *pl.* 18. *fig.* A. B.

Elle a de trois pouces & demi à quatre pouces d'envergure. Le dessus des premières ailes est d'un brun-noirâtre, chatoyant en vert ou en violet selon les aspects, avec trois bandes blanches continues, dont les deux antérieures obliques & parallèles, la postérieure transverse, plus courte & faisant face au sommet.

Le dessus des secondes ailes est rouge, avec deux lignes postérieures ondulées, & le limbe terminal, noirs. Avant les lignes, il y a deux ou trois points blanchâtres, surmontés d'une lunule centrale noire.

Le dessous ne diffère du dessus que parce que la base des ailes supérieures est rouge, & parce que les points blancs des inférieures sont accompagnés d'une double tache également blanche. Le corps est grisâtre, avec les côtés de l'abdomen & l'anus orangés. Les antennes sont noires & terminées de blanchâtre.

De Surinam.

6. Castnie Amycus.

Castnia Amycus.

Cast. alis integris, nigris, nitidis : anticis utrinquè fasciâ punctoque albis; posticis suprà fasciis duabus, subtùs paginâ omni rubris.

Papilio Amycus. Cram. *pl.* 227. *fig.* D. E.

Elle a un peu plus de deux pouces d'envergure. Le dessus des ailes est d'un noir-chatoyant, avec deux petites taches & une bande blanches aux supérieures; avec deux bandes rouges, dont la postérieure maculaire, aux inférieures. La bande des premières ailes est placée entre les deux taches, & elle descend de la côte à l'angle interne.

Le dessous des premières ailes diffère du dessus en ce que la base est rouge, & en ce que la tache blanche antérieure manque.

Le dessous des secondes ailes est rouge, avec une série transverse de points blancs cerclés de noir.

De Surinam.

7. Castnie Brécourt.

Castnia Brecourt.

Cast. alis integris, atris, nitidis : anticis fasciâ deformi albidâ, posticis duabus transversis albis intermediâque miniaceâ.

Elle a un peu plus de trois pouces d'envergure. Le dessus de ses ailes est d'un noir-brun, chatoyant en vert ou en violet selon les aspects, avec une bande très-difforme d'un blanc-sale aux supérieures; avec deux bandes transverses blanches & une bande intermédiaire d'un rouge-minium aux inférieures. La bande antérieure des secondes ailes est discoïdale, large, continue, tandis que la postérieure est très-étroite & maculaire.

Le dessous diffère du dessus en ce que les premières ailes ont l'origine de la côte rouge, & le bord postérieur chargé d'une série transverse de taches blanches. Le corps est d'un noir-brun, avec les genoux & l'anus d'un rouge-minium. Les antennes sont noires.

Dédiée à M. Cotty de Brécourt, entomologiste-observateur, & décrite d'après un individu de la collection de M. Latreille.

Du Brésil.

8. Castnie Cochrus.

Castnia Cochrus.

Cast. alis integris, concoloribus, atris, nitidis, omnium disco fasciâ abbreviatâ albâ : abdomine posticè cingulis sanguineis albo marginatis.

Papilio D. F. Cochrus, *alis integerrimis, concoloribus, atris, fasciâ maculari albâ : abdomine sanguineo cingulis atris.* Fab. *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 25. *n°.* 265. — *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 42. *n°.* 125

Elle a près de quatre pouces & demi d'envergure. Ses ailes ſont d'un noir-brun, chatoyant en vert ou en violet ſelon les aſpects, avec une bande blanche, diſcoïdale, oblique, courte & diviſée par les nervures. La bande des ſecondes ailes eſt plus courte & plus large, & ces mêmes ailes ont vers le ſommet deux à trois points blancs. Le corps eſt noir, avec les quatre anneaux poſtérieurs de l'abdomen rouges & bordés de blanc. Le devant du corſelet, la poitrine, la baſe du ventre ſont tachetés de rouge, & les genoux ſont de cette couleur. Les antennes ſont entièrement noires.

Quelquefois la bande des ailes ſupérieures eſt moins blanche en deſſus qu'en deſſous.

Du Bréſil.

9. Castnie Latreille.

Castnia Latreille.

Caſt. alis integris, atris, nitidis : anticis faſciâ albidâ, obliquâ, biſidâ ; poſticis vittâ longitudinali arcuque maculari cœſiis.

J'éprouve un véritable plaiſir à dédier cette nouvelle eſpèce à mon maître, ſavant académicien que les naturaliſtes de l'Europe ont, d'une voix unanime, proclamé le *prince des entomologiſtes* de notre ſiècle.

Elle a près de cinq pouces d'envergure. Les premières ailes ſont d'un brun-enfumé & très-chatoyant, avec le milieu coupé obliquement par une bande biſide, qui eſt d'un blanc-obſcur en deſſus, d'un blanc-violâtre en deſſous.

Le deſſus des ſecondes ailes eſt noir, avec une bandelette lilas, partant du diſque où elle ſe dilate en manière de hachette, & allant aboutir à un arc marginal de trois taches également lilas. Le deſſous eſt moins foncé que le deſſus, & il offre vers l'extrémité une ligne courbe & tranſverſe de points bleuâtres. Le corps eſt entièrement d'un brun-noirâtre, & les antennes ſont ferrugineuſes.

Du Bréſil; collection de M. Latreille.

10. Castnie Sautoir.

Castnia Decuſſata.

Caſt. alis integris, fuſco-viridibus, nitidis : anticis faſciis duabus albis decuſſatis, poſticis unicâ maculari.

Elle a environ deux pouces & demi d'envergure. Le deſſus des ailes eſt d'un vert-brun, chatoyant, avec deux bandes blanches, dont deux en ſautoir aux ailes ſupérieures, & une maculaire aux inférieures. La bande antérieure des premières ailes jette en outre un rameau qui ſe rabat ſur l'origine du bord interne.

Le deſſous diffère du deſſus en ce que le rameau de la bande antérieure des premières ailes manque, & en ce que le fond des ſecondes eſt d'un brun-jaunâtre-pâle.

Décrite d'après un individu unique.

Du Bréſil.

11. Castnie Phalaris.

Castnia Phalaris.

Caſt. alis integris, fuſco-griſeis, nitidis, faſciis duabus albidis : anticarum ſuprà obſoletis, ſubtùs biſidis, poſticarum utrinquè maculuribus.

Papilio F. Phalaris, *alis integerrimis, faſciis : poſticis ſtrigis duabus maculuribus albis.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 45. *n°.* 138.

Papilio Phalaris. Jon. *Fig. pict.* 3. *tab.* 75. *fig.* 2.

Elle a environ trois pouces d'envergure. Le deſſus des ailes eſt d'un gris-obſcur, chatoyant en vert ou en violet ſuivant les aſpects, avec deux bandes blanchâtres. Les bandes des premières ailes ſont obliques, peu prononcées, & biſides à leur extrémité ſupérieure. Les bandes des ſecondes ailes ſont maculaires, tranſverſales & placées derrière le milieu ſur un fond noirâtre.

Le deſſous ne diffère du deſſus que parce que les bandes des premières ailes ſont beaucoup plus diſtinctes & qu'elles ont une tache blanche dans la fiſſure. Le corps eſt entièrement de la couleur des ailes.

Du Bréſil.

12. Castnie Palatinus.

Castnia Palatinus.

Caſt. alis integris : anticis ferrugineis, nitidis, puncto ocellari nigro ; poſticis nigris, faſciâ mediâ ſtrigâque apicis maculari albido-flaveſcentibus.

Papilio Palatinus. Cram. *pl.* 159. *fig.* B. C.

Elle a environ trois pouces d'envergure. Le deſſus des premières ailes eſt d'un ferrugineux-chatoyant, avec un petit œil noir à prunelle blanche vis-à-vis du ſommet.

Le deſſus des ſecondes ailes eſt noir, avec une large bande d'un jaune-blanchâtre ſur le milieu, & une ſérie de taches du même jaune ſur le bord poſtérieur. La bande prend une teinte rouſſe vers la côte.

Le deſſous des quatre ailes diffère du deſſus en ce qu'il eſt généralement plus pâle, & en ce que le milieu des ſupérieures offre quatre taches noires dont une annulaire.

De Surinam.

13. Castnie Fonſcolombe.

Castnia Fonſcolombe.

Caſt. alis integris : anticis ſuprà ferrugineis, nitidis, diſco punctis quinque hyalino-flaveſ-

centibus ; poſticis teſtaceis, ſerie poſticâ è maculis nigris.

Elle a plus de quatre pouces & demi d'envergure. Le deſſus des premières ailes eſt d'un ferrugineux-chatoyant, avec cinq points jaunes, dont l'antérieur plus gros & preſque diſcoïdal, les autres un peu diaphanes & alignés tranſverſalement ſur une bande plus intenſe que le fond de l'aile. Le deſſus des ſecondes ailes eſt d'un rouge-brique, avec la baſe obſcure, & l'extrémité chargée d'une ſérie courbe de taches noires orbiculaires.

Le deſſous des premières ailes reſſemble au deſſus, quant au deſſin, mais il eſt d'un rouge-brique au lieu d'être ferrugineux. Le deſſous des ſecondes ailes eſt d'un jaune-d'ocre, avec trois lignes tranſverſes, dont les deux antérieures rougeâtres & ondulées, la poſtérieure noirâtre & maculaire. Le corps a le deſſus ferrugineux, avec la moitié poſtérieure de l'abdomen d'un jaune-rougeâtre. Les antennes ſont de la couleur du corſelet..

Dédiée à M. Boyer de Fonſcolombe, ſavant naturaliſte de la ville d'Aix en Provence.

Du Bréſil ; collection de M. Latreille.

14. Castnie Thalaire.

Castnia Thalaira.

Caſt. alis integris : anticis ſuprà fuſco-viridibus, nitidis, baſi fuſciſque duabus carneo-griſeis ; poſticis utrinquè rubris, fuſcis duabus margineque nigris.

Papilio Thais. Drury, *Inſ. tom.* 3. *pl.* 16. *fig.* 4.

Elle a de trois pouces à trois pouces & demi d'envergure. Le deſſus des premières ailes eſt d'un vert-brun, chatoyant, avec la baſe & deux bandes obliques d'un gris-incarnat. La bande intérieure eſt plus longue & plus large que l'extérieure.

Le deſſus des ſecondes ailes eſt rouge, avec deux bandes poſtérieures, & le bord terminal, noirs.

Le deſſous des premières ailes eſt noir, avec la baſe rouge, & trois bandes orangées, dont deux répondant aux bandes incarnates du deſſus, la troiſième maculaire & longeant le bord poſtérieur.

Le deſſous des ſecondes ailes reſſemble au deſſus, mais il eſt généralement plus pâle, & il offre trois ou quatre petites taches blanches ſur la bande qui avoiſine le diſque.

Quelquefois le rouge de l'extrémité des ſecondes ailes eſt remplacé par du jaune-orangé, comme dans l'individu figuré par Drury.

Cette Caſtnie a le bord poſtérieur des premières ailes beaucoup plus arqué en dehors que l'*Icare*.

Du Bréſil.

15. Castnie Fabricius.

Castnia Fabricii.

Caſt. alis integris : anticis ſuprà carneo-griſeſcentibus, nitidis, ſtrigis duabus maculâque intermediâ ferrugineis ; poſticis teſtaceis, faſciis duabus macularibus margineque crenato nigris.

Caſtnia Fabricii. Swainson, *Zoological illuſt. or origin. fig. an deſcrip.* &c. *cah.* 30. *pl.* 149.

Ce lépidoptère paroît être l'un des ſexes de celui que M. Swainſon a figuré ſous le nom de *caſtnia Fabricii*.

Il n'a guère que deux pouces d'envergure. Le deſſus des premières ailes eſt d'un gris-incarnat chatoyant, avec deux lignes tranſverſes, & une tache intermédiaire, ferrugineuſes. Le bord poſtérieur eſt en outre ferrugineux, principalement vers le ſommet. Le deſſus des ſecondes ailes eſt d'un rouge-brique, avec deux bandes maculaires, & une bordure crénelée, noires. Les deux bandes ſont courbes & placées tranſverſalement entre le milieu & l'extrémité de la ſurface.

Le deſſous des quatre ailes eſt d'un rouge-briqueté-pâle, avec des lignes noirâtres qui ne ſont que la répétition des caractères du deſſus, & ſur le milieu de l'antérieure deſquelles on voit aux ſecondes ailes un double point blanc ocellé.

Du Bréſil ; collection de M. Latreille.

16. Castnie Marcel-Serres.

Castnia Marcel-Serres.

Caſt. alis integris, ſuprà fuſcis, nitidis, faſciis obſoletis carneo-griſeſcentibus : anticarum tribus continuis, poſticarum duabus macularibus.

Elle a près de deux pouces & demi d'envergure. Le deſſus des ailes eſt d'un brun-enfumé, chatoyant en vert ou en violet ſelon les aſpects, avec des bandes tranſverſes & peu prononcées d'un gris-incarnat. Les bandes des premières ailes ſont au nombre de trois, dont l'intermédiaire ſinuée, la poſtérieure terminale, mais ne couvrant pas le ſommet. Les bandes des ſecondes ailes ſont au nombre de deux, & formées l'une par des taches preſque quadrangulaires, l'autre par des lunules renverſées. La frange de ces dernières ailes eſt en outre blanchâtre.

Le deſſous des premières ailes eſt d'un gris-chatoyant, avec l'extrémité traverſée par une bande biſide de taches blanchâtres. Le deſſous des ſecondes ailes eſt d'un gris-rougeâtre, avec trois lignes brunâtres, tranſverſes & ondulées, dont l'antérieure diſcoïdale & marquée d'un double point blanc. Le corps & les antennes ſont de la couleur des ailes.

Dédiée à M. Marcel de Serres, connu par pluſieurs écrits, profeſſeur de géologie & de minéralogie à la Faculté des Sciences de Montpellier, &c.

Du Bréſil ; collection de M. Latreille.

17. Castnie

17. Castnie Cronis.

Castnia Cronis.

Caſt. alis integris, concoloribus : anticis nigris, diſco maculiſque marginalibus niveis ; poſticis flaveſcentibus, margine crenato nigro.

Papilio Cronis, fem. Cram. *pl.* 178. *fig.* A.

L'individu que Cramer a pris pour la femelle de ſon papillon *Cronis* nous paroît être une caſtnie, tant par la forme des antennes, que par celle de la cellule diſcoïdale des ſecondes ailes.

Il a près de trois pouces d'envergure. Le deſſus des premières ailes eſt noir, avec une vingtaine de taches blanches, ſavoir : une très-grande ſur le diſque, une médiocrement grande ſur le milieu de la côte, les autres en forme de points ovales & diſpotées ſur deux rangs le long du bord poſtérieur.

Le deſſus des ſecondes ailes eſt d'un jaune-d'ocre pâle, avec une bordure noire, étroite & ayant le côté interne crénelé.

Le deſſous des quatre ailes diffère très-peu du deſſus. Le corſelet eſt noir, avec deux points rouges. L'abdomen eſt du même ton que les ſecondes ailes, & les antennes ſont noires.

De Surinam.

18. Castnie Pélaſgus.

Castnia Pelaſgus.

Caſt. alis integerrimis, concoloribus : anticis vtreſcentibus, faſciâ fulvâ ; poſticis nigris, immaculatis. Fab.

Papilio D. F. *Pelaſgus.* Fab. *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 26. *n°.* 274. — *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 46. *n°.* 159.

Papilio Pelaſgus. Cram. *pl.* 202. *fig.* D.

Papilio Pelaſgus. Herbst, *Pap. tab.* 136. *fig.* 6.

Nous ne connoiſſons cette eſpèce que par la figure de Cramer.

Elle a à peu près deux pouces & demi d'envergure. Les premières ailes ſont d'un vert-brun & chatoyant de part & d'autre, avec une bande fauve, tranſverſe, médiaire, courbe, atteignant à peine les deux bords.

Les ſecondes ailes ont le deſſus ainſi que le deſſous d'un noir-chatoyant, & ſans aucune tache.

De Surinam.

GENRE AGARISTE. *Agarista.* Leach.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Palpes inférieurs longs, ayant le deuxième article comprimé et barbu, le troisième subcylindrique et nu. (*Voyez* l'Observation ci-dessus, page 794.)

ESPÈCES.

A. Bord postérieur des premières ailes entier. Bord analogue des secondes ayant le milieu prolongé en une queue obtuse.

1. Agariste Leach.

Ailes semblables de part et d'autre, d'un brun-chatoyant : supérieures avec une bande transverse, inférieures avec le bord du sommet, blancs.

B. Bord postérieur des quatre ailes arrondi et entier.

2. Agariste Peinte.

Ailes presque semblables de part et d'autre, noires : supérieures tachetées de jaune-pâle, de jaune-orangé et de bleu-tendre; inférieures avec deux bandes transverses, dont l'antérieure d'un bleu-pâle, la postérieure écarlate.

3. Agariste Huit-taches.

Ailes entières, semblables de part et d'autre, noires, avec deux taches arrondies sur le disque de chacune : taches des supérieures d'un jaune-soufre pâle, taches des inférieures d'un blanc de neige.

A. Bord poſtérieur des premières ailes entier. Bord analogue des ſecondes ayant le milieu prolongé en une queue obtuſe.

1. Agariste Leach.

Agarista Leach.

Agar. alis concoloribus, fuſcis, nitidis : anticis faſciâ tranſverſâ, poſticis margine apicali, albis.

Elle a un peu plus de deux pouces d'envergure. Ses ailes ſont de part & d'autre d'un brun-noirâtre chatoyant, avec une bande tranſverſe aux ſupérieures, & le bord du ſommet aux inférieures, blancs. La bande des ailes ſupérieures eſt courbe, ultrà-médiaire, & moins blanche en deſſus qu'en deſſous. Le corps & les antennes ſont approchant du même ton que les ailes.

Dédiée à M. William Elford Leach, très-ſavant naturaliſte anglais, & décrite d'après un ſeul individu, envoyé du Bréſil à M. Latreille par M. de Langſdorff.

B. Bord poſtérieur des quatre ailes arrondi & entier.

2. Agariste Peinte.

Agarista Picta.

Agar. alis ſubconcoloribus, nigris : anticis flaveſcente, aurantio cœſioque maculatis ; poſticis faſciis duabus tranſverſis, alterâ cœſiâ, alterâ coccineâ.

Agariſta Picta, *atra, ano fulvo : alis anticis ſtrigâ baſeos flavâ maculiſque fulvis ; poſticis faſciis duabus tranſverſis, poſticâ coccineâ.* Leach, *the Zoological miſcellany, vol.* 1. *tab.* 15.

Papilio Agricola, *alis nigris : anticis flavo aurantioque maculatis ; poſticis cyaneo ſanguineoque faſciatis.* Donow. *Gen. Illuſt. of Ent. part.* 1. *an Epit. of the Inſ. of Aſia, pl. fig.*

Elle a entre deux pouces & demi & trois pouces d'envergure. Ses ailes ſont noires. Les ſupérieures ont à la baſe une bande longitudinale d'un jaune-verdâtre ; ſur le milieu deux bandes obliques de taches orangées ; & vis-à-vis du ſommet deux lignes maculaires, également obliques, dont l'antérieure bleuâtre, la poſtérieure à peu près du même jaune que la bande de la baſe. Il y a en outre ſur le bord interne deux litures bleues, puis une tache jaunâtre. Les ſecondes ailes ont deux bandes tranſverſes, dont l'antérieure d'un bleu-tendre, la poſtérieure écarlate & plus large. La frange de ces dernières ailes eſt entièrement blanche, tandis que celle des ailes de devant ne l'eſt qu'au ſommet & à l'angle inférieur. Le corps eſt noir, avec le corſelet d'un jaune-pâle, la poitrine écarlate, l'anus garni d'un bouquet de poils orangés. Les antennes ſont noires.

Le mâle ſe diſtingue de la femelle en ce qu'il a la bande baſilaire du deſſus des premières ailes plus étroite, & le deſſous des ſecondes tacheté de jaune-bleuâtre à ſon origine.

De la Nouvelle-Hollande.

3. Agariste Huit-taches.

Agarista octomaculata.

Agar. alis integris, concoloribus, nigris, diſco ſingularum maculis duabus rotundatis : anticarum pallidè ſulphureis, poſticarum niveis.

Seſia 8maculata, *alis atris : maculis duabus anticarum flavis, poſticarum albis.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *pag.* 381. *n°.* 8.

Elle a environ quinze lignes d'envergure. Ses ailes ſont noires en deſſus & en deſſous, avec deux taches orbiculaires ſur le milieu de chacune. Les taches des ailes ſupérieures ſont d'un jaune-ſoufre pâle, les taches des inférieures d'un blanc de neige. Le corps eſt noir, avec les épaulettes, un point frontal, le premier article des palpes & la baſe du troiſième, d'un jaune-ſoufre. Les deux jambes antérieures ſont garnies de poils orangés, & les antennes ſont toutes noires.

Recueillie dans l'Amérique ſeptentrionale par M. Milbert, voyageur du Gouvernement.

SUPPLÉMENT.

Avis. Sous le titre de RECTIFICATIONS, nous signalons : 1°. les espèces à supprimer comme ne formant qu'un seul sexe ; 2°. celles dont nous avons reconnu postérieurement la synonymie ou le véritable *habitat* ; 3°. les fautes typographiques qui nous avoient d'abord échappé.

RECTIFICATIONS.

GENRE PAPILLON.

Cellule discoïdale des secondes ailes fermée postérieurement.

Page 25. n°. 2. Pap. PANTHOÜS. — Femelle du PRIAM, page *ibidem*, n°. 1.

Page 38. n°. 39. Pap. TÉRÉAS. — Piéride.

Page 39. ß. *Pap. Lycidas.* Cram. — Femelle du BÉLUS, pag. 38. n°. 42.

Page 41. n°. 49. Pap. ANDROGÉE. — Femelle du POLYCAON, page *ibidem*, n°. 48.

Page 42. n°. 51. Pap. EPHESTION. — Nymphale. (*Voyez* Nymph. URSULE, page 380. n°. 101.)

Page 51. n°. 75. Pap. NIAMUS. — *Pap. Nomius.* Esp. *Pap. exot. tab.* 52. *fig.* 3.

Page 62. n°. 101. Pap. PANDROSUS. — *Pap. Torquatinus.* Esp. *Pap. exot. tab.* 51. *fig.* 2.

Page 63. n°. 104. Pap. TÉMÈNE. — *Pap. Ariflodemus.* Esp. *Pap. exot. tab.* 59. *fig.* 2.

Page 63. n°. 105. Pap. LYCORÆUS. — *Pap. Machaonides.* Esp. *Pap. exot. tab.* 45. *fig.* 2.

Page 67. n°. 114. Pap. PHORCAS. — *Pap.* N. *Doreus.* Fab. *Ent. Syst. tom.* 3. *pars* 1. *pag.* 68. n°. 212.

Page 73. n°. 136. Pap. LYSITHOÜS. — *Pap. Hectorides.* Esp. *Pap. exot. tab.* 40. C. *fig.* 1.

GENRE PARNASSIEN.

Cellule discoïdale des secondes ailes fermée postérieurement.

GENRE THAÏS.

Cellule discoïdale des secondes ailes fermée postérieurement. (Chrysalide attachée par les deux bouts, et terminée antérieurement par deux petites pointes garnies de crochets.)

GENRE COLIADE.

Cellule discoïdale des secondes ailes fermée postérieurement.

Page 89. col. 1. lig. 23, ont le bord interne anguleux ; *lisez*, ont le bord postérieur anguleux.

Page 91. n°. 6. Coliade CIPRIS. — La femelle est plus pâle, & le dessus de ses ailes supérieures offre souvent un gros point noir vers le milieu de la surface.

Page 91. n°. 7. Col. LEACH. — Fond des ailes d'un jaune-verdâtre chez le mâle, d'un blanc-verdâtre chez la femelle. Antennes rosées & non noires.

Page 92. n°. 12. — Col. EUBULE. — Femelle de la MARCELLINA, page *ibidem*, n°. 9.

Page 93. n°. 14. Col. CNIDIA. — Femelle de l'ARGANTE, page 92. n°. 11.

Page 94. { n°. 15. Col. Lollia. / n°. 16. Col. Aricie. / n°. 17. Col. Larra. } — Femelles & variétés femelles de la Philéa, page 91. n°. 18.

Page 95. n°. 20. Col. Catilla. — Femelle de l'Hilaria, page 97. n°. 25. Points disco'idaux du dessous des ailes inférieures, bien argentés & entourés de deux cercles, dont l'extérieur non fermé. Antennes d'un rose-grisâtre, avec le bout de la massue ferrugineux.

Page 96. n°. 21. Col. Jugurthina. (*Jugurtha* & *Crocale*. Cram.) — Femelle de notre Alcméoné, page 97. n°. 27. Dessous du mâle d'un jaune-soufre & sans taches. Dessous de la femelle d'un jaune-d'ocre, ordinairement très-pâle, avec un point blanc bordé d'un simple cercle rougeâtre aux ailes supérieures, & deux points semblables aux inférieures. Ces points manquent quelquefois. Dernier article des palpes très-court; antennes d'un brun-grisâtre, avec le bout de la massue ferrugineux.

Page 96. n°. 21. Col. Jugurthina. (*Statira*. Cramer.) — Femelle de notre Titania, page 97. n°. 26. Habite le Bréfil, & non le Coromandel, comme nous l'avions cru d'après Cramer. Dessous de ses ailes d'un gris-jaunâtre luisant, avec des points disco'idaux d'un blanc-vif, non bordés, ou seulement bordés en arrière par des atomes noirâtres. Dernier article des palpes alongé; antennes d'un brun-rougeâtre & ayant le tiers antérieur de la massue jaunâtre. Le *Papilio* D. C. *Titania* de Fabricius paroît plutôt répondre à l'Hilaria qu'à notre Titania.

Page 98. n°. 28. Col. Evadné (*Alcmeone*. Cram.) paroît être une variété mâle, & sans taches en dessous, de notre Titania.

GENRE PIÉRIDE.

Cellule discoïdale des secondes ailes fermée postérieurement.

Page 119. n°. 3. Piér. Callirrhoé. — Variété femelle de la Piér. Glaucippe, page *ibidem*, n°. 2.

Page 122. n°. 12. Piér. Omphale. — Femelle de l'Evippe, page *ibidem*, n°. 10.

Page 122. n°. 13. Piér. Achiné. — Variété femelle de l'Evippe, page *ibidem*, n°. 10.

Page 123. n°. 14. Piér. Amytis. (*Arethusa*. Cram.) — Variété femelle de l'Evippe, sans taches fauve au sommet des ailes supérieures en dessus.

Page 131. n°. 39. Piér. Amate. — Coliade.

Page 134. n°. 50. Piér. Candide. — Coliade.

Page 134. n°. 51. Piér. Hécabé. — Coliade.

Page 135. n°. 52. Piér. Agavé. — Coliade.

Page 135. n°. 53. Piér. Brigitte. — Coliade.

Page 135. n°. 54. Piér. Néda. — Coliade. Répond au P. D. *Libythea*. Fab. *Suppl. pag. 427. n°. 598—9.*

Page 136. n°. 56. Piér. Smilax. — Coliade.

Page 136. n°. 58. Piér. Elathée. — Coliade.

Page 137. n°. 59. Piér. Daira. — Coliade, variété de l'Elathée, n°. 58.

Page 137. n°. 61. Piér. Phialé. — Coliade.

Page 138. n°. 66. Piér. Sinoé. — Coliade.

Page 142. n°. 85. Piér. Caenis. — Nymphale. (*Voy.* Nymph. Amphicéda, page 384. n°. 113.)

Page 145. n°. 96. Piér. Hirlanda. — Chez le mâle, la bordure noire est moins large que chez la femelle que nous avons décrite.

Page 147. n°. 101. Piér. Thyria. — Pap. N. *Nero*. Fab. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 153. n°. 471.* — Donov. *of an Epit. Inf. of India, cah. 9. pl. 3. fig. 1.*

Page 147. n°. 102. Piér. Panda. — Coliade.

Page 150. n°. 113. Piér. Philyre. — *Pap. D. Cacneus.* Linn. *Syst. Nat. 2. p. 766. n°. 111.* — *Mus. Lud. Ulr. 271.*

Page 155. n°. 128. Piér. Pyrrha. — Nous avons vu, en double exemplaire, une variété mâle, dont le dessus des ailes est jaune au lieu d'être blanc.

Page 156. n°. 130. Piér. Paméla. — Femelle de la Piér. Pyrrha, page 155. n°. 128.

Page 157. n°. 133. Piér. Démophile. — Femelle de l'Amathonte, page *ibidem*, n°. 132.

Page 162. n°. 146. Piér. de la Bryone. — Nous avons actuellement la certitude que ce n'eſt qu'une variété femelle, & propre aux montagnes alpines, de la Piér. du Navet, page 161. n°. 145.

Page 165. n°. 155. Piér. Mélite. — La femelle eſt d'un jaune beaucoup plus pâle & tirant ſur le verdâtre. La baſe de ſes ailes inférieures eſt marquée en deſſous de deux points d'un jaune-orangé. Chez les deux ſexes, le deſſus des ailes ſupérieures offre le plus ſouvent au ſommet une ligne oblique de trois points du même jaune que le fond.

Page 168. n°. 165. Piér. Genutia. — Libythée.

GENRE LIBYTHÉE.

Cellule discoïdale des secondes ailes ouverte postérieurement.

GENRE DANAÏDE.

Cellule discoïdale des secondes ailes fermée postérieurement.

Page 175. n°. 32 du tableau. Dan. Cléobule; *liſez* Cléophile.

Page 188. n°. 40. Dan. Misippe. — Nymphale. (*Voyez* Nymph. Misippe, page 394. n°. 153.)

GENRE IDÉA.

Cellule discoïdale des secondes ailes fermée postérienrement.

GENRE HÉLICONIE.

Cellule discoïdale des secondes ailes fermée postérieurement.

Page 209. n°. 18. Hél. Lansdorf; *liſez* Langsdorff.

Page 211. n°. 23. Hél. Thallo. — Nocturne, que Linné a pris pour un diurne.

GENRE ACRÉE.

Cellule discoïdale des secondes ailes fermée postérieurement.

Page 231. n°. 3. Acr. Entoria. — *Pap.* P. *Andromacha.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *pag.* 182. *n°.* 564.

Page 234. n°. 13. Acr. Cynthia. — *Liſez* Cynthoa, & de même à la page 228. n°. 13 du tableau.

Page 236. n°. 20. Acr. Ombre. — Paroît être une nymphale, du moins par la cellule diſcoïdale des ſecondes ailes.

GENRE CÉTHOSIE.

Cellule discoïdale des secondes ailes ouverte postérieurement.

Page 245. n°. 6. Céth. Vibilie. — Acrée.

Page 246. n°. 7. Céth. Aliphéra. — Acrée.

GENRE ARGYNNE.

Cellule discoïdale des secondes ailes ouverte postérieurement.

Page 262. n°. 18. Arg. Tephnie. — Mâle de l'argynne Niphé, page 261. n°. 17.

Page 268. n°. 27. Arg. Myrina. — *Liſez* Myrissa, & de même à la page 235. n°. 27 du tableau; placez-la entre l'Euphrosyne & la Séléné.

Page 278. col. 2. lig. 35, de l'Allemagne & de la Ruſſie; *liſez*, de l'Allemagne, de la Ruſſie & de la France.

GENRE VANESSE.

Cellule discoïdale des secondes ailes ouverte postérieurement.

Page 299 n°. 8. Van. Aglatonice. — *Pap.* D. *Anacardii.* Linn. *Syſt. Nat.* 2. *p.* 758. *n°.* 74. — *Muſ. Lud. Ul.* 236.

Pap. Anacardii. Clerck, *Icon. tab.* 28. *fig.* 1.

Pap. P. *Anacardii.* Fab. *Mant. Inſ. tom.* 2. *pag.* 17. *n°.* 177. — *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *pag.* 183 *n°.* 567.

Pap. Parhaſſus. Drury, *Inſ. tom.* 3. *pl.* 4. *fig.* 1. 2.

Pap. Æthiopa. Palliſot-Beauvoir, *Inſ. liv.* 1. *pl.* 3. *fig.* 1. 2. a. b.

Pap. Opale. Palliſot-Beauvoir (*texte*), *pag.* 22. *livr. ibidem.*

Sans la figure de Clerck, on ne le douteroit jamais que ce lépidoptère fût le même que celui auquel Linnæus donne le nom d'*Anacardii*. Il ſe trouve ſur la côte occidentale d'Afrique, & principalement vers le golfe de Guinée. Linnæus & Fabricius l'ont probablement confondu avec un ſatyre d'Amérique, voiſin du philoctète, page 680.

Pag. 300. n°. 11. Van. Corinne. — Nymphale. (*Voyez* Nymph. Corinne, page 360. n°. 35.)

Page 300. n°. 12. Van. Dione. — Nymphale. (*Voyez* Nymph. Dioné, page 360. n°. 34.)

Page 301. n°. 14. Van. Demonica. — *Pap.* N. *Eurocilia.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *pag.* 79. *n°.* 247.

Pap. Delius. Drury, *Inſ. tom.* 3. *pl.* 14. *fig.* 5. 6.

Elle ſe trouve à Sierra-Léone en Afrique, ſelon Drury.

Page 302. n°. 16. Van. F-Blanche. — N'eſt qu'une variété du C-Blanc, page *ibidem*, n°. 17.

Page 315. n°. 43. Van. Emma. — *Pap.* N. *Zingha.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 117. *n°.* 338.

Pap. Ameſtris. Drury, *Inſ. tom.* 3. *pl.* 20. *fig.* 3.

Elle ſe trouve à Sierra-Léone en Afrique.

Page 315. n°. 44. Van. Micalia. — Nymphale. (*Voyez* Nymph. Micalia, pag. 415. n°. 205.)

Page 317. n°. 48. Van. Orithye. — *Voyez* le Supplément ci-après, n°. 48 *duplicata.*

Page 317. n°. 49. Van. Calybé. — *Pap.* N. *Vellida.* Fab. *Entom. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *pag.* 91. *n°.* 283.

Pap. Velleda. Donov.

Page 319. n°. 54. Van. Atalante. — Se trouve auſſi dans l'Amérique ſeptentrionale, comme le dit Fabricius.

Page 324. n°. 64. Van. Callithéa. — Argynne.

GENRE BIBLIS.

Nervure supérieure ou sous-costale des premières ailes très-renflée à son origine; cellule discoïdale des secondes ailes ouverte postérieurement.

Page 326. col. 1. lig. 26, au bord d'en haut; *liſez*, ou bord d'en haut.

Page 327. n°. 7. Bib. Illithye. — Vaneſſe.

GENRE MORPHO.

La deuxième diviſion de ce genre forme actuellement le genre Pavonie, *Pavonia*, lequel ſe diſtingue des morphos proprement dites en ce qu'il a les palpes moins barbus, la nervure inférieure

du deſſus des premières ailes courbée en S à ſon origine, & la cellule diſcoïdale des ſecondes ailes fermée poſtérieurement. (Les mâles de quelques eſpèces de ce nouveau genre ont, à la région du bord interne des ailes inférieures, une fente longitudinale couverte de poils.)

GENRE SATYRE.

Page 491. n°. 46. Sat. Pagyris. — *Satyrus argenteus.* Swainſon, *Zoological illuſtrations, or original figures and deſcriptions*, &c., *cah.* 1. *pl.* 5.

Page 520. colon. 2. lig. 27, celui des inférieures; *liſez*, celui des ſupérieures.

Page 528. colon. 2. lig. 38, *pag.* 22. *n°.* 701; *liſez*, *pag.* 224. *n°.* 701.

Page 547. colon. 1. lig. 4, ſans taches aux ſupérieures; *liſez*, ſans taches aux inférieures.

GENRE ÉRYCINE.

Page 587. n°. 111. Eryc. Ædon. (P. R. *Ægon.* Fab.) — Répond à notre argynne Pygmæa, page 290. n°. 63. C'eſt une véritable argynne.

GENRE HESPÉRIE.

Page 714. n°. 10 du tableau. Heſp. Polybie; — *liſez* Polybe.

Page 727. n°. 162 du tableau. Heſp. Néron; — *liſez* Heſp. Nerva.

Nota. Le défaut de conſervation, ou le manque d'objets, ne nous a pas permis de pouſſer plus loin nos rectifications.

ESPÈCES

ESPÈCES ADDITIONNELLES.

GENRE PAPILLON.

Nota. Pour indiquer la place que chaque eſpèce ſupplémentaire doit occuper dans le genre dont elle fait partie, nous employons, ſuivant l'uſage, deux chiffres ſéparés par un trait : ainſi, par exemple, le ſigne 10—11, qui précède le papillon *Floridor*, ſignifie que ce lépidoptère doit être mis entre le n°. 10 & le n°. 11 du genre PAPILLON.

10—11. PAPILLON Floridor.

PAPILIO Floridor.

Pap. alis dentatis, nigris : anticis utrinquè albido radiatis : poſticis ſubtùs maculis baſeos annuliſque marginalibus ſanguineis.

Il a de cinq à ſix pouces d'envergure. Le mâle eſt noir, avec des raies blanchâtres à l'extrémité des ailes ſupérieures de part & d'autre, & ſeulement à l'extrémité des inférieures en deſſus. Les ailes inférieures ont à l'angle de l'anus un cercle rouge ſurmonté d'un groupe d'atomes bleus. Leur deſſous offre à la baſe cinq taches triangulaires, & le long du bord terminal ſix anneaux d'un rouge-vermillon. Il y a encore deux anneaux ſemblables, mais dont l'un plus alongé, ſur le bord interne de ces mêmes ailes. Les trois anneaux extérieurs du bord terminal ſont ouverts, tandis que les trois autres, & au moins l'un des deux du bord interne, ſont fermés. Le deſſous des ailes ſupérieures eſt marqué à la baſe d'une tache longitudinale rouge.

La femelle ſe diſtingue du mâle, en ce que la tache rouge de la baſe de ſes premières ailes ſe reproduit en deſſus; en ce que ſes ſecondes ailes n'ont pas de raies blanchâtres, & que leur milieu eſt blanc ſur chaque face. Deux autres caractères qu'il eſt bon de ne pas omettre, c'eſt que ces dernières ailes ont en deſſus deux taches rouges, indépendamment du cercle anal, & que les anneaux de leur deſſous ſont tous ouverts, à l'exception cependant de celui qui occupe le haut du bord interne.

Des Philippines.

12—13. PAPILLON Mémercus.

PAPILIO Memercus.

Pap. alis ſubdentatis, concoloribus, ſuſconigris : anticis apice griſeſcenti radiatis, poſticis immaculatis. (Mas.)

Papilio Nox? SWAINSON, *Zoological Illuſtrations, or original figures and deſcriptions*, &c. *cah.* 21. *pl.* 102.

Il eſt large d'environ quatre pouces, & d'un noir-brun de part & d'autre. Ses ailes ſupérieures ſont entières, & elles ont l'extrémité rayée longitudinalement de griſâtre. Ses ailes inférieures ſont foiblement dentées & ſans aucune tache. Le corps eſt de la couleur des ailes, avec les côtés de la poitrine, le deſſous des palpes & le bout de l'anus d'un rouge-cramoiſi. Les antennes ſont entièrement noires.

Décrit d'après un individu mâle de la collection de M. Marchand, amateur à Chartres.

Il ſe trouve dans l'île de Java.

Nota. Le papillon *Nox* de M. Swainſon paroît n'en différer que par l'abſence des raies griſâtres du bout des ailes ſupérieures.

46—47. PAPILLON Serville.

PAPILIO Serville.

Pap. alis caudatis, dimidiatim flaveſcentibus nigriſque : anticis ſuprà apice ſulciis duabus abbreviatis albidis; poſticis lunulâ anali ſanguineâ punctiſque marginalibus niveis.

Il eſt un peu plus grand que le *Dolicaon*, auquel il reſſemble beaucoup. Le deſſus de ſes ailes eſt d'un jaune-d'ocre pâle depuis la baſe juſque vers le milieu, enſuite noir juſqu'au bout. Sur la partie noire, les ailes de devant ont deux bandes blanchâtres, tranſverſes & triangulaires, dont l'intérieure interrompue par une nervure bifurquée, l'extérieure plus courte & plus étroite. Les ſecondes ailes, qui ont trois dents inégales, avec une queue noire, linéaire, très-longue & terminée par du jaune-fauve; les ſecondes ailes, dis-je, offrent parallélement au bord poſtérieur une ſérie de points blancs, & leur échancrure anale eſt jaune & accompagnée d'une lunule écarlate.

Le deſſous des quatre ailes diffère du deſſus, en ce qu'il a un léger reflet violâtre; en ce que la bande extérieure du bout des premières ailes eſt remplacée par une bande bifide à ſon origine & deſcendant juſqu'à l'angle interne, où elle finit en pointe; en ce que les points blancs marginaux des ſecondes ailes ſont ſurmontés d'un rang de taches jaunâtres, luiſantes, grandes & preſqu'en forme de coin; enfin, en ce que la lunule rouge de l'angle de l'anus s'appuie ſur deux arcs d'ato-

mes blancs. Le corps & les antennes ſont comme chez le *Dolicaon*.

Décrit d'après un individu unique appartenant à M. de Serville, l'un des auteurs de la *Faune françaiſe*, & poſſeſſeur d'une des plus riches collections entomologiques de la capitale.

Il habite l'Amérique méridionale.

47—48. Papillon Devilliers.

Papilio Devilliers.

Pap. alis caudatis, atro-viridibus, nitidis, ſuprà lunularum cœruleſcentium ſerie poſticâ : inferioribus ſubtùs maculis argenteis, interpoſitis lunulis ſanguineis.

Papillon Devilliers. Godart, *Mém. de la Société Linnéenne de Paris, tom. 2. pl. 1 des lépid. fig. 3. 4.*

Nous ne connoiſſons ce lépidoptère que par un individu mâle & unique, recueilli dans l'île de Cuba.

Il a environ trois pouces & demi d'envergure. Ses ailes ont le deſſus d'un vert-bronzé-luiſant, & liſeré de blanc aux échancrures, avec une rangée poſtérieure de lunules bleuâtres, beaucoup plus grandes aux inférieures qu'aux ſupérieures.

Le deſſous des premières ailes reſſemble au deſſus, mais la couleur du fond varie ſelon les incidences de lumière ; les lunules & le liſeré des échancrures ſont plus larges, & il y a un arc de points blancs à l'extrémité de la cellule diſcoïdale.

Le deſſous des ſecondes ailes eſt vert, avec l'origine de la côte & tout le bord poſtérieur d'un blanc-mat, le milieu d'un brun-pourpre & chargé de huit à neuf taches argentées, dont trois plus grandes & enveloppées extérieurement par les autres. Sur le blanc du bord poſtérieur règne un cordon de taches argentées, bordées chacune en dehors par un chevron noir, & en dedans par une lunule d'un rouge-ferrugineux. On voit en outre une tache rouge au-deſſus de l'angle de l'anus. La queue de ces ailes eſt médiocrement longue & un peu en ſpatule. Le corps eſt vert en deſſus, avec des points blanchâtres ſur la tête ; il eſt noir en deſſous, avec une rangée de taches jaunâtres ſur chaque côté de l'abdomen. Les antennes ſont noires.

Dédié à M. le capitaine Devilliers, chevalier de St.-Ferdinand d'Eſpagne, amateur non moins recommandable par ſes connoiſſances & par ſon zèle, que par ſon extrême obligeance à communiquer les eſpèces inédites de ſon intéreſſante collection.

61—62. Papillon Jaſon.

Papilio Jaſon.

Pap. alis ſubcaudatis, ſuprà fuſcis, faſciâ poſticiſque maculis ſex viridibus. Linn.

Papilio E. A. *Jaſon.* Linn. *Syſt. Nat.* 2. *p.* 752. *n°.* 38. — *Muſ. Lud. Ulr. p.* 210.

Papilio Jaſon? Esp. *Pap. exot. tab.* 58. *fig.* 5.

D'après la figure ſuſmentionnée d'Eſper, ce papillon paroît bien être le même que l'*Eurypile* (*pag.* 45. *n°.* 61) ; mais, d'après Linnæus, il en diffère par l'abſence des taches & de la ligne rouges du deſſous des ailes inférieures. Ces caractères manquent-ils conſtamment, ou ſont-ils effacés dans l'individu décrit par Linnæus ? C'eſt ce qu'il nous eſt impoſſible de décider pour le moment ; notre but eſt ſeulement d'appeler l'attention du lecteur ſur ce point.

Des Indes orientales.

68—69. Papillon Empedocle.

Papilio Empedocles.

Pap. alis caudatis, fuſcis : anticis utrinquè faſciâ maculari viridi, tranſverſâ, mediâ : poſticis ſubtùs ad angulum ani lunulis duabus nigris.

Papilio N. Empedocles, *alis caudatis, fuſcis : anticis faſciâ abbreviatâ, maculari, viridi : poſticis ſubtùs maculis duabus anguli ani.* Fab. *Mant. Inſ. tom. 2. p. 10. n°. 94. — Ent. Syſt. em. tom. 3. pars 1. p. 70. n°. 217.*

Papilio Empedocles. Donov. *of an Epitom. of the Nat. Hiſt. Inſ. of Ind. cah. 14. pl. 2. fig. 1*

Fabricius met à tort ce lépidoptère parmi les *Nymphales.*

Il eſt grand. Ses ailes ſupérieures ſont ſinuées, d'un brun-obſcur de part & d'autre, avec une bande verte, tranſverſe, médiaire, & formée de cinq à ſix taches, dont les antérieures plus petites. Les ailes inférieures ont le deſſus d'un brun-obſcur, avec la baſe plus pâle. La queue qui les termine eſt large, médiocrement longue, arrondie & blanchâtre à ſon extrémité.

Le deſſous de ces dernières ailes eſt à peu près de la couleur du deſſus, avec deux lunules anales noires, ſurmontées chacune d'un croiſſant roux, & des atomes blanchâtres avant le bord poſtérieur. Le corps eſt brun, avec des poils blancs ſur l'abdomen. Les antennes ſont noires.

Des Indes orientales.

73—74. Papillon Coréſilas.

Papilio Coreſilaus.

Pap. alis caudatis, ſubhyalino flaveſcentibus, utrinquè faſciis tribus nigris : poſticarum faſciâ mediâ ſubtùs lineâ ſanguineâ longitudinaliter diviſâ.

Il ſe diſtingue du *Protéſilas* par les caractères ci-après : 1°. ſes ailes ne ſont pas blanches, mais d'un jaune-pâle, & ſans teinte verdâtre à la baſe ; 2°. les premières n'ont que trois bandes noires,

dont l'antérieure discoïdale, & ne descendant pas au-delà du milieu de la surface; la suivante fourchue ou en Y, & se réunissant près de l'angle interne à la postérieure qui est tout-à-fait marginale. 3°. Les trois bandes des secondes ailes sont visibles de part & d'autre, & l'intermédiaire d'entre elles est entièrement divisée en dessous par une ligne rouge, au lieu d'y être bordée par une ligne de cette couleur. 4°. Les lunules jaunâtres de l'extrémité des mêmes ailes ne forment qu'une seule rangée, & les croissans bleuâtres qui les accompagnent sont au nombre de cinq au lieu d'être au nombre de trois.

Le mâle ressemble à la femelle.

Recueilli au Brésil par M. le chevalier de Langsdorff.

105—106. Papillon Homère.

Papilio Homerus.

Pap. alis caudatis, atris: anticis fasciâ mediâ maculisque flavis: posticis flavescentibus, serie marginali è maculis septem nigris extùs lunulâ ferrugineâ marginatis.

Papilio E. A. Homerus, *alis caudatis, nigris, fasciâ flavâ: posticis subtùs flavescentibus, maculis ocellaribus septem.* Fab. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. pag. 29. n°. 85.*

Papilio Homerus. Jon. *Fig. pict. 1. tab. 8.*

Papilio Homerus. Esp. *Pap. exot. tab. 46. fig. 1.*

Il est grand. Son port est le même que celui du *Lycoreus*; c'est-à-dire qu'il a aussi une queue assez longue en spatule, plus une dent anale prolongée & aiguë. Le dessus de ses ailes est d'un noir-brun: celui des supérieures a deux bandes jaunes, transverses, dont l'extérieure formée de six taches; l'intérieure continue, un peu courbe en arrière, précédée en avant d'une tache oblique également jaune & voisine de la côte. Les ailes inférieures ont le milieu traversé d'un bord à l'autre par une bande jaune, large, dentée en dehors. Leur queue est toute noire & surmontée de deux lunules rouges, convexes en dehors.

Le dessous des premières ailes ne diffère du dessus que parce que la bande du bout se réduit à quatre taches, dont l'antérieure seule bien prononcée.

Le dessous des secondes ailes est jaunâtre, avec une bande blanchâtre, discoïdale, transverse, & une rangée postérieure de sept taches noires, orbiculaires, séparées de la bande du milieu par des groupes d'atomes bleuâtres, & bordées chacune extérieurement par une lunule ferrugineuse ou d'un rouge-fauve. Le corps est noir en dessus, jaunâtre en dessous.

De l'Amérique.

121—122. Papillon De Lalande.

Papilio De Lalande.

Pap. alis caudatis, concoloribus, nigris, fasciâ mediâ transversâ ochreaceâ: fasciâ anticarum bifidâ, posticarum extùs dentatâ.

Papillon De Lalande. Godart, *Mém. de la Société Linnéenne de Paris, tom. 2. pl. 1 des lépid. fig. 1. 2.*

Il a près de quatre pouces d'envergure. Le dessus des ailes est noir, avec une bande transverse & médiaire d'un jaune-d'ocre pâle. La bande des ailes supérieures forme à son origine deux branches, dont l'intérieure plus large & d'un gris-verdâtre. La bande des ailes inférieures offre à son côté externe six dents très-aiguës, & elle aboutit à l'angle anal, angle au-dessus duquel on voit une petite tache rousâtre que surmonte un arc d'atomes bleus. Outre cela, le bord postérieur des premières ailes est précédé dans toute sa longueur d'une série de neuf points jaunes, & il y a sur chaque échancrure, ainsi qu'au bout de la queue, une lunule également jaune. La queue est assez longue & en spatule.

Le dessous des quatre ailes ressemble au dessus, mais il est plus pâle, excepté sur le côté externe de la bande & le long du bord postérieur. Le corps est noir en dessus; il est brun en dessous, avec la poitrine & les palpes jaunes. Les antennes sont entièrement noires.

Recueilli en Cafrerie, sur les bords de *Groot-Fisch Rivier*, par feu De Lalande, chevalier de la légion d'honneur & aide-naturaliste au Jardin du Roi.

129—130. Papillon Polygius.

Papilio Polygius.

Pap. alis caudatis, nigris, virescenti-nitidis: anticis utrinquè ad apicem griseo-virescenti radiatis: posticis subtùs maculis novem chermesinis.

Il a environ trois pouces & demi d'envergure. Ses ailes sont d'un noir-foncé, chatoyant en verdâtre. Les premières ont de part & d'autre, vers l'extrémité, des raies longitudinales grisâtres. Le dessus des secondes ailes offre à l'angle de l'anus une tache rouge, plus ou moins obscure, & accompagnée parfois d'une autre plus petite.

Le dessous de ces dernières ailes a neuf lunules d'un rouge-carmin tendre; savoir: six alignées le long du bord postérieur, les trois autres groupées entre le milieu du bord interne & la cellule discoïdale. Le corps est noir, avec les palpes, les côtés de la poitrine, les anneaux du ventre & l'anus d'un rouge-écarlate. Les antennes, la trompe & les pattes sont noires.

La femelle ressemble au mâle, mais les raies

grifes de ſes premières ailes ſont moins apparentes.

Des Philippines.

133—134. Papillon ? Palamède.

Papilio Palamedes.

Pap. alis caudatis, nigris, lunulis marginalibus flavis : anticis faſciâ flavâ, poſticis maculâ rufâ. Fab.

Papilio N. *Palamedes.* Fab. *Syſt. Ent. p.* 454. *n°.* 45. — *Spec. Inſ. tom.* 2. *p.* 18. *n°.* 73. — *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 10. *n°.* 84. — *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 68. *n°.* 213.

Quoique nous n'ayons point vu ce lépidoptère, nous ſoupçonnons qu'il appartient plutôt au genre *Papillon* qu'aux *Nymphales* parmi leſquelles Fabricius l'a placé.

Le corps eſt grand, noir en deſſus, jaune en deſſous, avec quatre points blancs ſur la tête. Les antennes ſont renflées en dehors. Les ailes ſupérieures ſont concaves, noires, avec une bande arquée & des taches marginales jaunes vers la baſe. Les ailes inférieures ont une bande de lunules rouſſes, puis une bande de lunules bleues peu prononcées, & enſuite une ſérié terminale de lunules jaunes. Leur angle anal offre une lunule rouſſe, & leur queue eſt obtuſe & tout-à-fait noire.

Le deſſous reſſemble au deſſus, mais les lunules rouſſes & les lunules bleues des ailes inférieures ſont plus diſtinctes.

De l'Amérique.

(*Traduction de Fabricius.*)

137—138. Papillon Aſcalus.

Papilio Aſcalus.

Pap. alis caudatis, concoloribus, vireſcenti-nigris, ſtrigâ communi mediâ albâ : poſticis maculis marginalibus chermeſinis, geminatis.

Il a environ trois pouces & demi d'envergure. Le deſſus de ſes ailes eſt d'un noir-verdâtre, avec une bandelette ou raie blanche, commençant en pointe vers le bout de la côte des ſupérieures, & finiſſant preſque carrément vers le milieu du bord interne des inférieures. Ces dernières ailes ſont dentées, liſerées de blanc à chaque échancrure, & terminées par une queue de moyenne longueur, un peu en ſpatule. Sur leur bord poſtérieur eſt une ſuite de taches très-noires, grandes, longitudinales, cunéiformes, chargées chacune de deux taches d'un rouge-carmin, leſquelles ſont triangulaires & unies par un de leurs angles.

Le deſſous des quatre ailes reſſemble au deſſus, mais le fond eſt un peu plus pâle, & les taches rouges des inférieures ſont plus claires, du moins dans l'individu que nous décrivons. Le corps eſt noir, avec des points d'un rouge-carmin ſur la poitrine & ſur les côtés du ventre.

Du Bréſil.

138—139. Papillon Harris.

Papilio Harriſianus.

Pap. alis caudatis, nigris, faſciâ communi mediâ alba : anticis ſuprà maculâ baſeos ſanguineâ ; poſticis utrinquè maculis marginalibus chermeſinis, emarginatis.

Papilio Harriſianus. Swainson, *Zoological Illuſtrations, or original figures and deſcriptions*, &c. *cah.* 22. *pl.* 109.

Ce papillon a été dédié par M. Swainſon à M. Moſes Harris, artiſte anglais très-diſtingué.

Il a environ trois pouces d'envergure. Le deſſus des ailes eſt noir, avec une bande blanche, commune, médiaire, n'atteignant ni la côte des ſupérieures, ni le bord interne des inférieures. Les ailes ſupérieures ont à la baſe une tache d'un rouge-vermillon. Les inférieures ſont dentées, & terminées par une queue aſſez longue, un peu en ſpatule. Leur extrémité offre une ſérie de ſept taches échancrées d'un rouge-carmin.

Le deſſous diffère du deſſus en ce que la baſe des quatre ailes a pluſieurs taches vermillon, & en ce que les inférieures ſont marquées au bord interne d'une veine très-rouge qui aboutit aux taches baſilaires, mais ne touche pas la tache anale. Le corps eſt noir & ſans taches.

Il eſt des individus chez leſquels la bande des premières ailes monte à peine juſqu'au diſque ; il en eſt d'autres qui ſont ſans bande aux ailes inférieures, & qui n'ont qu'une tache blanche tranſverſale au bord interne des inférieures. Le deſſus de ces dernières ailes n'offre parfois que quatre taches rouges à ſon extrémité ; celles qui avoiſinent le ſommet manquent.

Du Bréſil.

GENRE THAÏS.

1—2. Thaïs Cériſy.

Thais Ceriſy.

Th. alis ſubcaudatis, flaveſcentibus : anticis utrinquè faſciis ſeptem tranſverſis nigris ; poſticis ſtrigâ poſticâ è lunulis ſex coccineis.

Thaïs Ceriſy. Godart, *Mém. de la Société Linn. de Paris, tom.* 2. *pl.* 2 *des lépid.*

Nous ne connoiſſons cette nouvelle Thaïs que d'après un ſeul individu, qui nous a été généreuſement offert par M. Lefebure de Cériſy, ingénieur de la marine à Toulon.

Elle a approchant deux pouces & demi d'envergure. Le deſſus de ſes ailes eſt d'un jaune très-pâle, avec la baſe noire & garnie de poils blan-

châtres. Les ailes supérieures offrent sept bandes noires transversales, dont les trois antérieures courtes & appuyées obliquement sur la côte, les trois suivantes maculaires & plus longues, la septième terminale & crénelée. Les ailes inférieures ont six taches écarlates, dont la supérieure isolée vers le milieu du bord d'en haut, les cinq autres alignées parallèlement au bord d'en bas. Ces taches sont suivies d'autant de lunules noires sur lesquelles il y a une poussière bleuâtre, & le bord postérieur est longé par une ligne noire anguleuse & interrompue. On remarque en outre quatre à cinq points noirs derrière la cellule discoïdale.

Le dessous des premières ailes ressemble au dessus, mais il est luisant, & les deux bandes noires de son extrémité sont moins apparentes.

Le dessous des secondes ailes présente des différences qui consistent : 1°. en ce que le bord antérieur, le milieu de la surface & celui de chaque échancrure sont lavés de blanc-argenté; 2°. en ce que la cellule du disque renferme trois taches longitudinales d'atomes noirâtres. Le corps est velu, jaunâtre, avec le dos noir, & sept lignes transversales orangées sur chaque côté de l'abdomen. Les antennes, la trompe & les pattes sont noires.

Prise au mois de février, sur les montagnes élevées & arides d'Ourlac (archipel de la Méditerranée).

Nota. Cette espèce se distingue de ses congénères en ce qu'elle a la deuxième dent après l'angle de l'anus prolongée en manière de queue.

GENRE LIBYTHÉE.

2. Libythée Téréna. (*Duplicata.*)

Libythea Terena.

Libyt. alis angulato-dentatis : anticis utrinquè maculis quatuor albis; posticis suprà disco albido seu rufescente.

La description que nous avons donnée de cette espèce (*pag.* 170), ayant été faite sur un individu mâle, n'est point exacte; c'est pourquoi nous en donnons ici une nouvelle d'après plusieurs exemplaires des deux sexes.

Son envergure est d'environ deux pouces. Ses ailes supérieures sont d'un brun-noirâtre de part & d'autre, avec quatre taches blanches, dont une en forme de point vis-à-vis du sommet, les deux suivantes disposées en une bande oblique; la quatrième longitudinale, très-grande, & prenant une teinte fauve près de l'origine de l'aile.

Le dessus des ailes inférieures est roussâtre dans le mâle, blanchâtre dans la femelle, avec tout le pourtour extérieur d'un brun-noirâtre & sinué à son côté interne. Le dessous est d'un gris-rosé, piqué de noirâtre, avec deux taches près du milieu du bord d'en haut, & le bord postérieur moins son angle externe, d'un brun-obscur. Le corps est brun en dessus, gris en dessous. Les antennes sont noirâtres & finement annelées de blanc.

Dans la variété mâle dont nous avons parlé à la page 170, la tache longitudinale de la base des premières ailes est tout-à-fait fauve.

Des Antilles, & principalement de l'île de Cuba.

5—6. Libythée Geoffroy.

Libythea Geoffroy.

Libyt. alis angulato-dentatis, suprà fuscis, violaceo nitidis : anticis apice punctis tribus albidis, posticis disco maculâ rufescente.

Libythée Geoffroy. God. *Mém. de la Société Linn. de Paris, tom. 2. pl. 2 des lépid.*

Nous n'avons vu que le mâle de cette libythée.

Il a un peu plus de deux pouces d'envergure. Le dessus de ses ailes est d'un brun-noirâtre, avec presque toute la surface des supérieures, & la base des inférieures, glacées de violet-argentin. Les ailes supérieures ont vis-à-vis du sommet trois points blanchâtres, plus ou moins distincts & formant un arc oblique. Les ailes inférieures offrent vers leur milieu une tache roussâtre qui est coupée par une nervure.

Le dessous des premières ailes est d'un brun-clair, avec une tache longitudinale fauve à la base, plusieurs points blancs groupés deux à deux sur le milieu, & des atomes d'un gris-violet au sommet.

Le dessous des secondes ailes est d'un brun piqué de violâtre, avec trois bandes blanchâtres, transverses, dont les deux postérieures se réunissant à l'angle externe de l'aile. Le corps a le dessus brun, le dessous gris. Les antennes sont noirâtres, avec la base annelée de blanc en dessous, la massue grêle & terminée de fauve.

Dédiée à M. le chevalier Geoffroy-Saint-Hilaire, membre de l'Académie des Sciences, professeur au Muséum d'histoire naturelle, à la Faculté des Sciences de Paris, &c. &c.

De l'île de Java.

GENRE COLIADE.

1—2. Coliade Clorinde.

Colias Clorinde.

Col. alis angulatis, virescenti-albidis (Mâle *pallidioribus*), *disco singularum puncto ocellari aurantio : anticis suprà medium costæ versus maculâ citrinâ.*

Elle a de trois pouces & demi à quatre pouces d'envergure. Le dessus de toutes les ailes est d'un blanc-verdâtre, avec un point central orangé à

prunelle noire. Les ailes supérieures offrent en outre vers le milieu de la côte une grande tache d'un jaune-citron.

Le dessous est verdâtre & légèrement réticulé, avec un point central incarnat répondant au point oculaire de la surface opposée. Le corps est de la couleur des ailes, & les antennes sont d'un gris-rosé qui s'étend sur la tête.

Les femelles, où du moins les deux que nous avons vues, sont un peu plus verdâtres que les mâles; mais elles ont la tache jaune du dessus des ailes supérieures moins prononcée.

Du Brésil.

GENRE PIÉRIDE.

56—57. Piéride Thymétus.

Pieris Thymetus.

Pier. alis integerrimis, flavis, limbo communi fusco. Fab.

Papilio F. *Thymetus.* Fab. *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 30. *n°.* 320. — *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *pag.* 56. *n°.* 173.

Ce lépidoptère paroît avoir tant de rapport avec la piéride (*par correction* la coliade) *similax* que nous le plaçons immédiatement après elle.

Fabricius le décrit ainsi : il est petit. Les antennes sont noires, annelées de blanc, avec la sommité de la massue fauve. Le corps est jaunâtre, avec le corselet noirâtre. Le dessus des ailes est jaune, avec tout le limbe postérieur noir. Leur dessous est d'un jaune-pâle, avec des ondes fauves.

Il habite.....

87—88. Piéride Cronissa.

Pieris Cronissa.

Pier. alis integris, concoloribus : anticis nigris, disco maculisque marginalibus albis ; posticis albis immaculatis.

Papilio Cronis. (Mas.) Cram. *pl.* 60. *fig.* C.

Cramer a pris cette piéride pour le mâle de la castnie *Cronis.* (*Voyez ci-dessus* genre Castnie, page 801, n°. 17.)

Elle a environ deux pouces & demi d'envergure. Ses premières ailes sont noires de part & d'autre, avec des taches blanches, dont une très-grande occupant le disque & se terminant en pointe à la base de l'aile, quatre ou cinq linéaires & longitudinales sur la côte, les autres en forme de points & alignées le long du bord postérieur. Les secondes ailes sont blanches, & sans taches en dessus comme en dessous. Le corselet est noir, avec une tache rouge à l'origine de chaque épaulette.

Des Indes occidentales.

102—103. Piéride Placidia.

Pieris Placidia.

Pier. alis suboblongis, integerrimis, immaculatis, supra nigro-fuscis, subtus glaucis.

Papilio Placidia. Stoll, *Pap. Suppl. à* Cram. *pl.* 28. *fig.* 4 & 4 C.

Elle a approchant trois pouces d'envergure. Ses quatre ailes sont d'un brun-noirâtre en dessus, d'un vert-blanchâtre en dessous, & sans taches de part & d'autre.

Décrite d'après un individu sans corps.

De l'île d'Amboine.

103—104. Piéride Libérius.

Pieris Liberius.

Pier. alis suboblongis, integerrimis, immaculatis, supra plumbeis : subtus anticis virescentibus, posticis lutescentibus.

Papilio F. Liberius, *alis integerrimis, plumbeis : subtus anticis viridibus, posticis fulvis.* Fab. *Spec. Inf. tom.* 2. *p.* 52. *n°.* 229. — *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 25. *n°.* 264. — *Entom. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 42. *n°.* 126.

Papilio Liberia. Cram. *pl.* 210. *fig.* G. H.

Elle a un peu plus de deux pouces & demi d'envergure. Le dessus de ses quatre ailes est couleur de mine de plomb. Le dessous des supérieures est verdâtre, le dessous des intérieures d'un jaune-fauve. Les unes & les autres sont sans taches de part & d'autre, seulement leur bord terminal est légèrement noir.

De l'île d'Amboine.

155—156. Piéride Mélia.

Pieris Melia.

Pier. alis oblongis, integerrimis : anticis nigris, lineâ longitudinali maculisque duabus transversis flavis : posticis supra flavis, liturâ limboque nigris ; subtus puncto baseos coccineo.

Elle a le port & la taille de la piéride *Mélite* (*pag.* 165). Le dessus des premières ailes est noir, avec une raie longitudinale à la base, puis deux taches transverses, jaunes. La tache antérieure est large, tandis que la postérieure est petite & trifide.

Le dessus des secondes ailes est jaune, avec le limbe postérieur, l'extrémité des nervures, & une liture arquée vers le bord interne, noirs.

Le dessous des premières ailes ressemble au dessus, excepté qu'il est plus pâle & que la tache jaune de l'extrémité est plus grande.

Le dessous des secondes ailes est d'un brun-noirâtre-pâle, avec des taches jaunes tout le long des bords & sur le disque. Il offre en outre à la

baſe un gros point d'un rouge-écarlate. Le corps eſt noir en deſſus, jaune en deſſous. Les antennes ſont noires.

Décrite d'après un individu mâle, appartenant à M. Florent Prévoſt.

Du Bréſil.

GENRE DANAÏDE.

Obſerv. Les Danaïdes forment trois diviſions diſtinctes; ſavoir :

1°. Mâles ayant le bord interne des premières ailes fortement arqué.

2°. Mâles ayant vers le milieu du bord interne des premières ailes une petite bande ou raie longitudinale, formée par des écailles plus claires & diſpoſées autrement que ſur le reſte de la ſurface.

3°. Mâles ayant une petite poche au-deſſous de la cellule diſcoïdale des ſecondes ailes.

Nous avons déjà ſignalé la première & la troiſième diviſions dans la note des pages 177 & 184 de ce volume.

2. Danaïde Eunice.

Danais Eunice. (*Voyez* page 177.)

Danaïde Eunice. *Voy. du cap.* de Freycinet, *pl.* 83. *fig.* 1.

Les individus recueillis dans l'île Guam (une des Mariannes), par MM. les docteurs Quoy & Gaimard, ont conſtamment la tache du milieu des ailes ſupérieures plus grande que ceux qui ſe trouvent à Java.

12—13. Danaïde Dufreſne.

Danais Dufreſne.

Dan. alis integris, ſuprà nigris, violaceo mutabili nitidiſſimis : anticis utrinquè fuſciâ apicis abbreviatâ albâ.

Elle a environ trois pouces d'envergure. Le deſſus de ſes ailes eſt noir, avec un reflet d'un bleu-violet très-vif & changeant de place ſelon les aſpects. Les premières ont vis-à-vis du ſommet une bande blanche, oblique, courte, maculaire, & le long du bord poſtérieur une ſérie de points d'un blanc-bleuâtre. Les ſecondes ailes ſont ſans taches dans le mâle, mais elles ont chez la femelle une rangée marginale de petits points blanchâtres, plus trois taches blanches orbiculaires alignées tranſverſalement en face du ſommet.

Le deſſous diffère du deſſus, en ce que le fond eſt brun; en ce qu'il y a des points bleuâtres ſur le milieu des ailes ſupérieures des deux ſexes, & à l'extrémité des ailes inférieures du mâle. Un caractère qu'il eſt encore bon d'indiquer, c'eſt que chaque aile a un petit liſeré blanc interrompu. Le corps eſt noir, avec des points blancs ſur la poitrine ainſi que ſur le corſelet, & une ſérie de taches d'un gris-bleuâtre le long du ventre. Les antennes ſont noires.

Dédiée à M. Dufreſne, chef des travaux zoologiques au Jardin du Roi.

Des Philippines; collection de M. Cotty de Brécourt.

16—17. Danaïde Swainſon.

Danais Swainſon.

Dan. alis integris, fuſcis : anticis utrinquè fuſciâ apicis abbreviatâ, poſticis punctis marginalibus in ſerie duplici, albis.

Elle a environ trois pouces d'envergure. Le deſſus des quatre ailes eſt d'un brun-noirâtre, avec une double ſérie de points blancs le long du bord poſtérieur. Il y a en outre, vis-à-vis du ſommet des premières ailes, une bande blanche, oblique, courte & maculaire.

Le deſſous reſſemble au deſſus, mais le fond eſt un peu plus clair; le diſque des ailes ſupérieures offre trois ou quatre taches blanches inégales, & le diſque des inférieures deux ou trois points blanchâtres. Le corps eſt brun, avec des points blancs ſur la poitrine ainſi que ſur le corſelet, & un rang de taches griſes le long du ventre. Les antennes ſont noires.

La femelle ne diffère du mâle que parce qu'elle a le bord interne des premières ailes un peu concave, & ſans raie longitudinale luiſante.

Dédiée à M. William Swainſon, qui publie en ce moment, avec figures, un très-bel ouvrage anglais ſur la zoologie.

Des Indes orientales; collection de M. Cotty de Brécourt.

17—18. Danaïde Eleutho.

Danais Eleutho.

Dan. alis repandis, fuſcis, fuſciâ maculari punctiſque marginalibus albis.

Danaïde Eleutho. *Voy. du cap.* de Freycinet, *pl.* 83. *fig.* 2.

Cette danaïde ſe diſtingue de celles de ſa diviſion par la concavité du bord poſtérieur des premières ailes & par les ſinus du bord analogue des ſecondes.

Elle a environ trois pouces d'envergure. Le deſſus de ſes ailes eſt d'un brun-noirâtre, avec une bande maculaire poſtérieure, & des points marginaux, blancs. La bande des premières ailes n'atteint pas la côte. La bande des ſecondes eſt échancrée ſur les côtés dans ſon milieu.

Le deſſous reſſemble au deſſus; mais le fond eſt plus pâle, la bande des ailes ſupérieures eſt plus longue, & le diſque des inférieures offre quatre

à cinq petits points violâtres. Le corps eſt brun, avec des points blancs ſur la poitrine.

Nous n'avons vu que des mâles. Ils ont aux ailes ſupérieures une raie longitudinale plus claire que le fond.

De Guam, îles Mariannes.

GENRE HÉLICONIE.

22—23. Héliconie Aſſarica.

Heliconia Aſſarica.

Hel. alis oblongis, integerrimis, nigris : anticis ſuprà maculis duabus, poſticis fuſcià dentatâ diſci, albis.

Papilio Aſſarica. Cram. *pl.* 363. *fig.* A. B.

Papilio Aſſarica. Herbst, *Pap. tab.* 79. *fig.* 5. 6.

Elle a environ deux pouces d'envergure. Ses ailes ſont noires, avec deux taches blanches irrégulières vers le milieu des ſupérieures, & une large bande dentée, également blanche, ſur le milieu des inférieures.

Le deſſous diffère du deſſus en ce que la côte & le bord poſtérieur des quatre ailes ſont chargés d'une ſérie de points blancs.

Cramer la dit de l'île d'Amboine; mais ne ſeroit-elle pas plutôt du nouveau continent?

GENRE CÉTHOSIE.

9—10. Céthosie Leſchenault.

Cethosia Leſchenault.

Ceth. alis dentatis, ſuprà violaceo-nigris, holoſericeis; ſubtùs ferrugineis, nigro vireſcentique variegatis : omnibus utrinquè faſciâ terminali ochreaceâ.

Par le deſſus des ailes, cette eſpèce a quelques rapports avec le *Morio* ou vaneſſe *Antiope*. (*Voyez* page 308. n°. 28.)

Son envergure eſt de trois pouces & demi. Ses ailes ſont à peu près rondes, & dentées. Leur deſſus eſt d'un noir-velouté à reflet violâtre, avec une bande d'un jaune-d'ocre, terminale, large, ſe répétant en deſſous, & formée par des taches très-voiſines, qui ſont en forme de coin. En avant de cette bande, & non loin de la côte, le deſſus des premières ailes offre deux taches du même jaune.

Le deſſous de chaque aile eſt ferrugineux, & deſſiné ainſi qu'il ſuit : entre la baſe & le milieu ſont trois bandes tranſverſes d'un vert-griſâtre, coupées dans le ſens de leur longueur par des lignes noires; vient enſuite, parallèlement à la bande terminale, une ſérie de petites taches plus ou moins noires, réniformes, entourées de jaunâtre aux ailes de devant, de cendré à celles de derrière.

Recueillie dans l'île de Java par M. le chevalier Leſchenault, voyageur du Gouvernement.

GENRE ARGYNNE.

14—15. Argynne Clagia.

Argynnis Clagia.

Arg. alis ſubdentatis, fulvis, ſuprà limbo poſtico aut ſtrigis tribus undulatis nigris : ſubtùs margaritaceo nitidis, ſtrigâ ocellorum.

Elle a environ deux pouces d'envergure. Le deſſus du mâle eſt d'un fauve-jaune, avec une large bande terminale d'un noir-violet, & bordée à ſon côté interne par des points très-noirs. Il y a en outre aux ſecondes ailes une ligne noire qui ſe dirige obliquement du diſque à l'angle de l'anus. Le deſſous a la moitié antérieure fauve & glacée de gris de perle; la moitié poſtérieure ferrugineuſe, avec trois lignes nacrées, tranſverſes & flexueuſes, dont les deux antérieures ſéparées par une ſérie d'yeux roux à prunelle noire. Le corps eſt verdâtre en deſſus, griſâtre en deſſous.

La femelle a le deſſus d'un fauve-obſcur, avec trois lignes ondulées tranſverſales, & un cordon de points, noirs; ſans compter une tache nacrée occupant le milieu de la côte. Son deſſous reſſemble à celui du mâle, mais il eſt généralement plus terne.

De l'île de Java; collection de MM. Marchand & Devilliers aîné.

15—16. Argynne Egeſtine.

Argynnis Egeſtina.

Arg. alis ſubcaudatis, baſi ſuprà fulvis, apice nigris : poſticis ſubtùs nitidè glaucis, ſtrigâ ocellorum.

Argynne Egeſtine. *Voyage du capitaine* de Freycinet, *pl.* 83. *fig.* 4.

Elle a le port & à peu près la taille de l'*Egiſta*. Le deſſus des quatre ailes eſt fauve depuis la baſe juſqu'au milieu, enſuite noir juſqu'au bout.

Le deſſous des ailes ſupérieures eſt jaunâtre & ſans taches vers le bord interne; il eſt brun vers la côte, avec la baſe verdâtre & coupée tranſverſalement par quatre lignes noires, le milieu marqué d'une bande blanche luiſante, derrière laquelle il y a une bande verdâtre peu prononcée.

Le deſſous des ailes inférieures eſt d'un vert-blanchâtre-luiſant, avec une rangée tranſverſe de cinq yeux noirs à iris roux ſur le milieu, & un double cordon de lunules nacrées le long du bord poſtérieur. Le corps eſt noirâtre en deſſus, jaunâtre en deſſous. Les antennes ſont ferrugineuſes.

Recueillie à l'île de Guam (une des Mariannes) par

par MM. Quoy & Gaimard, médecins de l'expédition de M. le capitaine de Freycinet.

24—25. Argynne Eliſa.

Argynnis Eliſa.

Arg. alis ſubdentatis, fulvis, nigro maculatis: poſticis ſubtùs lætè ochraceis, coſtâ baſeos, maculis parvis numeroſſimis pupillâque ocellorum aliquot fuſcefcentium argenteis.

Argynne Eliſa. God. *Tab. méth. des lépid. de France*, Diurnes, *p.* 64. *n°.* 86. 87.

Chez les argynnes *Aglaé*, *Adippé*, *Niobé* (pag. 264, 265, 266), les taches noires du milieu des ailes forment une ligne tranſverſe en zig-zag, & les chevrons qui précèdent le bord poſtérieur ſe touchent. Dans l'argynne *Eliſa*, au contraire, toutes les taches noires ſont iſolées & moins grandes. Le deſſous des ſecondes ailes diffère d'ailleurs en ce qu'il eſt d'un jaune plus gai, qu'il a les taches nacrées plus petites, plus nombreuſes, environnées de brunâtre, & en ce que celles de l'extrémité ſont preſque réniformes, au lieu d'être triangulaires comme dans l'*Adippé* & la *Niobé*. Indépendamment de cela, les nervures du deſſus des ailes ſupérieures du mâle ne ſont point dilatées dans leur milieu.

Communiquée par M. Lefebure de Cériſy.

Elle habite la Corſe & la Sardaigne.

58—59. Argynne Aceſte.

Argynnis Aceſta.

Arg. alis ſubintegris, luteis, anticarum dimidio apicali nigro ſuprà faſciâ flavâ: ſubtùs omnibus fuſco faſciatis.

Papilio N. Aceſte, *alis ſubdentatis: primoribus nigris, baſi fuſciâque flavis; poſticis flavis, ſubtùs faſciis fuſcis.* Linn. *Syſt. Nat.* 2. *p.* 782. *n°.* 191. — *Muſ. Lud. Ulr. p.* 298.

Papilio N. *Aceſte.* Fab. *Syſt. Ent. pag.* 511. *n°.* 287. — *Spec. Inſ. tom.* 2. *p.* 100. *n°.* 442. — *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 54. *n°.* 537.

Papilio S. *Aceſte.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 245. *n°.* 764.

Papilio Aceſta. Clerck, *Icon. tab.* 43. *fig.* 5. 6.

Papilio Aceſte. Herbst, *Pap. tab.* 145. *fig.* 3. 4.

Papilio Aceſte. Cram. *pl.* 121. *fig.* E. F.

Stoll, *Suppl. à* Cram. *pl.* 6. *fig.* 6. (la chenille.) *fig.* 6. E. (la chryſalide.)

Fabricius a placé cette eſpèce parmi les *Nymphales*, puis parmi les *Satyres*; mais par ſa chenille, elle nous paroît appartenir aux *Argynnes*.

Son envergure eſt d'environ deux pouces. Les premières ailes ont la moitié antérieure d'un jaune-fauve; l'autre moitié noire, avec une bande oblique, jaune ou blanchâtre, puis un arc tranſverſal de trois points blancs. Le deſſus des ſecondes ailes eſt d'un jaune-fauve, avec une double rangée marginale de taches noires, dont les intérieures lunulées. Le deſſous des premières ailes diffère du deſſus, en ce qu'il y a à la baſe quelques lignes noires tranſverſes, & au ſommet quatre raies blanchâtres, également tranſverſes. Le deſſous des ſecondes ailes eſt d'un gris-violâtre, rayé tranſverſalement de brun, & marqué avant le bord poſtérieur d'une ſuite de lunules bleues. L'empreinte des lignes brunes des quatre ailes ſe fait ſentir en deſſus.

La chenille vit ſur le *cacaoyer*. Stoll la repréſente d'un vert-pâle, avec une ligne jaunâtre le long de chaque côté, des épines noires & légèrement branchues ſur le dos. La tête, qui eſt pareillement noire, offre deux épines ſemblables, mais un peu plus longues.

La chryſalide eſt brune, rayée de jaune & parſemée de points argentés. Elle a ſur le dos quatre pointes noires, & ſa partie antérieure eſt profondément biſide.

De Surinam.

64. Argynne Télétuſe.

Argynnis Teletuſa.

Arg. alis oblongis, denticulatis, ſuprà nigro-fuſcis, anticarum maculis, poſticarum faſciâ, fulvis: ſubtùs anticis ocello unico, poſticis quinque, cæcis.

Elle a environ un pouce & demi d'envergure. Ses quatre ailes ſont foiblement dentées, d'un brun-noirâtre en deſſus, avec quatre taches inégales ſur les ſupérieures, une bande, puis une ligne ondulée ſur les inférieures, fauves. Les échancrures du bord terminal ſont en outre ciliées de blanchâtre ou de jaune-pâle.

Le deſſous des premières ailes eſt fauve vers la baſe, avec un point plus pâle, noirâtre au milieu, avec deux taches d'un jaune-d'ocre; brunâtre à l'extrémité, avec un œil & une ligne flexueuſe obſcurs, plus une liture blanche devant le ſommet.

Le deſſous des ſecondes ailes eſt d'un brun plus ou moins jaunâtre, avec des taches à la baſe, une bande peu prononcée au milieu, une rangée de lunules avant le bord poſtérieur, d'un blanc-violâtre-luiſant. Entre la bande & les lunules ſont cinq taches noirâtres, un tant ſoit peu cerclées de jaunâtre. Le corps & les antennes ſont comme dans le *Janthé*.

Quelquefois la bande du deſſus des ſecondes ailes & les trois taches antérieures du deſſus des premières ſont d'un jaune-d'ocre; il n'y a de fauve que la tache poſtérieure des ailes de devant.

Du Bréſil.

65. Argynne Janthé.

Argynnis Janthe.

Arg. alis oblongis, dentatis, suprà nigro-fuscis, anticarum maculis, posticarum fasciâ, albis : subtùs anticis ocellis duobus pupillatis, posticis sex cæcis.

Papilio N. Janthe, *alis dentatis, suprà fuscis, albo subfasciatis : posticis subtùs ocellis quinque cæcis.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 102. *n°.* 315.

Papilio Hera. Cram. *pl.* 253. *fig.* F. G.

Papilio Hera. Herbst, *Pap. tab.* 239. *fig.* 1. 2.

Par sa forme, cette espèce sembleroit appartenir à la division des *Nymphales* à ailes oblongues; mais il suffit de voir les palpes & ses antennes pour être convaincu que c'est une *argynne*.

Elle a entre un pouce & demi & deux pouces d'envergure. Les quatre ailes sont dentées, d'un brun-noirâtre en dessus, avec plusieurs taches éparses sur le milieu des supérieures, & une bande transverse & étroite sur le milieu des inférieures, blanches. Les échancrures du bord terminal sont en outre garnies de cils blancs.

Le dessous des premières ailes est d'un jaune-fauve depuis la base jusqu'au milieu, avec deux points blancs cerclés de noir; brun du milieu à l'extrémité, avec des taches & une ligne ondulée blanches, plus deux yeux à prunelle & à iris de cette couleur.

Le dessous des secondes ailes est d'un brun-jaunâtre-pâle, avec des taches à la base, une bande transverse sur le milieu, une série de lunules avant le bord postérieur, blanches. Entre ces lunules & la bande il y a une rangée transverse de six gros points noirs bordés de blanc. Le corps est noirâtre en dessus, blanchâtre en dessous. Les antennes sont brunes, annelées de blanc, avec la sommité de la massue fauve.

La femelle se distingue du mâle en ce que les lunules de l'extrémité de ses ailes inférieures se répètent en dessus, du moins dans les individus que nous avons vus.

De la Guyane & du Brésil, & non de la Guinée comme le dit Cramer.

66. Argynne Flavia.

Argynnis Flavia.

Arg. alis oblongis, integris, dilutè fulvis, suprà omnium limbo postico anticarumque liturâ obliquâ nigris : posticis subtùs undis ferrugineis strigâque punctorum fuscorum.

Elle a de quinze à dix-sept lignes d'envergure. Le dessus de ses quatre ailes est blond ou d'un fauve-clair, avec une bordure terminale noire. La bordure des secondes ailes est surmontée d'une ligne en feston de sa couleur. Les premières ailes ont à la base quelques *figmas* noirâtres, & derrière le milieu une liture noire, oblique, souvent interrompue.

Le dessous des ailes supérieures ressemble au dessus, mais il est plus pâle, tant sous le rapport du fond que sous celui du dessin. Le dessous des secondes ailes est légèrement ondé de ferrugineux, & il offre avant les deux lignes de l'extrémité une rangée transverse de points noirâtres. Ces points se répètent quelquefois en dessus, principalement chez la femelle.

Du Brésil.

GENRE VANESSE.

5 (*duplicata*). Vanesse Hyppocla.

Vanessa Hyppocla.

Van. alis subcaudatis, suprà nigris, fasciis communibus fulvis aut albis : subtùs lutescentibus, brunneo reticulatis; posticis strigâ è maculis margaritaceis.

Nous n'avons décrit dans le temps que le mâle de cette espèce (*voy.* page 298). La femelle en diffère en ce que les bandes du dessus de ses ailes sont blanches au lieu d'être fauves; en ce qu'elle a le dessous plus pâle, l'abdomen blanchâtre & annelé de brun.

De Java, d'Amboine & de la Chine.

5—6. Vanesse Hypsélis.

Vanessa Hypselis.

Van. alis subcaudatis, suprà nigris, fasciis communibus fulvis : subtùs albis, nigro multimaculatis; posticis strigâ ex ocellis viridimontanis. (Mas.)

Nous avions pris d'abord ce lépidoptère pour une variété de l'*Hyppocla;* mais il forme une espèce distincte, dont la femelle nous est encore inconnue.

Il ressemble en dessus à l'*Hyppocla* (page 268). En dessous, il est blanc vers la base, d'un jaune-orangé pâle à l'extrémité, avec une multitude de taches noires, parmi lesquelles les premières ailes offrent une tache ferrugineuse, réniforme & longitudinale. Les secondes ailes ont, avant le bord postérieur, une rangée transverse de cinq taches d'un vert de montagne, placées sur un fond noir & encadrées de jaune. La troisième & la quatrième, à compter du sommet, sont cunéiformes, tandis que les autres sont lunulées & plus petites.

De Java.

13—14. Vanesse Léthé.

Vanessa Lethe.

Van. alis subcaudatis, suprà fulvis : anticis apice latè nigro fasciâ maculisque fulvis; posti-

eis lineis marginalibus nigris, anteriore abbreviatâ dilatatâque.

Papilio N. Lethe, *alis dentato-caudatis, fulvis : anticis apice nigris fasciâ maculisque flavis.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *pag.* 80. *n°.* 250.

Papilio Lethe. Jon. *Fig. pict.* 5. *tab.* 18. *fig.* 2.

Papilio Lethe. Donov. *of an Epit. of the Nat. Hist. Inf. of India, cah.* 3. *pl.* 2, *fig.* 1.

Elle a environ deux pouces d'envergure. Le dessus des premières ailes est d'un fauve-foncé à la base; ensuite noir jusqu'au bout, avec une bande oblique sur le milieu, & cinq taches vis-à-vis du sommet, fauves ou jaunes. Les taches forment deux lignes, dont l'antérieure oblique & surmontant un point blanc, la postérieure transverse & courbée en arrière.

Le dessus des secondes ailes est d'un fauve-foncé, avec trois lignes marginales, dont l'antérieure très-dilatée vers la côte & ne descendant pas au-delà du niveau du disque. Il y a en outre, entre le bord interne & l'origine de la petite queue, une suite de trois croissans plus ou moins blanchâtres.

Le dessous des premières ailes est d'un jaune-pâle, réticulé de ferrugineux, avec deux ou trois points, puis une double liture, d'un blanc-violâtre vers l'extrémité.

Le dessous des secondes ailes ressemble au dessous des premières, près du bord d'en haut; mais il est ensuite d'une couleur feuille-morte plus ou moins obscure, avec une rangée de trois plus deux points oculaires à prunelle violâtre, & une série marginale de lunules lilas-clair. Les trois lunules placées entre le bord interne & la petite queue sont surmontées d'atomes verdâtres, & il y a entre la base & le disque trois à quatre *figmas* bleuâtres, consécutifs.

Du Brésil.

14—15. Vanesse Paullus.

Vanessa Paullus.

Van. alis bicaudatis, supra fulvis : anticis apice nigro maculis fulvis; posticis angulo ani cœrulescente.

Papilio N. Paullus, *alis dentato-bicaudatis, fulvis apice nigris : posticis subtùs variegatis, maculâ baseos albâ.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *pag.* 65. *n°.* 199.

Papilio Paullus. Jon. *Fig. pict. tab.* 78. *fig.* 2.

Elle a environ deux pouces & demi d'envergure. Le dessus de ses ailes est fauve. Les premières ont au sommet un large espace noir, avec trois taches fauves, inégales, & un seul point blanc. Il y a en outre sur leur milieu une ligne noire, transversale & presqu'en S. Les secondes ailes offrent avant le bord postérieur trois lignes noires, tortueuses, indépendamment desquelles on voit à l'angle de l'anus une tache noire saupoudrée de bleu.

Le dessous des quatre ailes est jaunâtre, avec deux lignes ferrugineuses, transverses, bordées de bleuâtre sur un de leurs côtés, & séparées de la base par quelques taches blanches. Vis-à-vis du sommet des premières ailes, est une ligne arquée de quatre points dont les deux antérieurs & le postérieur ocellés, l'autre plus gros & tout blanc. Le bord terminal des secondes ailes est longé par un cordon de lunules violâtres.

Chez la femelle, le dessus des premières ailes est moins noir au sommet que chez le mâle.

Des Antilles.

15 (*duplicata*). Vanesse Point d'interrogation.

Vanessa P. *interrogationis.*

Van. alis angulatis, supra fulvis nigro maculatis, margine postico cœsio : posticis subtùs ? argenteo notatis.

Ainsi que nous l'avons dit à la page 302, Fabricius a confondu le C-*Aureum* de Linnæus avec cette espèce américaine.

Elle a deux pouces à deux pouces & demi d'envergure. Le dessus des ailes est fauve, avec huit ou neuf taches noires inégales aux supérieures, & trois aux inférieures. Son extrémité qui est d'un ferrugineux plus ou moins intense, avec une série transverse de taches jaunâtres, est bordée extérieurement de bleu-cendré.

Le dessous est d'un brun-noirâtre ou feuille-morte, plus ou moins nuancé de gris-violet, avec une tache argentée en forme de point d'interrogation ou de C interrompu sur le disque des ailes inférieures. On remarque en outre vers le bout des quatre ailes une rangée transversale de points noirs, en partie sablés de bleuâtre.

La femelle, ordinairement plus grande que le mâle, a l'origine de la côte jaune & réticulée de ferrugineux en dessous. Le prolongement de ses secondes ailes est en outre plus prononcé, & le dessus de ses premières ailes offre neuf taches noires.

Voyez pour la synonymie & pour la description de la chenille, les pages 301 & 302 de ce volume.

De l'Amérique septentrionale.

19 (*duplicata*). Vanesse Progné.

Vanessa Progne.

Van. alis angulatis, supra fulvis, maculis anticarum octo posticarumque apice lato nigris : posticis subtùs angulo albo notatis.

Elle reſſemble beaucoup à L-*Blanche* (p. 303); mais, outre qu'elle eſt d'un fauve plus foncé en deſſus, elle a le limbe terminal des premières ailes, & preſque la moitié poſtérieure des ſecondes, noirs. Les ondes griſes du deſſous de ſes ailes occupent d'ailleurs plus d'eſpace.

Nous avions vu d'abord, comme Cramer & Fabricius, un individu chez lequel l'angle blanc du deſſous des ailes inférieures étoit effacé, c'eſt ce qui nous a fait dire que cette eſpèce n'avoit pas de tache ſur le diſque; mais nous ſommes actuellement convaincus du contraire. D'après cela, il faut regarder comme non-avenu le dernier alinéa du n°. 18, page 304, puiſque le lépidoptère que nous y ſignalons eſt le même que la *Progné*.

De l'Amérique ſeptentrionale & de la Jamaïque.

24 (*duplicata*). Vanesse Xanthomélas.

Vanessa Xanthomelas.

Van. alis ſuprà fulvis, limbo latè nigro lunulis violaceo-cœruleis: anticis maculis quatuor diſci nigris lunulâque apicis albâ: poſticis ſubtùs ſtrigâ mediâ nigricante, antrorſùm biangulatâ.

Vaneſſa Xanthomelas. God. *Tab. méth. des lépid. de France*, Duponchel, *page* 41. *n°.* 113.

Comme nous n'avons donné cette vaneſſe que d'après les auteurs, il eſt néceſſaire que nous en parlions actuellement *ex viſu*.

Elle ſe diſtingue de la *Polychlore* (page 304) par les caractères que voici: 1°. les deux taches ſupérieures du diſque de ſes premières ailes ſont oblongues & lunulées, & celle de l'angle de l'anus eſt ronde, tandis que le contraire a lieu chez la *Polychlore*; 2°. la lunule du ſommet des mêmes ailes eſt toujours blanche, & le jaune eſt à peine ſenſible entre les taches noires de leur bord antérieur; 3°. la bordure terminale des quatre ailes eſt plus large, & celle des ailes inférieures n'eſt ni dentée, ni liſerée de jaunâtre à ſon côté interne; 4°. la ligne noirâtre qui traverſe en deſſous le milieu de ces dernières ailes forme deux angles, au lieu d'un, à ſa partie antérieure. On pourroit encore ajouter que les lunules marginales bleues du deſſus tirent davantage ſur le violet.

On la trouve en Allemagne & en Alſace, ſur la rive du Rhin.

38—39. Vanesse Pélaſgis.

Vanessa Pelaſgis.

Van. alis dentatis: anticis falcatis, poſticis intùs ſubcaudatis: omnibus fuſcis, faſciâ ſuprà rufeſcente, ſubtùs albâ; anticarum bifidâ.

Nous ne connoiſſons cette eſpèce que par un individu unique, pris au pays des Hottentots par feu M. De Lalande.

Il a environ deux pouces & un quart d'envergure. Le deſſus des ailes eſt d'un brun-noirâtre, & entièrement traverſé au milieu par une bande rouſſâtre, ſur laquelle ſont alignés des points noirs à prunelle bleuâtre. Les premières ailes ont à la baſe deux raies fauves, courtes, tranſverſales, & leur bande offre près de la côte une fiſſure profonde qui renferme deux points blancs.

Le deſſous reſſemble au deſſus, mais la bande eſt blanche, au lieu d'être rouſſâtre, & il n'y a pas de raies fauves près de l'origine des ailes ſupérieures. Ainſi, ce lépidoptère ne peut être confondu avec le *Laodoni*, puiſqu'il n'a aucune tache ſur le bord poſtérieur des ailes, & que les points de la bande ſont ocellés de part & d'autre.

39—40. Vanesse? Proſopé.

Vanessa? Proſope.

Van. alis dentatis, fuſcis, faſciâ communi fulvâ: anticarum punctis duobus nigris. Fab.

Papilio N. *Proſope.* Fab. *Syſt. Ent. p.* 504. *n°.* 260. — *Spec. Inſ. tom.* 2. *p.* 91. *n°.* 400. — *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 49. *n°.* 483. — *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 120. *n°.* 367.

Papilio Proſope. Donov. *Gen. Illuſtr. of Ent. part.* 1. *an Epit. of the Nat. Hiſt. Inſ. of New Holl. pl.* 27. *fig.* 2.

Elle a environ deux pouces & demi d'envergure. Le deſſus des ailes eſt d'un brun-obſcur, particulièrement à l'extrémité, avec une bande fauve, commune, large, diſcoïdale. Cette bande eſt ſans taches aux ſecondes ailes; mais elle offre deux points aux premières, leſquelles ont en outre au ſommet deux taches fauves.

Le deſſous de toutes les ailes eſt plus pâle que le deſſus, avec une rangée poſtérieure de points noirs. Les points des ailes de devant ſont ſimples. Ceux des ailes de derrière ont un iris ferrugineux peu diſtinct, & ils ſont précédés d'une ligne blanche & ondulée.

Décrite d'après Fabricius & Donovan.

De la Nouvelle-Hollande.

42—43. Vanesse? Pythia.

Vanessa? Pythia.

Van. alis angulato-dentatis, fuſcis: anticis maculâ albidâ: ſubtùs griſeis, poſticis ſtrigâ punctorum nigrorum. Fab.

Papilio N. *Pythia.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 116. *n°.* 357.

Comme Fabricius place ce lépidoptère immédiatement à côté de ſon *Zingha* (notre Emma), il eſt très-probable que c'eſt une vaneſſe.

Il eſt de moyenne taille, & il a les ailes très-anguleuſes. Leur deſſus eſt d'un brun-obſcur, avec

une grande tache blanchâtre vis-à-vis du sommet des supérieures. Le dessous des quatre ailes est gris, avec une rangée transverse de six points blancs, appuyés chacun sur un point noir.

De la Guinée.

(*Traduction de Fabricius.*)

48 (*duplicata*). Vanesse Orithye.

Vanessa Orithya.

Van. alis denticulatis, supra nigris, singularum ocellis duobus unipupillatis : anticis subfalcatis, costâ baseos albâ ; posticis rotundatis, fasciâ cyaneâ.

Papilio N. Orithya, *alis dentatis, fuscis : omnibus supra ocellis duobus, anticis subtus unico.* Linn. *Syst. Nat.* 2. *p.* 770. *n°.* 137. — *Mus. Lud. Ulr. p.* 278.

Papilio N. *Orithya.* Fab. *Syst. Ent. pag.* 490. *n°.* 208. — *Spec. Inst. tom.* 2. *p.* 70. *n°.* 315. — *Mant. Inst. tom.* 2. *p.* 35. *n°.* 367. — *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 91. *n°.* 248.

Sulz. *Inst. tab.* 17. *fig.* 1. 2.

Roes. *Inst.* 4. *tab.* 6. *fig.* 2.

Papilio Orithya. Cram. *pl.* 19. *fig.* C. D. (La femelle.)

Papilio Orithya. Cram. *pl.* 32. *fig.* E. F. (Le mâle.)

Papilio Orithya. Cram. *pl.* 290. *fig.* A. B. (Le mâle.) *fig.* C. D. (La femelle.)

Nous avons donné pour la femelle de l'*Orithye* un lépidoptère qui en est très-voisin, mais qui forme une espèce distincte. Il devient donc nécessaire que nous décrivions de nouveau cette variété, afin qu'on ne la confonde pas avec celle qui y avoit été réunie.

L'orithye a le plus ordinairement deux pouces & un quart d'envergure. Le dessus de chaque aile est d'un noir-foncé & velouté dans le mâle, d'un noir-brun dans la femelle, avec deux yeux noirs à prunelle d'un bleu-violet & à iris d'un fauve-rougeâtre. Les premières ailes, dont la côte est blanchâtre depuis sa naissance jusqu'au milieu, ont vers la base quatre petites lignes obliques, alternativement fauves & bleuâtres; & vers le bout trois raies blanches, dont l'intérieure plus large, plus courte & comprimée au côté interne, l'intermédiaire interrompue par l'œil supérieur & descendant jusqu'à l'œil inférieur; la troisième maculaire & longeant tout le bord terminal, bord dont les échancrures sont blanches. Les secondes ailes ont le long du même bord une double ligne blanche sinuée, & surmontée d'une bande bleue, qui, dans le mâle, se replie vers la côte pour gagner la base, tandis que dans la femelle, au contraire, elle couvre l'angle interne des ailes supérieures. Le dessous de ces dernières ailes est fauve depuis son origine jusqu'au milieu, avec trois bandes blanchâtres, transverses, sinuées, bordées de noir; ensuite grisâtre jusqu'à l'extrémité, avec un ou deux yeux assez semblables à ceux de la surface opposée. Le dessous des ailes inférieures est tantôt blanchâtre, tantôt d'un gris-brun, avec des lignes roussâtres, flexueuses & transverses vers la base; quatre yeux, dont les deux intermédiaires beaucoup plus petits vers l'extrémité. Ces yeux sont remplacés quelquefois par des points à peine distincts, notamment dans les femelles. Le corps est noir en dessus, grisâtre en dessous. Les antennes sont blanchâtres, avec la massue noire.

Bengale, Chine, Java.

48—49. Vanesse Orthosie.

Vanessa Orthosia.

Van. alis denticulatis, supra nigricantibus : anticis subfalcatis, costâ baseos fuscâ : posticis rotundatis, ocellis sesquitertiis, anteriori tripupillato.

Papilio Orithya. Cram. *pl.* 281. *fig.* E. F.

Nous l'avions prise pour la femelle de l'*Orithye ;* mais elle en diffère en ce que l'origine de la côte des premières ailes est brune au lieu d'être blanchâtre; en ce que l'œil de leur angle interne est beaucoup plus grand, moins rond, & accompagné de part & d'autre de deux points noirs renfermés dans le même iris que lui; en ce que le dessus des secondes ailes est sans bande bleue, & qu'il a trois yeux lilas, dont l'antérieur plus grand & pourvu de trois prunelles blanches, l'intermédiaire très-petit & adhérant au postérieur; enfin, en ce que le dessous de ces dernières ailes a cinq taches oculaires, dont la seconde & la cinquième plus grossies.

De l'île d'Amboine.

Nota. On voit par la synonymie que Cramer la rapporte à l'orithye.

55—56. Vanesse Dejean.

Vanessa Dejeanii.

Van. alis subdentatis, supra fuscis : anticis dimidio apicali nigro fasciâ flavescente mediâ repandâ ; posticis ocellis quatuor marginalibus rufis.

Elle est à peu près de la taille de l'*Atalante*, à laquelle elle ressemble beaucoup en dessous.

Le dessus des ailes supérieures est brun à la base & tout le long du bord interne, ensuite très-noir jusqu'au bout, avec une bande d'un jaune-sale, transverse, centrale, courbe, sinuée, & suivie de cinq taches blanches inégales, dont l'intérieure appuyée obliquement sur la côte, les quatre au-

tres en forme de points & disposées en arc vis-à-vis du sommet. Le dessus des secondes ailes est brun, avec une rangée terminale de quatre yeux roux à prunelle noire, & surmontés chacun d'un point immédiat de cette couleur : outre cela, il y a à l'angle de l'anus deux petits groupes d'atomes violâtres.

Le dessous des premières ailes offre les mêmes caractères que le dessus; mais l'origine du bord antérieur est entrecoupée de jaunâtre, la bande adhère par son côté interne à un V ferrugineux; il y a entr'elle & la tache blanche intérieure un anneau bleu, & le sommet est brun, avec une ligne violâtre transversale.

Le dessous des secondes ailes est brun, avec la base finement réticulée de blanc, le milieu de la côte marqué d'une tache d'un gris-lilas, & le bord postérieur longé par une ligne bleue, ligne avant laquelle il y a une série de cinq yeux presqu'effacés. Ce bord est, ainsi que celui des premières ailes, liseré de blanc aux échancrures. Le corps est brun en dessus, jaunâtre en dessous. Les antennes sont noires, annelées de blanc, avec la sommité de la massue rousse.

Les deux sexes sont semblables.

Dédiée à M. le baron Dejean, savant entomologiste, à qui nous en devons la connoissance.

Elle habite l'île de Java.

56—57. Vanesse Chrysités.

Vanessa Chrysites.

Van. alis denticulatis : anticis subtruncatis utrinquè violaceo-nigris, fasciis calthaceis : posticis rotundatis, subtùs maculâ costali stramineâ, emarginato-trigonâ.

Nymphalis Chrysites. Recueil d'observations de zool. & d'anat. comp., par Alex. de Humboldt & A. Bonpland, vol. 1. *p.* 245. *fig.* 1. 2. (La femelle.)

Puisque le renflement brusque de la massue des antennes est le caractère qui distingue principalement les Vanesses des Nymphales, l'espèce dont il s'agit ici doit appartenir au premier de ces deux genres.

Elle a de deux pouces & un quart à deux pouces & demi d'envergure. Le dessus des premières ailes est d'un noir à reflet violet dans les deux sexes, avec trois bandes transverses d'un jaune-fouci chatoyant, & dont la postérieure maculaire plus courte, marquée d'un point blanc ou blanchâtre. Le mâle a le dessus des secondes ailes d'un noir-brun, avec un espace discoïdal d'un bleu-violet-luisant, grand & arrondi en dehors. La femelle a le dessus des mêmes ailes d'un brun-noirâtre, & entièrement traversé dans son milieu par une bande-fouci un peu glacée de violet, large, coupée parallèlement au bord postérieur par une ligne noirâtre en feston, & que surmonte près de l'angle anal un point également noirâtre. Le dessous des ailes de devant, dans le mâle comme dans la femelle, diffère du dessus en ce que l'espace qui sépare les deux bandes antérieures offre un gros point bleu; en ce que le sommet est bai-brun, avec une rangée courbe & transverse de quatre yeux, dont les deux antérieurs très-petits, noirâtres, à prunelle & à iris violâtres; le troisième plus grand, blanchâtre, entouré de deux cercles dont l'interne roussâtre, l'externe jaunâtre; le quatrième de la grosseur du précédent, noir, avec la prunelle bleuâtre, l'iris jaunâtre. Ces yeux sont suivis d'un cordon transversal de lunules violâtres. Le dessous des ailes de derrière est bai-brun, teinté de bleuâtre vers la base, marqué au milieu de la côte d'une tache triangulaire & échancrée d'un jaune-paille-luisant, traversé au-delà du milieu par une rangée de quatre yeux entourés d'un cercle jaunâtre, & ayant, à l'exception de l'avant-dernier, une prunelle noire sablée de bleuâtre. Le corps est à peu près du même ton que le fond des ailes. Les antennes sont brunes, annelées & terminées de blanchâtre.

Du Pérou & du Brésil.

57—58. Vanesse? Drusius.

Vanessa? Drusius.

Van. alis integerrimis, fulvis, apice nigris : posticis subtùs punctis albis ocelliscque duabus. Fab.

Papilio N. *Drusius.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 56. *n°.* 172.

Papilio Drusius. Donov. *Gen. Illust. of Ent. part.* 1. *an Epit. of the Nat. Hist. Ins. of Asia, pl.* 26. *fig.* 2.

Elle a le port & la taille de la vanesse du *Chardon* (la belle-dame). Ses antennes sont en massue. Les premières ailes sont fauves, avec l'extrémité noire & chargée d'une bande & d'un point fauve. Les secondes ailes sont fauves, avec le bord terminal noir & précédé de deux points oculaires de sa couleur. Le dessous des quatre ailes est nuancé de ferrugineux : celui des supérieurs offre au milieu une tache blanche flexueuse & une raie noire transverse, à l'extrémité des points blancs & deux yeux à prunelle noire & blanche, sans compter deux autres yeux peu distincts & disposés sur la même ligne. Le dessous des secondes ailes a des points blancs & deux yeux.

De l'île de Rotterdam.

(*Décrite d'après Fabricius.*)

58—59. Vanesse Cælina.

Vanessa Cælina.

Van. alis dentatis, fusco-nigris : anticis subtruncatis, disco suprà nitidè cæruleo : posticis rotundatis, subtùs marmoratis, ocellis octo obsoletis.

Nous n'avons vu que des mâles de ce lépidoptère. Ils ont environ deux pouces & demi d'envergure. Le deſſus des ailes ſupérieures eſt d'un bleu-violet-luiſant, avec l'extrémité d'un noir-brun & coupée par une ligne oblique de trois points blancs. Le deſſus des ſecondes ailes eſt d'un noir-brun, ſans aucune tache. Le deſſous des ailes ſupérieures eſt noirâtre, avec une bande blanchâtre, oblique, peu prononcée; puis trois points blancs correſpondant à ceux du deſſus : derrière ces points, ſont trois petites taches verdâtres, rangées obliquement ſur un fond gris qui s'étend juſqu'au bord du ſommet. Le deſſous des ailes inférieures eſt marbré de brun, de noirâtre & de blanchâtre, & préſente au-delà du milieu une rangée tranſverſale de huit yeux peu prononcés, à prunelle verdâtre & à iris brun. Les échancrures des quatre ailes ſont blanches. Le corps eſt de la couleur des ailes. Les antennes ſont brunes, avec le deſſous de la maſſue jaunâtre.

Du Bréſil.

58—59 *a*. Vanesse Sophronie.

Vanessa Sophronia.

Van. alis dentatis, ſuprà cyaneo-vireſcentibus : anticis ſubtruncatis, utrinquè faſciâ punctiſque albis : poſticis rotundatis, ſubtùs marmoratis, ocellis quinque obſoletis.

Nous n'avons vu que des femelles de cette eſpèce. Elles ont près de deux pouces & demi d'envergure. Le deſſus des ailes eſt d'un vert-bleuâtre un peu luiſant, avec le ſommet des ſupérieures & le pourtour des inférieures noirs. Les ſupérieures ont, au-delà du milieu, une bande blanche, oblique, ſinuée, preſque maculaire, & ſuivie d'une rangée oblique de trois points blancs, dont l'inférieur moins diſtinct. Les ſecondes ailes ſont ſans taches. Le deſſous des ailes de devant eſt noirâtre, avec la baſe & le ſommet griſâtres : on y voit, outre la bande & les points de la ſurface oppoſée, un trait d'un blanc-bleuâtre, peu éloigné de la baſe & appuyé obliquement ſous la côte. Le deſſus des ailes de derrière eſt marbré de blanc, de gris-cendré & de violâtre, avec une ligne d'un brun-foncé, tranſverſe & flexueuſe, ſur le milieu; puis une rangée également tranſverſe de cinq yeux noirâtres, ayant la prunelle bleuâtre, l'iris plus ou moins blanchâtre & peu prononcé. Les échancrures du bord poſtérieur ſont blanches. Le corps eſt bleuâtre en deſſus, gris en deſſous. Les antennes ſont ferrugineuſes, avec la maſſue noirâtre.

Du Bréſil.

59—60. Vanesse Amycla.

Vanessa Amycla.

Van. alis denticulatis, ſuſcis : anticis ſubtruncatis, apice cæruleſcenti-nigro alboque maculato : poſticis rotundatis, ſubtùs ocellis quinque obſoletis.

Nous ne connoiſſons cette eſpèce que par des individus femelles. Leur envergure eſt de près de deux pouces. Le deſſus des ailes eſt d'un brun-obſcur, avec le ſommet des ſupérieures d'un noir-bleuâtre & marqué de quatre taches blanches, le bord terminal des inférieures longé par une ligne noirâtre en feſton. Le deſſous des ailes de devant eſt gris à la baſe, avec du rouſſâtre; noirâtre au-delà du milieu, avec des taches blanches comme deſſus, mais ſéparées par des points bleuâtres; gris au ſommet, avec une ligne violâtre en forme de 3. Le deſſous des ailes de derrière a environ la moitié antérieure violâtre & bordée par une ligne ferrugineuſe très-ſinuée; l'autre moitié d'un brun-rouſſâtre, avec cinq yeux peu prononcés, ferrugineux, à prunelle & à iris d'un gris-violâtre, & entourés de violet-obſcur. Le bord poſtérieur des quatre ailes eſt ferrugineux & irrégulièrement entrecoupé de blanc. Le corps eſt à peu près du même ton que les ailes. Les antennes ſont brunes en deſſus, ferrugineuſes en deſſous.

Du Bréſil.

60—61. Vanesse Sophie.

Vanessa Sophia.

Van. alis denticulatis, anticis ſubfalcatis, poſticis rotundatis : omnibus ſuprà ruſo, nigro flavidoque variis, limbo fuſco, nigro punctato.

Papilio S. Sophia, *alis dentatis, flavo fulvo nigroque variis, margine fuſco, nigro punctato lunuliſque poſticarum albis.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 248. *n°.* 771.

Papilio Sophia. Jon. *Fig. pict.* 4. *tab.* 91. *fig.* 2.

Papilio Sophia. Donov. *of an Epitom. of the Nat. Hiſt. Inſ. of Ind. cah.* 2. *pl.* 2. *fig.* 3.

Fabricius place cette eſpèce dans ſon magaſin des *Satyres*.

Elle a de dix-huit à vingt lignes d'envergure. Le deſſus des premières ailes eſt roux à la baſe, avec quatre lignes noires, courtes & tranſverſales; jaunâtre au milieu, avec les nervures noirâtres; obſcur à l'extrémité, avec une petite bande jaunâtre, courbe, tranſverſe, & ſéparée de l'angle interne par une ſuite de quelques points noirs. Le deſſus des ſecondes ailes eſt obſcur, avec deux petites taches rouſſes à la baſe, une bande jaunâtre ſur le milieu, deux rangs de points noirs & une double ligne blanchâtre ſur le limbe poſtérieur. Le deſſous des quatre ailes ne diffère du deſſus que parce que tout le jaunâtre eſt remplacé par du blanc-luiſant, & le brun-obſcur par du jaune-pâle.

De la côte occidentale d'Afrique. Fabricius dit qu'elle ſe trouve dans les Indes.

63—64. Vanesse ? Sophonisbe.

Vanessa ? Sophonisba.

Van. alis rotundatis, ſubintegris, utrinquè cyaneo-virescentibus, nigro maculatis : anticis fasciâ albâ.

Papilio Sophonisba. Cram. *pl.* 295. *fig.* A. B.

Si la figure de Cramer eſt exacte, ce lépidoptère a bien du rapport avec la vaneſſe *Sophronie ;* mais ſes ailes ſupérieures ſont arrondies, & non tronquées ; la bande blanche de leur deſſus n'eſt ni ſinuée ni ſuivie de points blancs ; le deſſous de ces mêmes ailes eſt verdâtre à la baſe, ainſi qu'à l'extrémité, avec des taches noires ; les deux ſurfaces des ſecondes ailes ſont d'un vert-bleuâtre, avec des taches noires, dont cinq ocellées, & formant une rangée tranſverſe au-delà du milieu.

De Surinam.

GENRE BIBLIS.

5—6. Biblis Antholia.

Biblis Antholia.

Bib. alis dentatis, ſuprà nigris, violaceo micantibus : anticis truncatis, utrinquè albo maculatis : poſticis rotundatis, ſubtùs ſtrigâ mediâ punctorum fuſcorum.

Nous n'avons vu de cette eſpèce que deux individus, & ils étoient ſans abdomen ; leur envergure eſt d'environ trois pouces. Le deſſus des ailes eſt noir, avec un reflet violet aſſez vif. Les ſupérieures, dont le ſommet eſt prolongé & largement tronqué, ont vers le bout une bande blanche, tranſverſe, interrompue dans ſon milieu, & précédée en dehors de deux gros points de ſa couleur. Les ailes inférieures ſont arrondies, dentées & ſans taches en deſſus. Le deſſous des premières ailes eſt d'un brun-noirâtre, avec tout l'angle externe, & une bande correſpondante à celle du deſſus, d'un blanc-violâtre. Le deſſous des ailes de derrière eſt d'un brun-griſâtre, teinté de violâtre, avec deux raies ou bandes plus claires, diſcoïdales, tranſverſes & ſinuées, dont la poſtérieure offrant ſur ſon côté interne une ſérie de cinq à ſix points noirâtres.

Des Antilles, & particulièrement de la Martinique.

5—6 *a.* Biblis Hiarba.

Biblis Hiarba.

Bib. alis dentatis, fuſcis, faſciâ utrinquè communi albâ : poſticarum latiore, bipunctatâ.

Papilio N. Hiarba, *alis dentatis, nigris, faſciâ communi albâ : anticarum abbreviatâ.* Fab. *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 128. *n°.* 391.

Papilio Hiarba. Jon. *Fig. pict.* 5. *tab.* 79. *fig.* 2.

Papilio Hiarba. Donov. *of an Epit. of the Nat. Hiſt. Inſ. of Ind. cah.* 9. *pl.* 3. *fig.* 3.

Papilio Hiarba. Drury, *Inſ. tom.* 3. *pl.* 14. *fig.* 1. 2.

Elle eſt de la taille de la précédente. Le deſſus des ailes eſt d'un brun-noirâtre, avec une bande blanche commune, plus étroite & ſans taches aux ſupérieures, marquée aux inférieures de deux petits points obſcurs : il y a en outre le long du bord terminal des unes & des autres, une ligne flexueuſe d'un gris-cendré. Le deſſous diffère du deſſus en ce que le fond eſt plus pâle ; en ce que la baſe des quatre ailes eſt finement ondée de blanc, & leur milieu traverſé avant la bande par une raie ferrugineuſe, ſinuée & peu diſtincte. Le corps & les antennes ſont de la couleur des ailes.

Priſe dans les grands bois au pays des Hottentots, par M. De Lalande. On la trouve auſſi à Sierra-Léone, mais non dans les Indes comme le dit Fabricius.

5—6 *b.* Biblis Dryope.

Biblis Dryope.

Bib. alis dentatis, fuſcis, faſciâ communi, ſuprà fulvâ & immaculatâ, ſubtùs albidâ : poſticarum latiore ſubtùſque ſeptem punctatâ.

Papilio S. Driope, *alis dentatis, fuſcis, rufo maculatis, apice fulvis : ſubtùs maculis rufis albo cinctis.* Fab. *Spec. Inſ. tom.* 2. *pag.* 107. *n°.* 469. — *Mant. Inſ. tom.* 2. *p.* 61. *n°.* 582. — *Ent. Syſt. em. tom.* 3. *pars* 1. *pag.* 156. *n°.* 793.

Papilio Driope. Cram. *pl.* 78. *fig.* E. F.

Papilio Dryope. Herbst, *tab.* 168. *fig.* 5. 6.

Elle a environ deux pouces d'envergure. Le deſſus des ailes eſt d'un brun-obſcur, faiblement tacheté de roux près de la baſe, & traverſé vers l'extrémité par une bande fauve, commune & ſans taches. La bande des premières ailes n'atteint pas la côte, du moins ordinairement ; celle des ſecondes ailes eſt plus large & précédée en dehors d'une ligne flexueuſe de ſa couleur. Le deſſous de toutes les ailes a environ la moitié antérieure d'une teinte verdâtre, avec des taches ferrugineuſes encadrées de blanc, & le bord poſtérieur d'un brun-pâle, avec une ligne blanche en feſton : à la bande du deſſus correſpond une bande blanchâtre, ſur laquelle les ſecondes ailes ont une rangée courbe de ſept points obſcurs.

De la côte de Guinée.

GENRE

GENRE NYMPHALE.

11—12. Nymphale Schreiber.

Nymphalis Schreiber.

Nym. alis bicaudatis, suprà nigris : subtùs margaritaceo olivaceoque variis, fasciâ mediâ hyalino-albâ.

Elle a un peu plus de trois pouces d'envergure. Le dessus des ailes est d'un noir-verdâtre à la base, d'un noir-violet à l'extrémité, avec une bande blanche, commune, oblique, discoïdale, un peu transparente, terminée en pointe à chaque bout & presqu'entièrement bordée de bleu-pâle à son côté externe. Entre cette bande & le sommet, les premières ailes ont deux points blancs, disposés longitudinalement. Les secondes ailes ont avant le bord postérieur une rangée de sept lunules blanches, & sur ce bord même une rangée de sept lunules fauves, mais dont l'anale moins foncée. Leurs deux queues sont extérieures, linéaires, bleues de part & d'autre, avec les bords noirs.

Le dessous des quatre ailes est d'un gris de perle à la base & vers l'extrémité, d'un vert-olive pâle avant le milieu & le long du bord postérieur. A la bande blanche du dessus correspond ici une bande semblable, mais bordée intérieurement par une ligne noire, & extérieurement par une série de petits croissans blanchâtres, lesquels s'appuient aux secondes ailes sur un cordon de lunules ferrugineuses. Ces dernières ailes sont en outre terminées par sept lunules jaunâtres. Les ailes supérieures ont près de l'origine de la côte deux petits points, & près de l'angle interne une grande tache, noirs. Le corps est verdâtre en dessus, grisâtre en dessous, avec quatre points blancs sur la tête. Les antennes sont noires, avec la sommité ferrugineuse.

Décrite d'après un individu unique appartenant à M. Marchand de Chartres, & dédié au savant M. Schreiber, directeur du cabinet impérial de Vienne.

De l'île de Java.

45—46. Nymphale Franck.

Nymphalis Franck.

Nym. alis subcaudatis, suprà nigris : anticis fasciâ obliquâ albâ azureo marginatâ : posticis subtùs basi fusco inscriptis, apice virescenti pulverulentis.

Nymphale Franck. *Mém. de la Soc. Linn. de Paris, tom. 2. pl.*

Nous ne connoissons ce beau lépidoptère que par un individu mâle & unique, recueilli dans l'île de Java.

Il a environ deux pouces & demi d'envergure. Le dessus des ailes est d'un noir-violet, avec la base verdâtre. Les ailes supérieures ont une bande blanche, anguleuse, largement bordée de bleu d'azur, descendant obliquement du milieu de la côte à l'angle postérieur, & offrant vers l'origine de son côté interne un *stigma* transversal d'un noir-foncé. Il y a en outre près du sommet trois gros points blancs, rangés en arc. Le sommet des ailes inférieures est chargé de deux points semblables, mais bordés de violâtre intérieurement.

Le dessous des premières ailes est d'une couleur nankin, avec une multitude d'hiéroglyphes d'un noir-brun, & parmi lesquels se répètent la bande ainsi que les trois points blancs de la surface opposée.

Le dessous des secondes ailes est nankin vers la base, avec des hiéroglyphes du même noir que ceux des ailes de devant; puis d'un brun-noir jusqu'au bout, avec des lignes nankin, transverses, flexueuses, séparées l'une de l'autre par un large semis d'un vert-grisâtre luisant, semis qui remonte jusqu'au milieu du bord abdominal. A l'angle de l'anus est une lunule ferrugineuse, derrière laquelle sont placées successivement deux taches d'un vert-jaune. Le corps est brun, avec le dessus de l'abdomen jaunâtre. Les antennes sont ferrugineuses.

Dédié à M. Franck de Strasbourg, amateur très-instruit & possédant en lépidoptères d'Europe la collection la plus complète que l'on ait formée jusqu'ici.

222—223. Nymphale Livius.

Nymphalis Livius.

Nym. alis integerrimis, atris, maculâ disci cœruleâ : posticis subtùs cinereis, fasciis rufis argenteo marginatis. Fab.

Hesperia R. *Livius.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 315. *n°.* 194.

Papilio Livius. Jon. *Fig. pict.* 6. *tab.* 38. *fig.* 1.

Elle est de moyenne taille. Toutes ses ailes sont noires en dessus, avec une grande tache bleue sur le disque.

Le dessous des premières ailes est cendré vers la base, avec une grande tache jaune, oblongue & bordée d'argent; il est jaunâtre vers l'extrémité, avec une bande brune, large, & pareillement bordée d'argent.

Le dessous des secondes ailes est cendré, avec trois bandes rousses bordées d'argent, & dont la troisième interrompue : il a en outre le bord postérieur jaune, avec une bande argentée.

Des Indes.

(*Traduction de Fabricius.*)

234—235. Nymphale Héraclite.

Nymphalis Heraclitus.

Nym. alis dentatis, atris : anticis maculâ fulvâ, posticis cœruleâ : subtùs posticis strigis flavis punctisque cœruleis. Fab.

Hesperia R. *Heraclitus.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 291. *n°.* 112.

Papilio Heraclitus. Jon. *Fig. pict.* 6. *tab.* 37. *fig.* 2.

Ses ailes sont très-noires. Les supérieures ont en dessus une grande tache fauve, transversale. Leur dessous offre un point & une tache fauves, plus deux lignes jaunes, dont une à la base, l'autre à l'extrémité. Le dessus des ailes inférieures a une grande tache bleue sur le disque. Le dessous a cinq lignes noires, transversales, dont l'antérieure commune aux ailes de devant, la seconde & la troisième se réunissant en arrière, la quatrième courte, la cinquième arquée : entre la troisième & la quatrième il y a quatre points bleus, sans compter trois points semblables placés vers l'angle de l'anus.

De l'Amérique méridionale.

(*Traduction de Fabricius.*)

235—236. Nymphale Ischaris.

Nymphalis Ischaris.

Nym. alis integris, suprà fusco-nigris : anticis maculâ disci niveâ apiceque chermesino : omnibus subtùs chermesinis, maculis argenteo-cœruleis nigrisque.

Elle a un peu plus d'un pouce & demi d'envergure. Le dessus de ses ailes est d'un noir-brun chatoyant, avec toute l'extrémité des supérieures, & une liture marginale au sommet des inférieures, d'un rouge-carmin.

Le dessous est d'un rouge-carmin, avec une multitude de taches d'un bleu-argenté, entremêlées de taches noires, & éparses depuis la base jusqu'au-delà du disque. Les ailes supérieures offrent en face du sommet un grand espace fauve, absolument nu. Les inférieures ont l'extrémité noire, avec trois lignes arquées, dont l'antérieure d'un bleu-argenté, l'intermédiaire d'un jaune-d'ocre, la postérieure rouge vers l'angle externe, & jaune vers l'angle interne : outre cela, les taches qui précèdent la ligne antérieure sont bordées en arrière de jaune-orangé. Le corps est brun en dessus, jaunâtre en dessous.

Décrite d'après un individu recueilli dans les Indes orientales par MM. Diard & Duvaucel, voyageurs du Gouvernement.

GENRE EUMÉNIE. *Eumenia.*

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Palpes inférieurs alongés, simplement garnis d'écailles, ayant le premier et le troisième articles, mais surtout le premier, sensiblement plus courts que le deuxième. Cellule discoïdale des secondes ailes fermée en arrière comme dans le genre Eurybie.

Nota. Ce nouveau genre doit être placé entre les pages 459 & 460 de ce volume.

1. Euménie Toxéa.

Eumenia Toxea.

Eum. alis rotundatis, integris, suprà ardosiaceis, limbo nigro : subtùs fuscis; anticis immaculatis, posticis apice strigis tribus è punctis inauratо-viridibus maculâque marginis interni aurantiâ.

Elle a de deux pouces à deux pouces & un quart d'envergure. Le dessus des ailes est d'un bleu-ardoisé-chatoyant, avec le limbe postérieur noir, & chargé aux inférieures d'une série de points d'un vert-doré. La frange est en outre totalement blanche.

Le dessous est d'un brun-noirâtre, sans aucune tache aux ailes supérieures, avec trois rangées transverses de points d'un vert-doré à l'extrémité des inférieures. Ces points sont placés sur un fond plus intense que tout le reste de la surface, & il y a vers le milieu du bord interne une tache orangée. Le corps est ardoisé en dessus; d'un brun-noirâtre en dessous, avec les trois quarts postérieurs du ventre orangés. Les antennes manquoient aux trois individus d'après lesquels nous faisons la présente description.

Chez la femelle, le bleu du dessus des ailes a moins d'étendue, principalement aux inférieures.

De l'intérieur de l'Amérique méridionale.

GENRE SATYRE.

109—110. Satyre Anthé.

Satyrus Anthe.

Sat. alis dentatis, suprà fuscis, nitidis, fusciâ albâ : anticarum maculari ocellis duobus haud pupillatis; posticis ocello utrinquè cæco.

Hipparchia Anthe, *alis dentatis, fuscis, fusciâ albâ, anticarum interruptâ ocellis duobus cæcis : posticis subtùs cinereo fuscoque marmoratis, ocello utrinquè unico.* Oschsen. *Pap. Eur. edit.* 2. *tom.* 4. *p.* 131. *n°.* 4.

Papilio Perſephone. Hubn. *Pap. tab.* 140. *fig.* 710. 711. (Mas.) — *tab.* 115. *fig.* 589. 590. (Fœm.)

Ainſi que nous l'avons dit à la page 515, ce ſatyre ſe rapproche extrêmement de la femelle du *Briſéis ;* mais les yeux de ſes ailes ſupérieures ſont toujours ſans prunelle, & ſes ailes inférieures ont de part & d'autre un œil également dépourvu de prunelle : outre cela, il offre en deſſous des différences qui conſiſtent en ce que le double ſigne noir du milieu de la côte des premières ailes & les trois bandes blanchâtres des ſecondes ailes ſont beaucoup plus étroits. La femelle ne diffère d'ailleurs eſſentiellement du mâle que par la grandeur.

Il habite la Ruſſie orientale.

111—112. Satyre Néomiris.

Satyrus Neomiris.

Sat. alis ſubdentatis, ſuprà ſuſcis, faſciâ fulvâ : anticarum maculari ocello unico ſeu duobus : poſticis ſubtùs fuſco cinereoque marmoratis, faſciâ albâ intùs emarginatâ. (Mas.)

Satyre Néomiris. God. *Hiſt. nat. des lépid. de France, tom. 2. p. 88. pl. XI. fig. 1. 2.*

Satyre Néomiris. God. *Tab. méthod. des lépid. de France,* Diurnes, *p. 19. n°. 32.*

Nous n'avons vu que le mâle de ce ſatyre. Il a de vingt à vingt-deux lignes d'envergure. Le deſſus des ailes eſt d'un brun-noirâtre, avec une bande fauve, parallèle au bord poſtérieur. La bande des premières ailes eſt maculaire, oblitérée antérieurement, & marquée vis-à-vis du ſommet d'un petit œil noir à prunelle blanche. La bande des ſecondes ailes eſt courbe, large, & elle a le côté interne carrément échancré dans ſon milieu.

Le deſſous des premières ailes diffère du deſſus en ce que la bande fauve eſt continue & tiquetée de blanc à ſon extrémité ſupérieure.

Le deſſous des ſecondes ailes eſt marbré de brun & de cendré, & traverſé dans ſon milieu par une bande blanche, ayant le côté interne échancré, le côté externe ſuivi d'une rangée de points blanchâtres, derrière laquelle il y a une ligne noire anguleuſe. Les antennes ſont brunes en deſſus, pâles en deſſous, & terminées par une maſſue en cuilleron.

Quelquefois la bande du deſſus des ailes ſupérieures offre un ſecond œil, & l'on en voit auſſi un près de l'angle anal des inférieures.

De la Corſe ; communiqué par M. Lefebure de Cériſy.

GENRE ÉRYCINE.

5 (*duplicata*). Erycine Curius.

Erycina Curius.

Eryc. alis ſubconcoloribus, nigris, faſciâ communi glaucâ : anticis antè apicem hyalinis.

Papilio E. A. Curius, *alis caudatis, concoloribus, atris : anticis faſciis duabus hyalinis, poſticis unicâ albâ.* Fab. *Mant. Inſ. tom. 2. p. 9. n°. 71. — Ent. Syſt. em. tom. 3. pars 1. p. 28. n°. 81.*

Papilio Curius. Donov. *Gen. Illuſt. of Entom. an Epit. of the Nat. Hiſt. Inſ. of Ind. cah. 4. pl. 4. fig. 4.*

Par la forme de la tête, cette eſpèce ſembleroit appartenir au genre Papillon (*Equites,* Linn.) ; mais, d'après la ſtructure de la cellule diſcoïdale de ſes ailes inférieures, elle doit être miſe dans la diviſion des *Chenilles cloportes,* où elle conſtituera probablement un genre, lorſqu'on aura acquis des notions ſur ſes deux premiers états. En attendant, nous la laiſſons parmi les *Erycines ;* mais nous la décrivons de nouveau ici, attendu que nous ne l'avions fait connoître que par la traduction du texte de Fabricius.

Elle a de dix-huit à vingt lignes d'envergure. Le deſſus des ailes eſt noir, avec une bande d'un vert-blanchâtre, deſcendant de la côte des ſupérieures au diſque des inférieures, où elle ſe termine en pointe. Les premières ailes ont entre le milieu & le bord terminal un eſpace diaphane, grand, en forme de triangle curviligne & coupé par des nervures noires. Les ſecondes ailes ſont brièvement dentées, liſerées de blanc à leur bord poſtérieur ainſi qu'au côté interne de la queue, laquelle eſt entièrement ſaupoudrée de gris.

Le deſſous reſſemble au deſſus, excepté que les ailes inférieures ont vers le bas du bord abdominal trois chevrons blanchâtres, tranſverſes & ſucceſſifs. — Le corps eſt noir en deſſus, blanchâtre en deſſous, avec une double rangée latérale de points noirâtres. Les antennes ſont noires, avec le deſſous de la maſſue rouſſâtre.

Nous n'avons vu que des individus femelles.

De l'île de Java & du royaume de Siam.

10—11. Erycine ? Amyntor.

Erycina ? Amyntor.

Eryc. alis dentato-caudatis, atris, baſi maculâ fulvâ, apice faſciâ flavâ. Fab.

Papilio Cœcilia. Cram. *pl. 159. fig. D. E.*

Elle a environ un pouce & demi d'envergure. Les quatre ailes ſont d'un noir-foncé, avec une grande tache fauve à la baſe, & une bande jaune tranſverſe à l'extrémité. La bande des premières ailes eſt plus large que celle des ſecondes.

Le deſſous reſſemble au deſſus, mais le bord poſtérieur des ſecondes ailes offre derrière la bande jaune une ſérie de petites taches blanches, lunulées.

De l'Inde, selon Fabricius; du Bengale, selon Cramer.

Nota. Le papillon *Dorinne*, pl. 376, fig. G, H, de Cramer, n'en seroit-il pas la femelle ou une variété? Il n'en diffère en dessus que par l'absence de la bande jaune des ailes inférieures. On le trouve à Surinam.

11—12. Erycine? Coriolan.

Erycina? Coriolanus.

Eryc. alis dentatis, caudatis, obscurè cinereis, strigâ communi ferrugineâ. Fab.

Hesperia R. *Coriolanus.* Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 284. *n°.* 91.

Papilio Coriolanus. Jon. *Fig. pict.* 6. *tab.* 48. *fig.* 1.

Elle est grande. Les ailes sont grises, avec une ligne commune sur le milieu des quatre, & une liture à l'extrémité des inférieures, ferrugineuses. Le dessous ressemble au dessus, mais les ailes inférieures ont quatre points noirs, marqués de blanc.

Des Indes.

(*Traduction de Fabricius.*)

13—14. Erycine? Plaute.

Erycina? Plautus.

Eryc. alis dentatis, fuscis, suprà immaculatis: subtùs lineolis atris albisque. Fab.

Hesperia R. *Plautus.* Fab. *Entom. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *pag.* 291. *n°.* 113.

Hesperia Plautus. Jon. *Fig. pict.* 6. *tab.* 44. *fig.* 1.

Elle est de moyenne taille. Le dessus de ses ailes est d'un brun-noirâtre, sans taches. Leur dessous est obscur: celui des supérieures offre à la base deux traits noirs, sur le milieu & vers l'extrémité une ligne maculaire noire & blanche, & à l'extrémité même des lignes blanches. Le dessous des secondes ailes a six lignes noires, transverses & interrompues, dont la seconde & la quatrième bordées de blanc sur un de leurs côtés. Ces dernières ailes ont des dents aiguës.

Des Indes.

(*Traduction de Fabricius.*)

GENRE MYRINE.

6. Myrine? Phocides.

Myrina? Phocides.

Myr. alis caudatis, suprà fuscis: posticis albis, punctis duobus nigris. Fab.

Hesperia R. *Phocides.* Fab. *Entom. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 282. *n°.* 85.

Papilio Phocides. Jon. *Fig. pict.* 6. *tab.* 12. *fig.* 2.

Elle est de la taille de l'*Atymnus*. Le dessus des ailes est d'un brun-obscur, avec l'extrémité des inférieures blanche & marquée de deux points noirs opposés. La queue de ces dernières ailes est longue, ciliée, blanche.

Le dessous des ailes supérieures est alternativement taché de blanc & de rouge-brique. Le dessous des ailes inférieures est blanc, avec des points & des lignes d'un brun-obscur, & deux taches anales noires.

De Sierra-Léone en Afrique.

(*Traduction de Fabricius.*)

FIN DU TOME NEUVIÈME.